





Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

72'3.7.

re

12
17
C
2-d



SANCTORII
SANCTORII
IVSTINOPOLITANI.

Olim in Patauino Gymnasio Medicinæ Theoricam Ordinariam

3. *Phil. Soc. Col.* primo loco profitentis. *Rom. Soc. Stud.*

METHODI VITANDORVM

Errorum omnium, qui in Arte Medica contingunt

LIBRI QVINDECIM,

Quorum principia sunt ab auctoritate Medicorum, & Philosophorum
Principum desumpta, eaque omnia experimentis,
& rationibus analyticis comprobata.

CVM TRIPLICI INDICE VNO LIBRORVM,


Altero Caputum omnium, Tertio Rerum notabilium.



VENETIIS, M. DC. LX:

Apud Franciscum Brogiollum.

SVPERIORVM PERMISSV, ET PRIVILEGIIS.




SAVING THE
SAVING THE
SAVING THE

SAVING THE


SAVING THE



SAVING THE



INDEX LIBRORVM.

- I.  **I**BER est de Methodis, quibus omnium mor-
borum formæ inquiri possint, Castigan-
turque Empiricorum errata.
- II. De affectuum Idiopathia, & Sympathia,
& de erroribus rudiorum pertinentibus
ad hanc contemplationem.
- III. De ratione inueniendi specificas affe-
ctuum differentias,
- IV. De metiendis morborum Ideis, agitur de consuetudine.
- V. De modo cognoscendi peccantes humores per signa pro-
pria.
- VI. De Syndrome signorum qua peccantes humores occulti in-
quiruntur.
- VII. De humorum misturis plenè agitur.
- VIII. De principijs reconditarum qualitatum.
- IX. De via cognoscendi quantitatem peccantium humorum.
- X. De pertinentibus ad motum localem humorum.
- XI. De primis principijs Methodi medendi.
- XII. De Analogismo, & experientia.
- XIII. De recta administratione remediorum.
- XIV. De Reuulsione, & deriuatione.
- XV. De indicantium æquilibrio.



I N D E X

C A P I T V M.

Capita primi libri de affectuum ideis
perquirendis.

- Cap. 1. **P**ROHEMIVM
operis.
- Cap. 2. De partitione totius operis.
- Cap. 3. Ostenditur, quod ad quatuor capita omnes errores, qui fieri possunt in scrutandis affectuum ideis reducuntur.
- Cap. 4. De suprema omnium morborum diuisione.
- Cap. 5. De symptomatum omnium diuisione breuissima.
- Cap. 6. De Methodo qua symptomata primi, & secundi ordinis reducuntur ad vnum, quod est in facto esse.
- Cap. 7. Ostenditur virtute logica, quod per viam diuisionem a generalissimis usque ad specifica progrediendo non possit inueniri occultus affectus.
- Cap. 8. Ostenditur, quod signa propria affectuum prater naturam a quinque sentibus tantum possint exhauriri.
- Cap. 9. Ostenditur, quod signa communia, que faciunt exaltam syndromem a sex fontibus solum colligantur, agiturque de primo fonte.
- Cap. 10. Quomodo per viscerum dispositionem precedentem ducamur ad cognoscendos affectus internos.
- Cap. 11. Qua Methodo ducamur ad cognoscendos locos affectos.
- Cap. 12. Quomodo cognoscatur Veterinus affectus per syndromem signorum a sex fontibus collectam.
- Cap. 13. Quomodo eadem syndrome cognoscatur empyema.

- Cap. 14. Quomodo per syndromem popositam cognoscatur peripneumonia.
- Cap. 15. Quomodo eadem syndrome noscatur phthisis.
- Cap. 16. Quomodo eadem syndrome noscatur tumor ventriculi a flatu.
- Cap. 17. Quomodo proposita syndrome noscatur vlcus ventriculi.
- Cap. 18. Quomodo dicta syndrome noscatur vlcus renum.
- Cap. 19. Quomodo dicta syndrome noscatur vlcus iecoris.
- Cap. 20. Quomodo per syndromem noscatur calculus vesicae.
- Cap. 21. Agitur de communissimo empiricorum errore dum causam generationis morborum referunt ad causam precatartificas, & non ad prauam viscerum dispositionem.
- Cap. 22. Agitur de illo errore Rudiorum dum omnes affectuum ideas appellant intemperies.
- Cap. 23. Agitur de illo errore dum putant abscessum mesenterij esse vlcus intestinorum, & deratione cognoscendi abscessus mesenterij.
- Cap. 24. Agitur de errore dum putant inflammationem iecoris esse pleuritidem.
- Cap. 25. Agitur de errore dum colligunt ex sanguine spumoso secundum omnes partes per tusum eiecto in pulmone esse vlcus.
- Cap. 26. Agitur de errore illorum, qui dicunt catarrhum esse semper vitium capitis.
- Cap. 27. Agitur de illo errore dum dicunt catarrhum semper pendere a secunda collione lesa.

Cap.

INDEX CAPITVM.

- Cap. 28. Agitur de illo errore dum dicunt
pregnantem ex urinis cognosci.
Cap. 29. Agitur de illo errore dū dicūt ex
menſib ſuppreſſis pregnantem cognosci.
Cap. 30. Agitur de impoſtura obſteiri-
cum dicentium pregnantis, digitis tan-
gentibus vterum cognosci.
Cap. 31. Agitur de illo errore dum dicunt
conceptum noſci ſi poſt canam epoto hy-
dromelle ſequantur tormina.
Cap. 32. Quomodo per ſyndromem noſca-
tur conceptus occultus.
Cap. 33. Quomodo ex ſignis non neceſſa-
rio conſequentibus conceptum pregnantis
cognoscatur.

Capita Secundi Libri de affectuum idio- pathia, & ſympathia.

- Cap. 1. **Q**uod quelibet corporis pars
modo per eſſentiam, modo
per conſenſum affici poſſit.
Cap. 2. De diuiſione propriorum affectio-
num in affectus per eſſentiam, & per
conſenſum.
Cap. 3. Methodus breuiſſima qua in co-
gnitionem affectuum principalium, pro-
priorum, & per conſenſum ducimur.
Cap. 4. De diuiſione ſympathia in ſuas
differentias.
Cap. 5. Quod errent, qui dicunt ventricu-
lum frigere ſi ob ſecoris aſtum, ſicut dū
lumen maius extinguere ſolet minus.
Cap. 6. Quod malè agant, qui applicant
calida ventriculo rugitibus pleno laſo
ob caliditatem ſecoris in quo exemplo
obſeruantur affectuum protopathia idio-
pathia, & ſympathia.
Cap. 7. Exemplum pro declaratione ſym-
pathia generis, & vicinitatis.
Cap. 8. Oſtenditur nullā eſſe ſympathia
inter meſenterium, & muſculos rectos.
Cap. 9. Noſtri corporis varia archana à
ſympathia generis pèdencia declarantur.
Cap. 10. De ſympathia inter labia, & la-
tum muſculum in collo poſitum.
Cap. 11. De ſympathia inter labia, & ter-
tium par nernorum cerebri, & tertiam
vertebram ceruicis.
Cap. 12. De ſympathia inter bregma, &
maxillam inferiorem.
Cap. 13. De ſympathia inter maxillam in-
feriorem, & muſculum temporalem.

- Cap. 14. Declaratur erratum empiricorū
dum ſemper inungunt maxillam infe-
riorem ſi os non poteſt aperiri.
Cap. 15. De ſympathia inter brachia, &
pectus.
Cap. 16. De ſympathia inter os ſacrum,
& brachia.
Cap. 17. De ſympathia inter quintam
vertebram thoracis, & collum.
Cap. 18. De ſympathia inter muſculos
veneris, & teſticulos.
Cap. 19. De ſympathia inter ſternon, &
pubem.
Cap. 20. De ſympathia inter os ſacrum,
collum, pectus, brachia, & manus.
Cap. 21. De alia ſympathia inter cerui-
cem, & quintam vertebram thoracis.
Cap. 22. De ſympathia inter ſeptimam
thoracis vertebram, & ceruicem.
Cap. 23. De ſympathia inter os ſacrum,
& ceruicem.
Cap. 24. De ſympathia inter cubitum ſca-
pulam, & collum.
Cap. 25. De ſympathia inter ſecundo ar-
ticulos digitorum manus, & humerum.
Cap. 26. De ſympathia inter tertium arti-
culum quatuor digitorum, & internum
articulum cubiti.
Cap. 27. De ſympathia inter externum
humeri tuberculum, & quatuor digitos
pollice excepto.
Cap. 28. De ſympathia inter indicem, &
cubitum.
Cap. 29. De ſympathia inter tertium arti-
culum pollicis, & cubitum.
Cap. 30. De ſympathia inter brachiale,
& externum humeri tuberculum.
Cap. 31. De ſympathia inter brachiale, &
humerum.
Cap. 32. De ſympat. inter ilia, & tibia.
Cap. 33. De ſympathia inter pubem, &
tibia.
Cap. 34. De ſympathia inter vertebraſ
ultimas lumborum, & primas offiſ ſa-
cri, & tibia.
Cap. 35. De ſympathia inter coxendi-
cem, & tibia.
Cap. 36. De ſympathia inter mediam ap-
pendicem iliū, & tibia.
Cap. 37. De ſympathia inter partem po-
ſteriorem iliū, & tibia.
Cap. 38. De ſympathia inter femur, &
os ſacrum.

Cap. 39. De sympathia inter femur, & undecimam, & duodecimam vertebra thoracis.

Cap. 40. De sympathia inter appendicem fibulæ, & calcaneum.

Cap. 41. De sympathia inter calcem, & externum caput femoris, & os sacrum.

Cap. 42. De sympathia inter digitos, & tibiam.

Cap. 43. De sympathia inter tibiam, & tertia internodia quatuor digitorum, & secundum pollicis.

Capita tertij libri de modo inueniendi
specificas affectuum
differentias.

Cap. 1. **Q**uod specificæ affectuum differentie oriuntur à decem differentiis partium nostri corporis.

Cap. 2. ostenditur inductione, morbos constitui in esse specifico à differentiis partium nostri corporis specificis.

Cap. 3. Ostenditur, ubi agendum colligi modo ex partium situ, & meatu, moao ex progressu, & exordio.

Cap. 4. Quomodo colligi, modo ex par. figura, & substantia, & compositione, modo ex numero, & officio partium.

Cap. 5. Ostenditur errare, qui dicunt situm pylori esse in ventriculi fundo.

Cap. 6. Ostenditur errare, qui putant situm oris ventriculi esse sub mucronata cartilagine.

Cap. 7. Ostenditur errare, qui dicunt causas adequatas lithiasis esse materiam crassam, & calorem renum.

Cap. 8. Ostenditur errare, Galenum dicentem in renibus esse cribrum.

Cap. 9. Ostenditur errare, qui dicunt trachilos, & balbos ab intemperie humidæ capitis prodire.

Cap. 10. Declarantur errata, que contingere solent in temperatura perquirèda.

Cap. 11. Declarantur errata, que contingunt ob partium corporis substantiam ignoratam.

Cap. 12. Declarantur errata, que contingunt ob progressum vasorum ignoratum.

Cap. 13. Exempla errorum ob numerum partium corporis ignoratum.

Cap. 14. Exempla errorum ob compositio-

nem, & el connexum ignoratum.

Cap. 15. Exempla errorum ob exordium vasorum ignoratum.

Cap. 16. Ostenditur, quod errent, qui dicunt venas cubiti dextri melius euacuare hepar, quàm sinistri.

Cap. 17. Ostenditur errare Vesalius dicentem in omni pleuritis de esse à dextro & non à sinistro brachio sanguinem euacuandum.

Cap. 18. Proponuntur errata adscripta Galeno ob situm, & meatum partium corporis ignoratos.

Cap. 19. Proponuntur errata Galeno adscripta in his, que pertinent ad figuram, & progressum part. humani corporis.

Cap. 20. Proponuntur errata adscripta in his que pertinent ad numerum partium corporis.

Cap. 21. Proponuntur errata Galeno adscripta in pertinentibus ad substantiam compositionem officium, & exordium part. nostri corporis.

Capita quarti libri de metiendis morbo-
rum idcis.

Cap. 1. **O**stenditur esse metiendos recessus morbosicos à statu salubri aacueritio, & non à primitio.

Cap. 2. Ostenditur posse mutari sine morbi introductione temperaturam meatuum suam, & figuram partium: reliqua vero non mutari.

Cap. 3. Habet latitudinem venarum, ergo secur calidum, ostenditur consequentiam esse nullam.

Cap. 4. Ostenditur aduentitium statum, solum acquiri per consuetudinem se & rerum non naturalium.

Cap. 5. Ostenditur à longa consuetudine mutari omnes facultates viuentis.

Cap. 6. Agitur de consuetudine ex Galeni sententia, & agenda in hoc libro proponuntur.

Cap. 7. Ostenditur consuetudinem non posse conuerti in naturam, & argumenta in contrarium adducta soluntur.

Cap. 8. De consuetudinis definitione, eiusque declaratione.

Cap. 9. Vi errant, qui volunt malam consuetudinem statim amittere.

Cap. 10. *Vi errant, qui vetustam, & deterrimam consuetudinem senum, & debiliū hominū volūti amouere.*

Cap. 11. *Vi non vident vitiosas, sed vitiosas consuetudines agrorum, vel robustorum indicare sui conseruationem, & in sanitate ablationem.*

Cap. 12. *Ostenditur assuetum plurimis rebus minus lēdi à contrarijs.*

Cap. 13. *Errant dum dant agrotantibus alterantia, eaque non mutant.*

Cap. 14. *Vi errant, qui introducunt consuetudinem sumendi medicamenta soluentia, & alterantia.*

Capita quinti libri de perquirendis humoribus per propria signa.

PRÆFATIO LOGICA.

Cap. 1. *Quibus methodis sit incedendum in occultis humoribus vitiosis perquirendis.*

Cap. 2. *Ostenditur quomodo sapores proprii indicent humores peccantes.*

Cap. 3. *Ostenditur quomodo colores indicent prædominantes humores.*

Cap. 4. *Ostenditur periodos, & motū morbi proprii indicare peccantes humores.*

Cap. 5. *Agitur de periodorum causis.*

Cap. 6. *Ostenditur errare, qui ex urina humorum prædominium, & eorum collationes necessario colligunt.*

Cap. 7. *Ostenditur errare, qui ex pulsu humorum prædominium, & eorum collationes seu cruditates colligunt.*

Cap. 8. *Ostenditur errare, qui ex antepositione, & postpositione paroxysmorum humores peccantes, & eorum collationes seu cruditates colligunt.*

Cap. 9. *Ostenditur errare, qui ex colore insensu rubro faciei colligunt sanguinis dominium.*

Cap. 10. *Ostenditur errare Oribasium, & Montanum, dum à caloribus humbricorum dominium peccantium humorū colligunt.*

Cap. 11. *Ostenditur errare qui reiciunt Oribasium, & Montanum dicentes ex bile, & melancholia gigni posse lumbiicos.*

Cap. 12. *Vi errant qui ex lingua agrotantium colligunt peccantes humores.*

Capita sexti libri de perquirendis humoribus signorum syndromem.

Cap. 1. *Declaratur methodus præstantissima, quæ per syndromem aperit latentes humores.*

Cap. 2. *Quomodo omnes differentie bilis per syndromen signorum à sex rebus non naturalibus desumptam cognoscantur.*

Cap. 3. *Quomodo biles noscantur per signa desumpta à dispositione patientis, & à morbis.*

Cap. 4. *Vi biles noscantur per signa desumpta à symptomatis, locis affectis, & iuuantibus, & lædentibus.*

Cap. 5. *Quomodo pituita omnes cognoscantur per syndromem signorum desumptam à sex rebus non naturalibus.*

Cap. 6. *Vi pituita noscantur per signa desumpta à dispositione patientis, & à morbis.*

Cap. 7. *Quomodo pituita noscantur per signa desumpta à symptomatis, locis affectis, & iuuantibus, & lædentibus.*

Cap. 8. *Quomodo omnes melancholia noscantur per signa desumpta à sex rebus non naturalibus.*

Cap. 9. *Vi omnes melancholia noscantur per signa desumpta à dispositione patientis, & à morbis.*

Cap. 10. *Vi melancholici succi præcognoscantur per signa desumpta à symptomatis, locis affectis, & iuuantibus, & lædentibus.*

Cap. 11. *Quomodo status noscantur per syndromem signorum communium à sex rebus non naturalibus à dispositione corporis.*

Cap. 12. *Vi status innotescant per syndromen signorum desumptam à morbis, symptomatis, locis affectis, & à iuuantibus, & lædentibus.*

Cap. 13. *De polyamia perquirenda per syndromem signorum communium.*

Cap. 14. *Vi ex dispositione corporis, & morbis symptomatis, locis affectis, & iuuantibus, & lædentibus polyamia noscitur.*

Capita septimi libri de misturis humorum perquirendis.

Cap. 1. *Ostenditur, quod omnes humores peccantes misceantur.*

INDEX CAPITVM.

- Cap. 2. *Quomodo cognoscitur quando falsedo in pituita sit per misturam intus factam, & quando per musturam humoris aliunde venientis.*
- Cap. 3. *Qua via noscitur quando humores sunt dulces ob misturam intus factam, & quando ob misturam humoris aliunde venientis.*
- Cap. 4. *Qua via noscatur quando humores sunt acidi per se, & quando ob mixture acidi humoris aliunde venientis.*
- Cap. 5. *Ut cognoscitur quando ponticus sapor indicat humorum misturam intus factam, & quando ab humore aliunde veniente.*
- Cap. 6. *Ostenditur vitellinum colorem esse simplicem, & non mistum.*
- Cap. 7. *Quorum humorum misturam indices porræcus color.*
- Cap. 8. *Quod albus humorum color indicet modo calidos, modo frigidos, & mistos humores.*
- Cap. 9. *Ostenditur ex peccantibus humoribus traditis fieri misturas possibiliæ 80084.*

Capitalibri octauide initijs reconditarum qualitatuum.

- Cap. 1. **Q**uid intelligant auctores per qualitates manifestas: & cur aliqui introduxerint qualitates occultas seu substantias operantes.
- Cap. 2. *Qua via morborum inuouatores possint conuinci.*
- Cap. 3. *Potiora argumenta ab altiori schola desumpta, quæ ostendere videntur quod omnes potentia agendi sint in substantiæ cathegoria.*
- Cap. 4. *Argumenta potissima, quibus ostendi potest, potentias omnes genere differre a substantia.*
- Cap. 5. *Soluuntur argumenta in contrarium adducta.*
- Cap. 6. *Galenî auctoritatibus, rationibus, & experimentis ostenditur, qualitates occultas non à substantia, sed à multis manifestis prodire.*
- Cap. 7. *Quæ sint reconditarum qualitarum differentie, & à quo subiecto communissimo prodeant.*
- Cap. 8. *Responsio ad duas difficultates, quæ ex dictis exurgunt.*
- Cap. 9. *Quomodo Galenî fundamenta sa-*

ueant sententia nostra.

- Cap. 10. *Experimentis confirmatur, quod dari possint potentia, seu virtutes operatrices, quæ non oriuntur à quattuor vocatis primis qualitatibus.*
- Cap. 11. *Experimentis ostenditur, quod qui putant, quantitates occultas esse substantias operantes faciles sint ad credendum vanissima.*
- Cap. 12. *Ostenditur, venenatos non cognosci ex veneni definitione, sed ex syndrome signorum communium à sex fontibus desumpta.*
- Cap. 13. *Ostenditur, quod putredo febrium sit, quam philosophus vocat simpliciter, & non secundum partem, & quod omnia auxilia pro putredine auferenda sint præseruatoria, & non curatoria.*
- Cap. 14. *Reuocatur argumentum nonnullorum ostendentium putredinem insignem esse venenum.*
- Cap. 15. *A quibus humoribus, & causis fiat pus.*

Capita Noni Libri, de quantitate peccantium humorum.

- Cap. 1. **Q**uomodo per syndromen signorum quantitas humorum cognoscatur.
- Cap. 2. *Declaratur alia methodus, qua perquiri possit quantitas peccantium humorum.*

Capita Decimi Libri, de motu locali peccantium humorum.

- Cap. 1. **O**stenditur, quod humores non moueantur ex se, & proprio impetu, sed ab alio.
- Cap. 2. *Quod sex sint modi, & non plures, quibus pars mittens sit fluxionis origo.*
- Cap. 3. *In fluxionibus curandis in quor præcipua errata incidant empirici.*

Capita Vndecimi Libri, de principiis methodi medendi.

- Cap. 1. **P**rohemium: de scilicet etiam agitur.
- Cap. 2. *Ostenditur ex Aristotele, & Galeno in Methodo per solam indicationem perquiri posse remedia, & ne-*

INDEX CAPITVM.

quaquam per experientiam, & per analogismum.

Cap. 3. Referuntur attributa indicationis, & logica virtute detegitur erratum illorum, qui morbos in causas diuidunt.

Cap. 4. Vnde in logica desumatur, quod à generaliss., vel subalterno genere affectus præter naturam non indicetur curatio.

Cap. 5. Vnde sit, quod à singularibus non hauriantur indicationes, sed solum ab affectu specifico.

Cap. 6. Vnde sit, quod indicans vnū indicet.

Cap. 7. A quibus analyticis rationib. pendeat, quod indicans debeat esse notius iudicato.

Cap. 8. A quibus rationib. analyticis pendeat hæc indicantis conditio, quod indicans debeat esse præsens.

Cap. 9. Ostenditur, quod indicans non sit externum, sed sit illud, quod curatur.

Cap. 10. Quomodo alioribus principiis probeatur, symptomata non indicare.

Cap. 11. Quibus logicis principiis probeatur, locum affectum in methodo curatrice non indicare.

Cap. 12. Vnde sit, quod quid agendum debeat necessitudo desumi ab essentia specifica indicantis.

Cap. 13. Ut errant, qui plura tribus indicantia faciunt.

Capita Duodecimi Libri de analogismis, & experimentis.

Cap. 1. Vid sit analogismus empiricorum, & quomodo formetur.

Cap. 2. Ostenditur, quod analogismus ratione forme sit paralogismus.

Cap. 3. Ostenditur, quod analogismus ratione materie sit paralogismus.

Cap. 4. Quid sit analogismus dogmaticorum, & quomodo formetur.

Cap. 5. Ut colligitur à Medicina fundamentis, quod experientia sit fallax.

Cap. 6. Ostenditur ex analyticis principiis, quod experientia sit fallax, & periculosa.

Capita Decim tertij Libri, de administrandis remedijs.

Cap. 1. Ostenditur, quod omnia errata, que committuntur in

administrandis remedijs ad tria capita reducuntur.

Cap. 2. De erratis empiricorum circa quantum diminutum.

Cap. 3. Errata empiricorum circa Quādo.

Cap. 4. De erratis circa Quomodo.

Cap. 5. De erratis circa vbi agendum.

Cap. 6. Ut errant, dum in lienis affectibus putant, quod vbi agendum sit vena saluatella.

Cap. 7. Proponuntur octo sophistica argumenta, quibus nonnulli probant, quod semper ad cutim debeant attrahi humores maligni vesicantium auxilio.

Cap. 8. Ostenditur, quod argumenta superius allata pro vesicantium defensione sint paralogismi.

Cap. 9. Reijciuntur quoque argumenta illorum qui nunquam admittunt, vesicantia in malignis febribus habere locum.

Cap. 10. Ostenditur, quod maligni, & turgescentes humores possint aliquando vesicantium auxilio transponi ad cutim.

Capita Decimiquarti Libri de reuulsione, & deriuatione.

Cap. 1. Ostenditur, quomodo variæ sint opiniones auctorum in his, que pertinent ad reuulsionem.

Cap. 2. Reijciuntur quedam definitio reuulsionis, & ostenditur, quod reuulsio non sit attractio.

Cap. 3. Ostenditur, quod reuulsio non solum conuenire possit humoribus fluentibus, verum etiam fluxui, & fluxui.

Cap. 4. Quæ sit causa efficiens reuulsionis.

Cap. 5. Quomodo sanguis à sella recta egrediatur.

Cap. 7. Ostenditur, quod euacuatio per distansissima non sit conditio reuulsionis propria, & per se, sed per accedens.

Cap. 7. Diluuntur aduersariorum fundamenta, & apertius manifestatur, quod de ratione reuulsionis non sit, ut per distansissima fiat.

Cap. 8. Exemplo ischiadis declaratur, quando auxilia reuulsoria debeant applicari remeioribus, & quando proximioribus partibus.

Cap. 9. Quid per reuulsionem seruandam in reuulsione intelligi debeat.

Cap. 10. Diluuntur rationes aduersariorum

INDEX CAPITVM.

- dum probat per rectitudinē esse intelligenda longitudinem sursum, & deorsū.
- Cap. 11. Declaratur, quid intelligi debeat per vasa communia.
- Cap. 12. Ostenditur, quod retractione humorum ad fluxionis originem non conueniat per se reuulsioni.
- Cap. 13. Ut errant, qui dicunt sursum, & deorsum dextrum, & sinistrum reuulsioni, ante, retro, intus, & foris deriuationi conuenire.
- Cap. 14. Monardi, & Curtii opinio improbat, dum dicunt phlebotomiam non posse esse remedium mixtum, reuulsorium scilicet, & deriuatorium.
- Capita libri decimiquinti de indicantium æquilibrio.
- Cap. 1. **O**stenditur, quod medendi principium sit sumendum primo ab urgente, secundo a causa, tertio ab impedimento, & quarto a morbo.
- Cap. 2. Declaratur distinctius, cur primo ab urgentibus, secundo a causa, tertio ab impedimento, & quarto a morbo sumitur ordo curationis.
- Cap. 3. Ut vires totius corporis collapsæ possint recuperari.
- Cap. 4. Quomodo vires partium collapsæ possint recuperari.
- Cap. 5. De ordine, & potestate indicantium.
- Cap. 6. Ostenditur, quod quindecim sine indicantium comparationes, & quodnam sit illud indicans, quod in qualibet occasione magis possit.
- Cap. 7. Ostenditur, quod chirurgi illi sine a methodis, qui in omnibus vlceribus vtuntur exsiccantibus.
- Cap. 8. Ut errant, qui in suppurandis apostematibus vtuntur duris emplastris.
- Cap. 9. Illa errata reſciuntur, quæ fiunt dum rudiores prius causis, & morbis, quam urgentibus attendunt.
- Cap. 10. Casus in quibus empirici pluries faciunt morbum, quam impedimenta.
- Cap. 11. Errata illorum, qui prius indicantibus, quam prohibentibus potentioribus attendunt.
- Cap. 12. Ostenditur exemplo localium, quod qualibet sententia medicorum sit methodi censura moderanda.
- Cap. 13. An febribus cum alui fluxu conueniat pharmacum, vel phlebotomia.
- Cap. 14. Ostenditur, vanam, & medico indignam esse Archigenis opinionem, quod semper à lenioribus auxilijs sit exoranda morborum cura.



INDEX RERVM NOTABILIVM.

A

Acerbum, & austerum non differre specie, sed secundum magis, & minus. 300.
Acerba cur à potentissimo calore fiant dulcia. 295. cap. 3.
Acerba in superficie magis, austerà in profundo astringunt. 300. cap. 5.
Acetum cur frigidum, cur acre, cur tenuius par. cur astringens. 297. cap. 4.
Acet. sus. sapor unde prodeat. 24.
Acetum inuat, ergo bilis redundat est Galeni. ibid.
Acetum cur nihil aqua vita retineat. ibid.
Acetum ut fiat. ibid.
Acetum cur biliosis proficit. 251.
Acetum cur melancholicis sit inimicum. 274.
Acetum refrigerare probatur à Galeno evidentissimo experimento. 297.
Acetum ex Galeno est siccum in tertio gradu. 390. cap. 4.
Acetum cur sit frigidum. ibid.
Acetum à Galeno laudatur in febris. ibid.
Acetum esse frigidum ex Galeno, & Aristotele confirmatur. ibid.
Acetum habere frigiditatem violentiam. ibid.
Acida qualitas ut per se conveniat melancholica, & non pituita. ibid.
Acidam qualitatem convenire per accidens punita tribus modis. ibid.
Acida punita ex Galeno à frigiditate sit. 292.
Acidus sapor quomodo fiat ex Galeno. 297.
Accidens ut non est accidentis accidens. 363.
Accidentium cathena qua sit. 319.
Accidentia non pendere à substantia optimo noua. ibid.
Accidens ex Aristotele non est accidentis accidens. 320.
Actio laesa ut est radix omnium symptomatum. 10. cap. 6.
Actio per se leditur solum à facultate laesa, vel ab obiecto. 20.

Actio et enirix per se leditur ab intemperie humida. 20.
Actio expulsiua per se leditur ab intemperie calida, & sicca fibrarum transfusarum. 20.
Actio diminuta semper iudicat affectum frigidum. 21. 22.
Actio musculorum quanti sit in medicina. 164.
Actio ab iis, quae toto genere differunt, non sequitur. 359.
Adustionis gradus ex Galeno quot sunt. 21.
Aedema ut à flatuoso tumore differt. 279.
Aegrotus quidam leditur primo à dogmatico, & deinde ab empirico. 112.
Aegroti dum sanantur, ad statum adueniunt, & non primigenium debent educi. 167.
Aegroti citati ab Hippocrate, qui ob errorem in vitium pereunt qui. 438.
Aenobarbus rudis de saluatella loquens ut vacillat. 402.
Aenobarbus obreclator, ut male se gessit, dum ignorauit situm oris ventriculi. 133.
Aer ut iudicat extra methodum medendi. 363.
Affectus dum plures sunt à quo cura est incipienda. 60.
Affectus de loco affecto ut predicatur per se, & per accedens. 127.
Affectus ex Arist. 2. ethicorum duum generum sunt. 184.
Agens ex Aristotele non agit in contrarium sed in eius subiectum. 32.
Albertus Magnus unde est, quod teris falsa immiscet. 327.
Albertus Magnus cur praeter ceteris laudet septimum clima. 282. 283.
Alexander massaria instantiam quādam, quod magnitudo morbi nō indicet venesectionem, nunquam diluere potuit. 377.
Alexander Aphro. quomodo intelligit dum dicit qualitates esse formas elementorum. 322.
Aic-

Alexander Aphr. cur negat mathematicam esse philosophiam. 320.
Alex. Tralliani opinio an sit medicandum in alui fluxu. 462.
Alaaxen recte dici, quod colores sint luminia. 231.
Alimentum calidum ut per se generat calidos, & per accidens frigidos humores. 244.
Alimentum non in omnibus generat eundem succum. 284.
Allium comestum cur non exedat ventriculum. 248.
Allium coctum ex Galeno discutit flatus, & non mouet sitim. 280.
Aloe illota ut necat vermes 232.
Alte rancia interna, externa sepe mutanda. 192. 193.
Alterantia refrigerantia cur actu calida non sunt danda. 397.
Alius astricta ut tractetur a dogmatico, & ut ab empirico. 378.
Amara quod participant dulcibus, experientis alchimistarum probatur. 232.
Amara ex Alberto falsum quidpiam obinere. 294.
Amarus sapor indicat maiorem calorem, quam falsus. ibi.
Amarum a falso differi secundum magis, & minus. ibi.
Amatus Lusitanus buxo curabat luem Gallicam. 385.
Ametihodi cur plures contradictiones inueniant. 322.
Analogata cur nullam habeant communem dependentiam. 374.
Analogismi dogmatici perfectissimum exemplum. 376. cap. 4.
Analogismus dogmaticus quis, & qualis sit. ibi.
Analogismus dogmaticus comparatur indicationi. ibi.
Analog. dogmat. ut differt ab empir. ibi.
Analogismus ut ratione materia est paralogismus. 373. cap. 3.
Analogismi empirici exemplum vsuatum a recentioribus dum putant vesicantia valere in febre maligna. 406.
Analogismus, ut est inductio. 372.
Analogismi dogmatici, & empirici parallesus. 377.
Analogismi cur non pertineant ad Methodum. 348. cap. 1.

Analogismus cur sit falsus procedendi modus. 370.
Analogis. ut differt ab indicatione, & experientia. 369.
Analogismus, ut duplex est. ibi.
Analogismus quid sit exemplo declaratur 370.
Analogismus colligit a similitudine materiarum, locorum affectorum, & affectuum praternaturam. 370.
Analogismus, ut reici debet. ibi.
Analogismum ratione forme esse paralogismum ostenditur. 372. cap. 2.
Analogismus empiricorum habet medium terminum communem passionem. ibi.
Analogismus est in secunda figura ex affirmatiuis, & irreducibilis ad primam. ibi.
Analogismus, ut est falsus enthimema. ibi.
Anaximandri Opinio de falsedine maris. 290.
Anaxagora opinio de falsedine maris. ibi.
Anaxagoras, ut reprehenditur dum dicit quodlibet fieri ex quolibet. ibi.
An consuetudo conuertitur in naturam. 182. cap. 7.
Anglia habitatio cur bona. 283.
Angustianimia, quod suffocet declaratur. 252.
Anima per se primo modo non est potentia. 315.
Animalia cur non generentur in mari mortuo. 232.
Anni tempora, ut quatuor humoribus respondent. 281.
Anodyna non indicari a dolore, sed a parte dolente, & cur. 11.
Anostomasis causae tres, acrimonia, copia, & imbecillitas. 21.
Antipatrum Medicum habuisse tuberculum in spiritalibus partibus, ut cognouit Gal. 255.
Antipater ex Arist. quid. 259.
Aphra maligna cur alba fiant. 304.
Apoplexia causa, ut inueniantur. 259.
Apoplexia modo a pituita, modo a melancholia fit. 257.
Apparatus morbosus, ut sunt in similibus, & dissimilibus partibus. 32.
Appetitus amissio indicat crudam pituitam. 258.
Aqua Gallarum, & Calcantis, licet splendide sint, si vniantur efficiunt nigred. 325.

Aqua

Aqua Rosacea se communi miscetur cur lactea fiat. 1b.
Aqua Rosacea, ut cognoscatur esse facta plumbeo alembico. 228
Aquam thesacalem stillatam ex scalige ro curare gallicum luum. 385
Aqua frigida quando uinat conuulsos. 453
Ardor stomachi unde fiat. 273
Argentarius, ut errat dum negat vapores petentes caput conuerti in pituitam. 45
Argentarius, ut errat in perquirendis humoribus occultis. 15
Argumentum in quatuor terminis declaratur. 335. c. 14
Argumentum in quarta figura declaratur ab. 335. c. 14
Argumenta ab auctoritate sunt probabilia. 454
Argumentum ab accidente ad accedens non facere demonstrationem. 321
Argumentum a contrariis unius predicamenti ad contraria alterius est falsissimum. 315
Argumentum a particularibus cur fallax. 155
Argumentum a destructione consequentis ad destructionem antecedentis cur non valeat. 7
Argumentum ex sufficienti partium enumeratione sine alia demonstratione petit. 14
Argumentum a partibus ad totum, & a toto ad partes est paradoxismus.
Argumentum quod colligit negatiuum ex affirmatiuis nullum est. 154. c. 16
Argumentum a causis proximis ad an sit nullum est. 204
Argumentum in prima figura cum minori negatiua exemplo ostenditur non valere. 454
Argumentum in prima figura ex minori particulari ut est vanum. 371
Argumentum in secunda figura ex affirmatiuis ex medio communiori predicato cur est irreducibile ad primam figuram. ibi.
Argumenta in quarta figura cur monstriosa. 348
Argumentum est vanissimum, dum medius est genus, vel differentia maioris extremi. 372
Argumentum a partibus ad totum est vitiosum. 407
Aristoteles, ut vicit veteres loquendo de principio materiali. 31
Aristoteli falso attribuitur, quod non cognouerit in corde esse pinguedinem. 163
Aristotelis famose opiniones. 574

Aristotelis artificium in combinationibus quatuor qualitatibus inueniendis. 305
Artes medica quo ordine tradatur a Galeno, & ab Auerroae. 349
Artes medica cur difficilis. 357
Artes medica esset vana, si indiuidua curaret. ibi.
Artes omnes ut ordine resolutio ordinentur. 349
Arthritis cur suppurantibus non potest vinci. 337
Articuli laesi ostendunt pituitam dominari. 261
Artes medicae difficultas unde pendet. 442
Asclepiadis consilium ab omnibus medicis acceptum. 420
Asia sacida ferulis apud indos miscetur, ut suauius oleant. 177
Asuetus omnibus externis rebus cur minus ledatur a contrariis. 190. c. 2
Asuetus paucis, ut ab omnibus ferè ledatur. 239
Asthmatici cur a se ledantur. 325
Astringentia in alni fluore sepe noxia, & cur. 10
Astringentia moderata cur in omni inflammatione sint danda. 392
Astringentia cur sanant spleneticos. 440
Atrabilis in toto elephanticum in parte cancerum facit. 124
Atrabilis manu gestata, ut tollere possit dolorē causatum ab ictu scorpionis. 305
Athrepsia, ut sepe fit a mucosa pituita. 149
Auctoribus additi, ut errent. 151
Andros tria officula antiquis ignota. 156
Auempaces recte dicitur, colores esse lumina vario modo resalta. 231
Auerroes, ut errat dum negat sub primo climate esse locum habitabilem. 234
Auerrois opinio de periodicatione resistit. 213
Auerroes errare videtur dum dicit dari colores sine lumine. 231
Auerroes putat epilepsiam a spiritibus suis fieri. 278
Auerroes recte reprehendit Themistium de demonstratione ab accidente ad accedens. 365
Auerroes cur laudat praeceteris quintum clima. 283
Auerroes dicit propter quid accidentium esse causam extrinsecam. 414
Auiconas cur praeceteris laudat quartum clima. 283

INDEX RERVM

<i>clima.</i>	283
<i>Auicene opinio de pituita dulci.</i>	296
<i>Auicem. ut defendatur de quarto genere melancholie.</i>	299
<i>Auicenn. dicit epilepsiam puerorum esse flatulentiam.</i>	279
<i>Auicem. & Auerrhois opinio quod vitelina bilis sit mistura ex flaua, & crassa pituita.</i>	302
<i>Auicene opinio, ut sit medicandum in alui fluxu.</i>	463
<i>Aures parue, ut versutiam, & melancholiam indicant.</i>	265
<i>Austera, ut fiant dulcia, ut acerba, & vitacida.</i>	301
<i>Austerum, ut magis astringit acerbior.</i>	301
<i>Austero magis in profundo acerbum magis in superficie adstringit.</i>	ib.
<i>Austerus sapor in pituita vitrea, & melancholia facili inuenitur.</i>	ib.
<i>Austerus sapor non conuenit per se pituita vitrea, sed melancholia.</i>	ib.

B

B Alim herbam vitam mortuis restitue- re, ut est sabulosum.	315
<i>Bezoar ad nos delatus cur sit nullius vir- tutis.</i>	396
<i>Bezoar quid.</i>	ib.
<i>Rezoartica reijciuntur.</i>	397
<i>Bilis species ex Galeno sunt septem pallida flaua vitelina poracea eruginosa caru- lea rubra.</i>	196
<i>Bilem copia peccare, ut noscitur.</i>	338
<i>Bilem poraceam ostenditur non solum in ventriculo verum etiam intra venas gigni.</i>	303
<i>Bilis porracea, ut fiat duplici misturarum genere.</i>	ib.
<i>Bilem porraceam esse misturam ex bile eruginosa, & pituita ostenditur.</i>	300
<i>Bilis porracea, ut recognoscatur ante- quam e corpore exeat.</i>	250
<i>Bilis porracea pro varietate sita, ut sa- lubres, & letales morbus faciat, pag. 125</i>	
<i>Bilis species, ut differant secundum ma- gis, & minus.</i>	242
<i>Bilem flauam non esse misturam contra Auicennam ostenditur.</i>	301.c.6
<i>Bilem vitelinam ostenditur non esse mi- sturam ex flaua, & pituita, ibidem cap.6.</i>	

<i>Bilem dominari, ut a somnis recognosci- tur.</i>	258
<i>Bilis qua externa die erat flaua hodie fieri potest eruginosa.</i>	290
<i>Bilis efficiens erispellas externum est mixta ichori sanguineo.</i>	291
<i>Biliofis cur acetum prosit.</i>	251
<i>Biliofi paucitate cibi adaugent sitim, & lassitudinem.</i>	ib.
<i>Bilis, ut ex iuuantibus, & lacerantibus colli- gitur.</i>	ib.
<i>Biliofi sunt graciles, habent venas latas, & frontem rotundam.</i>	246
<i>Bilioforum succorum differentie a locis affectis colliguntur.</i>	ib.
<i>Bilis rubra quomodo fiat, & bilium diffe- rentia.</i>	198
<i>Bilis, ut fiat ab animi passionibus, & vigi- lia.</i>	243
<i>Bilis, ut ab Australibus ventis generatur.</i>	244
<i>Bilis, ut ab infedia augeatur.</i>	244
<i>Bilis, ut noscitur quod peccat a quaque lo- cis antecedentibus desumptis.</i>	55
<i>Bilis ob ieiunium caput implet.</i>	ib.
<i>Biliofi sunt in venerem furiosi, sed post ces- sum penitentes.</i>	247
<i>Biliofis cur cibis nunquam molestus, ibi- dem.</i>	
<i>Bilosum caput ex copiosis aurium excre- mentis cognoscitur.</i>	ib.
<i>Biliofi morbi qui sint.</i>	248
<i>Bilis eruginosa in febre maligna multa, ibid.</i>	
<i>Bilis eruginosa quomodo fiat.</i>	242.
<i>Bilis cognoscitur ex velocitate morbi, pa- gin.</i>	248
<i>Bilis mouetur in meridie.</i>	298
<i>Bilem peccare noscitur ex inflammatio- nibus membranarum.</i>	248
<i>Bilis sincera, & mista cum ichore sangui- neo quomodo cognoscitur dum peccat.</i>	ib.
<i>Bilis sincera in partibus internis non ero- dit, sed in externis, & cur.</i>	248
<i>Bilis noscitur per octo loca desumpta a morbus.</i>	ib.
<i>Bilis in phrenetico si est sine furore, & fle- tu neque est adusta, ut eruginosa, neque putrida.</i>	249
<i>Bilis noscitur dum agri nuntium loquun- tur, vel magis quam antea.</i>	ib.
<i>Bilis colligitur ex vigilia, siti, & inappe- tentia.</i>	ib.

NOTABILIVM

Bilis colligitur ex punctis visum.
 250
Bilis cur indicetur à pulsu duro. *ibid.*
Bilis, ut colligitur ex facie soliso colora-
tori. 250
Bilis pro varietate sinus salubrem, & in
salubrem malum facit. 124
Bilis in toto icterum, in parte Erisipilla-
facit. *ibid.*
Bilis, ut ex coloribus, & ex saporibus no-
scitur. 207
Bilis à quibus causis non naturalibus oria-
tur. 245
Bilis pallida quomodo fiat. 247
Bilis flaua est calidior, & crassior palli-
da. *ibid.*
Bilis flaua quomodo fiat. *ibid.*
Bilis vitelina quomodo fiat. *ibid.*
Biliosi cur bouinam carnem citius dige-
rant piscibus saxatilibus. 192
Biliosorum succorum species cur modo-
quantur modo septem, & ultra enume-
rantur à Galeno. 242
Boleti ut suffocantur Sophiam Presolam,
& ut oleo citri liberetur. 64
Boleti cur occidunt. 325
Bovina caro cur citius digeratur pisciculis.
 180
Brisonis Paralogsismus de quadratura
quis sit. 376

C

Calculi causa potest esse calor modo-
 ratissimus renum. 136
Calculus non committitur electuario de vi-
tro. 355
Calculosi cur ladantur à diureticis, pagin.
 396
Calidum est cor, & iecur ergo totus habi-
tus consequentia est Galeni. 68
Calor à quibus causis fiat. 31
Calor est causa contingens magnitudinum
partium. 172
Calor natiuus, est Celestis quia proportio-
ne respondet elemento stellarum, est pa-
ralogsismus in quatuor terminis. 335
Calor quibus resoluendis absumatur
pag. 253
Calor magnus quomodo prius faciat ni-
gredinem, & deinde eam denudet, &
faciat albedinem. 304

Calor, ut attrahit. 343
Caput ob tres causas repleti. 36
Capitis foramina que, & quot sint, pag.
 138
Caput est pituita metropolis. 261
Cardum Benedictum quos status expel-
lat. *lib. 6. cap. de flatibus.*
Cartilago mucronata cur non possit deci-
dere. 149
Carnis abundantia unde fiat. 285
Casus de gangrena. *ibid.*
Casus notabilis de gangrena genarum or-
ia à remedii Empirici. *ibid.*
Casus de Arthritis de quomodo suppuran-
tibus liberetur. 336
Casus dum liberatur quidam sciatica fa-
cto cauerosi in eodem crure. 425
Casus puella deglutientis acum magnum.
 430
Casus Matrone Romane habentis herpe-
tem. 392
Casus cuiusdam qui perit medicorum in-
scitia. 400
Casus notabilis de consuetudine. 173
Casus venenatorum sublimato. 333
Casus venenati opio. *ibid.*
Casus amici facientis lapillum periodicè.
 209
Casus notabilis cuiusdam comis percele-
bris. 187
Casus viri diutissimi que ob rectam viuen-
di normam insolitam moritur. 191
Casus de punctura nerui. 438
Catarrhus ob varium situm quos morbos
faciat. 124
Catarrhi falsi cause quinque sunt, & qua-
 294
Catarrho vexatos citius sine medicinis li-
berari. 390
Catochi que sita immediata causa. 278
Catochus à qua melancholia oritur, pag.
 277
Cause principali, ut secundo loco atten-
dendum. 437
Cause externa cur non indicant. 313
Cause efficien tes preternaturam in con-
tentis sunt centum & sexaginta quin-
que. 445. cap. 9.
Causa procatarctica que sint que per acci-
dens refrigerant. 237
Cause procatarctice semper examinanda
sunt an per se, vel per accedens operen-
tur. *ibid.*

INDEX RERVM

<i>Causæ externæ nihil efficiunt sine viscerum dispositione.</i>	3	<i>Climata proprio cur laudantur.</i>	ibid.
<i>Causæ omnes externa ut ad quatuor, & non ad sex reducuntur.</i>	204	<i>Clima pro quolibet temperamento quale debeat.</i>	281
<i>Causæ procacitæ non possunt dici nec proxima nec remota.</i>	34	<i>Clima quid sit.</i>	ibid.
<i>Causa procacitæ cur dicitur procacitæ.</i>	203	<i>Climata septem sunt.</i>	ibid.
<i>Causa efficiens immediata cui sapè igno- retur.</i>	417	<i>Coccyx in parturientibus mouetur.</i>	150
<i>Causa præcedens effectum temporis inter- uallo non est causa illius effectus.</i>	17	<i>Coccygis cartilago maior est in mulieri- bus quam in uiris.</i>	ibid.
<i>Causa remota nunquam efficitur argumen- tum affirmatiuum.</i>	217	<i>Coctiones in uinente trici & sex excre- menta.</i>	44
<i>Causæ remotæ quam potentiam habeant.</i>	203	<i>Colla immodice cur salsa fiant.</i>	290
<i>Causæ remotæ cur argumenta in secunda figura efficiunt.</i>	383	<i>Coctio ut quæte sit.</i>	457
<i>Causa proxima non dant an sit, & cur.</i>	203	<i>Coctio ut ex Arist. sit incrassando.</i>	207
<i>Causæ suffocantes quæ sint.</i>	252	<i>Coctio à quibus impeditur.</i>	440
<i>Cauteria non recipere excrementa quia attrahant.</i>	345	<i>Celestia corpora ut inuenit Aristoteles non esse elementalitæ.</i>	358
<i>Cerebellum dicentes esse durius cerebro in duo errata incidunt.</i>	143	<i>Cognitio specifica affectuum unde hausa- tur.</i>	2
<i>Chylus cur albefcat.</i>	66	<i>Cognitio progressus partium in medicina quanta sit.</i>	161
<i>Christoforus à uaga defendit febrem esse naturæ conatum.</i>	224	<i>Cognitio numeri partium in medicina quanta sit.</i>	162
<i>Cibi melancholici quæ sint.</i>	263	<i>Cognitio exacta cui ex primis subiecti de- bet esse.</i>	321
<i>Cibi quantitas unde sinenda.</i>	438	<i>Coitus causa perit maligna febre adole- scens Melibæa.</i>	243
<i>Cibus intemperatissimus ex Galeno quæ mala faciat.</i>	393	<i>Coitus abstinentia cur generatur melan- cholia fecalis.</i>	252
<i>Cibandi ægri ars.</i>	438	<i>Coitus nimia abstinentia ut suffocet.</i>	ib.
<i>Cibum in ventre corrumpi ob tres cau- sas.</i>	3637	<i>Coitus calefacit & ut refrigerat.</i>	244
<i>Ciborum tenuium usus quod damnum afferat.</i>	192	<i>Coitus frequens efficit satyrum tabidum.</i>	19
<i>Cinis putredinis humorum, ut in lotio no- scitur.</i>	334	<i>Coitus abstinentia disponit ad sex mala ex Galeno.</i>	ibid.
<i>Claudus, ut curatur ab empirico, & ut a dogmatico.</i>	378	<i>Colica passio fit inter spatia tunicarum intestinorum.</i>	244
<i>Clima secundum quæ loca sub se contineat.</i>	281	<i>Colica passio quibus chysteribus tolli pos- sit.</i>	388
<i>Climata omnia quas provincias sub se ha- beant.</i>	ibid.	<i>Colica passio ut aliquando fit ob meatum felleum occlusum.</i>	140
<i>Clima temperatissimum quod sit.</i>	ib.	<i>Calorum principia quæ sint.</i>	229
<i>Clima primum est habitabile quod non co- gnouit Aristoteles.</i>	ibid.	<i>Calor oculorum quid significet.</i>	207
<i>Clima primum quas provincias habitatis- simas, & temperatissimas contineat.</i>	ibidem.	<i>Calor quos humores inducet.</i>	ibid.
<i>Clima quoduis, ut potest esse temperatissi- mum.</i>	282	<i>Colorata simularia, & dissimularia ut dis- ferant.</i>	226
		<i>Color niger turbidus quem incidet humo- rem.</i>	208
		<i>Color niger splendidus quem humorem in- dicet.</i>	213
		<i>Color flauus & vitellinus non indicat adustionem.</i>	207
		<i>Color intensis ruber in facie cur melan- choliam indicet.</i>	226

Color valde ruber quam melancholiam
indiciet. 1b.
Colores vt indicent temperaturas. 227.
Color vt fiat. 1b.
Color niger vt est in calidis, & frigidis
rebus, & albus similiter in calidis, &
frigidis. 1b.
Colores non solum in mixtione sed in in-
xtapositione mutantur. 229.
Color niger vt illico fieri potest ex mistura
duarum albarum aquarum. 1b.
Color lacteus vt illico fiat ex mistura dua-
rum aquarum splendidarum. 1b.
Color viridis ex viro ceruleo, & vt eo
statim oritur. 1b.
Colores cur non pendent à primis quali-
tatibus. 229.
Color luidus non est caracter venenato-
rum. 332.
Color ceruleus lapidis lazuli, & iridis
celestis ab eadem causa prodeunt. 231.
Colores qui inscunt humorum misturas.
290.
Colores medij vt fiant ex albo, & nigro.
302.
Colores albi humorum vt ostendant modo
calidos, & modo frigidos humores. 304.
cap. 8.
Color albus turbidus humorum indicat
melancholiam esse mistam cum pituita.
1b.
Colores noui vt ex mistura aliorum fiant.
318.
Colorem viridem quomodo figuli compo-
nant. 1b.
Coma vigil à qua causa fiat. 291.
Comparatur corpus animatum testudini,
& fribus. 68.
Conciliatoris opinio de persodicatione
recitat. 208.
Conclusio vt ignobiliorem partem semper
sequitur. 382.
Conclusio ex medio simili, & non vniuo-
catur vana. 352.
Conclusio vniuersalis collecta ab exem-
plis vel experimentis non sequitur, sit
que argumentum in tertia figura cum
conclusionem vniuersali. 405.
Conclusio à medio simili tertio collecta, est
vana. 406.
Congelata à frigido vt liqueant ab huius-
modi. 456.
Consequentia de omni ad per se negatiue

vi valet. 30.
Consequentia nulla est à partibus ad io-
tum nec vice versa. 141.
Consequentia ex membris diuisis illata
cur nulla. 14.
Consequentia à coniunctis ad diuisa cur
nulla. 1b.
Consequentia à Genere ad species nulla,
& cur. 356.
Constitutio salubris duplex primigenia, &
aduenitia. 166.
Consuetudines male in senibus, & debili-
bus cur non mutandæ. 167.
Consuetudinem sex rerum non natura-
lium efficere aduenitium statim. 172.
Consuetudines diuersarum gentium que
174.
Consuetudines ex Arist. impedire verita-
tem. 175.
Consuetudines diuersæ à Sexto empirico
relatæ. 1b.
Consuetudines decipere sensum gustus
exemplis ostenditur. 176.
Consuetudinem decipere sensum visus
exemplis probatur. 1b.
Consuetudo vt decipiat sensum auditus.
177.
Consuetudo vt decipiat sensum tactus. 1b.
Consuetudine vt virtus morosa roboratur.
1b.
Consuetudine vt roboratur virtus vitalis.
178.
Consuetudinem in naturam non conuertit.
182. cap. 7.
Consuetudinis definitio perfectæ quæ sit.
184.
Consuetudo respectu naturæ non est dispo-
sitis vt dicit Valelius. 185.
Consuetudine dantur, quæ minus mutantur
quam natura. 1b.
Consuetudinis subiectum quid sit. 1b.
Consuetudinis causa efficiens. 1b.
Consuetudines cur fiant ab assiduo exerci-
tio. 1b.
Consuetudinis causa finalis. 184.
Consuetudo inueterata dum tollitur, sta-
tim duplex natura suboritur. 190.
Consuetudo noua autem quam fiat dua sunt
condiciones seruandæ. 192.
Consuetudinem medicinarum non esse
admutandam experimentis probatur.
194.
Contrarium non agit in contrarium. 22.
b. Con.

INDEX RERVM

Contrarium vnus generis non aduersatur contrarijs aliorum. 353.
 Contraria media vt relictantur inter se. 359.
 Contrarietas vt definitur. ib.
 Contrarium vnus generis si haberet plura contraria vt ruerent rationes Aristotelis primo cels. 315.
 Contraria vt sunt due forme. 357.
 Comulso ex inuentione duplex lethalis, & non lethalis. 214.
 Comulso ex repletione vt noscitur, & vt curatur. 450.
 Copia humorum vt noscitur. 338. cap. 1. 2.
 Copiam mouere facultatem vt noscitur. 366.
 Copiam humorum ex quibus symptomatibus colligitur. 341.
 Cor est fons caloris, quamuis omnes eius partes frigide sint. 140. cap. 10.
 Cor habet duo temperamenta. 141.
 Cordis partes cur frigide facte sint. 440.
 Corrobantium rectus vsus qui sit. 441.
 Cornelij Celsi sententia de innotandis remedijs. 409.
 Corporis diuisio in duas partes cur fiat ab Hippocrate. 419.
 Corrupti accidentia communia, & propria seruari non posse ingenito. 227.
 Corrupti accidentia si seruarentur ingenito quid sequeretur. 228.
 Cranes humanum, ridiculum remedium. 54.
 Cranes foramina precipua, qua sint, 187.
 Crisis bone quinque sunt ex Gal. conditiones. 391.
 Crudus e vistenibus humoribus, vt est quocumque euacuandum. 407.
 Curbita cum magna flamma vt tollit status ventris. 280.
 Curbitalis quando vitimur crudo existente morbo. 405.
 Cur errent qui ex ratione vniuersali hauriunt specificam cognitionem. 3.
 Cur ex urina coniecturam colligimus in morbis. 219.
 Cutanei affectus a melancholia prodentes qui sint. 268.

D

Definitio accidentium sine causa inherentia est varia. 127.

A diffinitione in qualibet occasione est exordendum. 413.
 Definitio, que non dat consequentia quid vana est. 331.
 Definitiones per subiecta proxima non possunt esse substantie. 413.
 Definitiones a potentijs desumi, & non ab actu. 415.
 Demonstratio ab effectu ad effectum cur non datur. 321.
 Demonstratio ex medio termino preterito, vel futuro, & ex quaesito presente est vanissima. 361.
 Demonstratur, cubitum sinistrum sectum aque iuuare Hepar, ac dextrum. 254.
 Densum vt est causa frigoris. 322.
 Densitas, & raritas vt sunt principia omnium passionum. 321.
 Densitas, & raritas cur ad situm pertinent. ibi.
 Deriuationis proprium est sequi inclinationem humorum. 417.
 Derinatio vt sit etiam per longinqua ostenditur. 424.
 Destillatio vt excutitur a parte mittente, lege pars mittens. ibi.
 Desipientia cum risu vt indicant sanguinem. 270.
 Diacodium non dandum in pectoris catarro. 345.
 Diaphanum non pendet a raritate corporis vt dicit Zabarella. 230.
 Diaphanum non fieri a raritate experientia ostenditur. ibi.
 Diaphanum quid ex sententia perspectiuorum. ibi.
 Diarthrosis connexus quis sit. 149.
 Distemum curare Gallicam luem ex Scaligero. 385.
 Diuresis causa tres acrimonia, copia, & eternus ictus. 21.
 Differentia specifica cur operantur, & non indiuiduales. 350.
 Differentia specifica est epilogus generum, & differentiarum. 354.
 Differentie partium, que pertinent ad primigenium, & que ad aduentitium statum. 170.
 Differentie specificae lecorum affectionum sunt decem, & non plures, & que sint. 3.
 Differentia specifica affectionum unde sumatur. 123.

Digo.

NOTABILIVM.

Digerentibus ut possumus aliquando ante
torius purgationem. 459.
Digiti longi ut ostendunt iecoris calidita-
tem. 265.
Digiti breues ut ostendunt iecoris frigi-
ditatem. ibi.
Dyonisius Tyrannus pre latitiam moritur.
255.
Dyonisius grammaticus ut ob inedia in-
epilepsiam incidebat. 39.
Dioscoridis fabulosa proponuntur. 328. c. 11
Dioscorides defendit. ib.
Dioscorides cur tot fabulosa protulerit.
ib.
Dioscorides si credi disset que scripsit, me-
mo eo stolidior fuisset. ib.
Dispositio corporis pituitosi ut cognosci-
tur. 254. cap. 6.
Dispositio, & habitus cur non sint due spe-
cies qualitates. 185.
Dispositio visceris, per quinque loca nosci-
tur. 238.
Dispositio calida visceris a tribus causis
poreft introduci. 243.
Dispositio biliosa ex quibus antecedenti-
bus signis cognoscatur. 246.
Dispositio viscerum ad congregandam
melancholiam ut noscitur. 168.
Dispositiones de nominibus ubi a Galeno
vocantur garule. 263.
Diuisio omnium affectuum prater natu-
ram proponitur. cap. 4. primo lib.
Diuisio sine demonstratione non aperit
occulia. 12.
Diuisiois utilitas. ib.
Diuisio petri principium. ibi.
Diuisio omnis ex Boethio ad bimembrem
reducitur. 201.
Diuisio est facienda in eodem genere. 353.
Diuisio non est facienda in differentias
inter quas cadit medium. ib.
Diuisio corporis in duas partes an semper
seruanda sit. 134.
D. Thomas ut probat potentias operatri-
ces non esse substantias. 312.
Dogmatica selecta precipua dogmata que
sunt. 349.
Dolor areolarum sensissimus ut statim
tollit possit. 396.
Dolor ut attrahat. 343.
Dolor a causa frigida cur attrahat. ib.
Dolor ite suus sine pondere statim indicat.
279.

Dolor collicus ut tollitur aqua frigida, pag.
277.
Dolor non indicat ut symptoma. 11.
Dolor cur in membrana fiat pungitius.
122.
Dolor cur in carne fiat laceratiuus. 123.
Dolor in osse cur fiat frangitius. ib.
Dolor granatiui spinae ut sit conuulsus.
142.
Doloris colici cause qua meth. inuenian-
tur. 258.
Dolor exasperatiuus stomachi a quo humo-
re fiat. 273.
Doronici ut occidant canes. 231.
Dulcedo, quot modis fiat in humoribus.
296.
Dulcedo nauseosa ut tollitur oleo calchan-
tino. ib.
Dulcedo in sanguine, & pituita aliquan-
do ex Gal. sentitur. 295. cap. 3.
Dulcedo manifesta ut duorum generum
esse possit. ib.
Dulcedo manifesta alia suavis alia nau-
seosa. ibi.
Dulcedo nascens in humoribus ex Au-
cenna ut a putredine fit. ib.
Dulcia sunt que corrumpuntur. 290.
Dulcia vel sunt manifesta, vel insipida.
ib.
Dulcis humor insipidus est incognoscibi-
lis. ib.
Dulcia omnia a calore moderato sunt.
ib.
Dulcia a Galeno comparantur aqua cali-
da tepida. ib.
Dulcia que abstergunt, & que opillant.
ib.
Dulcia ex Auicenna oppillant quia ra-
piuntur ante coctionem. ib.
Dulcia cur aliquando acescant, & ali-
quando amarescant. 297.
Dulcia ut noceant melancholicis. 274.
Durities ut a triplici causa fiat. 383.
Dysenteria ut distinguitur ab ulcere Me-
patis. 29.

E

E Cheneis non habet vim firmandi na-
um. 327.
Elenchus dum sim tur non causa pro
causa declaratur exemplo Medico. 335
Elenchus accedens exemplo Medico decla-
ratur.

lum dextrum cubitum secant. 158
 Errare videtur Vesalius dum dicit pleu-
 ritidem fieri à sanguine veniente à ve-
 na sine pari, 158
 Errata quæ in IV. libro rejiciuntur.
 Errant qui in cōsultationibus de primige-
 nio statu ab ortu scilicet naturæ tractant,
 illumque conservandum dicunt. 167
 Errant qui arguunt à signis adventitij sta-
 tus pro cognitione primigenij. 168
 Errare videntur qui ex latitudine vena-
 rum colligunt securis caliditatem. 170.
 cap. 3.
 Errare videntur qui dicunt magnitudinē
 partium indicare temperaturam, ib.
 Errare videntur qui dicunt venas ab He-
 pate prodire, ib.
 Errare videntur qui à proprio gustu colli-
 gunt quodnam vinum sit proportiona-
 tum conualescentibus. 177
 Errant qui tenent affixa cerata donec
 sponte cadant. 178
 Vt errant qui faciunt naturam medica-
 mentis consuetudinariam. 178
 Errata Galeno adscripta.
 Error Galeno adscriptus de usu primi
 musculi tibie. 103
 Error Gal. adscriptus de quarto musculo
 tibie. 106
 Err. dum dicit pylorum oriri à fundo ven-
 triculi. 130
 Error adscriptus de cribro in renibus. 137
 Error adscriptus dum dicit in osse cuneali
 esse veluti cribrum, 137
 Dum dicit, septimum par nervorum à ce-
 rebello oriri. 143
 Dum dicit quod appendices ossium sint du-
 riores ossibus. 144
 Dum dicit infernum orificium ventriculi
 habere glandulam. 148
 Dum dicit quod ren dexter sit altior sini-
 stro. 159
 Dum dicit, quod ventriculus sit magis in
 dextro latere, quam in sinistro, 159
 Dum negat ossa digitorum esse concava. 159
 Dum dicit inter oculos, & nares esse mea-
 tum, 159
 Dum dicit processus vertebrarum collis in-
 tegros esse. 159
 Dum dicit Hepar in Lobos esse divisum. 160

Dum dicit quod in extremâ parte spinae sit
 nervus inconiugatus. 161
 Dum dicit quod pulmo habeat quinque Lo-
 bos. 161
 Dum dicit musculum temporalem in me-
 dio esse tendinosum. 161
 Dum dicit os sacrum ex tribus tantum of-
 sibus constare. 162
 Dum dicit decimam vertebra[m] esse me-
 dium Dorso. 162
 Dum dicit scapulam moveri à septem mu-
 sculis, 162
 Dum dicit duos esse musculos cuculares. 162
 Dum dicit à coccyge oriri nervorum co-
 niugationes, 163
 Dum dicit cerebellum esse durius cerebro. 163
 Dum dicit aliquos nervos oriri à cerebel-
 lo. 163
 Dum dicit spinalem medullam esse mol-
 liorem medulla ossium. 163
 Error Galeno & Aristoteli adscriptus,
 dum dicunt in corde non esse pinguedi-
 nem. 163
 Error Galeno adscriptus dum dicere vi-
 detur, quod vertebra iungantur per ter-
 tiam tunicam spinalis medulla. 163
 Error adscriptus dum dicit caput infimum
 vlnæ componi cum brachiali. 164
 Dum dicit, quod quartus musculus hyoidis
 attollat scapulam. 164
 Dum dicit substantiam penis exordiri à
 superiori parte penis. 164
 Errata alia Galeno adscripta ac non af-
 ferantur. 164
 Error Lithotomi, dum duos quoque muscu-
 los penis secant. 165
 Error illorum qui dimittunt sensum ob
 auctoritates qualis sit. 151
 Error cuiusdam peripatetici de pinguedi-
 ne cordis credentis magis Aristoteli
 quam sensui. 152
 Error Anobarbi de saluatiella. 154
 Errata tria Valesij observantur dum lo-
 quitur de vetula Atheniensis. 180
 Erratum cuiusdam empirici commissum,
 ob loci affectu inscitiam. 273
 Erratum cuiusdam dicentis ab intesti-
 no recto ad caput statim non pervenire. 276
 Errata omnia ut ad duos errandi modos
 reducantur. 346. 347.
 Er-

Errata omnia committuntur ob logices in-
fensiam. 1b.
Errorum omnium fontes duos esse, & qui
sint, 1b.
Errare videntur, qui dicunt consuetudi-
nem in naturam conuerſi. 182. c. 7.
Errare videtur Valensius dicens consuetu-
dinem esse dispositionem, naturam esse
habitu. 185
Err. qui dicunt omnis repletio mala, panis
autem pessima, cum de carne sic intelli-
gendum. 186
Err. qui malas consuetudines statim vo-
lunt amovere. 186. c. 9.
Err. qui solitis meraco consulunt tenuissi-
mum vinum. 186
Errare quoque videntur, qui coitus anti-
quam sum subito, & omnino debilibus,
& senibus interdiciunt. 187
Errant Epicurus quod usus venercorum,
sit insalubris. 187
Errant qui consuetos cibos ex toto amo-
uent. 187
Err. qui consuetum aerem reprehendunt.
188.
Er. qui solitum, & antiquum meridianum
somnia omnino reprehendunt. 188
Er. qui consulunt antiquum exercitium,
esse omittendum. 188
— Er. qui consulunt medicis vel aduocatis
senibus ut deponant artis sue exerci-
tium. 188
Er. qui consuetudinem inneteratam licet
deterrima sit in senibus, & debilibus iu-
bent esse amouendam. 188. c. 10.
Err. etiam qui in robustis agris volunt,
malas inneteratas consuetudines deme-
re. 189
Errare videntur nonnulli, dum dant alte-
rantia, eaque non mutant. 192. c. 13.
Err. dupliciter qui iubent, cerata affixa te-
nere donec cadunt. 193
Errare videtur Valesius dum dicit, perio-
dorum causam esse humorum copiam.
213
Er. videtur Capuaceus dum dicit, cau-
sam periodorum esse naturam humo-
rum. 213
Errare aliquando solent, qui vtuntur sy-
rupis de lactuca & cichorea. 246
Errare videntur qui introducunt consue-
tudinem medicinarum soluentium, &
alterantium. 194

Errata quæ reijciuntur in V. libro.
Errare videtur Auer. dum dicit naturam,
seu calidum innatum esse causam perio-
dicationis. 212
Errare videtur Conciliator dum dicit pe-
riodicationem à motu Luna pendere
212
Errare videtur Fernelius dum dicit, cau-
sam periodorum esse idiosinchrismam.
213
Errare videtur Gentilis cum Herculano
dum dicit, periodicationem à causis oc-
cultis prodire. 213
Errare quoque videtur Modernus dum di-
cit periodorum causam esse inquinamen-
ta varia putredinis. 214
Err. aliquando qui colligunt ex urina iu-
dicium de humoribus pectoris. 211
Err. qui perpetuo conditiones peccantium
humorum ex urina colligunt. 211
Err. qui dicunt, pulsus per se indicare hu-
morum collectiones, & cruditates. 219.
c. 7.
Erratum cuiusdam medici dum expulſu
ferratis dicebat plerumque idem cognosci.
221
Err. qui ex antepositione, & postpositione
paroxysmorum collectiones, & cruditates
humorum colligunt. 223 c. 8.
Err. Trallianus, & Christophorus à Vega
dum dicunt quod febris sit solum naturæ
conatus. 205
Errare videntur, qui ex colore intensè ru-
bro faciei colligunt sanguinis domini-
um. 225. c. 9.
Errare videntur Montanus, & Orsibius
dum dicunt colorem lumbricorum ar-
guere dominium peccantium humorum.
227. c. 10.
Errare videtur Albertus, & Zabarella
de natura Diaphani. 230
Er. videtur Auer. dum dicit dari colores
antequam adueniat lumen. 230.
231
Errare videtur Mercurialis, dum dicit
vermes non posse fieri à quolibet humo-
re. 231
Errant dum pro necandis lumbricis pu-
tant theriacam temporibus applicatam
esse bonam. 232
Erratum cuiusdam amici dicentis à ſci-
bus, & à qualibet re dulces lumbrices
gigni. 232
b 4 Er.

Errare videntur, qui ex glabra, & nigra lingua semper colligunt dominari calidos humores. 233. cap. 13.

Errata quæ reijciuntur in VI. libro.
Er. videtur Argerterius de loco à proportionem in facienda syndrome signorum pro cognoscendis humoribus peccantibus. 241.

Errare illos medicos dicit Gal. qui non distinguunt calefacientia per se à calefacientibus per accedens. 244.

Er. Cardanus dum dicit frigus esse quid primum, & non positivum. 253.

Er. videtur Fernelius, dum dicit podagram solam à pituita fieri. 266.

Er. videntur qui putant à solo ventriculi calore primam coctionem fieri. ibidem.

Er. qui in omnibus secant varices, pagina 268.

Er. videntur, qui tenent hypocondriacam passionem, & picam ab atra bile furiosa oriri. 269.

Er. videntur, qui dicunt melancholicam cum risu sanguinem indicare. 270.

Er. ruidiores dum non faciunt discrimen inter evacuationem nigrorum, & atrabilis. 272.

Er. qui discentibus sentiunt solere flatus hypocondriacos. 274.

Et er. qui tenent causam generationis flatuum semper esse calorem diminutum. 275.

Et er. quidem vecordes in Ungaria, dum ad tollendum collicum dolorem hauriunt aquam gelidam. 277.

Er. videtur Aristoteles, & Auer. dum negant sub aquatore esse locum habitabilem. 282.

Er. videtur Auer. dicens quantum clima esse omnium temperatissimum ibidem.

Er. videtur Manardus dicens sextum clima esse omnium temperatissimum. ib.

Er. videtur Albertus Magnus dicens septimum clima esse temperatissimum. ib.

Errata quæ reijciuntur in VII. libro.

Et er. Tyrones Medici dum insunt consilia procurandis morbis. 290.

Er. videntur qui dicunt putredinem, & moram esse veras causas falsedinis. pag. 291.

Et er. qui contradicunt Auicenna dum dicit ex amaro fieri posse falsum, pag. 292.

Et er. qui dicunt Auicennam de causa falsedinis à Galeno dissentire. 293.

Et er. Manardus, & Valesius dum argumentis nullius roboris disputant contra Auicennam de quarto genere Melancholia. 296.

Errare videntur Auer. & Auicenn. dum putant vitellinam bilem esse misurans ex flava, & crassa pituita. 301. cap. 6.

Er. videtur Auicenn. dum dicit bilem flavam esse mixturam ex bile, & aqua pituita. 302.

Er. qui tenent porraceam bilem esse mixturam ex flava seu vitellina, & pituita. ib.

Errare videntur qui tenent porraceam bilem solum in ventriculo gigni. 303.

Et er. qui per paracemeseos totam aquam hydropicorum euacuant. 304.

Errata quæ reijciuntur in VIII. libro.

Et er. morborum innovatores, sicut est Fernelius, & Argerterius. 311. cap. 2.

Errare videntur, qui dicunt de predicamentis non agi diligentius in Logica, quam in Metaphisica. 312.

Et er. qui tenent, potentias varias esse solum fundamenta relationis. 314.

Et er. qui ex eo, quod potentia est principium transmutandi aliud, tenent quodque potentias non pertinere ad qualitationem, sed ad substantiam. ib.

Et errant qui dicunt, potentias operatrices esse substantiam, quia activa potentia est essentia forma. ib.

Errare videtur Zabarella dum dicit, quod potentia à forma, ut ab efficiente per emanationem emanant. 316.

Et errant qui attribuant Galeno, quod qualitates occulte substantie sint. 317. cap. 6.

Et errat Themistius dum dat demonstrationem ab effectu ad effectum. 321.

Et er. qui tenent omnes potentias operatrices à quatuor qualitatibus, ut ab origine pendere. 326.

Uter. Fernelius, dum refert omnes animalium potentias in substantiam. ibi.
Uter. Cardanus loquens de mirabile lapillo Papa Clementis Septimi, ibidem.

Uter. qui putant quod acheneis navim firmet. 327.

Uter. Albertus Magnus, dum dicit, quod Lapis aquile conciliet amorem, & partum facilem reddat. ibi.

Uter. qui dicunt lapidem calcedonem collo appensum tollere illusiones phantasticas. ibi.

Uter. qui dicunt Calcedonem, qui inuenitur in ventre byrundinum, sub sinistra ascella gestatum sanare epilepsiam. ibi.

Uter. Albertus, dum dicit, quod lapis christolatus pellat stultitiam. ibi.

Uter. qui lapidem lapidem collo appensum putant suppressere hemorrhagiam. 328.

Uter. qui lapidem Iudicum gestatum in brachio putant calculum renalem expellere. ibi.

Uter. qui tenent cristallum pulverizatum augere lac. ibi.

Fabulosi à Dioscoride relata.

Uter. dum refert, surculum Rhami impositum senectutis veneficia depellere. 328.

Uter. refert virgam viticis inueniginem si manu teneatur non sentire. ibi.

Uter. refert araneum fronti alligatum, tertianam curare. ibi.

Uter. refert araneum albam tellam facientem lacero appensam curare quartanam. ibi.

Uter. refert caput lacerte inritum aculeos infixos corpori extrahere, & varo, & formicantes verrucas tollere. ibi.

Uter. refert vermiculos qui in dyspno inueniuntur appensos collo pellere quartanam. ibi.

Uter. refert semina spine albe gestata serpentes abigere. 329.

Uter. refert asysum foribus appensum esse fascini amuletum, & morbos pecudum abigere. ibi.

Uter. refert atractilidem manu gestatam dolores ab usu scorpionis tollere. ibi.

Uter. refert substractum conyzæ abigi culicem, & pulices. ibi.

Uter. refert venerem excitari, si manu te-

neatur radix satyrj Erithronij. ibi.
Uter. refert penthapilum dum incenditur valere ad castimonias, & expiationem peccatorum. ibi.

Uter. refert phenicem herbam adligatam in puniceo vello sanguinem suppressere. ibi.

Uter. refert sideritis decoctionem sparsam in triclinio conuiuas reddere latiores. ibi.

Uter. dicit quod radices mandragoræ decoctum possit emollire dentem elephantis. ibi.

Uter. dicit, quod asfer atticus, si manu teneatur dolore inguinum sedare possit. ibi.

Uter. dicit Leontapodium conuenire ad amatoria. 330.

Uter. putat, quod folia mercurialis masculi trita à purgatione mestrurorum admota genitalibus masculinum gignat. ibi.

Uter. dicit lapidem selenitem adligatum arboribus reddere eos frugiferos. ibi.

Uter. dicit, quod iaspis appositus famoribus partum accelleret.

Uter. refert opussem lapidem collo appensum auxiliari lethargo. ibi.

Uter. errant qui dixerunt herbam Balni vocatam posse excitare à mortuis animas. ibi.

Uter. Democritus, & Theophrastus dicentes ethiopidem herbam foribus clausis applicatam eas aperire. 328.

Uter. errat Democritus dicens achemenidem herbam datam us qui lacerantur tormentis cogere, ut omnia fiteantur. 330.

Uter. putant aliam achemenidem tractatam in Hostium aciem eos fugere. ibi.

Uter. errant Quintus Serenus, & alij, qui putant morbos curari brenticulis caratibus refertis. ibi.

Uter. Marcus Cato dum putat luxatos curari quodam cantu. ibi.

Uter. qui putant, venenum esse quid absolutum. 331.

Uter. Capinaceus tradens veneni definitionem. ibi.

Uter. qui putant liuidum colorem indicare venenatos. ibi.

Uter. qui unicam dare definitionis veneni putant. 332.

Uter. qui ex apertione cadaueris venenatum cognosci putant. 333.

Uter. videntur Mercenarius, & Zabarella cum

err. qui faciunt indicantia plura tri-
bus, ib. c. 12.
Errata quæ reijciuntur in XII. libro.
err. Empir. dum videntur in perqui-
rendis remedijs analogismo. 369. c. 1.
err. qui proponunt remedia, quia alios
inueniunt. 373
err. qui videntur analogismo, quia præmissæ
non continent conclusionem, 373
err. secundo, quia in analogismo maior est
particularis. 373
err. Empir. dum remedium, qui est
superioris affectus, attribuant inferiori,
ib. c. 3.
err. qui videntur tripliciter, qui adequatam
causam non afferunt. ib.
err. Empir. dum videntur syringam
qualibet urine suppressione, ib. c. 3.
err. dum remedia speciei applicant ge-
neri, ib.
err. qui videntur analogismo Empirico-
nibus, quia transeunt de genere in genus. ib.
err. Empir. quia semper præuè diui-
dunt, ib.
Erratum Empiricorum commune, est quia
utabant causas esse imperceptibiles, ib.
utabant Empir. in suis similitudinibus,
ib.
err. Empir. dum dicunt Cidonium
roboret ventriculum, quia astringit, ergo
respicuum, ib.
utabant Empir. quia propria subiecta
uestigatorum non poterant inquirere, ib.
errabat Briso viens principio commu-
ni in perquirenda quadratura circuli,
in fine cap.
err. Massarie de indicantibus sanguinis
diffusionem. 377
err. Empir. dum in erisipellate par-
tibus laccidarum videntur suppurantibus.
ib. c. 8.
err. Empir. dum claudum remedijs
affert, 378
err. experientia sola in medicina ince-
dit. 379. c. 5.
err. Empir. dum putant ex re semel
facta fieri experientiam, ib.
err. Empir. dum ab hausto medica-
mento putant fieri sensationem, ib.
err. qui videntur secretis. 380
err. qui dicunt experientiam procedere ab
effectibus ad causas, cum procedat ab
effectibus ad subiecta. 384

Vi err. qui à subiectis, vel à causis remotis
putant vniuersale colligi, 384
Errata quæ reijciuntur in XIII. libro.
Errata tria & non plura posse committi
in administrandis remedijs. 386
Vi err. Empir. dum quantitatem reme-
diorum, à communibus indicantibus su-
munt. 387. c. 2.
Vi err. dum in affectibus pulmonis dant so-
lum duas drachmas pro vice sacchari ros-
æ. ib.
Vi errant qui in Vigilijs dant diminuta
seminifera, ib.
Vi err. qui in magnis obstructionibus solum
vnciam cum dimidia oxymellis exhi-
bent, ib.
Vi err. dum in oculorum doloribus, & in-
flammationibus solum aqua tepida
videntur, ib.
Err. qui videntur in sedandis doloribus, aqua
rosacea plumbeo alembico stillata, ib.
Vi errant, qui videntur diminui a feri lactis
dosi in ardenti febre, ib.
Dum videntur in collica passione anemiam
diminui virtutis, ib.
Dum in lumbricis auferendis nigis videntur,
ib.
Dum diminutis & extraneis remedijs pu-
tanti gonorrhœam sanari, ib.
Dum tentant mouere menses fabulosis præ-
sidijs. 389
Dum sili enectis dant saccharo condita, ib.
Vi err. empirici dum leuissima de causa
dant pharmaca, 389
Dum nimiam inedia præcipiunt choleræ
detentis capitis destillationibus, ib. c. 3.
Vi err. dum terrena videntur, quando non
oportet, ib.
Err. videntur Conciliator & Cardanus,
dum sustinent nunquam terrena rationem
conuenire, ib.
Err. videntur dum videntur repellentibus
quando non oportet, ib.
Erratum proponitur cuiusdam medici no-
stri temporis dum applicat in angina par-
tis externæ gutturis repellentia, ib.
Errata duo Guidonis reijciuntur, dum ne-
gat vsum repellentium in affectibus à
causa externa, alter in affectibus à ma-
teria crassa, ib.
Vi err. qui in principio inflammationis non
purgato corpore videntur laxantibus, ut
est oleum amygdalarum dulcium, ib.

INDEX RERUM

Vi er. Alalus Medicus dum laxantibus occidit Theaginem Cynicum Philosophum. 389.
Vi errant qui repellentia applicant strumis. 389.
Vi er. qui viuuntur hyeme Herbis siccis. 389.
Vi errant qui curant Alatronam Romanam medicamento ex alga non purgato corpore. 389.
Vi er. dum omnibus dant syrupum post duas horas ab incipio calore paroxysmi. 389.
Vi er. dum omnibus dant post tres horas à syrupo cibum. 389.
Vi er. dum referunt mulierum iudicio de cibandis agris, & de alijs. 389.
Vi er. Medici dum in acutis horas cibandi pro die sequenti prescribunt ac si essent vates. 389.
Vi er. dum in statu morbi precipue purgant sanguinem mittunt, & alia efficiunt. 389.
Vi er. dum plus nutriunt in statu morbi, quam in principio. 389.
Vi er. Empirici, dum obseruant virtutem languidam indicare, qua valde nutriunt, & fortem indicare inedia. 389.
Vi er. dum alunt debiles multum, & sepe. 389.
Errata & ia que committi solent circa quomodo agendum. 395.
Vi er. qui putant, quod lapis renum, & vesica possit remedijs frangi. 395.
Vi errant Medici quidam viens pro calculo minuendo in preclarissimo viro Electuario de vitro. 395.
Vi errant dum per loca affecta euacuans. 395.
Er. dum exhibent pharmacum in collica passione. 395.
Er. dum in vteri inflammatione mouent menses. 395.
Er. dum in renum inflammatione dant diuretica. 395.
Vi er. qui in calculosis dant diuretica. 395.
Vi famosus circulator morte peremptus calculosum. 395.
Vi er. qui adhibent fidem alicorno. 395.
Vi er. qui credunt lapillos preciosos malignitati aduersari. 395.
Vi er. qui dant refrigerantes syrupos actu calidos. 395.

Dum localia actu frigida applicant partibus externis. 395.
Er. qui viuuntur glacie in alterantibus syrups. 395.
Vi er. dum tenent febrientes in calido cubiculo. 395.
Er. dum permittunt ut plurimi ingrediantur cubiculum. 395.
Errata circa vbi agendum notantur, pag. 398. cap. 5.
Vi er. rudiores dum in omni morbo procedunt cathartici. 398.
Vi er. dum occidunt egrum, qui lotionibus capitis enassisset. 398.
Vi er. dum in sanguineo fluxu narium applicant pinis narium astringentia. 398.
Vi er. in curandis lumbricis. 398.
Vi er. qui putant saluatellam in affectibus lienis esse accomodatam. 400. cap. 6.
Vi errant Aenobarbus loquens de saluatella. 400.
Vi er. qui in omni maligna febre viuuntur vesicantibus. 404. cap. 8.
Dum dicunt, quod propterea humores in agrotantibus sint transponendi ad cutem, quia est debilior, argumentum est in secunda figura ex affirmatiuis. 405.
Vi er. qui in febribus malignis probantes vesicantia viuuntur analogismo empirico. 405.
Vi er. qui pro comprobatione vesicantium viuuntur enthimem. ex signo solubili. 405.
Vi er. dum exemplo canis rabidi paralogizant de vesicantibus. 406.
Vi er. qui primum de medio concludunt per simile tertio. 405.
Er. quoque qui in maligna febre nunquam admittunt vesicantia. 406. cap. 9.
Er. qui dicunt vesicantia nocent, ergo non habent locum. 406.
Er. qui negant vesicantium vsum in febribus, quia incidunt in primam figuram cum minori negatiua. 406.
Vi er. qui in principio febrium dum turget materia dant semper pharmacum. 406.
Vi er. quidam arguentes à paribus ad totum. 406.
Vi er. qui dicunt, nunquam crudis existentibus humoribus esse euacuandum. 406.
Errata duo committunt, dum dicunt vesicantia non esse admissenda in febribus quia calefaciunt. 406.

Errata quæ reijciuntur in XIV.
libro.

r. qui dicunt reuulſionem eſſe attra-
ctionem. 413. cap. 2.
r. qui dicunt reuulſionem indicari ſo-
m a materia, quæ eſt in motu. 417. c. 3.
r. Curtius, & Manardus dum inter-
erantur Hippocratem loquentem de
uulſione. ib.
r. Fernelius, & Petrus Briſotus di-
cunt ſanguinem egredi à ſeſta vena,
ia eſt expulſus à fibris rectis. 417. c. 3.
r. Fernelius dicens fieri reuulſionem
ter partem ſupernam, & infernam,
nequaquam ſinter partem dextram
ſiniſtram. 426. cap. 9.
r. Argenterius dum dicit, ſanguinem
edi à ſeſta vena ob dolorem ſeſtio-
, & vinculorum. 417. cap. 5.
r. Altimarus, dum dicit ſanguinem
edi ob vim vacui. ib.
r. recentiores dicentes ſanguinem à
ta vena deſluere vi grauis. ib.
r. qui dicunt Cauterium commiſſure
onaliſ reuellere per diſtantiſſima
n ſit per proxima. 419. cap. 6.
r. Laurentius ſoubertus dicens in in-
flammatione manus eſſe per idem cubi-
u reuellendum. 423.
r. Argenterius negans non eſſe perfe-
m reſtitutionem inter partem dex-
m, & ſiniſtram. 426. cap. 9.
r. Briſotus, & Fernelius dicentes
d fibra recta ſolum ſini in longum
enſe. 428. cap. 10.
r. Curtius intelligens per uafa com-
nia in reuulſione ſeruanda uenas.
ap. 11.
r. Curſius, dum uidetur tenere quod
ueniat per ſe reuulſioni trahere hu-
es ad originem fluxionis. 431. c. 12.
r. Manardus, & Curtius dicentes
obotomiam non poſſe eſſe remedium
tum reuulſorium ſcilicet, & deriu-
um. 432. cap. 14.

ata quæ reijciuntur in 15. libro.

Empiricorum dum putant, agrotan-
ſemper unico affectu præter natu-
detineri. 434.
r. qui exiſtente uirtute imbecilli,

dant medicamenta potentiſſima. 436.
Er. dum in morbi lumine uirtute exiſten-
ſe robuſta plenè nutriunt. ib.
Er. Empirici, dum eadem die qua uirtus
eſt attendendum, alia quæ affectum re-
ſpiciunt, quæ alijs diebus poſſent dari,
exhibent. ib.
Vi er. qui utuntur exiccantibus in ulceri-
bus ante amotionem intemperiei partis
circumſtantiſ. 437.
Vi er. qui utuntur Sarcocollis, & deterſo-
rijs in ulceribus ante amotionem intem-
periei partis circumſtantiſ. ib.
Vi errant Medicus Theſalius, & noſtra-
tes aliqui in curatione puncturæ nerui.
437.
Vi er. noſtrates dum omittunt indicatio-
nes quæ debent ſumi à partibus. 442.
Vi er. nonnulli chirurgi, dum primis die-
bus roborant partes debiles. 444.
Errata chirurgorum, dum in omni ulcere
utuntur exiccantibus. 447. cap. 7.
Primum eſt dum ulcus eſt cum fluxu.
Secundum dum pars circumſtans eſt im-
bibita.
Tertium dum pars circumſtans eſt in-
flammata.
Quartum dum in ulcere eſt durities ſcyr-
rhoſa. ib.
Quintum erratum, dum utuntur exiccantibus
ante ablationem impedimento-
rum. ib.
Vi er. qui in ſuppurandis apoſtematibus
utuntur duris emplaſtris. 450. c. 8.
Errata rudiorum chirurgorum unde pen-
deant. ib.
Vi err. qui ſemper uetant lac beſticis ob
leuem obſtruſionem. 451. cap. 9.
Vi er. qui ſemper febris ſemper reijciunt ue-
ſicantia. ib.
Vi er. qui in omni maligna febre ueſican-
tia proponunt. ib.
Quando errant qui conuulſionem curant
ys quæ excitant febrem. ibi.
Erratum quorundam notatur qui calidis
curant conuulſionem factam ab arugi-
noſis ſuccis. ib.
Vi er. quoque utuntur calidis in conuulſio-
ne ex pituitofiſ ſuccis. ib.
Vi er. qui purgant ſtomachum dum mor-
ſum paſtur. ib.
Vi er. qui in ſpleneticis incipiunt ab ape-
rientibus, & non aſtringentibus. ibi.

Uter, qui apparentibus populis semper respiciunt sanguinis euacuationem à cubi-
ro. ib.
Uter, qui congelatos pedes putant esse ca-
lescentia. ib.
Errata duo Rudiorum de ordine medi-
candi. ib.
Uter, dum permittunt totum pus ab apo-
stematē egredi. 456.
Uter, dum symptoma hamorrhoidum,
hirudinibus tractant. ib.
Perrant, qui utuntur diureticis in ha-
bentibus cruditates. 457. cap. 11.
Uter, qui dant manam habentibus. crudos
succos in pectore. ib.
Uter, qui in principijs morborum dant
sem. mellonum. ib.
Perrant Archigenes, dum dicebat sem-
per à lenioribus esse exordicandam cu-
ram. 453. cap. 14.
Uter, dum in principijs morborum utun-
tur frictionibus Balneis, & cucurbitu-
lis. 458.
Uter, dum nunquam applicant localia
absque purgatione. ib. 958. cap. 11.
Uter, qui prima die in phrasi non au-
denti vii oxyrodinis. ib.
Uter, qui prima die in dolorib. articulari-
bus anodyna non applicant. ib.
Errant non solum qui prohibent medici-
nas, & phlebotomiam in alui fluore, ve-
rum etiam qui semper in fluxu utuntur
medicinis. 460. cap. 12.
Euacuatio nunquam facienda per loca as-
fecta. 395.
Eustachius Rudius defenditur, & lauda-
tur. 215.
Exempla cur non concludant. 351.
Exemplo pulcherrimo ostenditur natu-
ram differre à consuetudine. 183.
Exempla apud Crisost. sæpè falsa pro veris
proponuntur. 354.
Exempla ex Galeno ut à somno excitent.
• 435.
Experientia nihil concludere ostenditur.
351.
Experientia cur fallax. 155.
Experientia cur non pertineat ad Ale-
xandrum. 349. cap. 2.
Experientia est paralogsismus, licet ex in-
finitis particularibus colligatur. 382.
Experientia ex particularibus sola
non docet. ib.

Experientia ex Aristotele non dat uni-
uersale. 381. cap. 6.
Experientia non dare propositiones
universales indefinitas. 384.
Experimentum ut definitur ab Arist.
379. cap. 5.
Experimentum non ab unica memoria,
sed à multis fieri. ib.
Experimentum perfectum quomodo fiat
ut non decipiat. ib.
Experimentum ut est falsus syllogismus.
381. cap. 6.

F

Facies coloratio agrotantium quos
morbos portendat. 250.
Facultates omnes, & præcipue sensitiuas
ob consuetudinem amitti. 181.
Faces nigra quam melancholiam indu-
cent. 267.
Fax melancholica aut austera, & ut acida
fiat. 301.
Faces luteæ quid significant. 304.
Falopij opinio de ortu Cephalicæ, & basi-
licæ. 152.
Famelici ostendunt pituitæ acide redun-
dantiam. 258.
Febris diu durat ob tres causas ex Gale-
no, scilicet ob particulam læsam, ob
crassitiem humorum, & ob erratum
commisum. 326.
Febris maligna à quibus externis causis
excitari solet. 245.
Febris ardens à quibus externis causis
fiat. ib.
Febris tertiana detenti solum alternis die-
bus ex Galeno debent cibari. 394.
Febricitantibus aer frigidus maius commo-
dum, quam incommodum affert, pag.
398.
Felis tria venena. 302.
Fernelius de morborum formis agens quibus
principijs suffulgit. 311.
Fernelij opinio, quod causa periodorum
sit idiosyncrasis, est falsa. 213.
Fernelij commentum, cur euacuatio bra-
chij dexteri conveniat Hepati, sinistri
leni. 156.
Fides ut mitigat dolores. 329.
Finis in affectibus præter naturam cin-
randis triplex est. 364.
Figura tertia habet sex modos possibiles,
& non

NOTABILIVM.

<p> & non plures : 382. lisci morbum ut Galenus cognoverit fore breuem. 248. atus varios morbos pro varietate locorum facere. 125. atibus ut qualibet pars corporis vexetur. 275. atus aliquando ossa frangere. ib. atus definitio ex Galeno qua sit. ib. atus causa efficiens non potest esse calor omnino diminutus. ib. atus ut generentur. ib. atus ex Galeno comparatur. aeri antrino. ib. atum causa alia est generationis, alia expulsiōis. ib. atus à quatuor causis externis fieri possunt. 276. atus ut capitis dolores efficiant. ib. atus ut oriantur à diminuta alteratice, & ab irritata expultrice. 277. atus ut ex urina cognoscantur. ib. atus indicatur à tensione sine pondere. 278. atus ex Avicenna indicatur à tribus modis. 279. à motu scilicet membrorum. ib. à sono. ib. à tactu. ib. atus que corporis partes subiecte sint. 1. cap. 13. atus ut cognoscitur ex sono esse in varijs testinis. ib. atus ex Galeno mirabiliter discutuntur alio collo, ruta, cimino, nigella, & iso. ib. atus vel à mittente, vel à recipiente causa fit. 343. ationum causa qua sint. ib. atum attrahere puriorem sanguinem, & puriorem ex Galeno relinquere. pag. 2. atum morbos dari, ut quinque argumentis probant aduersary. 312. cap. 3. atum morbos non dari quinque efficacissimis argumentis probatur, 313. pag. 4. atus in temperies in cerebro obliuio in Hepate hydropisim facit. 444. atus ut in humido operatur albedinis, & in siccis nigredinem. 303. atus causa sex sunt ex Galeno, pag. 7. </p>	<p> Frigus ut differt à rigore, & horrore, pag. 250. Frigida causa qua per se refrigerant, qua sint. 253. Frigida causa, qua per accidens refrigerant, qua. ib. Frigus est quid positivum, & non privativum contra Cardanum. ib. Frigus quod sit quid positivum duplici experimento ostenditur. ib. <p style="text-align: center;">G</p> Galenus defenditur dum ei adscribitur, quod apendices ossium sint duriores ossibus. 144. Galenus solum duo humana cadauera, ea que imperfecta dicit se vidisse. 151. Galenum cur non semper sequimur, pag. 152. Galenus reprehendit usum medicinarum 194. 195. Galenus ut pronovit morbi brevitatem. Filicis. 210. Galenus ut pronovit longitudinem pleuritidis, Anaxionis. 211. Galenus precipue docet esse distinguendum id quod calefactum per se ab illo quod per accidens. 19. Galenus cur præceteris laudat quartum clima. 252. 283. Galeno quomodo consentit hoc principium, quod omnes passionēs araro, & densio fiant. 320. Gallica lues in principio ut virtute analogismi inuentum fuerit remedium. 376. Genus unum cur unicam habeat contrarietatem. 359. Giulius Scaliger refert gallicam luem tolli vel aqua ex theriaca destillata, cortice iuniperi tormentilla, caduo benedictio, scordeo, & dictamo. 390. Glandula, que assimilatur pine, & que dicitur conarium, qua sit. 260. Glandule ossis cunealis usus qualis. ib. Glandula mesenterij cur melancholiam quoque suscipiant. ib. Glandule pancreas ubi sint. ib. Glandularum natura fecit ubicumque vena, vel arteria bipartitur. 261. Graciles ut possunt habere multum sanguinem. 265. Graciliras ut sit aliquando ex sanguinis </p>
---	--

repletionem . ib.
Gravitas, & leuitas ut ex Arist. sunt for-
mae elementorum . 316.
Gravitas indicat copiam excrementorum,
sed non versa vice . 340.
Guaiacum lignum cur curet gallicum tres
opiniones . 385.
Guaiaci qualitas si esset substantifica non
curaret gallicum, probatur . 315.

H

Habere tres angulos non convenit pri-
mo Scaleno . 184.
Habitus & dispositio non sunt dua species
qualitatis, & cur . 73.
Hemorrhoidalis sanguis quam melancholia
indicer . 63.
Hætica febris cur periodis careant . 210.
Hepar aliquando inuentum in parte fini-
stra, licet in dextra . 153.
Hepar pervenit ad mucronatam Carula-
ginem . 133.
Hepar ut afficitur per consensum vicina-
rum partium . 59.
Hepatis figura imitatur semilunium, pag.
129.
Hepatis vlcus ut noscitur signorum syn-
drome . 29. cap. 19.
Hepatis vlcus ut noscitur dum est in gib-
ba, vel sine parte . 30.
Hepatis incendium et extinguit calorem
ventriculi . cap. 5. 2. libri
Hepar non esse principium venarum ra-
tione analytice probatur . 170.
Herbarum succi cur oleo preseruantur
ne acescant . 298.
Herbarum succi acescunt ob duas cau-
sas . ib.
Hernia quomodo fiant . 86.
Hieronymus Cardanus errat & dum dicit
frigus esse priuativum . 253.
Hieronymus Cardanus hallucinatur, dum
loquitur de admirabili lapillo Papæ
Clementis Septimi . 326.
Hieronymus Capuacensis reicitur, dum di-
cit periodorum causam esse naturam
humorum . 213.
Hippocratem omnes crediderunt fuisse
sua seculi auctorem . 348.
Hippocratis aphorismos non omnes esse
perpetua veritatis . 52.
Hippocratis aphorismum de balbis non

esse semper verum . 139.
Hippocrates cur laudat præ cæteris quatuor
clima . 256.
Hippocratis sententia omnes sunt melio-
di censura subiectæ . 459.
Historia Cardinalis Cibò de hæmorrhagia . 149.
Historia cuiusdam Comitis percelebris . 187.
Historia agrorum Hippocratis proponi-
tur, ut cognoscatur per quas vias natu-
ra curet morbos . 399.
Homines assuescere possunt uenenis ob du-
plicem rationem . 180.
Homo quatenus est aliquod animal est ri-
sibilis, est propositio falsa . 375.
Horror ut differt a rigore, & frigore, pag.
250.
Humores si mouerentur ex se, omnes in pe-
des currerent . 342.
Humorum aliqui mane, aliqui uespere, ali-
qui nocte, aliqui in meridie moventur . 209.
Humores predominantes ut noscantur per
physiognomiam . 201.
Humor acer ut in cerebro maniam, & in-
cute scabiem facit . 125.
Humorum species quindecim sunt . 196.
Humorum peccantium signa conuertibilia
qua . 254.
Humorum peccantium propria signa tria
sunt . ib.
Humorum saporis quot sint, & qui . 205.
Humores ad instar præterit induunt naturas
affectibus præter naturam . 236.
Humores synceri neque in ægris, nec sanis
inueniuntur . 291.
Humores dulces qui sunt per se, & qui per
participationem . 295.
Humores ut a putredine fieri possint dul-
ces . ib.
Humores albi ut indigent modo calidos, &
modo frigidos, & modo mistos humores . 304. cap. 8.
Humorum mixtura qua sunt possibiles, &
qua impossibiles . 308.
Humores putridi ut non possunt am-
plius redire . 319.
Humores frigidi ut conuertantur in pus . 335. cap. 15.
Humores calidi cum uiribus robustis
conuertuntur in pus . 31.
Humores in corpore à quo efficiuntur

nr. 342.
me cur lac, & piffano difficilis acce-
cant. 298.
pocondria crassa ob duplicem causam
profundi ventriculo. 66.

I

Acobus Syluius de concanitate ossium,
digitorum nescit Galenum defendere. 159.
obus Syluius ut iurauerit in verba
Galeni de offe sacro. 162.
obus Syluius ut iniuste calumniatur
Cesalium. 165.
or sanguineus dum pituita miscetur ex
Galeno dulcis fit. 295.
or in omnibus humorib. proprius ex
Galeno inuenitur. 296.
eritiae cur saepe ab humore melancholi-
ofiat. 273.
ritiae cur tollitur hemorrhoidibus
pertus. ibi.
opathia duplex cum dependentia, &
ne dependentia. 39. cap. 2.
ur calidum est, ergo vena lata, non va-
ti. 170. cap. 3.
ur cur sanguinem bene coquat, pag
87.
ur lege Hepar.
nium nocet, ergo bilis redundat, est
Galeni. 23.
no ut augetur bilis. 244.
nium intestinum, ut nescitur dum fla-
bus corripitur. 280.
nium quot mala in cholericiis pariat.
90.
nium ut est causa falfedinis. 295.
sphaera cur sit ouata. 320.
s motum circularem non esse natura-
m, ut nouit Philosophus. 359.
s ut gignitur à motu diurno. 320.
s cur sub polis non detur. ibi.
no ex particularib. cur nulla. 351.
petentia à quo humore fiat. 249.
la regionis frigide cur diligentissimi.
4.
bus à qua causa fiat. 278.
nientes natura cur facilius curan-
t, quam per consuetudinem. 184.
assam satidam ferculis immiscent.
7.
cantia, cur non possint esse plura

tribus. 367. cap. 13.
Indicantis tria in febribus putridis, ibi.
Indicans, remedium, & egrotus Syllogis-
mum perfectum faciunt, ibi.
Indicata unde sumantur, ibi.
Indicans dupliciter sumitur, ibi.
Indicationes curatiuas qui colligunt, ab
externis, in quod erratum incidunt. 354.
Indicans cur debet esse praesens, ibi.
Indicantia sunt medij termini, quibus in-
dicata perquirimus, ibi.
Indicans cur debet esse id, quod curatur.
362. cap. 9.
Indicationem qui sumunt ab externis,
transcunt de genere in genus, ibi.
Indicans semper indicat ut est causa, ibi.
Indicatio quid sit. 354.
Indicantium diuisio cur in eodem genere
fieri debeat, septem afferuntur rationes.
352. cap. 3.
Indicata non sunt accidentia generis in-
dicantium, sed species quae per se pri-
mo modo predicantur digenere. ibi.
Indicationes cur non desumantur à disse-
rentijs accidentalibus. ibi.
Indicans cur unum indicet, & non plura.
358. cap. 6.
Indicans genericum cur non indicet reme-
dium specificum. 357.
Indicans unum indicat unum. 358. cap. 6.
Indicans cur debet esse notus indicatis;
360. cap. 7.
Indicans ut est medius terminus. ibi.
In Indicationibus perquirendis qui nescit
diuidere, sic centum annis quareret re-
medium illud non inueniret. 352. cap. 3.
Indicationis verè conditiones. ibi.
Indicationis conditiones ut omnes à logi-
ca. ibi.
Indicantis inherentiam ostenditur esse
quid equiuocum. 128.
Indicatio quomodo fiat cum discursu, pag.
351.
Indicatio sola inuenit remedia. 349. cap. 2.
Indicatio sola pertinet ad methodum, &
non analogismus, & experientia. ibi.
Indicationem habere tres terminos syllo-
gisticos ostenditur. ibi.
Indicationes ante morbum curandum non
esse plures tribus. 434.
Indicantium comparationes esse quinde-
cim, & non plures. 443. cap. 5.
Indiuidua cur non curentur. 357. cap. 5.
c In-

INDEX RERVM

Individuum vnum vt complet speciem. 384
Inductio cur sit vanus inquirendi modus.
Inductio non possunt inueniri que sunt ignota. 372.
Inductio cur reducitur ad tertiam figuram cū conclusione vniuersali. 381.c. 6.
Inductio per milliona millia particularia falsi adhuc non daret vniuersale. ibi.
Inductio ab Aristotele, & ab alijs reprobatur vt insufficiens ad cognoscendum vniuersale. ibi.
Inductiones habere verisimile, & non necessarium. ibi.
Inductio quid sit, ex Alessandro, Auero, D. Thoma, & Io. Grama. ibi.
Inductionem non dare vniuersales propositiones sed indefinitas. ibi.
Inductio nec statim, nec per regressum ex se potest dare vniuersalem cognitionem. ibi.
Inductio vt conferat ad cognoscendum vniuersale. ibi.
Inedia lege ieiunium.
Inflam natio magis prohibet cibum, quam febris maligna. 394.
Inflammatio quomodo fiat. 451.
Instrumentum aqua refertum à quo aqua dissuluit, vt sanguis in venis. 418.
Intellectus, & intelligibile, sensus, & sensibile sunt relativa secundum dici, pag. 65.
Intellectus vt cognoscit vniuersale, pag. 385.
Intelligendi vis cur ocio contabescit, & exercitio augetur. 181.
Intemperatura vt sint nonaginta sex, pag. 6.
Intemperies humida cur per se ledit re- tentricem. 11.
Infectia medicorum quando non sit ferenda. 71.
Infectia progressus partium in medendo quantis sit. 161.
Intercipientis materia, vt est intercipientis, est occulta. 381.
Iudices recti de rebus anatomicis qui sint. 145.
Inueteri corticem curare Gallicum ex Scaligero. 285.
Inuertia, & ledentia vt doceant internes a. l. l. l. 23.
Inuertia, & ledentia vt breuis doceant pec- 251.

inuantia, & ledentia vt merito quinque locorum doceat internos affectus. 261.

L

L *Ac copiosum arguit polyamiā, pag. 325.*
Lactens color ex quorum mixtura fieri possit. ibi.
Lachrimæ ex Aristotele cur falsæ. 390.
Lacus cur falsi non sint. 291.
Lætitia excessu qui mortui sint. 285.
Lætitia vt parit meliorem coctionem, pag. 284.
Lætitia nimia dissoluit vires. ibi.
Lenitas à qua causa fiat. 10.
Lapilli præciosi reuincuntur. 397.
Lapis Bezoar lege bezoar. 395.
Lapis in vesica nunquam comminuetur electuario de vitro Asontag.
Lapides terri cur diaphani. 230.
Lapis iudæus puluerizatus, haustuque renalem calculum tollit. 328.
Lapis lazuli vt facit pillos palpebrarum augere, ibi.
Latitudo venarum adest, ergo iecur est calidum, consequentia est nulla. 170.
Latitudo venarum est signum temperamenti primigeni, & non aduentiti. 167.
Laxantibus vt occiditur Theagines Cy- nicus ab Alalo Medico. 392.
Lepra vt tolli possit. 427.
Lenientia medicamentosa vt sunt auxilia preseruatoria, & non curatoria pre- dicit. 334.
Leithargi causa immediata qua. 291.
Leithargus signorum syndromie vt noscitur. 24 cap. 12.
Leithargo affecti cur pulsus tardum habeant. ibi.
Leithargi locus affectus est substantia cerebri, & non membrana. 25.
Lenitas, & gravitas vt ex Aristotele sunt elementorum forma. 317.
Lienis durities quam melancholie speciem insciat. 267.
Lien cur proficiat hyruidines hamorrhoi- dishus applicite. 148.
Lien cur proficiat cucurbitula natibus applicite. ibi.
Lingua agrotantium non semper indicat peccantes humores. 233. cap. 12.
Lin.

lingua est aspera, & nigra, ergo peccant
adusti humores, non sequitur. ibi.
ippitudines ex Galeno habent circuitus.
206.
ithiosis causa immediata qua sit .
cap.7.
ithotomi error dum secat duos primos
musculos penis. 105.
ithotomus quando, & cur interficit .
134.
viduus color non necessario indicat ve-
nenatum esse. 332.
ocus affectus oculatus ex Galeno ab
exercitatus in anatomia cognoscitur .
221.
oca quatuor communia qua ostendunt
peccantes humores. 201.
ocalia, & ide topica.
ocus affectus oculatus per quinque loca
noscitur. 240.
cum affectum non indicare, ostenditur .
356. cap. 11.
ocus à proportionem ab Argenterio pro-
positus, ut est vitiosus. 241.
curio, & inciturnitas nimia quomodo
melancholiam indicent. 271.
gici ut optimè dicunt secundam speci-
em qualitatis fieri à tertia, & à quarta.
23.
gica cur dicunt, quod potentia solum à
ertia, & à quarta specie qualitatis ori-
nuntur. ibi.
ndinum Anglia cur sit temperati ac-
is. 283.
ntrici à quibus verè gignantur. 232.
ntrici cur à qualibet re dulci non gi-
nantur. 233.
ntrici cur in lactatib. nō generentur. ibi.
ntrici aloe illota, vel mercuri paulil-
certo necantur. ibi.
ntricorum colores non indicant pec-
cantes humores. 231.
ntrici ut fieri possint quoque ex bile, &
melancholia. ibi. cap. 12.
ntrici ex Galeno ut fiant, magnus ca-
r requiritur. 232.
ntrici quibus remedijs superentur .
28.
ntricorum auxilia ubi sint admini-
randa. 400.
ntricorum remedia potentissima sunt
fercurium, & cantaris laugatta, ut
oponitur à Galeno. 399.

Lumen maius probatur non extinguere
minus 65.

M

Macilenti ut aliquando ex sanguinis
plenuidine fiant. 265.
Maciores cum audacia indicant melan-
choliā ex flaua superaffata. 270.
Maciores ut corpus calefaciant . pag.
262.
Maciores cur reddant homines melanco-
licos. 266.
Magnes non potest ratione caloris fer-
rum trahere. 306.
Magnitudo partium corporis sequitur
formatricem, & multitudinem materis.
171.
Magnitudo morbi cur non indicet phlebo-
tomiam. 372.
Magnitudo morbi cum virium robore per
analogismum declarat phlebotomiam .
377.
Maior propositio cur non potest esse parti-
cularis in prima, neque in secunda figu-
ra. 373.
Malignitas in humoribus putridis à quib-
us externis causis exciteitur. 245.
Manardi argumentum in Auicē. de
quarto genere melancholia nullius ro-
boris. 299.
Manardus cur præ ceteris laudet sextum
clima. 282.
Manus nomine quid apud Gal. intelligi
debeat. 41.
Marcus Cato quot vanissima referat. 686.
Mare habet motus specie diuersos .
261.
Maris falsedo unde fiat varie opiniones .
ibi.
Mare tandem cur non fiat dulce. ibi.
Materia prima nullum accidens termi-
natum habere potest, & cur . 228.
Materia primæ essentiam non esse poten-
tiam probatur. 315.
Materia prima per se primo modo est cur-
pus. 320.
Materia primæ dispositiones sunt octo
differentie positionis. 323.
Mathematica cur nō est philosophia. 320.
Maxilla inferior si magna sit indicat ha-
bitum esse pituitosum . 254.
Medica auxilia qua efficiant in agris. 334.

- Medici additi auctoritatibus ut à Gal. reprobenitur.* 131.
- Medicina pro loco affecto remoto qua virtute debeat esse.* 387.
- Medicus sine anatomia ut homini insano comparatur.* 85.
- Medicus ut curat specificas naturas, & non indidit.* 356.
- Medico necessaria quae sint.* ibi.
- Medicorum praeipuum munus quod sit.* 452.
- Medicina praepostera ut mortem adferat.* 434.
- Medius terminus solum valet, dum est universalis, & predicativus.* 372.
- Medius terminus non debet contineri.* 371.
- Medius terminus cur non debet esse communior quaesito.* ibi. cap. 2.
- Medij termini conditiones sunt tres, & quae sint.* 360.
- Medio termino praeterit, vel futuro non concluditur quaesitum praesens.* 361.
- Medius terminus cur non potest esse definitio maioris extremi.* 357.
- Medius terminus universalior predicato conclusionis: semper vitiosus.* 3.
- Medius terminus ex Arist. quot modis sit vitiosus.* 34.
- Mel cur frigidus inuit.* 274.
- Mel in calidis bilem, in frigidis sanguinem gignit.* 284.
- Mel cur statim ab igne redditur amarum.* 296.
- Melancholia cur redditur austera.* 301.
- Melancholia mista cum sanguine si ad cutem moueatur elephanticum facit.* 272.
- Melancholia adusta ut per excrementa, & per sapores cognoscitur.* ibi.
- Melancholici cur ieiunium ferre non possunt.* 274.
- Melancholia quartum genus Avicenna, ut admittitur.* 299.
- Melancholia cur aliquando fit austera, aliquando acida.* ibi. cap. 5.
- Melancholia diu est suppressa, ergo est adusta, valet.* 267.
- Melancholia cum copia peccare ut noscitur.* 340.
- Melancholia reddi expultricem diminuat.* 266.
- Melancholia faecalis cur ex Alberto terribiles immaginations afferat.* 265.
- Melancholia faecalis ut cognoscitur per actiones animales.* ibi.
- Melancholia omnes ut quatuor locis cognoscantur.* 263.
- Melancholia omnes indicantur à risu, fletu, & audacia.* 270.
- Melancholia ex flaua adusta, ut indicetur ex nimia locutione.* 266.
- Melancholici cur sint salua abundantes, & à potu abstinentes.* 270.
- Melancholia, quot sint.* 199.
- Melancholici cur cito digerant.* 265.
- Melancholici cur famelici.* ibi.
- Melancholici cur auari.* 263. cap. 9.
- Melancholici cur semper versentur cum medicis.* ibi.
- Melancholici semper firmanantur in unica infamia.* ibi.
- Melancholici cur pueri, & iuvenes esse non possunt.* ibi.
- Melancholici ut sunt ex Avic. vsa phar-macorum.* ibi.
- Melancholici ut omnes graciles esse debeant.* ibi.
- Melancholici sunt taciturni, morosi, astuti, ingenui, & firmi in sententia.* ibi.
- Melancholici terrestres sunt timidi, sine siti, salua abundantes, famelici, & morosi.* lib. 6. cap. 9. & 10.
- Melancholicus sanguis cur sit serosus.* 266.
- Melancholia cur deletatur serositate, pag. ibi.*
- Melancholia adusta mista sanguini, si febrem faciat, carbonem quoque molitur.* 272.
- Melancholici audaces magis marent, quam timent.* 270.
- Melancholia ut sex cur potius timorem, quam furorem excitet.* 269. cap. 10.
- Melancholici omnes in quo conueniant.* ibi.
- Melancholici ut indicentur à typis, & ab his determinatis insultus.* 269.
- Melancholia putrida ut differt à non putrida.* 268.
- Melancholia ut aliqua causantur à causa externa frigida, alique à calida.* 262.
- Melancholia quae est fax sanguinis ex Galeno est frigida, & sicca.* ibi.
- Melancholia tres species sunt, & quae sint.*

lib. 5. cap. 1.
 melancholicis cur habeant respirationem
 asam. 83.
 melancholia cur in aere canoso gignatur.
 7.
 melancholia in cerebro aestitiam, in sto-
 macho famem facit. 125.
 melancholia cor colligatur in porta, &
 non in cava. 148.
 melancholia ut vesperi monetur. 30.
 memoria deperditur non semper à pituita
 ti. 257.
 memoria deperditur ob externum frigus.
 bi.
 memoriae deperdite causa ut inuenian-
 tur: paulo infra.
 memoriae cur exercitio augetur, & ocio
 ontaebeat. 181.
 nses ob quas causas supprimantur.
 R.
 nses quibus remedijs possint reuocari.
 89.
 rcurium mirabiliter necat vermes.
 32.
 ssagetes interficiebant parentes, eosque
 comedebant. 175.
 ssesterij abscessus qua methodo sit no-
 scendus. 38. cap. 23.
 ssesterij abscessus cur raro in Italia
 at. 255.
 rhodus medendi sola contradictiones
 medicinae soluit. 440.
 rhodi medendi ut à logica pendent.
 51.
 rhodica secta auctores, & dogmata.
 48.
 rhodus cognoscendi protopathiam,
 diopathiam, & sympathiam. 61. cap. 3.
 rhodus qua nascitur dum os non aperit-
 ur ob lesionem nervorum in origine.
 0.
 rhodus qua nascitur causa, cur brachi-
 um non possit adiacere ad pectus ob lasio-
 nem in origine nervorum. 82.
 rhodus qua nascitur cur brachium non
 potest trahi deorsum ob morbum exi-
 stentem in origine nervorum. 83.
 rhodus cognoscendi lesionem cervicis
 ob lasam quintam vertebrae thoracis.
 9.
 rhodus cognoscendi protopathiam.
 bi.
 rhodus cognoscendi omnes causas pa-

ralysis primi paris musculorum dorfi.
 ibi.
 Methodus qua nascitur, quando pars su-
 perior dorfi non extenditur ob lesionem
 nervorum in origine. 90.
 Methodus cognoscendi causas semipar-
 lysis sexi paris musculorum dorfi. 91.
 Methodus cognoscendi lesionem secundo-
 rum articularum digitorum ob morbum
 in ceruice existentem. 95. 96.
 Methodus cognoscendi lesionem ter-
 ticui quatuor digitorum ob lesionem
 in origine illorum nervorum. 97.
 Methodus cognoscendi cur quatuor digiti
 non possint extendi ob morbum in origi-
 ne quarti paris nervorum. 98.
 Methodus qua nascitur, dum minimus di-
 gitus laeditur ob morbum cervicis. 99.
 Methodus nascendi, dum index digiti
 non extenditur ob morbum existentem in
 nervorum origine. ibi.
 Methodus qua nascitur, dum pollex non
 extenditur ob lesos nervos in rete, siue
 rete, vel collo. 100.
 Methodus nascendi dum brachium lesum
 flectitur ob nervos lesos in rete, vel in
 colo. 102.
 Methodus nascendi dum tibia sursum
 non potest trahi, ob morbum existentem
 in tertio pari nervorum lumborum. 103.
 Methodus nascendi dum tibia non potest
 deferri supra tibiam ob morbum in
 exordio nervorum. 104.
 Methodus nascendi dum tibia non potest
 introsum inflecti ob nervos lesos in
 osse sacro. 106.
 Methodus cognoscendi dum tibia non po-
 test flecti in rectum ob morbum ossis sa-
 cri. 111.
 Methodus cognoscendi dum tibia non po-
 test extendi in rectum ob morbum exi-
 stentem circa os sacrum. 108.
 Methodus cognoscendi dum tibia non po-
 test extendi ob morbum circa quartam
 vertebrae lumborum. 109.
 Methodus cognoscendi dum symptomata
 tibia prodeunt à lumbis. ibi.
 Methodus cognoscendi dum semur non po-
 test extendi ob morbum primi paris
 nervorum ossis sacri. 111.
 Methodus cognoscendi dum semoris sym-
 ptomata oriuntur à morbo existente
 circa primam vertebrae lumborum. 108.

- Methodus cognoscendi dum sextus musculus femoris per sympathia leditur.* 114.
Methodus cognoscendi dum digiti pedis non extenduntur ob morbum quarti parvis nervorum pedis. 117.
Methodus inveniendi tranolorum specifice causam. 100. cap. 9.
Methodi proponuntur, quæ declarant an res sit. 340.
Methodus cognoscendi partes corporis flatibus correptas. 280.
Methodus cognoscendi quando pituita sit falsa ab humore aliunde missa, & quando ab humore existente in eodem loco. 291. cap. 2.
Methodus auferendi falsam pituitam. ibi.
Methodus cognoscendi differentias specifice dulcedinum humorum. 296.
Methodus curandi nimiam humorum acerositatem. 300.
Methodus cognoscendi humorum austeritatem. 301.
Methodus cognoscendi quomodo facta sit porracea bilis. 303.
Methodus curandi affectus à porracea bile prodeuntes. ibi.
Methodus cognoscendi dum albus color humorum indicat misturam intus factam. 304.
Methodus cognoscendi humores copia peccare. 348. cap. 1.
Methodus medendi cur in particularibus non sit. 357.
Methodus medendi est logica. 356. cap. 4.
Methodi nomine intelligitur perfectus Syllogismus. 350.
Methodus medendi ab analytico fonte pendet. 353.
Methodi universales ex Gal. sine exercitio non satisfaciunt ad exactam cognitionem. 447.
Micrologia nominum ubi reprehenditur à Galeno. 363.
Mista omnia à prædominante moventur. 282.
Misturarum aliqua sunt intus facta, aliqua extra. 289. cap. 1.
Mista cur semper sint humores peccantes. ibi.
Mista ut habent duas humiditates vitales scilicet, & oleaginosa. 300.
Misturas humorum numero esse 80084. ostenditur, & non plures. 445. cap. 9.
Misturæ um combinationes vi colligantur. ibi.
Mistura ex tribus, & quattuor vi colligantur. ibi.
Mistura humorum quæ sint impossibiles. ibi.
Molla à qua melancholia fiat. 268.
Moluntis quid ex Arist. 360.
Modi dicendi per se sunt impermiscibiles. 460.
Monachorum quorundam optimum decretum. 187.
Morbos forma non dari, quattuor argumentis efficacissimis ostenditur. 313. c. 4.
Morbo an sit essentielle magnitudo, & mos 7.
Morbi cur ut plurimum per plura signa debent nosci. 16.
Morbos forme dari, probans aduersarij quinque argumentis. 311. cap. 3.
Morbus ceruicis vi per Sympathiam apparuit in manu. 73.
Morbus ceruicis ut per Sympathiam appareat in diaphragmate. 151.
Morbus in clunibus vi per Sympathiam apparet in brachys. 74.
Morbus in vertebra ossis sacri per Sympathiam apparet in pene. ibi.
Morbus in temporibus per Sympathiam apparet in oculo. ibi.
Morbus potest esse in iugulo eius apparentia in labijs. 27.
Morbus in pleura eius Symptoma in iugulo. ibi.
Morbus existens in tertio pari nervorum, & Symptoma in labijs vi noscitur. 81.
Morbus existens ubi est brevis apparet in maxilla inferiori qua methodo perquiritur. 77.
Morbus existens in secundo vel quinto pari nervorum, eius Symptoma in maxilla inferiori qua methodo perquiritur. 78 cap. 13.
Morbus ut potest esse in ilibus, & dolor circa costas. 86.
Morbus ut potest esse in medio pubis, & dolor circa sternon, & versa vice. 87.
Morbus ut potest esse in cubito, causa verò circa septimam vertebra ceruicis pag 94.
Morbus ut potest esse sub axillis, eius verò Symptoma in femore. 114.

NOTABILIVM.

rbus e Galeno tantus est, quantus est
ecessus à salubri statu. 166.
rbis quor sint qui habent circuitus. 209.
rborum tempora cur ab humoribus, &
on à morbis prudeant. 206.
rbis naturam ex Galeno esse ante cu-
ationem cognoscendam. 360. c. 7.
res animi sunt tales, ut acies mentis
ilem, prudentia melancholiam, & flo-
ditas sanguinem indisent. 255.
rs aliquando accedit, dum postponun-
ur paroxysmi 225.
rs repentina non arguit necessario ve-
enatum. 331.
tores primi si auferrentur quomodo
Mundus e x Arist. & Auer. rueret. 203.
tores primi si plures essent, ex Arist.
senti corruptibiles, & cur. 384.
ter lac habes, ergo concepit, non valet.
7.
ieres flatibus referta ut decipiantur,
am putant vtero zerere. 279.
cronata cartilago quo connexu sit vni-
a. 149.
sculus non fungitur officio suo ob tres
usas. 76.

N

Arium hemorrhagia non prouenit a
venis frontis. 147.
ura quot vias sibi parei in pellendis
morbis. 398.
ura est occupata in morbis pellendis,
in corrigendis plagis ab infantis me-
icis influctis. 379.
ura cur medicinis non est facienda
nsuetudinaria. 194. cap. 4.
ura cur conseruat species aternas pag.
88.
ura non patitur salus ab extremo ad
extremum. 187.
ura mirabile opus in culicis pede pag.
et.
ura simplex non facit duo, sed unum.
61.
ura cur incommodae quitationis senti-
a. 189.
ui omnes dant motum opticis exce-
is. 298.
uorum rete ubi sit, & quomodo sit. 147.
uorum coniugationes à coctyge non
odire. 163.

Nidrosi cibi à qua causa fiant. 297.
Nigrorum euacuatio ut differat ab atra
bilis euacuacione. 292.
Nomina ignota, & qualitates occultae, ut
sunt refugium Empiricorum. 312.
Nutriendi cur minus sint qui patiuntur
inflammationem, quam qui febrem ma-
lignam. 394.

O

O Basi qui sint cum paucio sanguine.
94.
Obstetricum impostura dum tangunt vie-
rum. 50. cap. 30.
Obstruclio magna qua oxymellis quantis-
rate tolli possit. 388.
Obstruclio nimia quod suffocet exemplo
declaratur. 352.
Occasio esterna cur incidunt homines in
malignam febrem. 243.
Ocium quod suffocet declaratur. 161.
Oculi macri, & concaui melancholiam in-
dican. 265.
Oculi albi ex Auer. habitum pituitosum
indican. 254.
Oculorum dolores, & inflammationes quib-
us remedijs tollantur. 388.
Occultas qualitates alius peripatetici de-
clarant quam medici. 311.
Occultarum qualitatum genus scire, quan-
tum conferat medende. 161.
Officia par. corporis viuentis esse immutabi-
lilia, alterabilia tamen. 168. cap. 2.
Oleum rosarum cur in capite est conc. & o-
rium, in alijs partibus repercutiens. 275.
Oleum calchasinum ut tollit nauseas, &
dulcedinem humorum. 297.
Oleum de corticibus citri ut liberari à
morte percelebrem mulierem. 64.
Omphacium cur ex Galeno in ardenti hy-
pocondriaca magis laudatur, quam ace-
tum. 298.
opus unde fiat. 239.
Opacum unde fiat. 230.
Operationes omnes ut à subiectis fluunt.
316.
Opiniones variae de pulchritudine oculo-
rum. 176. 177.
Opium non occidit ut frigidum. 324.
Opium cur occidat. 161.
Orbasius, & Montanus in hoc rectè di-
cunt, quod vermes à quolibet humore gi-

possint. 231.
Os pectoris ex quot ossibus conflet, quanti sit scire. 162.
Ossis pectoris vulnus ex ossium notitia melius curatur. ibi.
Oraculi delphici responsum. 283.
Oratio inuictiva contra Empiricos. 381.
Ordine resolutivo ut omnes artes fiant. 347.
Ordo curandi omnes affectus prater naturam quis sit. 435. cap. 2.
Ordo indicantium omnium quis sit. 440. cap. 4.
Ordo curationis ulcerum. 447. cap. 7.

P

Palpitatione ut noscitur dum à melancholia oritur. 271.
Palpitatione ex Galeno immediate à flatu fit. 279.
Panis triticeus albiſſimus gignit vermes. 232.
Panis ut gignit multum sanguinem. 281. cap. 12.
Papaver impedit ne catarrhus à pectore elidatur. 373.
Paralogismus secundæ figuræ ex affirmatiuis, & primæ ex maioris particulari declaratur. 331. 332.
Paralogismos trium generum committit qui ex proprijs non procedit. 204.
Paralogismus proprius rudiorum. 184.
Parelli opinio de periodis quæ. 213.
Parotides cur causent dolorem etiam in ingulo. 82.
Paroxysmus sit longus vel brevis ob quatuor causas. 213. cap. 8.
Paroxysmi incrementum non indicat morbi augmentum. 224.
Paroxysmi in feb. putridis à qua causa excutuntur. 225.
Passiones omnes ut pendunt à raritate, & densitate. 460.
Passiones probande aquè de subiecto suo dici debent. 374.
Particularia differunt per hic, & nunc, & non forma. 372.
Pars qualibet corporis per essentiam, & per consensum affici potest. 57.
Pars aliqua corporis dum est læsa, cur alia sitim lædantur. 58.
Pars corporis ut cognoscitur dum est per

se læsa. 69.
Pars mittens à frigore excitata ut plurimum sana est. 346.
Pars corporis suscipit excrementa ob duas causas. 343.
Pars mittens solum habet vim mouendis excrementa. 344.
Pars mittens potest esse fluxionis origo sex modis. 345.
Pars mittens ut cognoscitur dum irritatur à qualitate mordaci. ibi.
Partes corporis quæ amputantur, dum adest vrgens. 443.
Partes quando roborande sint. 444.
Paulus Aegineta dum dixit, vermes à calidis non fieri ut exponitur. 232.
Penis in Vulua coeundo cur cōstringitur. 31.
Penis duo primi musculi ut amittant usum ob errorem Isthotomi. 105.
Penis substantia unde oritur. 164.
Pericharia occasione moriuntur Dionys. Tyran. Sophocles, & Romana mulier 285.
Periodi cur inter propriissima signa humorum collocentur. 209. cap. 4.
Periodicatio non conuenit solum feb. putridis. ibi.
Periodicatio cur heclicis non conueniat. pag. 210.
Periodicationis opinio noua. 214.
Periodi ut inducent, & non inducent humores peccantes. 216.
Periodi cur à Medicis in multis morbis non obseruentur. 219.
Peripatetici cuiusdam erratum dum credidit magis Aristoteli quam sensui. 152.
Peripneumonia syndrome ut noscitur. pag. 26. cap. 14.
Peripneumoniam cur habeat diffinitionem respirationem pleuritide. ibi.
Peripneumonia cur habeat maiorem infimileuritide. ibi.
Peripneumonics cur faciem rubram habeant. ibi.
Per se conueniens uni per accidens omnibus vltus conueni. 219.
Peste affecti cur si semel curentur vix amplius lædantur. 194.
Petitio principij, & falsus Syllogismus sunt origines omnium errorum. 349.
Petitio principij sit dum melius terminus est genus, vel differentia maioris extremi. 372.

Pharmaca cur dentur febrientibus , pag.	Pituita acida vt irritet expultricem ?
334.	259.
Pharmacorum vsus quolibet mense solitus, vt irahit corpora in malam consuetudinem. 389.	Pituita dulcis vt accida sit. 299.
Phlebotomia vt est remedium mistum reuulsorium, scilicet, & deriuatorium . 432. cap. 14.	Pituitam pro varietate situs partium corporis varios morbos efficere. 125.
Phlebotomia vt semper est auxilium praeseruatorium. 334	Pituitae quattuor species. 196.
Phlebotomia à magnitudine morbi, & virium robore per Analogismum colligitur. 377.	Pituitosi tardè apprehendunt, sed firman- tur. 251. cap. 5.
Phrænesis vt fiat à bile syncera, pagina 248.	Pituitosi ad alia agrè transseunt. ibi.
Phthisis syndrome signorum vt noscitur : cap. 15. 27.	Pituitosi paucitate cibi tollunt sitim, & lassitudinem. ibi.
Physonomica signa polyemiam ostendentia. 285.	Pituitosi sunt somnulosi, carent, siti, & sunt vt plurimum inappetentes. ibi.
Physonomica ostendentia melancholiam. 265.	Pituitosi cur non fiant phrænetici . ibi.
Physonomica ostendentia pituitae dominium. 254.	Pituita acida excitat appetitum. ?
Physonomica ostendentia biliosorum succorum dominium. 246.	Pituitosorum succorum cause efficientes specifica quæ. ibi.
Pituita à qua melancholia fiat. 269.	Pituita cause externa per se quæ sint . 11.
Pituita à quo humore fiat. 273.	Pituitosus cibus in stomacho cur molestus . ibi.
Pituita cani significant pituitam. 255.	Plantago sicca contrariam naturam habet, quam viridis. 392.
Pituita pro necandis vermibus quæ sint 232.	Plantaginem non asstringere. ibi.
Pinguedo cur à sanguine non fiat . 285.	Platonis falsæ opiniones. 174.
Pituita salsa, Lege salsæ pituitam.	Platonis opinio de salsedine maris. 173.
Pituitam peccare copia vt noscitur. 339.	Pleuritici cur pituitosi, & melancholici fiant. 123.
Pituita salsa vt à ieiunio efficitur. 294.	Pleuritis vt distinguitur ab inflammatione vinculorum iecoris. 42.
Pituita salsa cause quinque. 295.	Pleuritis signa quattuor tantum sunt . ibi.
Pituita salsa vt curetur. ibi.	Pleuritis à quo sanguine fiat. 158.
Pituita solum per participationem esse potest dulcis. ibi.	Plinius cur vires falsa immiscet. 327.
Pituita frigida vt fiat dulcis à potenti calore. ibi.	Plutarchus quid referat de filijs parentum tabidorum. 251. cap. 5.
Pituita acida cur reddat homines famelicos. 298.	Polyemia vt cognoscitur. 281. cap. 13.
Pituita vt si i potest melancholia. 299.	Polyemia in quo acre fiat. ibi.
Pituita salsa vt noscitur dum fit humore aliunde misso, vel in eodem loco existente. 322.	Polyemia somno fit. ibi.
Pituita mucosa impedit nutritionem. 259.	Polyemia à balneo fit. ibi.
Pituita vt noctu mouetur. 256.	Polyemia ex lingua rubra noscitur. 287.
Pituita vt à somnis præcognoscitur. 258.	Polyemia vt per excrementa cognoscitur. ibi.
Pituita differentia specifica, vt ex Galeno noscuntur. 251. cap. 5	Ponticum, lege Austerum.
	Pontica vt differant ab acerbis, & quæ sint. 300. cap. 5.
	Pontica vt fiant. ibi.
	Porrigo furfuracea vt cognoscitur dum à bile vel melancholia fit. 250.
	Positionis differentia vt à primo mobili prodeant. 320.

Potentia naturalis sunt aptitudines subiecti. 316.
 Potentiam non esse materiam essentiam probatur. ibi.
 Potentie cur locantur in predicamento accidentium. ibi.
 Potentie vi oriantur omnes a tertia, & quarta specie qualitatibus. ibi.
 Potentie non pendunt a forma, neque ab efficiente per transmutationem, neque ab efficiente per emanationem. ibi. cap. 5.
 Potentie operatrices omnes ut ex Galeno pendunt ex figura, & situ, ibidem cap. 8.
 Potentie operatrices, ut sexcentis modis variant actionem. 353.
 Predicatorum primi modi per se sunt quinque gradus. 356.
 Predicamenta in logica melius tractantur, quam in Metaphysica.
 Predicamentorum proprietates cur impermiscibiles sint.
 Predicatum accidentale semper est falsum. 171.
 Pregnans non cognoscitur hydromelle vel suffitu aromatum ut dicit Hippocr.
 Pregnantes qui dicunt ex urina nosci sunt anatomici imperiti. 47.
 Pregnans vi cognoscitur signorum syndrome, & mirabili mirrenchisa. 54.
 Presagire breuitatem seu longitudinem morbi vi colligitur ex primis diebus. 211.
 Principia communia ex Averr. inductione veloci noscuntur. 352.
 Triuatio ex Aristotele vi est forma. 32.
 Priuatio quomodo sit principium rerum naturalium. 238.
 Problema vi rite possit proponi. 347.
 Proprietates cur alie conueniant per accidentia, alie nunquam. 299.
 Portopathia que affectio sit. 60.
 Protopathia inueniendo exemplum. 97.
 Ptolomeus fuit post aduentum Christi 68. annis. 244.
 Ptolomeus sub primo climate provincias temperatissimas posuit. ibi.
 Pubis ossa per symphysim sunt connexa ideo in parturientibus non dimouentur. 150.

Puella veneno alia suo amplexu alios venenabat. 194.
 Puerperia ex quibus humoribus consistit. 272.
 Pulchritudinis, & turpitudinis opinio unde habeat principium. 177.
 Pulmonis medicina quas partes percurrat antequam illuc veniat. 387.
 Pulsilogii instrumentum ab altore nuper inuentum. 223.
 Pulsus duo sunt arcana, & ostenditur ut consequi possimus. 329.
 Pulsus difficultas unde oritur. 222.
 Pulsus vermicularis quid indicet. ibi.
 Pulsus ostendens per se feb. putridam, quis sit. 220.
 Pulsus ostendens diariam quis sit, pag. 220.
 Pulsus prodians per se ab inflammatione quis sit. ibi.
 Pulsus mollis latus, & undosus quid per se, & quid per accidens indicet. 210.
 Pulsus durus, & ferratilis quid per se, & quid per accidens indicet. 221.
 Pulsus serinus non est proprius plenitudinis. ibi.
 Pulsus serinus vi conueniat omni inflammationi. ibi.
 Pulsus durus ab aqua frigida potu sit, pag. ibi.
 Pulsus vibratus quid per se, & quid per accidens indicet. ibi.
 Pulsus formicans quid per se, & quid per accidens indicet. ibi.
 Pulsus duriores cur indicent bilem peccare. 250.
 Pulsus per se non indicat humores, & eorum collisiones vel cruditates. 210.
 Pus effectum per vomitum quando indicet vlcus ventriculi. 22.
 Pus vi fiat, & a quo. 445. cap. 15.
 Pus in urina vi indicat renes esse ulceratos. 22.
 Pus in urina vi indicat hepar esse ulceratum. ibi.
 Pus cur albescat. 66.
 Putredo si vi calida laderet, nos non aleret lumbricos. 325.
 Putredini ex Galeno quattuor sunt contraria. 295.
 Putredinis remedia ut omnia sunt

preservatoria, & non curatoria .
 335. cap. 11.
 Putredo ex Aristotele duplex, simpliciter,
 & secundum partem. ibi.
 Putredo secundum partem que sit quat-
 tuor opiniones proponuntur, & Zaba-
 rulle opinio laudatur. 333.
 Putredo in venis cur non sit medicabilis .
 334.
 Putredo in venis ut pervenit ad cinerem .
 ibi.
 Putridi humores duas habent partes ,
 coctam, idest dulcem, & spiritus
 acres. 231.
 Pylorum ostenditur non oriri à fundo
 ventericuli. 131.
 Pyttion sanatur à morbo pectoris urina
 manente cruda. 211.

Q

Qvastio sub quo climate aer sit tempe-
 ratissimus. 185.
 Questio an Vitellina bilis sit mistura. 155.
 cap. 6.
 Questio an bilis flava sit mistura ex bile,
 & pituita aquosa. ibi.
 Questio de vesicantibus. 404. cap. 8.
 Questio, ex qua bile sit porracea .
 ibi.
 Questio ubi generetur porracea 297.
 cap. 7.
 Quest. de occultis qualitatibus unde pro-
 deant: 310.
 Questio de occultis qualitatibus ut est
 Philosophica, & non medica. 313.
 Questio an experimentum dei univ ersa-
 le. 383.
 Questio an repellentia lesis glandulis de-
 debeant applicari. 392.
 Questio de bezoarticis. 397.
 Questio an saluatella sit frenetica, pag.
 399. cap. 6.
 Questio an in febrì cum alui fluore liceat
 uti medicinis vel sanguinis euacuatio-
 ne. 310.
 Qualitates occulte qua dicantur. 310.
 Qualitates secunda ex Gal. plurima sunt,
 & que simi. 121.
 Qualitates prima manifesta qua dican-
 tur. 309.
 Qualitates ut à substantia pendent, pag.
 319.

Qualitates occulte ut fiant. 321.
 Qualitates manifeste cur fiant. ibi-
 dem.
 Qualitates occultas non fieri omnes e
 quatuor primis probatur duodecim ex-
 perimentis. 324. cap. 11.
 Qualitatum occultarum natura ut per
 analogiam inveniatur. 326.
 Qualitatum occultarum sectatores cur
 sepe vanissima credant. 324.
 capit. 11.
 Qualitas secunda utrarum sub se multa
 species vari continentur. cap. 1. 308.
 Qualitates tertie que sint. ibi.
 Qualitatem occultam vocant substantiam
 per se operantem. 309.
 Qualitates occulte cur dicantur totius, &
 solius substantie. ibi.
 Qualitates substantificas dari, quibus ex-
 perimentis probentur Adversarij. ibi.
 Qualitates occulte si dentur, potentie non
 essent in qualitate sed in substantia .
 308.
 Qualitates occultas non esse substantias
 operantes duabus rationibus probatur .
 ibi.
 Qualitates occulte, & nomina ignota sunt
 refugium rudiorum. 212.
 Qualitates occultas non esse substantias,
 ut efficaciter ostenditur. 315.
 Qualitates occulte si essent substantie duo-
 bus aduereantur quod est inconueniens.
 ibi.
 Qualitates occulte ex Gal. habent contra-
 rium. 316. cap. 6.
 Qualitates occulte ut fiant cum Galeno ex
 infinitis alterationibus elementorum .
 ibi.
 Qualitates occulte sunt incognoscibiles .
 ibi.
 Quando agendum unde sumatur .
 130.
 Quantum agendum ut indicatur à tempe-
 ratura. 114.
 Quantum agendum ut ab actione indica-
 tis desumitur. 119.
 Quantitas peccantium humorum: quomodo
 cognoscatur. 238. cap. 1. & cap. 2.
 Quarta figura cur vanissima. 372.
 Quartanarij cur magnis scatcant sudori-
 bus. 266.
 Quartanarij cur plurimum lotium creant.
 ibi.

Quar-

Quartana febres cur aliquando fiant post pituitofas. 299.
Quatuor prima qualitates ut ex Aristotele dici possint elementorum forme. 317.
Quattuor qualitates non esse omnium primas exemplo Horology ostenditur. 326.
Quid agendum ut sumitur ab essentia specifica indicantis. 357. cap. 11.
Quomodo agendum à quibus conditionibus colligatur. 129.

R

R *Arefactio nimia ut refrigerat animal.* 253.
Kuritas, & densitas, ut sunt initia omnium passionum. 319.
Raritas ut pertinet ad situm. 320.
Rarum, & densum unde pendeant. ibi.
Rarum quomodo sit prius calido. ibi.
Rarum quomodo sit causa caloris. 322.
Realdi Columbi error dum dicit Lithotomum incidere collum vesicae. 133.
Realdus Columbus ut errat dum dicit musculos frontis habere fibras rectas. 147.
Recessus à statu naturali quomodo duplex sit. 166.
Rectitudo quid significet apud Galenum, & Hippocratem. 427.
Regio frigida remota à mari cur frigidior sit ea quae proxima est mari. 281.
Remedia non posse per analogysmum sine experientia inquiri, sed solum per indicationem. 349. cap. 2.
Remedia in statu naturali non danda. 393.
Remedia non posse inueniri nisi quod quid est indicantis prauioscatur. 353.
Remedia specifica quomodo in nullo modo dicendi per se praeferantur de indiscantibus genericis. 356.
Remedia omnia sunt specifica, & non generica. 357.
Remedia tribus instrumentis perquiruntur. cap. 1. 369.
Renatus ut optimè rescit Iacobum Syluium. 164.
Renes ut constituti sint. 137.
Renum vlcus ut synàrome signorum no-

scitur. 29.
Renum pus cur non faciat. ibi.
Renum pus ut noscitur dum prodit à superficie uel ab interna parte. ibi.
Repellentibus uti possumus in cancro ante purgationem totius. 459.
Repellere ad partes participes quando oportet. ibi.
Repellentia in podagra quando applicentur. 392.
Repellentia quando non conueniant, sunt nouem casus. 391.
Repellentia ex Gal. ut sunt duum generum. ibi.
Reuulsionem fieri modo à uirtute mittente, modo attrahente. 414.
Reuulsionis genus esse auersionem, & non attractionem. ibi.
Reuulsio ut possit conuenire fluxis, & fluxuris. 415.
Reuulsionem fluxis conuenire probatur efficaci argumento. ibi.
Reuulsionis proprium est sequi remissionem humorum. 417.
Reuulsionis causa efficiens immediata est innominata. ibi.
Reuulsionis definitio quae sit. ibi.
Reuulsio cur non sit attractio. 414.
Reuulsio ut semper per proxima fiat. 425.
Reuulsionis condiciones quattuor, pag. 156.
Reuulsioni fieri per uasa communia per se conuenit. 428.
Reuulsio quomodo fiat secundum relictudinem uariae opinionis. 412.
Reuulsio quomodo fiat per distantissima. 386.
Reuulsioni non conuenire per se, ut humores trahantur ad originem. 430. cap. 12.
Reuulsio quomodo fiat trahendo uersus originem. 413.
Reuulsio quomodo non sit attractio. ibi.
Reuulsio non est solum sursum, & deorsum. 417.
Reuulsioni non conuenire per se, ut per distantissima fiat, probatur multis rationibus. 419.
Reuulsio in quibus differat à deriuatione. 432.
Reuulsio cur saepe per distantissima fiat. 420.

pag. 420.
eunſio quomodo per proxima fiat .
 394.
eunſio ut per proxima, ut per remota, &
ut per remotiſſima fiat . 423.
Rhinocerotis cornu eſt fabula. 396.
Ridiculum eſt audire medicos preſcriben-
tes tria folia lactuca iſis, que ſolent quo-
tidie lactuca impleri. 193.
Rigor ſine ſucceſſione caloris quid indicet.
 240.
Rigor ut differt ab horrore, & frigore .
ibi.
Rigor à pituita, & bile quibus ſignis co-
gnoſcatur . ibi.
Rigor eſt ſine conſecutione caloris, ergo
peccat pituita acida valet . ibi.
Rofacea Aqua ut noſcitur dum facta eſt
plumbeo Alembico . 229.
Rubrum intenſum vult Gal. indicare
melancholiam. 225. cap. 9.
Ruſtus ut indigent melancholiam, pagina
 167.
Ruſtus acidum qui habent cur non fiant
pleuritiſi. 251.
Ruſtus acidi quomodo fiant. 297.
Ruſtiſci cur externo frigore minus ledan-
tur. lib. 4. cap. 6.
Ruſtiſci cur ſine pharmacis liberentur ma-
gnis morbis . 177.

S

*S*abelini cur in Italia non generent .
 283.
Sabelini in Africa cur non vuant .
ibi.
Sacris videtur interdittum quibusdam
citare Galeni libros, vel capita .
 381.
Salua ut occidat ſcorpiones. 264.
Sal cur penetret. 291. cap. 2.
Sal cur omnia conferunt. ibi.
Salſedo à quibus cauſis fiat. ibi.
Salſa pituita cauſe ex Gal. que ſint .
ibi.
Salſedinis cauſa ex Auicenna qua .
ibi.
Salſedo ex Ariſt. ut fiat . ibi.
Salſedinis vera cauſa qua ſit . ibi.
Salſedinis plurime immediata cauſa .
ibi. cap. 2.
Salſedinis proprietates ex Gal. que ſint .

ibi.
Salſedinis cauſas Galenum non at-
tuliſſe, ſed modos quibus ſit ſal-
ſedo. ibi.
Salſedo ut fiat duo propoſuntur modi .
ibi.
Salſum, & amarum ut ex Ariſt. & Gal.
non differant ſpecie . ibi.
Salſedo in pituita quando fiat per
mixturam intus factam, quando
extra. ibi.
Salſedinem ut cauſat ieiunium . ibi.
Salſe pituita cur ſint ex Gal. quinque cau-
ſe. ibi.
Salus Italicè Gamſo à qua cauſa fiat .
 281. cap. 13.
Salus quomodo curetur. ibi.
Saluatella vena nullo modo eſt ſplenetica .
ibi.
Sanguinei cur hirsuti. 285. cap. 14.
Sanguinei frontem magnam, atque aures
erectas habent . ibi.
Sanguinei habent immobilitatem oculo-
rum. ibi.
Sanguinei habent facultates animales re-
uſas. ibi. cap. 14.
Sanguinei ex Gal. ſunt ſtolidi, ibi-
dem.
Sanguinei ut ad riſum proſuſi. ibi.
Sanguinei ut incontinentes . ibi.
Sanguinei cur difficulter montes aſcen-
dant. 286.
Sanguinei quem habeant pulſum . ibi.
dem.
Sanguis à ſecta vena ut defluit . 417.
 cap. 5.
Sanguinis abundantia quibus ſignis ex
Galeno cognoscatur. 285. cap. 14.
Sanguis quomodo per ſe dulcis ſit. 295.
 cap. 3.
Sanguis ut conuertatur in alios humores .
 281. cap. 13.
Sanguis cur augetur in vere. ibi.
Sanguis in quo aere augetur . ibi.
Sanguis diſcitur per tuiſſim ſpumofus,
ergo à pulmone, eſt emhimeſis
falſum. 43.
Sanguis pulmonis cur non ſemper ſit ſpn-
moſus. 42.
Sanguis per tuiſſim eiectus ut noſcitur
quando à capite, & quando à pulmone
prodit. 43.
Sanguis pallidus quid indicet. 304. cap. 8.
 San-

INDEX RERVM

- Sanguis in venis cur non fiat pus.* 451.
Sapor dulcis, lege dulce.
Sapores indicantes omnes melancholicos humores, qui. 300. cap. 3.
Sapor ponticus quid indicet per se. 206.
Sapor unus, ut unus humorem unum per se, & non plures indicet. 205.
Sapor dulcis quem humorem indicet. ibidem.
Sapor acetosus quid significet in humoribus corporis. 206.
Sapores indicantes mixturas humorum, qui. 290.
Sapor amarum indicat maiorem calorem quam falsus. 295.
Sciatica quando ex Galeno secto alio crure tollitur. 431. cap. 13.
Sciatica ut tollitur secto cubito, ut secto alio crure, & ut eodem. 424. cap. 8.
Sciatica cur vario modo sanetur. ibi.
Scientia cur sit aeternorum. 356. cap. 5.
Scordeum cur axe Gallicam luem. 385.
Secreta medicorum, cur sepe ledant. 380. 381.
Semen copiosum arguit polyamiam, 285. cap. 14.
Senes debiles assueti facilius omnia tolerant inuenibus robustis in foliis. ibi.
Senum ulcera cur difficulter sanentur. 450.
Serapue cur aliquando in officinis accescant. 297. cap. 4.
Serum: lege ichor.
Serum lactis qua quantitate dari possit in ardenti febre. 388.
Sex res non naturales non esse causas remotas. 203.
Sex diebus adisci potest medicina decepta indicatione desumenda à partibus 442.
Signa communia dum sunt dubia, quomodo reddi possint certa. 250.
Signa dum plura sunt, quibus magis sit credendum. 249.
Signa conuertibilia peccantium humorum que. 205.
Signa propria morborum ex quibus fontibus colligantur. 15.
Signa humorum propria tria sunt. 322.
Signa propria raro inueniuntur. 205.
Signa omnia affectuum reducuntur ad quatuor fontes. 121.
Signa temperaturarum artis medicæ cum aliorum syndrome indicant. 175.
Signa communia qua scientiam pariunt à sex fontibus hauriuntur, & cur. 17.
Signorum communium primus fons. 18.
Signorum communium secundus fons. 19.
Signorum proprium semper unicum esse debet. 171.
Signa propria biliosorum humorum que. 205.
Signa qua ostendunt naturam, & qua existentiā, ut differant inter se. 227.
Silentium tacto maius quam par sit melancholiam indicat. 271.
Singularia nullas habent conditiones seu naturas præter hic, & nunc. 383.
Similitudines ut sunt generum, & non specierum. 406.
Sitim non semper auferri potationibus. 69.
Sitis que sedari non potest qua. 249.
Situm remouentia qua sint. 389.
Solutio contritus sensim facta sine dolore fit. 75.
Somnus qua optime conciliant. 387.
Somnus ut concoquat, & vigilia digerat. 284.
Somnus ut cruditatem tol. at. 284.
Somnia indicantia peccantes humores que. 218.
Somnolenti ut inditant dulcem pituitam. ibi.
Somnia aquea pituitam: ignea bilem ostendunt. 249.
Somnus nimis quod suffocet calorem ostenditur. 252.
Sophia Priola ut suffocatione liberetur oleo curri. 64.
Sorries vitiosus, & concludens declaratur. 211.
Species cur à natura aeterno tempore conseruentur. 180.
Species stant sine quolibet individuo, sed non è comita. 383.
Species non est de natura generis. 374.
Spleneticæ cur astringentibus curentur. 408.
Sputa rotunda quid significant. 260.
Status morbi cur non patitur remedia. 394.
Strume ut curentur. 392.
Stuporis cause efficiētes et inueniantur. 277.

277.
Subiectum passionum ex Arist. semper est
causa remota. 385.
Subiectum cur nunquam ex Auerroes dat
quid passionum. ibi.
Subiecta prima passionum cur semper que
renda sint. 291.
Substantia locorum affectionum ignorata
ignoranter quoque specifica indica-
tiones. 144.
Substantia Appendicum ossium cognita
prodest curationi Appendicum. ibi.
Substantia cur sit impassibilis. 312.
Substantiam non posse aduersari substan-
tia neque qualitatibus. 310.
Substantia quid significet apud Galenum.
318.
Substantia ut sit omnium basis. ibi. cap. 7.
Substantia corporea ut alia est similis,
alia dissimilis. ibi.
Substantia cur nihil indicet. 311.
Substantia tota peccare ut dupliciter in-
telligitur. 310.
Succi omnes ut acefiant. 299.
Succi omnes habent quatuor partes quat-
tuor elementis respondentibus. ibi.
Sudor, ex Aristotele, cur falsus. 290.
Sudoris sapores ut ostendant varios pre-
dominari humores. 260.
Suffocatio caloris à quinque causis fieri
potest, & que sint. 61.
Suppressio ut suppressio urina nec aliqua
suppressio ut aliqua est requirit cathete-
rem. 376.
Syllogismi duplantis exemplum medi-
cum. 14.
Syllogismus falsus, & principij peti-
tio sunt origines omnium errorum. 349.
Syllogismus ex particularibus cur nullus. 331.
Syllogismus non potest esse bonus, nisi tres
formaliter differant. 282.
Sympathia ex Galeno triplex est scilicet
generis, vicinitatis, & operis familiari-
tatis. 36. cap. 3.
Sympathia inter leuē, & ventriculum
per que vasa feruetur. 206.
Sympathia inter œsophagum, & trache-
am, stomacum, & cor que sit. 63.
Sympathia nulla est inter mesenterium,
& iuxta Aldeu. 71.

Sympathia inter musculus temporalem,
& musculos oculorum, & palpebrarum
que sit. 78.
Sympathia que sit inter musculus orinum
à stiloide, & iugulum. 80.
Sympathia inter quartum musculus ma-
xille, & linguam. ibi.
Sympathia inter brachium, & pectus. 81.
Sympathia inter primum musculus bra-
chij, & os pubis. 82.
Sympathia inter nates, & brachia cap.
16.
Sympathia inter collum, & quintam tho-
racis vertebra. 84.
Sympathia inter testiculos, & musculos
ventris. 71. cap. 18.
Sympathia inter sternon, & pubem pag.
87. cap. 19.
Sympathia inter os sacrum, & pectus. ibi.
Sympathia inter os sacrum, & manus. 88.
Sympathia inter cervicem, & quintam
vertebra thoracis. 89. cap. 21.
Sympathia inter os sacrum, & cervicem.
91. cap. 23.
Sympathia inter cubitum, scapulam, &
collum. 93. cap. 24.
Sympathia vicinitatis exemplo musculo-
rum cubiti declaratur. ibi.
Sympathia cause sunt impenetrabiles si-
ne cognitione situs, figure, & originis
partium. ibi.
Sympathia inter secundos articulos digi-
torum manus, & humerum 44. cap. 15.
Sympathia inter tertium articulum
quatuor digitorum, & internum arti-
culum cubiti. 96. cap. 26.
Sympathia inter externum humeri tu-
berculum, & quatuor digitos pollice
excepto. 97. cap. 27.
Sympathia inter minimum digitum, &
humerum. 99.
Sympathia inter indicem, & cubitum.
ibi. cap. 25.
Sympathia inter tertium articulum polli-
cis, & cubitum. 100.
Sympathia inter pollicem, & cubitum,
ibi.
Sympathia inter brachiale, & externum
humeri tuberculum. 101.
Sympathia inter brachiale, & humerum.
ibi.

rum. *ibi.*
Sympathia inter ilia, & tibiam. 102.
Sympathia inter lumbos, & tibiam. 103.
 104.
Sympathia inter tibiam, & femur.
ibi.
Sympathia inter pubem, & tibiam.
ibi.
Sympathia inter ultimas vertebrae lum-
borum, & prima ossis sacri, & tibiam.
 217.
Sympathia inter coxendicem, & tibiam.
 106. c. 35.
Sympathia inter media appendicem ili-
um, & tibiam. 107. c. 36.
Sympathia inter tertium foramen lum-
borum, & tibiam. 108.
Sympathia inter maius trochantirium, &
tibiam. *ibi.*
Sympathia inter partem posteriorem ili-
um, & tibiam. 109. c. 37.
Sympathia inter tibiam, & foramina os-
sis sacri. 110.
Sympathia inter femur, & os sacrum.
ibi.
Sympathia inter femur, lumbos, & os sa-
crum. 111.
Sympathia inter femur, & undecimam,
& duodecimam vertebrae thoracis,
 112.
Sympathia inter pectus, brachia, femur,
ventrem, & primam vertebrae lum-
borum. 113.
Sympathia inter appendicem fibule, &
calcanei. 114.
Sympathia inter calcaneum, & quartam
vertebrae lumborum. *ibi.*
Sympathia inter calcem, & externum ca-
pui femoris, & os sacrum 116.
Sympathia inter calcem, tibiam, & fibu-
lam. *ibi.*
Sympathia inter digitos, & tibiam.
ibi.
Sympathia inter fibulam, & digitum pol-
licem. *ibi.*
Sympathia inter mediam fibulam, & mi-
nimum digitum. *ibi.*
Sympathia inter tibiam, & internodia
tertia quatuor digitorum, & secundum
pollicis. 117. c. 43.
Sympathia inter pollicem, & tibiam, &
os sacrum. 118.
Symptomati quando prius attendendum.

436.
Symptomaticos motus aliquando esse
adiuvandos. 410.
Symptomatum omnium resolutio in pri-
mas radices. 10. c. 6.
Symptoma ut non possit facere aliud
sympoma. 11.
Symptomata cur non indicent. 12. c. 10.
Symptomatum omnium inuisa quae sint.
cap. 6. primi libri.
Symptomata non tolluntur, nisi aliquid
quod est in facto esse tollatur. 20.
Symptomata cum sint iufieri cur non in-
dicent. 373. c. 4.
Symptomata utilia ex Gal. desumun-
tur a causis, locis affectis, & a
virtute. 356. c. 5.
Symptomata inutilia desumuntur a pa-
tiente. *ibi.*
Symphisis connexus quis sit. 149.
Synarthrosis connexus quis sit. *ibi.*
Synecdoche figura peotis, & non medicis
conuenit. 274.
Syndrome sufficientissima signorum com-
muniū scientiam parit. 17.
Syndrome signorum communium ex qui-
buz, & quot fontibus fiat. 24.
Syndrome signorum cur tutius doceat. 25.

T

T Abule nodus cur transparentior ?
 pag. 230
Tempus ex Galeno non indicat per
se. 368.
Temperatum quomodo intelligitur. 282.
Temperatum Germanum cur equipa-
rari possit temperato Abissino. *ibi.*
Temperamentum aequale ad pondus cur
non detur. 283.
Temperamentum aequale ad iustitiam in
omni climate inueniri potest. *ibi.*
Temperatum dum dicitur, ut intelligi de-
bet. *ibi.*
Temperamentum primigenium in agris
non seruandum. 168.
Temperamentum primigenium non esse
querendum, ostenditur exemplis.
ibi.
Temperatarum signa tradita in arte
medicinali quid arguant. *ibi.*
Temperatissimus vir sub primo climate
cur esset intemperatissimus sub septimo.
 282.

282.
Tensiones quæ cito sunt semper indicant
suum. 278.
Tensio grauius, & non grauius quid
significent. 341.
Terrebram non conuenire in debili. 390.
Terrebra quando moriem pariat
ibi.
Terrebra quæ mala pariat. ibi.
Theriac odor non potest lumbricos occi-
dere. 232.
Thesalus vocabatur latro. 349.
Thesalici putabant sex mensibus adisci
medicinam. ibi.
Thesalus solus vititur topicis ante purga-
tionem totius. 459.
Thorax est hyssidus, estque latitudo tho-
racis, ergo temperamentum est cali-
dum, consequentia nulla est. 168.
Timor est sine causa, & sine audacia, ergo
peccat sex melancholica, valet. 280.
Timor sine causa unde oritur. ibi.
Tinea ut nescitur, dum sit à bile. 250.
Tinea ut nescitur dum sit à pituita.
260.
Tinnitus aurium à qua causa fiat.
291.
Tonfores ut errant dum transuersim in-
cidunt musculum temporalem. 78.
Tonfores ut errant dum transuersim in-
cidunt primum musculum brachij pag.
81.
Tonfores dorfi, & lumborum apostema-
ta transuersim non debent incidere.
83.
Tonfores ut errant dum musculum inter-
num manus transuersim secant. 95.
Tonfores ut errant dum transuersim in-
cidunt frontem. 147.
Tonfores errant dum in longum incidunt
primum musculum brachij. ibi.
Tonfores errant dum secant in longum
primum musculum tibiae. ibi.
Tophi concrefunt à calore quoque mode-
rato. 136.
Topica cur sæpè ex Arist. in agris mutari
debent. 193.
Topica externa aëni frigida cur non ap-
plicentur. 305.
Topicis vititur Hippocrates ante purga-
tionem.
Tumorem nullum ex Sceligere curare Gullis.

canluem. 385.
Trallianus putauit febrem esse naturæ
connatum. 224.
Transcendunt de genere in genus qui sic
diuidunt: intemperiem aliam esse cum
materia, aliam sine materia. 6.
Transitus de accidente in subiectum non
datur in natura. 271.
Transitus de genere in genus cur fugien-
dus. 354.
Transmissionem humorum fieri ob quat-
tuor causas. 341.
Tumor ventriculi à flatu ut syndrome
noscitur. 27. cap. 16.
Tumor ventriculi ut noscitur dum est in
parie interna, & externa. ibi.
Tyranica est illorum doctrina, qui aucto-
ribus sunt additi, quod auctoritate Ga-
leni confirmatur. 151.

V

Vacuum non attrahit, sed suscipit.
pag. 343.
Vacuum ut attrahit. 344.
Valesius incidit in tria errata dum loqui-
tur de vetula Atheniensi cicuta alia
180.
Valesius errat dicens naturam esse habitum
consuetudinem dispositionem. 184.
Valesius non rectè tenet, copiam humorum
esse causam periodorum. 213.
Valesij argumenta in Auicennam de
quarto genere melancholia nullius ro-
boris. 299.
Valuerde reprehendit Vesalium dicen-
tem, dextrum cubitum in pleuritide
semper esse secandum. 158.
Vappa quomodo fiat. 300.
Varices in quibus partibus corporis fiant.
ibi.
Varices quando possint tuto secari, pagina
76.
Varices dum secantur aliquando homines
fiunt melancholici. ibi.
Varices à quibus causis externis fiant.
268.
Varices a vene indicant melancholiam.
265.
Vbi agendum unde colligitur. 127.
Vbi dolor ibi morbus, propositio est subal-
terna, & sæpè falsa. 86.

- Vena dextri cubiti non deplet Hepar me-*
lancholicis. 154.
- Vena cephalica ob capilarem si:rculum vi*
non possit esse capitalis. 153.
- Vena basilica sub se habet nervum, unde*
dum secatur manus est periculum,
quam dum cephalica, & mediana
145.
- Venam cephalicam vel medianam, cur*
tutius sit ut secemus. 146.
- Vena basilica magis quam alia vena, pro*
dest mamillis. 161.
- Vena saluatella secta ut inuat.* 149.
- Vena saluatella à quo oritur.* 154.
- Vena manus à quo truncho omnes orsan-*
tur.
- Vena non servant semper eundem situm,*
& exordium. 154.
- Venam portam esse sedem melancholiae.*
173.
- Vena sine pari non mittit furculos ad bra-*
chium. 158.
- Vena saphena non inuidetur non secto pri-*
us cubito. 389.
- Venarum latitudo non indicat tempera-*
mentum calidum. 167.
- Venenis quomodo assuescere possimus.*
180.
- Veneni calidis cur assuescere non possi-*
mus. 181.
- Venena in sele que sint.* 325.
- Venena tota substantia aduersantia tria.*
331. cap. 12.
- Veneni calidi accidentia que.* 161.
- Venenum est quid equinocum.* 161.
- Venenum absolute tale non datur.*
161.
- Venenatorum que pars prima ladatur.*
161.
- Veneni definitio cur unica esse non possit.*
161.
- Venenatum qua arte nosci possit.* 161.
- Venenatorum morbi qui sint.* 161.
- Venenati sublimato que habeant acciden-*
tia. 161.
- Venenatorum symptomata.* 161.
- Venenatus opio que accidentia habuerit.*
161.
- Venen cur melancholici Hypochondriaci.*
18.
- Ventriculus ut assuescere possit cubi-*
tilima concoctionis. 174.
- Ventriculus est per se laesus, ergo pituita*
redundat valet. 261.
- Ventriculus cur subiectus affectibus me-*
lancholicis. 273.
- Ventriculus imbecillitas ut cognoscitur à*
qua causa fiat. 69.
- Ventriculus imbecillitatem aliquando tolli*
ama frigiditas. 66.
- Ventriculus tunica non solum chylum effu-*
cere. 161.
- Ventriculus calidus ut refrigeretur à cali-*
ditate secoris. 161.
- Ventriculus ut laditur per consensum à*
splene, & Hepate.
- Ventriculum ex Galeno tribus modis affi-*
ci. 35.
- Ventriculi ulcus ut noscitur dum est*
in externa, vel interna tunica.
28.
- Ventriculi ulcus ut signorum syndrome*
noscitur. 161. cap. 17.
- Ventriculi ulcus cur situm excitet, ibi-*
dem.
- Venus confert, si tres conditiones seruen-*
tur. 186.
- Veritas sui, & obliqui index ex Arist. 1.*
de Anima. tex. 2.
- Vesaly opinio de ortu cephalice, & basili-*
ca. 152.
- Vesaly opinio quod vena non seruent eun-*
dem situm, & ordinem in omnibus. pag.
151.
- Vesaly error, dum secatur in omni pleuriti-*
de dextrum cubitum. 361.
- Vesalium vi iniuste Iacobus Syllius mor-*
det. 163.
- Vesica fellea cur sepe ladatur.* 273.
- Vesica calculus ut syndrome signorum no-*
scitur. 30. cap. 21.
- Vesica fellea lapilli à quo humore fiant*
pag. 273.
- Vesica quem fructum colligat ab urina.*
340.
- Vesica inflammata quando non curatur*
syringis. 374.
- Vesicantia ex Galeno ostenditur non cale-*
facere. 407.
- Vesicantium deserventes pro maligna fe-*
bre, robabiliter arguunt. 406.
- Vesicantia occipitis à plicia statim occu-*
porum straxionem tollunt. 388.
- Vesicantia an convenient in febre mali-*
gra.

gna.	404. cap. 8.	Viceris sanatio est fucata, dum videntur	
Vesicantium introductores in febribus videntur analogismo empirico.		exsiccantibus potentissimis.	449.
405.		Vicus quo ordine curatur.	435.
Vesicantia aliquando surgentes humores ad cutim astant.	408.	Vlcus trachea ut cognoscitur.	23.
Vesicantia quibus argumentis defendi possint.	ibi. cap. 10.	Vlcera lata quam melancholia. speciem indicent.	269.
Vesicantia quomodo, quamvis noceant, sint applicanda.	409.	Vlcera maligna cur alba fiant.	pag. 305.
Vesicantia ut colliguntur ex aegrotantibus Hippocratis.	ibi.	Vlcera non sanari ob quatuor causas.	143.
Vesicantia non inuare semper, probatur principio contradictionis.	410.	Vlcera non sanari ob plures causas quam quatuor.	449.
Vesicantia quando sint applicanda ex seipie signis colligitur.	ibi.	Vlcus Cachecticum quod sit.	ibi.
Vetula ut cicuta assuescere potuit.	180.	Vlcus dyspepticum quod sit.	ibi.
Vetula alia cicuta si incidisset in febrem, cicuta fuisset ei amuletum.	190.	Vlcera quo ordine curentur.	ibi.
Via duplex qua scire possimus causam iarditatis paroxysmi.	256.	Vlcus quando à Galeno humidis curetur.	ibi.
Via quas sibi parat natura, quot sint.	406.	Vniuersale quomodo percipiat ab intellectu.	446.
Vitarum nostri corporis latensium sex pulcherrima exempla.	429.	Vniuersalia cur ab Arist. vocentur.	449.
Vitellus crassus, & aer feruidus ad atram bilem disponunt.	245.	Vniuersale si esset diuisum in particularia esset corruptibile.	ibi.
Vina potentia cur refrigerent stomachum vacuum.	257.	Vniuersale ut cognoscitur ab intellectu.	385.
Vini multam potationem ex Gal. debilitare, ut coitus.	17.	Vitamentum respectu cuius dicatur temperatissima.	282.
Vini vappa quo modo fiat.	15.	Vitamentum sunt quatuor classes.	434.
Vinum quomodo fiat acetum.	297. cap. 4.	cap. 1.	
Vinum quomodo fiat amarum.	ibi.	Urina suppressio desperata cur catharides postules.	396.
Vinum ut habet quatuor naturas quatuor elementis respondentes.	299.	Urina alba cum multo sedimento ostendit pituitam.	259.
Vinum sit acetum, dum abit aqua vite.	300.	Urina qua ostendat flatum dominari.	277.
Virtutis bone signa que sint.	439.	Urina ex Arist. cur salsa sit.	290.
Vires ut recuperentur quatuor sunt necessaria.	276.	Urina cur cruda etiam sit post sanatum morbum.	219.
Virtus desumit rationem à tribus.	397.	Urina ut non ostendat aliquando humores existentes in caua.	217.
Viscera omnia triplici modo laedi possunt.	35.	Urina ut fallit nos in cognoscendis peccantibus humoribus, & solorum coctionibus.	211.
Viscera disposita ad flatum per quinque loca noscuntur.	276.	Urina non potest esse signum pragnantis proprium, nec commune.	48.
Vitrum rubrum iuxta positum carulea facit violaceum.	324.	Urina si lenta in febribus malignis cur deterior subigali.	208.
Vitrum caruleum luteo unitum facit viridem.	ibi.	Urina cur non ostendat coctionem triplicis.	211.
Vitens non conseruaretur, si alius humor deficeret.	205.	Urina rari indicet.	
		Urina non indicet humores e.	
		vena p.	

INDEX RERVM NOTABILIVM.

<i>Vteri orificium in vivente ut noscitur .</i>	51.	antea bilem colligebat Galenus, & quia tacebat melancholiam misceri putabat.	249.
<i>Vulnus penetrans ad proceffum internum</i>	147.	<i>Vxor Epicratis habuit rigorem sine con-</i>	
<i>scapula cur periculofum.</i>	133.	<i>secutione caloris unde Galenus collige-</i>	
<i>Vulnus mucronata cartilaginis cur lethali</i>	133.	<i>bai pituitam acidam peccare.</i>	250.
<i>le fit .</i>	133.		
<i>Vulnus Lithotomi carere periculo .</i>	131.		
<i>ulnra cur aperta fervantur.</i>	437.		
<i>xores ubi ante maritum coeant primo</i>			
<i>cum sacerdotibus.</i>	175.		
<i>Vxor Dealcis qui à magis loquebatur, quàm</i>			

X.

X Enoeratis erratum de Syllogismo
duplante. 360.

FINIS.





SANCTORII SANCTORII

Olim

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIVM

In Morborum, & Symptomatum Ideis perquirendis.

LIBER PRIMVS.

CAPVT PRIMVM.

Prefatio vniuersalis.



ONSTARE arbitror in arte Medica contemplatrice, & præcipuè in curatrice infinitos committi errores posse vel in cognitione morbi, vel causæ, vel in præfagiendo, vel in auxiliorum inuentione, vel postremò in remedium administratione.

In hæc capita, tamquam in summas partes tota medicina, quam *dispositiua*, Græci vocant, distribuitur; & alia in hoc exordio accommodatiora, circa quæ omnes medicorum errores, & mali medendi vsus contingunt, nec mente fingere, vel comminisci possumus.

Varia tamen sub his, & specifica magis continentur capita; quibus cunctis vel diligentissimè certa methodo præfisis, insi-

Sanctory Sanctory Pars I.

niti medicorum errores vitari, & præcaueri poterunt

Quare, cum hæc tempora malum hunc casum subeant, vt nostratum plerique plures malam in omni negotio medico doctrinæ sementem faciant, & nullum penè relinquant locum errandi tam in cognoscenda, quam in facienda medicina.

Proinde decreui in hac contemplatione insistere, & pro meo virili non solum aliquot nostratum errorum stirpes principijs medicis suffultus elidere; verùm etiam physiologicis, & analyticis initijs adiutus semina omnium errorum, qui fieri possunt in hac medicina curatrice, extinguere, & ad certissima & propinquissima capita, certa, & infallibili quadam methodo (nisi me fallat opinio) cuncta transferre errata, quod perbellè præstabimus, si cum his altioribus principijs methodi cognoscendi, & medendi prin-

A cipia

cipia in unum quasi complexum copulabimus, ut consequamur hunc exoptatum finem: quibus pollicitis ni frustrabimur lectorem ad extremam huius methodi coronidem sicuti manu apprehensum deferemus; & tunc ipse tamquam ab alto, & excelso loco munere analytico excitatus, laqueos nostratum, & Syrtis innumeras oculis penè uidebit.

Inde cognoscemus optimos medicos, qui defixi in præstantissimarum artium studio; qui diuina exculti sunt arte, qui nunquam ullo temporis puncto mentis aciem à uera Hippocratis, & Galeni Physiologia deflectunt, eosque secerne ab ijs, qui pallio medico tantummodo sunt laruati, qui summa ipsorum incuria multos decipiunt, quippe consilij, & medicinis miseros ægrotantes totis horis lacerant, & ad necem usque diuerberant.

De totius operis partitione, & intentione.
Capit. 12.

Praestabit ergo uniuersam hanc Methodum, quam in conspectum, & lucem hominum in præsentia promerit, placuit, in tres uniuersales partes distribuere. In prima quarum quatuor librorum Compaginem de affectuum omnium Ideis parauimus; & tali artificio disposuimus; ut priusquam de erroribus, qui fieri possunt in expendendis morborum, & symptomatum formis, ageretur; illarum omnium Methodorum inquisitio præcederet; quæ ad rectam idearum, vel formarum affectuum præter naturam cognitionem nos ducere potis esset: quia alius sanè uitandorum errorum omnium modus non datur: nisi præcognita ueritate, quæ sola, ut ait Aristoteles text. 85. primi libri de anima, est sui, & obliqui iudex.

Ad hos igitur quatuor, primos libros in hac prima parte, ac ad quatuor suprema capita tamquam ad uinum singillatim errores omnes (ni fallor) qui possunt contingere, & ipsos imaginari possumus in librandis morborum, & symptomatum essentijs, hoc Methodorum opificio rescari, & corrigi poterunt.

In primo libro agemus de tribus Me-

thodis, & in primis de Methodo resolutionis, quæ nos à symptomatibus secundi ordinis ad actiones læsas ducit; & ab ijs ad illud, quod est in facto esse; quod uerè indicat, & quod medicum allicit.

Ex in agemus de Methodo, quæ per signa propria ad cognoscendas morborum omnium formas genericas procedit.

Tandem de Methodo, quæ per communium signorum syndromen sufficientissimam procedit, agemus; quarum methodorum virtutes, & affectuum ideas præter naturam uniuersas commodè inquirere; & errores, diu omnium morborum, & symptomatum formæ confundi solent, anteuertere poterimus. Sicuti diu morbos in mala compositione rudiores crederent esse in intemperie, vel uiceuersa: In quo primo libro hoc supremum caput de uitandis erroribus, qui sunt in affectuum ideis præter enarratas Methodos, tam varijs omnium generum affectuum spicandelere exemplis utauimus; ut lector nisi fuerit mente obsecutus, illis excitatus, atque commotus falli, neque agros fallere poterit.

Cæterum in exacta morborum essentia petnoscenda non satis est cognoscere formas; sed expedit ulterius philosophari; nempe an morborum, & symptomatum cognita idea, vel formæ læsis corporis partibus per essentiam, vel per consensum competant.

Scire enim optimè possumus ventriculum intemperie aliqua consistari; sed numquid per essentiam, vel per consensum ab alijs visceribus sit facta, & adhuc fiat; hoc in primo non elucet, sed tenebrarum velo ibi est obuolutum: cum sæpe numero adsint, qui rectè affectuum formas cognoscant; tamen huic impingant scopulo, nescientes an per essentiam, vel per consensum viscus aliquod ingrauescat.

Proinde erat opus de hoc tanto initio statim in 2. libro uerba facere; & perquirere aliquam Methodum, quæ de affectibus uniuersis promptè doceret, quando per essentiam; & quando per consensum viscera essent in iactata, atque conuulsa; & quæ affectio esset Idiopathia; & quæ prothopathia; & de omni partium Sympathia, quæ in hac humana fabrica obseruari possit,

examen de hac re instituiamus, ad quem librum multis exornatum Methodis vitandorum errorum omnium de Sympathia in muscoli, & nervis longis observata, plurima renocamus errorum exempla: quorum luce admoniti, expeditius ceteros infinitos eandem sortem subeuntes tradita arte cognoscere, & vitare poterimus.

His de formis genericis, & de Sympathia affectuum peractis, mox in 3. libro dirigitur philosophandi spiritus ad exquirendam Methodum magis particularem quæ nos docere possit specificas & vitimas affectuum differentias, & quæ esset ex proprijs, & non ex communibus, & genericis affectuum principijs.

Quoniam qui ex ratione vniuersali, vel ex medio tantum generico specificam haurire cognitionem volunt; vel ex medio termino, qui sit vniuersalior conclusionis prædicato, quæ in idem recidunt, syllogizant; non possunt cominiter quin paralogismo ex affirmatiuis in secunda figura illidunt; cuius consequentiæ redduntur monstruosæ, & irreducibiles ad bonam figuram, ob hanc nimirum vnicam, & singularem rationem; quia continentia non possunt fieri contenta, nec versa vice.

Ideo Methodum hanc particularem cognoscendi propria, & specifica affectuum principia constituiamus esse processum à locorum affectuum conditionibus, quæ sunt illæ, quæ definiunt, & constituunt specificas affectuum formas; quia propriorum omnium passionum naturam, & essentiam alio modo consequi non possumus; imaginetur quis quantum volet, si Aristoteli credendum est. poster. quam per earum subiectum, quod solum definit passiones proprias.

Hinc est quid genericus affectus transiit in specificum, quando iungitur partibus nostri corporis, & aliquo proprio subiecto.

Hinc dolor, ut dolor naturam quandam genericam exprimens; expensus tamen in aliqua corporis particula, euadit specificus; Sic in membrana euadit pungitius, in carne laceratius, & sic de alijs doloribus; similiter si ulcus consideretur sub genu, potest illud esse cauterium ali-

quod salubre, si illud nec in Pulmone, ulceris differentia euadit sineusta, ac deplo-rata, ut specificæ differentię partium nostri corporis sint illæ, quæ coarctent affectus communes, & específicos reddant, & constituent.

Specificæ affectuum differentię (ut hic breuibus agam) ad has decem vniuersæ reducuntur, ad situm, meatum, figuram, compositionem, exordium, substantiam, temperaturam, progressum, numerum, & officium: harum quælibet specificum facit affectum, & ob harum diligentissimam inquisitionem omniam in plurimos ostendimus nos labi posse errores.

Ceterum cum differentię antedictę partium corporis aliquæ; vt temperatūra, meatus, situs, & figura, aliquando alterentur, & mutantur, & præter statum primigenium à primis generationis exordijs comparatum, subire possint aduentitium introductum ab assidua sex rerum non naturalium consuetudine; quæ si calum obducatur in debilibus, & senibus non sit mutanda; necessario agendum relinquatur in 4. lib. de hoc aduentitio statu: vt secundum considerationem primigeniam, & aduentitiam conditiones partium corporis enarratas contemplerur; quia ab ijs tantummodo metimur recessum morbosum, & specificæ formæ affectuum formantur, ideo de hoc statu aduentitio, & de consuetudine ereximus librum: vnde infinitam propemodum errorum sobolem detegere, & vitare poterimus.

Hicce omnibus visis, quorum potentia infinitos Empiricorum errores in symptomatum, & morborum Ideis genericis & specificis perquirendis cognoscere, & oblitescere possumus: Exinde animum conuertimus ad enodandos lapsus; qui fieri possunt in humoribus omnibus præter naturam contemplandis.

Quinque generalissimos modos, vel quinque suprema capita, circa quæ claudicant, atque vacillant Empirici in perquirendis humoribus præter naturam, asserimus, cum neq; plura, neq; pauciora esse possint: Vt primum sit dum Medicus noxiam prædominantis humoris speciem nesciret.

Secundum, cum perpetuo humores de-

teriores qualitatem nacti ceteros inficiant, iisdemq; misceantur; & inde sic mixti, & simul confarcinati inferant noxam: hoc supremum errandi genus prodit, cum sint mixti, nescire, an mixtura intus facta sit, vel foris: Cui scopulo quam saepe rudiores impingant, vobis expendendum, dijudicandumve suo loco relinquam.

Tertium, cum humores tota substantia aliquando peccare possint, & prae manifestas qualitates sint aliqua abdita, quae concurrant, atque patientes feriant; de ijs, quae tota peccant substantia, agemus, & de reconditarum qualitatum primis initijs.

Quartum, qua quantitate agros invadant humores: vbi tradita est duplex Methodus, qua in quantitatis humorum cognitione ducimur.

Quintum, & postremum fallendi genus est, dum aliquem humorum peccantium motus, fingeret, atque lateret. Ad quae suprema capita (ni fallor) errores, qui possunt fieri in humoribus praeter naturam scrutandis, apertissime conferimus omnes; ita ut in sex libros sit dispositum totum hoc negotium.

Primus est de Methodo cognoscendi peccantes humores per signa propria, qualia sunt (& alia non inuenimus) lapores, colores, & Typi.

Secundus liber est de communibus signis coarctandis per syndromen in tantum, ut subrogentur proprijs.

Tertius est de omnium mixturis.

Quartus de ijs, quae peccant substantia, & de reconditis qualitatibus.

Quintus de quantitate peccantium humorum.

Sextus, & postremus de pertinentibus ad morum localem.

Denique perceptis exordijs errorum omnium, qui fieri possunt, tum in perquirendis formis, tum efficientibus affectuum praeter naturam, & traditis illis initijs quorum opificio philosophantes ad veritatis fastigium deferimur. Inde convertimur ad omnia illa instrumenta, quae ad solertiam, & inuentionem remedium in medendis aegrotantibus conferre possunt.

Ceterum, ut laqueos omnes, & Em-

piricorum multorum lapsus in tanto negotio aperirem, & ob oculos collocarem, altius erexi spiritum, & me ad Logicam, & ad illa prima initia humanae cognitionis contuli, quae solum aeternas, & infallibiles sciendi normas tradunt, & quae animos ligant, atque demincent.

Hinc extat in hac tertia parte de inuentione remediorum primus liber de principijs methodi incedendi à fonte Logico exhauriendis, & confirmandis. Vbi indicantium vere conditiones elucet: Vbi constituimus hoc caput supremum; Quomodo medicus in cognoscendis indicationibus, analytica doctrina excultus non possit in errores incidere.

Secundus extat liber de inuentione remediorum per analogismum & experientiam, vbi ostenditur, quando analogismus, & experientia sint inepta argumenta sciendi, & medendi.

Tertius est de recta administratione remediorum, & ad Tria capita ibi reducuntur errores omnes, qui committuntur in remedijs administrandis.

Quartus est de erroribus, qui sunt in humoribus quarens loco mouentur; agiturque de remissione, & deriuatione.

Quintus, & postremus est de indicationum omnium aequilibrio; & de erroribus, qui contingunt, dum male librantur haec tria, vrgentia videlicet, causae fontes, & impedimenta: ad quae omnia indicantia, siue sint sumpta à virtute, siue à causa, siue etiam a morbo, vel à symptomatibus reuocantur; vbi praecedit subtilis inquisitio, cui ex illis tribus prius coniectos oculos habere praestet.

Ceterum, ut omnibus numeris absolutum hoc nostrum reddatur opus, non modò in arte medica conferens; sed in omni disciplinarum genere ob oculos quemlibet errandi modum, quò quiuis discurrendo errare possit, proponam, ut ab hinc neq; desinendo, vel discurrendo in hac, & in quavis facultate à vero desistere possit: omnibus locis à Thesauris Arist. (ut verum fatear) in diuitias meas congestis, & ad ipsos tamquam ad Lydium lapidem, & ad Tribunal veritatis, quae-

quælibet propositio, quælibet de finitio, & quivis discursus, an rectus, & concludens sit, transferri potest.

Cur quattuor sint suprema genera, ad que reducuntur errores, qui sunt in scrutandis affectuum præter naturam Ideis. Cap. III.

CUm mihi sint in animo in huius operis exordio ad quatuor certa, & suprema genera errores omnes, quos in expendendis affectuum præter naturam formis imaginari possumus; præstat in primis hic contemplari, unde quaternus hic numerus trahat initium.

Dicimus ergo hac orationis necessitate dispersos, atque dilociatos errores, qui fieri possunt in speculandis essentijs, in quatuor capita suprema finiri, dicentes quod errantes vel eò cadimus, ut rei de qua instituta est contemplatio, nesciamus naturam genericam, transcendentes de genere in genus.

Vel secundo loco philosophantes decipimur in attributis; postquam scilicet cognita est natura, & forma generica; attamen errant credentes illam naturam genericam convenire alicui ægrotanti per se, cum per accidens competat.

Vel tertio loco contingit errare, nesciendo differentiam specificam, à partibus metientes rectum secundum primigenium statum.

Vel quarto nesciendo differentiam specificam confundendo adventitium statum cum primigenio.

Ad ista quatuor capita errores omnes circa affectuum formas contingentes reducuntur, & plures; imaginetur quis quantum voluit, non intenet modos.

Sed conseramus hos quatuor generalissimos modos in stylum medicum, dicendo primum modum errandi esse, dum affectus præter naturam ideam, & formam genericam confundimus, verbi causa, dum crederemus affectum aliquem internum esse imperiem, nihilominus esse mali compositio, vel viceversa, & sic de omnibus morbis.

Ad eundem modum, in symptomatibus scrutandis, veluti in exente aliquo,

Sanctory & Santory Pars I.

ut in alni fluore iudicaret imperitus, symptoma illud esse in actione recetrice diminuta: unde vellet astringentibus uti: attamen symptoma esset in actione naturali expultrice irritata: quod deberet tolli non astringentibus, sed potius refrigerantibus, & aperientibus.

Quem modum errandi ne in Syrtis incidamus, trium methodorum virtute in hoc libro antevertere sumus conati; ut prima sit de resolutione symptomatum, ad id quod est in facto; secunda sit de signis proprijs; tertia de syndrome sufficientissima communium signorum.

Secundum errandi modum dicimus esse, dum affectum per sympathiam, & per consensum credimus per essentiam ægotantes lacerare.

Tertium errandi modum dicimus esse dum expendimus affectus alienius specificam differentiam quæ talis facta sit ab unica ex decem illis specificis partium differentijs ab ortu comparatis, verumtamen illas partium differentias vel conditiones vel perperam, vel neutiquam expendimus.

Postreimum, dum omittimus aliquam specificam differentiam partium adventitiam, temporis cursu per consuetudinem sex causarum non naturalium acquisitam.

Hinc in lucem, & in conspectum vestrum lectores quatuor primos edidi libros, quippe qui tot perceptionibus, & varijs relucet exemplis, quæ sum expiscatus, ut hæc nova Methodus cum primis exemplorum luce splendeat; Et hac methodo exemplis exornata, atque illustrata merito incedendum duxi, quoniam hæc mentis aciem excitant, hæc scientiæ igniculos in animum iuvenum mittunt, & hæc sunt efficacissima monumenta, ut errores omnes quispiam antevertat, & fugiat, & que magis seniel docere possunt, quam perennis causarum contemplatio.

De suprema omnium Morborum divisione. Cap. IV.

CUm in librum hunc illa Empyricorum errata, dum transcendent de genere in genus, & Ideas confundunt; non

A 3 per-

percepta affectuum præter naturam forma, & Idea, reduxerimus. Par est exordiri à summa omnium morborum generum, & symptomatum diuisione in suas species, & hanc uniuersalissimam diuisionem à doctrina Galeni ubertate haurire, & strictim eam colligere: & merito postquam ab alijs libentissimè est supposita atque probata: propterea à nobis erit recipienda tamquam specimen, & exemplar præsentis cognitionis, & eo libentius, cum præuideam nostri temporis, Sicopliantæ saltem non reclinatos aduersus Galenum, qui meritò ab omnibus extollitur ad sydera, & cuius laus ita edito loco est collocata, ad quem obrectatores, uel inuidi pertinere minimè possunt: aggrediamur ergo morborum suprenam diuisionem, deinde symptomatum ex Galeni sententia.

Morbi erunt uel intemperies, uel mala cõpositio, uel soluta unitas; intemperies erunt simplices, uel cõpositæ simplices, ut calida, frigida, humida, sicca; Cõpositæ, calida sicca, calida humida, frigida humida, & frigida & sicca; Oïo ergo erunt intemperantiæ.

Nec mihi obijciant, præterea dari intemperies cum materia, quoniam nullus error magis à ueris inijs, & fundamentis analiticis abhorret, quam in diuisionibus transcendere de genere in genus, & uitiosam proponere diuisionem: transcendimus, dum intemperierum fieret diuisio in simplices, & cum materia, à genere formarum, in genus causæ efficientis intemperies enim sunt formæ humorum uel materiæ facientes intemperies sunt causæ efficientes. Similiter Asclepiades meritò à Galeno reprehenditur lib. de trem. & palp. cap. 6. dum tenet uniuersas febres esse obstructions humorum existentium in meatibus, & in meatuum magnitudinibus febrium omnium differentias consistere. Ecce, quod transit de genere in genus; quia mala cõpositio differt genere ab intemperie, ostendimus, ubi egimus de humoribus, humores esse efficientes causas; quare non est, ut de intemperiebus cum materia loquamur, & incidamur in laqueum tam manifestè ab Aristotele ex-

plosum 2. libro post.

Oïo igitur enarratarum intemperantiarum qualibet uel esse potest in primo gradu recedens à temperato: uel in secundo; uel tertio, uel quarto: sic enim antiquis Medicis placuit ad quartum usque diuidere; & quemuis gradum diuidere in tres mansiones; quare intemperantiæ expensæ secundum suas ideas & formas (omisso illo uitioso transitu formarum, in efficientes causas) si enumerabimus mansiones erunt 24. duodecim in simplicibus & 12. in cõpositis, sic omnes erunt nonaginta sex mansiones recedentes à temperatissimo, hæc enim sunt supposita atque probata, & non dæcet perpetuò à primis exordijs litigia suscitare, sed supponenda tanquam initia præsentis contemplationis.

Mala cõpositio erit, uel in numero, uel magnitudine, uel situ, uel mala conformatione. Numerus uel deficiens, uel superfluous, d. sicciẽs erit, dum abscinditur pars, dum uritur, dum putrescit, uel ob congelationem contrahitur. Superfluous ut pterygion in oculo: lumbrici: lapis in uelica: Magnitudo aucta, & diminuta. Situs ut infra.

Mala conformatio quatuor sub se habet subalterna genera, uel est figura uitata; uel asperitas: uel læuitas: uel cavititas.

Figura uitatur uel in utero, uel foris: Vnde nasus simus, acutus, oculi concaui, scapulæ in alarum modum: conuulsiones, tabes, elephas, &c.

Asperitas, ueluti dum ob acres humores aliquando in ossibus fit: uel ob medicamenta abstergentia; uel in oculis ob puluerem, uel fimum.

Læuitas, ueluti ob humorem uiscosum & pinguem in ossibus, & alijs partibus, ut in uentriculo, lienteria.

Cavititas habet duo genera: aliud quod est in angustia, uel in patefactione nimia: sub angustia sex sunt species; ebulescentia, subsidentia, obstructio, cõpressio, oclusio, & constipatio; coalescentia fit dū coalescunt partes; subsidentia ob frigus, uel ob nimiam siccitatem; & dum expultrix facultas immodicè mouet obstructio uel à lentis, crassis, uel copiosis humoribus. Cõpressio, ut ob tunicem: Oclusio,

ob carunculam fit, vel ob lapidem occludentem meatum vrinarium. Constipatio pertinet ad meatus insensibiles: ideo Gal. lib. de constitutione ar. med. cap. 17. dicit obstructionem fieri in meatibus sensibilibus: constipationem v^o in meatibus insensibilibus: similiter Galen. 11. meth. 4. dicit constipationem fieri à frigido externo densante meatus insensibiles.

Sub patefactione, vel nimia apertione tria sunt: diuresis, diapedijis, anastomasis.

Solutio vnitatis vel à causis internis: vel ab externo ictu. Nemo imaginabitur aliquam speciem, seu ideam morbi, quæ sub his non contineatur, & quamvis Gal. 3. de Crisibus capite quarto dicat: ad rationem morbi pertinere hæc quattuor, ideæ videlicet, magnitudinem, motum, & morem, attamen præter ideam; videlicet magnitudinem, motum, & morem, negamus esse constituenta essentiam morbi, quoniam nos non vocamus essentiale illud, quod perpetuò saltem non conuenit

Mos, vel magnitudo modò vnà morbo conuenit: modò nequaquam, vt propterea cum non sint de omni; non erunt per se, vel essentialia; vt valeat in analyticis consequentia à de omni ad per se negatiuè, dicendo, non est de omni, ergo non est per se: quia argumentum est à destructione consequentis ad destructionem antecedentis; & valet, quia reducitur ad secundam figuram in camestres, sic; Omnis aqua est elementum, sed non est elementum, ergo non est aqua. Similiter omne per se est de omni: sed non est de omni, ergo non est per se, vel essentialia, quod idem est. Quare pro defensione Galeni dicimus per essentialia intelligere lato modo, per illud quod vt plurimum accidit. Vel dicimus, quod illa tria conueniant omnibus morbis, dicendo quod omnis morbus semper sit vel magnus, vel paruus; malignus, vel benignus, diuturnus, vel acutus, & hoc modo erunt essentialia.

Intemperies sunt octo.	{ Simplicium, sunt quatuor genera.	{ Calida tantum vt Febris. Frigida tantum vt Ascitis principium. Humida tantum vt Cachexia. Sicca tantum vt Marasmus.
	{ Compositarū similiter quatuor.	{ Calida sicca vt Marasmus Torridus. Calida humida vt Febris Quotidiana. Frigida sicca vt est seniu Philippi, & vltimū seniu. Frigida humida, vt Anasarca.

Queliber intemperies habet quatuor gradus, & quilibet gradus tres mansiones, ita vt nonaginta sex mansiones intemperierum præter naturam à medicis cognoscantur, & non plures.

		Deficiens	{	Dum abscinditur pars. Dum vritur. Dum putrescit. Dum vehementissimè refrigeratur.
	Numerus			
		Super vus	{	Pterygion in oculo. ● Caro in aure. Lumbrici. Lapis in vesica, &c.
	Situs		{	Luxatio. Prolapsus intestini recti. Hernia intestinalis, &c.
	Magnitudo	Aucta	{	(vt Tumores.
		Diminuta	{	(vt Concanitas oculorum, &c.
		Figura	{	(Nasus simus, vel acutus, Gibbositas, &c.
		Asperitas	{	(In ossibus. (In oculis, & alijs partibus.
		Leuitas	{	(In ossibus. (In ventre, & alijs partibus.
Malæ cōposi- tionis quat- tuor gene- ra.				{ Coalescētia. (vt oculorū albu- go, & omnes ci- catrices.
	Conforma- tio			Subsidentia. (Ob nimium frigus (Ob nimiam eua- cuationem, &c.
		Angustia ni- mia habet sex species.	{	Obstructio 38. (à Lētis humorib. (à Crassis. (à Copiosis.
		Cōcanitas	{	(à Tumore. Compressio (à Nimia pingue- dine.
				(ab Angustia Constipatio. (meatuū in se sibi. (lium, à frigore, (vel à nimio ca- lore.
				(à Caruncula. Occlusio. (à Lapillo. (à quavis re solida
				Anostomas
		Apertio.	{	Dixeresis. Diapidisis.

*De Symptomatum omnium diuisione
brenissima. Cap. V.*

Symptomata omnia in tria genera ducta sunt: cum aliqua sint ex euntia: aliqua qualitates mutatae: aliqua sint actiones laesae: Actio, quae debet esse radix symptomatum omnium tam in qualitate mutata, quam in exeuntibus mutatis, sola in suas species debet partiiri: eum ad actiones, tamquam ad symptomata primi ordinis omnia exeuntia symptomata, & omnes qualitates resoluantur.

Actio ergo erit vel naturalis, vel animalis, vel vitalis, vel mixta ex his, sicuti est tussis, quae est actio mixta ex animali & naturali: est animalis, quia musculorum opera perficitur: est naturalis: quia causa faciens tussim est expultrix naturalis, quae impellit. Hinc, hac distinctione, videlicet quod tussis ratione facultatis sit naturalis: ratione vero causae morbosae sit praeter naturam:

Hinc inuenimus in Galeni modo tussim vocari affectum naturalem: modò affectum praeter naturam. Hinc 2. de Sympt. causis & 3. de locis affectis tussim vocat affectum naturalem, lib. verò de trem. & palp. tussim vocat praeter naturam, naturalis sub se continet alteratricem, expultricem, retentricem, & attractricem: & quaelibet ex his esse potest vel ablata, vel diminuta, vel deprauata: animalis quae sub se continet rectricem, sensitiuam appetitiuam, & motiuam, & quaelibet ex ijs potest esse vel ablata, vel deprauata, vel diminuta: verbi causa, animalis rectrix deprauata est delirium: quod pertinet ad discursum. Et sic de alijs. Sensitiua continet quinque sensus: Motiua sicuti motus totius, sicuti inquietudo: tremor, vel motus partis, vt respiratio, quae ad pectus: Tussis ad pectus, vitalis dum vires languent, licet vitalis praecipue ad pulsum pertineat.



Qua Methodo symptomata primi & secundæ ordinis reducuntur ad unum, quod est in facto esse, quod est illud quod solum indicat remedium. Caput VI.

C Aterum alius de symptomatibus est agendum, methodum resolutionis tradendo, quomodo à qualitatibus mutatis, ab exeuntibus, uel à retentis immodicè ad actiones læsas, & ab his ad primas radices reducuntur. Dicas ergo si est exiens mutatum, uel retentum immodicè, uel qualitas mutata; hæc, quæ uocantur symptomata secundæ ordinis necessaria insequi actiones læsas: tanquam symptomata primi ordinis.

Dicas ergo, est exiens, ergo insequitur actionem retentricem diminutam, uel ablatam: nihil enim potest egredi ex corporibus nostris, quod immediate non fiat ob actionem retentricem diminutam, uel ablatam: alioquin non exiret; sed retineretur; & uicueris, si aliquod nimium retinetur; dicas: ergo insequitur expultricem diminutam, uel ablatam, non enim posset plus debito retinere, si facultas expultrix ualeret.

Dicas similiter, est qualitas mutata, ergo insequitur actionem læsam; & cum qualitas non ueniat in cōspectum nostrū nisi exeat, & non exeat sine subiecto: quemadmodum exiens perpetuò supponit retentricem diminutam; ad eādem prorsus modum qualitas mutata insequetur immediate actionem retentricem læsam uel diminutam, uel ablatam; quoniam dum est ablata retentrix, humor qui fert qualitatem mutatam, subito diffluit: & tale quippiam accidere potest, dum retentrix est diminuta astrictis.

Sed ulterius, nostrum est disquirere, & animum ad primam ideam, & primam causam transferre, dicēdo, sicuti in egrotante symptomata exeuntia insequuntur necessariò retentricem diminutam, uel ablatam tanquam primam radicem: simili modo actiones retentrices omnes læsæ tanquā causam insequi possunt alia symptomata, quæ sunt primi ordinis, & hæc sunt expultrices, & alteratrices deprauatæ, & diminutæ: quoniam solet accidere,

quod retentrix uel sæpissimè non detineat, ob id, quia expultrix irritata sit ab obiecto mordac, & inde expellat, & tunc dicimus retentricem læsam esse ex accidenti, non per se quatenus nimirum non detinet ratione expultricis irritatæ; itidem retentrix lædi potest ratione alteratricis non concoquentis, unde lubricum, & viscidum illud incoctum læuitatem facit; ut in ossibus, & in intestinis licentiam aliquando fieri uidimus.

Ad eundem modum progredimur in symptomatibus illis, quæ consistunt in retentis immodicè, potest enim esse, quod aliquid immodicè retineatur: non quod læsa sit retentrix per se, sed ex accidenti, quatenus nimirum expultrix non fungatur suo officio: ueluti in arqato fæces diutius morantur in intestinis, uò ob deprauatam retentricem: sed ob expultricem diminutam: quatenus porus fellæus occlusus sit, & bilis cum non transeat, non uellicet, atque lancinet intestina: Vnde vires expultricis satisfiunt.

Quare in expendendis symptomatum formis, atque Ideis licet referre formas ad uium: ut proprium genus peruestigemus, distinguendo per accidens, ab eo quod est per se; quoniam nimium errarent, quos lateret uera idea, ueluti si quis alui fluore premeretur, & diceret; est exiens mutatum, ergo retentrix diminuta; ergo alstringendum, quod non sequeretur, nisi excutias nodū, hoc modo uidelicet inuestigando, an retentrix læsa sit per se, uel per accidens: læsa inquam erit per accidens, si expultrix irritata sit in causa fluoris: tunc erit obiectum irritans demulcendum: quod non erit alstringens remedium, sed potius aperiens: sicuti est serum lactis: læsa erit per se, certè dum retentrix lædetur ob fibras orbiculares, & rotundas destinatas retinendi muneribus uiribus contracta: tunc nisi aliter aduersentur indicationes, erit alstringenda.

Nouimus hæc in initia symptomatum, & coordinationem inter primum, & secundum ordinem, ut uidelicet exeuntibus, & qualitatibus mutatis, prior sit retentrix læsa, retentrix prior esse possit expultricis læsio: & expultrice alteratricis uitium; & immodicè retentis expultricis diminutæ labes, uel demum expul-

pultrice prius sit vitium alteratricis, quādo adeo esset perdita, ut omnino incoctum generet, quod ex partium debilitate, & ex superfluo quodam madore facilliter possemus animaduertere.

Ceterum ingruit necessitas ut altius adhuc expēdamus, & ad primos characteres resolvamus symptomatum omnium contemplationem; siquidem re vera symptomata non potest per se aliud symptoma procreare, cum nimis clarum, atque apertum sit, symptomata omnia esse in fieri, & quod est in fieri, nihil agere, cum de ratione agētis sit per se existeret, & in facto esse; & melius, cum symptomata sint accidentia atque ex Arist. 4. meth. tex. 17. accidens non sit accidentis accidens, sed eius cui primo inhaereat, quare si exiens prodit à retentrice diminuta, & retentrix ab expultrice depravata, & hæc ab alteratrice corrupta, omnes istæ functiones necessarii debent prodire ab aliquo principio, quod sit in facto esse; quo ablato statim abeant, & evanescent symptomata; alioquin nihil esset factum præter naturam, & nihil fieret; quoniam ad hoc, ut aliquid fiat, requiritur rei forma, & efficiens causa, quæ facta sunt, & habet permanentiā, & hæc facta sunt talia, ut symptomata ab ipsis perpetuo in fieri pendeant, ut umbra à corpore; morbus, & causa habent esse, & permanentiam separatam, & ambo sunt in facto esse, cum agant diversas, & dissociatas radices; sæpius enim vidimus post causam ablatam relinqui morbum, & iure merito, cum morbus sit partium nostri corporis permanentis tan similium, quam dissimilium mala constitutio; quod nunquam visum fuit ablato morbo & causa, symptomata relinqui, cum symptomata non sint in facto, nec ullam habeant permanentiam, & propterea non indigent neque efflagitent curationem.

Nec obijciat quis ex Gal. de differentiis morbi & alibi: dari symptomata in habitu, ut est icteritia, & plurimæ qualitates mutatae, quæ symptomata sunt in facto esse, non in fieri, quia occurrimus, dicentes, esse in habitu, non colorem, quæ vocamus icteritiam: sed bilem effusam, per corporis ambitum, quæ est causa coloris, verò semper pendere in fieri à bi-

le, ut umbra pendet à corpore.

Similiter nec mihi obijciat, dolorem indicare, & propterea me falsò tutari, symptomata non indicare; quia occurrimus dicentes, anodyna non desumi à dolore, ut symptoma, sed à parte dolente, quæ est in facto esse; sic Narcotica desumuntur, ut destruantur partes: digerentia, ut resolvantur causæ; Emplastica, ut partes emolliantur; vel contemperentur spiritus animales, vel ipsorum radijs.

Sed redeamus ad symptomata, unde digressi sumus, & in pauca conferamus hunc symptomatum omnium ordinem; cum meum hic non sit reuocare examen vel diligentissimum de symptomatibus, cum illud præstiterim in libro de indicatione secundum leges logicas inuenta.

Cum igitur symptomata omnia aliqua sint primi ordinis, aliqua secundi, & primi sint actiones lesæ; Secundi sint exeuntia, & qualitates mutatae: haurire possumus tali pacto necessarias consequentias ordine resolutio: est exiens præter naturam, ergo erit retentrix lesa, diminuta videlicet, vel ablata: est retentrix lesa; ergo poterit esse lesa vel per se vel per accidens: si per se est Gal. sententia 3. de symp. causis primo, quod lædatur vel lesa facultas, vel ob errorem externum; si per accidens lædatur retentrix, erit ob lesam expultricem irritata, quæ expultrix lædatur per accidens ob lesam alteratricem, vel ablatam, vel corruptam; & hæc omnes læduntur demum ab aliquo per se, quod est vel obiectum externum, vel lesa facultas: ut obiectum externum, & lesa facultas sint initium, & sumum per se, ut feruetur famosa illa propositio quod omne per accidens sit recessus à suo per se, & possit reduci ad suum per se.

Per se actiones omnes læduntur ab obiecto, vel à facultatibus; intelligendo tamen, tunc lesam esse facultatem, quando eius instrumentum lesum est; per eius instrumentum intelligendo constitutionem, partium similium, & dissimilium; in quibus stant intemperatura, male compositiones, & solute unitates; quæ sunt prima initia omnium symptomatum, sed in primis actionum lesarum, tam naturalium, quam animalium, & vitalium, deinde ab his exeuntia & ab exeuntibus, qualita-

lirates mutatz; per obiectum intelligimus humores, vel tale quippiam, quod esse potest causa efficiens malz constitutionis.

Quare primz radices symptomatum omnium sunt vel malz constitutiones similium, & dissimilium, vel causz efficientes internz: vnde malz constitutiones habent primum exordium; verbi causa, retentrix erit diminuta ob malam constitutionem similium; tunc alia non potest esse intemperies, quz efficiat diminutam, vel ablatam retentricem per se, quam humida, quz facit fibras in orbem positas adeo flaccidas, vt nulla polleant retinendi virtute.

Neque quis obijciat ex Gal. 4. de vsu Part. & 5. intestina neq; attrahere, neq; retinere, & 3. de fac. nat. dicente, nō habere nisi fibras circulares, quibus expultrix facultas vritur, qui motus non est voluntarius, sed naturalis, communi nomine dictus peristalticus.

Respondemus, Gal. non esse locutum de intestinorum facultatibus, sed in communi. Præterea, nemo negat, actionem attractricem, & retentricem priuatam esse in intestinis; sed negant actionē communem. Auicennas dissidet à Galeno in hac re; quia Auic. Fen. prima primi, & lib. de animalibus tenet, quod Chylus nō solum expellatur à ventriculo in intestina, sed etiam attrahatur ab attractrice communi intestinorum, quz vt diuersa à priuata omnino negari potest.

Si retentrix erit diminutz virtutis ob malam constitutionem dissimilium; erit nimia apertio: vt anafomosis, quz fieri potest ex Gal. 5. meth. c. 2. vel ob acrimoniam humorum, vel ob nimiam copiam, vel ob debilitatem, & debilitatem prodire à qualibet intemperie facta à calido nativo viribus perditio, & demolito; si denique retentrix erit læsa ob malā constitutionem similium, & dissimilium, erit digressiua: id est soluta vnitas.

Quod diximus de retentrice: simili modo est dicendum de expultrice, quod lædatur, vel per se, vel per accidens: si per se, vel ob læsam constitutionem naturalem, quz est verum facultatis instrumentum: vel ob causam efficientem externam: veluti sunt humores malam qualitatem &

illam mordacem naturz: vel læditur expultrix per accidens: quatenus alteratrix corrumpitur, & generatur bilis, tunc expultrix ratione alteratricis læditur per accidens, ratione obiecti lædētis, quod est bilis, læditur per se, vel si alteratrix adeo sit diminuta, vt si collapsa, atque collisa; tunc cadit in *αποψία*, & cum non generetur bilis, obtrunditur facultas expellendi: Sed quomodocumque lædatur actio ex accidenti: semper per accidens debet reduci ad suum per se: quia per accidens est recessum ab eo quod est per se, non licet philosophando quiescere, nisi ad aliquod per se mens sit euecta. Verbi causa, retentrix est in statu salubri ex se: attamen non fungitur suo officio retinēdi, quia expultrix irritata à mordacibus succis ita cum impetu expellit, vt non possit retinere.

Similiter expultrix læsa est à mordacibus per se; sed accidit, vt irritetur quia alteratrix sit deprauata; & talem malam sobolem sibi parauerit bilioziam.

Tandem ergo desinere oportet in veram causam omnium malorum, quz sit primo, & per se, & hæc erit læsum instrumentum, id est mala constitutio similium, vel dissimilium, quz est vera radix omnium, quz ex accidenti continentur agrotantibus.

Concludimus ergo, qualitates mutatas esse non posse, nisi vitium sit in exeuntibus, vel retentis immodicè: & hæc non esse, nisi actiones retentrices, vel expultrices aliquz læsæ sint, & has non lædi, nisi alteratrices prius conflictentur, & demum alteratrices non angī, vel corripī, nisi instrumenta facultatis, quz sunt constitutiones similium, & dissimilium læsæ sint, & hæc erunt intemperaturæ, malæ compositiones, & solutz vnitates, quz erunt initia omnium symptomatum.

Offenditur non posse per viam diuisiuam occultum aliquem affectum inueniri. Caput PII.

AB hac suprema omnium affectuum præter naturam diuisione iam tractata, & à resolutione symptomatum omnium in suas radices capiendum erit exordium cognitionis ideaz, vel formæ cuiusque

que affectus in corporis latebris delitescens.

Cæterum ad explorandam alicuius rei formam ignotam diuisio omnium affectuum ex se tanta non pollet prærogativa, ut mētis aciem transferat ad morborum ideas penitiores, ac latentes, cognoscendas. Quandoquidem hoc officium notificandi, quod est sua natura ignotū, via syllogistica: quod est demandatum. Arist. 1. priorum, & secundo post. circa finem dixit, quod nulla sit via, quæ aduibrata, & caligine aliqua obruta in lucem efferrat, quam syllogistica: ut meritò Arist. reiciat illos, qui partes definitionis ignotas crediderunt, sola methodo diuisiua pernoscentas.

Perutilis tamen adeo est diuisio in venandis specificis differentiis, ut Gal. primo methodi c. 5. habent hæc uerba fieri ne quid, ut differentias generis unius morbi inuenias, ipso quod diuiditur non plane explorato. Hinc Gal. 1. ad Glauc. in limine libri, consueque Mnesithem Arleniensem fuisse effectum litteris tradit: ut nemini fuisset, secundum in medendo ferat, quia à generalissimis (conditione recte diuisionis seruata) ad subalterna; & ab his ad specifica descendat, dixitque, quod, qui in diuidendo est adeo exactus, quantum permittitur uiribus, medendo non erret.

Attamen non credant Lectores, nam diuisiuam solam nos ducere posse ad aliqd, quod sit ignotum: quoniam si cum diuisione non coniungamus demonstrationem a posteriori, incidimus in principij petitionem, quod uitium est explodendum ab omni diligenti inquisitione: diuisio enim tantum disponit, in ordinem redigit; & ante oculos è uestigio collocat, quæ sunt pernoscenda, nihil tamen concludit, quod sua natura ignotum sit.

Verbi causa; sint menies suppressi ob angustiam: tunc diuidimus angustiam in suas species, dicendo, quod angustia uel fiat ob subsidentiam, uel coalescentiam, uel obstructionem, uel compressionem, uel occlusionem, uel constipationem; tunc ante oculos obijciuntur illi cō sunt libranda; deinde aliqua demonstratione à posteriori inferre possumus remedium, alioquin occultum, probando non esse ob

subsidentiam, quoniam forsitan habitus erit carnosus, & fortis, non fuscus, uel frigidus; omnis enim subsidentia ob tres causas obtingere solet, uel ob nimium frigus, uel ob nimiam siccitatem: uel dū expultrice immodicè mouente, innauita reddita sint uascula; probando similiter non ob coalescentiam, cum non præcesserint cicatrices, nō ob compressionem, cum tumor non exeret, non ob occlusionem, cum caruncula aliqua non præcesserit; non ob constipationem; quia constipatio ex Gal. 11. meth. cap. 4. & libr. de constit. ord. de angustia meatuum insensibilium; ergo erit ab obstructione exorta angustia.

Ecce quod in argumento ex sufficienti partium enumeratione, probando, & secludendo aliquo signo, uel demonstratione à posteriori; concludimus quoque quod sua natura est tenebrarum uelo absconditum.

Ecce, quod diuisio adducit in medium omnia specifica membra pernoscentia, & ante oculos collocat, quæ expendenda veniunt, nil tamen aperit, quod ex se sit delitescens; sic nil concludit, cum solum syllogistica: uel delegatum sic munus hoc inferendi.

Sed quamuis aliquando diuisio videatur in lucem ferre, quod antea obtutum oculorum fugebat, ueluti ubi quis nesciret, quodnam symptoma esset gonorrhæa, statim dum symptomatum genera diuideret, quod aliqua sint exuntia, aliqua mutatz qualitates, aliqua actiones læsæ; statim sine demonstratione, facta diuisione, cognosceret gonorrhæam esse symptoma in genere exuntium, quoniam differentia hæ notæ ex ipsis se manifestant; nihilominus si diuisio fieret in rebus obscuris, tunc nulla fieri posset conclusio sine petitione principij, si aliquis diceret, primo cognitū est singulare, uel uniuersale, quodnam ex his sit nulla diuisio ex se daret nobis in pernoscedo, manus; uel si quis diceret, principium indiuiduationis est materia, uel forma, uel Heceitas quodnam sit, ex hac diuisione nemo percipiet. Idē dicimus de omnib. absconditis; expedit igitur insudare, & uenari demonstrationes, quæ tanta quæstia aperiant, quoniam in his si diuisio à demonstratione à signo

à signo seiungatur, petitur principium. Amplius duum inferimus ex membris diuifis consequentiam, tunc est peccatum in forma fyllogistica, à pofitione confequētis ad pofitionem antecedentis; quoniam est illatio à genere ad species; veluti est animal, ergo est homo, est febris cōtinua, ergo maligna, quæ illatio est abfurda: verbi caufa, si diuidamus febrem continuam in malignam, & ardentem: si velimus colligere per diuifionem, esse malignam, tunc genus idest febris continua per aduersarios effcet medius terminus; proponamus igitur omnes modos pofitionis formandæ, & fyllogizandi: vt error detegatur: esset ergo vel faciēda hæc maior, omnis febris continua est maligna: & sic esset in prima figura: quoniam febris continua, quæ est medius terminus, subijcitur in maiori; sed cum apertè falsa sit, alium modum formandi maiorem experiamur: sic, omnis maligna est continua febris; & hæc erit in secunda figura, quoniam medius prædicatur in maiori, & argumentum fiet ex duabus affirmatiuis in secunda figura, quod non fequitur, & argumentum reddetur ridiculū. Formemus iterum, vt experiamur omnes modos fyllogizandi, tali pacto, aliqua febris continua est maligna, & hæc esset in prima figura cū maiori particulari, quod est monstruosum: quoniam maior debet esse perpetuū vniuersalis; quia continere debet minorem; quando verò non continetur minor sub maiori, argumentum non fequitur, de hoc luculētius egimus in libris de indicatione: ecce ergo, quod per diuifionem generis procedentes ad subalternas, & ab alijs ad specificas ideas, nos sēper in occultis, & ignotis differentijs petimus; quoniam semper argumentum ex sufficienti partenumeratione, dum vtimur ipso sine demonstratione aliqua in rebus inquirendis; petit turpiter principium: Hinc Arist. 1. priorum; & in fine secundi concludit, ex diuifione consequentias esse prauas, vel si consequens est bonum; illud non colligi ex præmissis: quia à genere ad differentias nulla est illatio.

Ad hæc, quod diuifio generalissimi ad specifica nullā in hauriendis consequentijs opem ferat, patebit non solum, quia

peccet semel in forma, verum etiam non correspondet Aristotelis præceptis, veluti secundo peribet. vbi vult à coniunctis ad diuersa non valere consequentias: similiter non valet in fyllogismo diuifiuo duplante, dicendo, omnis febris continua vel est benigna, vel maligna; hæc est continua, ergo benigna, vel maligna: iste est fyllogismus duplans, at nil concludit, nisi quod est in maiori pofitione.

Sunt tamen, qui inferunt, non maligna, ergo benigna: iste processus à coniunctis ad diuifia, nullus est sine demonstratione: quia est in diuerso sensu in coniuncto, quā sit in diuifio, veluti febris continua est benigna, vel maligna: hæc non est vera, dum verò dicimus sine probatione, est maligna, est alter scūs, & nō fequitur.

Demum diuifione inuenire occulta est peccatum in materia, quod committitur circa vniuersale reiectum ab Aristot. 1. post. capite de tribus erroribus circa vniuersale, vitium est attribueret ex diuifione inferiori, quod superiori esset attribuendum, veluti, vt inistamus in eodem exemplo: febris continua vel est benigna, vel maligna: hoc attributum, esse benignam, vel malignam aptissime tanquam proprio subiecto cōuenit febrī cōtinuæ, quia cōtinua est vel maligna, vel benigna, at dicēdo febris, vt febris est continua, & ex hoc inferre, quod sit maligna, est attributum specificum nō inferendum, cum inferiori subiecto conuenire debuit sit: adest in primis febris continua tanquam genus: sub hac continentur maligna, ardens, & variæ species, & vni ex omnibus attributum illud, quod sit maligna, conuenire debet: quare attribueret inferiori, quod superiori esset attribuendum, est error in materia non excusandus.

Cōcludimus ergo diuifionem sine demonstratione nos decipere, & nihil utilitatis in hauriendis asserte, & hanc summam vtilitatem venandi incognita esse deferendam ad demonstrationem, quæ sola obstruit, & recondita aperit.

Oscenditur quod signa propria affectuum præter naturam à quaque fontibus desumantur. Cap. VIII.

Diuifio generalissimi in subalterna, et subalternaorū in specificas affectuū præ-

præter naturam differentias utilis quædam via est; sed à demonstratione seuncta, ob petitionis vitium in cognoscendis occultis affectuum ideis, mutila, & insuficiens. Optimum factu existimaui, in præsentia signa aliqua morborum tradere & Methodum aliquam demonstrationem condere; quæ post factam sufficientem affectuum enumerationem, vel diuisionem, principij petitionem tollat, & nõ bis commodè, & perpetuò manifestet, quo morbo vnusquisq; patiens sit iactatus, atque percussus. Caterum, quia Medicus est senatus philosophus, idcirco per signa, & à posteriori coactus est, quæ sua natura aliquo sunt obtenebrata vclò, in lucem promere.

Age, ostendam, quæ nam sint hæc signa, quæ vim demonstratiuum obtinere videntur.

Dicimus ergo, aliqua esse propria, quæ à determinatis fontibus, & separatim ex vnico tantum vnicum signum proprium aliquando colligere possumus: sed, cum humana hæc conditio vix ferat, quod nos in morbis contemplandis, atq; indagandis signa propria inueniamus, cum re vera perpaucæ sint, vt in centum affectibus vix vnus sit, qui per vnicū signum proprium pateat: ideo methodum certam de signis propriis tradere non possumus, cum de illis, quæ non sunt semper, nulla methodus, vel scientia detur.

Verumtamen in Capite proponimus illos fontes, ad quos (si aderunt propria signa) reducantur, & per quos possumus in morbis cognoscendis philosophari an vnicum existat proprium signum, vel an fontes illi suggerant nobis aliquod proprium; exinde fontibus ijs explicatis spiritum dirigemus ad Meth. de signis communibus, quæ abundantissimè à qualibet re seaturiant, de quibus, & Methodus, & scientia dantur.

Aliqua ergo præter propria signa erunt communia, sed eo vique certa methodo coarctari possunt; vt proprijs bellissimè subrogentur, quæ admodum Arist. ita extulit alib. post. circa finem, quemque adeo obseruat, dum delitescunt propria vt doceat syndromen signorum communium aliquando vicem subire priorum, sicuti exemplificat de animalibus habenti-

bus quatuor ventres; Hæc carent dentibus superioribus, & gestant cornua, hæc duæ proprietates coarctat animal habes quatuor ventres: quæ conuertunt cum subiecto, ac vnica esset conuertibilis proprietas, & sicuti nos in venandis causis efficientibus in m: diu adduximus syndromen nostram communium signorum à sex fontibus hauriendum, infallibilem, æternæ veritatis & scientificam.

Si verò de proprijs est loquendum: Dicimus quod si aliqua quandoq; signa propria aderint pro morbis cognoscendis, sint haurienda ex aliquo ex ijs 3. fontibus.

Vt primus fons hauriatur ab actione, aliqua læsa, quod est immediatum symptoma.

Secundus ab exeunte mutato.

Tertius à qualitate mutata; quæ mediata symptomata appellari merentur, quia exeuntia, vel qualitates mutata non sunt, nisi prius actio aliqua lædatur, quam deinde sequuntur.

Quartus fons erit à motu morbi; motus verò morbi est vel vniuersalis, vel particularis: vniuersalis est Chronicus vel acutus, particularis, sunt periodi, & paroxysmi.

Quintus & postremus à iuuantibus, & lædentibus: à quibus seorsum expensis, atque libatis, non in syndromen collectis, aliquando signum aliquod proprium maximè expiscari possumus, neque alios præterea fontes, vbi propria signa collocari contingat, imaginari possumus; quoniam omnia quæcuq; nexum aliquem necessarium tenent, vel pendunt per se à mala corporis constitutione, & erunt symptomata, quæ constituunt primos tres fontes, vel è contentis, quæ proprie motum periodicum faciunt: vnde quartus fons, vel sunt iuuantia, & lædentia.

Cætera verò omnia signa ad hos reducuntur, vel si non reducuntur, sunt accidentalialia, & paralogismos constituunt, veluti est illud à nobis alibi reiectum à similitudine, vel à proportionem, quod proponitur ab Argenterio, & facit vel syllogismum in quatuor terminis, vel argumentum in 3. figura cum conclusione vniuersali, vel similia sequuntur inconuenientia, de quibus alibi.

Sed redeamus ad propositos fontes, dicendo, in primo fonte actiones collocari: quate si expendamus actionem animalem, vel sapissimè ab hoc solo, & vnico fonte depromere poterimus, quo morbo aliquis angatur, & corripiatur: sicuti exèph causa in animali fuctione princeps, & non princeps, in princeps, si memoria est deperdita; dicimus, ergo est intemperies frigida: somnus nimium longus, ergo cerebrum est frigidum & humidum. *In nò princeps, aliquis fame intempestua laborat: ergo affectus oris ventriculi erit fictus, vel frigidus.*

Similiter in actione vitali: pulsus ægrotantis erit valde tardus, ergo colliges affectum frigidum cordis, & plura quæ vnico signo sine syndrome optimè cognoscuntur.

Ad eundem modum, si de exeuntibus instituiamus sermonem; quàmprimù pus vidimus; inferimus, ergo est vlcus, si cartilaginè tussi eiectà, ergo vlcus thracæ, nulla interposita difficultate, certas has cõsequentiã ex vnico signo, sine aliqua syndrome, morbum vel affectum internum colligere poterimus.

Idem si in lotio carunculam spectemus, illud affectionem renalem comprehendimus; si in vrinis sedimentum multum, & album sine aliquo vrinæ colore, dicimus affectionem esse frigidam, & humidam; quia tale quippiam de qualitatibus dicendum si album inspicimus colorem dicimus esse intemperiem frigidam, & humidam: si flauum, & ictærum, & obstructionem pori fellei: si nigrum, siccitatem, & melancholiam. Ecce ergo, quod non à multis symptomatibus, sed ab vnico tantum, & sorsum expenso euecti sunt prisci in altissimam, & latentem affectionem genericam.

Ad hæc præter symptomata, adest motus vniuersalis, sicut choniceus affectus, affectionem frigidã ostendit; adest quoque motus particularis, vt periodicus, nam ille qui alteritis diebus in grauescit; valetudinem calidiorẽ; qui de quarto in quattuor inualefcit, affectus nõ adeo caloris feraces. Qui mouentur vesperti, melancholicos, qui stauunt noctu, pituitosos; qui commouentur matutinis hõris, sanguineos; & qui inouentur in meridie,

effrenes biles portendunt.

Postremò ex iuuantibus & lædentibus aliquid propriissimum signum comprehendimus, nulla facta symptomatum cõtemplatione, veluti si morbus in immensa caligine versaretur; & symptomata adhuc sub iudice essent collocata: an videlicet vnum magis, quàm alium affectum ostenderent, peruenimus saltem ad cognitionem aliquam genericam, dicendo iuuant calida, ergo affectus debet esse frigidus, & viceuetiã; frigida manus dant, ergo calida affectio, veluti dum in aliquo varijs oppresso affectionibus si videris febrem magnas suppetias afferre, aliud nõ poteris dicere, nisi quod affectus debeat esse frigidus: Hinc Galen. 6. aphorism. 9. habet hæc verba, nouimus febrẽ illis tantum morbis conferre, quæ ex frigidityte sunt sola, vel cum humoribus crudis, & statutis spiritibus. Similiter Hippocrates in apothorismis vult, quod febris tollat conuulsionem: quare valebit semper dicere, febris opitulatur patienti, ergo valetudo erit frigida.

Hæc signa in exempla adducuntur, cū plura signa propria alicuius affectus possem in has meas diuitias congerere; quæ cum apud præcticos nostros Excellentissimos, vt apud Excellentissimum Eustachium Rudium, quem honoris causa nomino innumera legi, & obseruari possint, non par est elegantissimè, & summo eloquentiæ ornatu in conspectum hominum edita huc trāsferre, ne in maiorem molem volumen crescat; non conuenit inquam, quia hic tantum meum non est propositum, methodum de signis proprijs promere à quinque fontibus expiscandis, sed meum præcipuè est, methodum de signis communibus contrahendis in syndromem tradere, quod fiet in sequenti capite.

Non enim est laborandum in proprijs signis colligendis: quia si in vnico morbo vnicum proprium inuenimus, in centum affectibus, vt dixi, vix vnicus affectus erit qui in lucem ferat proprium, & per illud cognoscatur affectus. Quocirca cū scientia debeat esse æternorum, & propria nõ possint inueniri semper; insudabimus, vt inueniamus methodum obseruandum in quolibet morbo cognoscendo, quæ erit

per communia signa contrahenda per syndromen, in cognitionem æternam, & infallibilem.

Methodus de syndrome signorum communium affectuum à sex fontibus colligenda. Cap. IX.

Planum est in cognoscendis internis morborum Ideis nos per sepe latere morbi differentiam, quoniam proprium signum, quod nos ad illam affectus naturam ducere potest, est obtenebratum, & eadem caligine, qua morbus, obductum, & circumseptum; ratio vero tantæ obscuritatis est, quia omnis morbus ferme est cõpositus, ideo per plura signa ferè semper in cognitionem venimus. Pleuritis, verbi causa, est inflammatio, est morbus mixtus, adest intemperies calida, & putredo, unde febris, adest solutio continui in tunica, unde dolor pungitius, adest magnitudo aucta, unde difficultas respirandi, adest humorum confluxus in pectus, unde tussis, eadem in mille alijs videmus. Idcirco summa debemus abundare solertia in syndrome aliqua signorum communium parâda, quæ ita contrahat, ut convertibilem cognitionem pariat, & ad penitissimos illos affectus corporis peripheriæ vallo circumuentos, nos commode deferat.

Cæterum cum signa communia sint propemodum infinita, nos illa aniplecti dumtaxat constituimus, quæ immediatè insequuntur causas antecedentes, & subsequentes; quæ ad sex fontes hos transferre possumus.

In primo fonte collocatur omnia illa, quæ à procatacticis causis hauriuntur.

Quod verò præcognitio procatacticarum in cognoscendis internis affectibus valde iuvet, parebit, si ante oculos obijciemus duos casus à Gal. citatos in libro quomodo morbum simulantes depræhendantur. Alter est de concionatore, qui fingebat torqueri Colica passione: cognitus fuit à Gal. quia non præcessit victus infrigidans. Alter est de seruo qui amore captus excitavit tumorem per thapsiam, ne iter faceret cum Domino suo: novit Gal. quia nulla externa causa præcessit, quæ tumorem efficere potuisset.

Sanctory Sanctory Pars I.

In secundo fonte signa ponuntur, quæ à dispositione patientis hauriuntur.

In tertio collocabimus, quæ à causis efficientibus internis trahunt initium.

In quarto, quæ à symptomatibus scaturiunt.

In quinto, quæ à locis affectis.

In postremo collocatur illa signa, quæ per iuvantia & lædientia nos poterunt excitare, & commonescere, quo morbo quis in altissimis corporis partibus concutiat, atque iactetur.

Quod verò nec plures, nec pauciores esse possint fontes; à quibus signa communia possunt in hunc usum colligi; talis ingruit necessitas; siquidem factum est impossibile, ut aliquis in morbum corruat, nisi sex non naturalium rerum allecamentis aliquibus accersitus, ac delinitus.

Similiter qui fit, ut quispiam in malam valentiam cadat, nisi corpus ipsius sit dispositum, atque paratum; ut hinc Galenus in historia Silenti dicat, vix; Silenus non incidisset in morbum gravissimum ob externos errores, nisi antea dispositum corpus fuisset.

Ad eundem modum requiritur, ut morbus fiat, causa aliqua efficiens interna, à qua petenda sunt signa, de quibus egimus in 6. libro.

Similiter morbus non habebit permanentiam, nisi exemplo sequantur symptomata, ut hinc fons quartus ortus sit: unde signa petuntur à symptomatibus.

Denique cum morbus non possit esse, nisi sit locus affectus; à locis affectis depromemus notas.

Postremo est fons à iuvantibus, & lædientibus, quo fonte utimur, ut est abundans rei probatio, ut diximus lib. 6.

Quod ad primum fontem, qui continet procatacticas; procatacticæ omnes causas ad has reducuntur; ad aerem, ad cibum & potum; ad somnum & vigiliam; ad motum, & quietem; ad animi passiones, & ad coitum, vel ad inanitionem, & repletionem. Vel quod magis placet cum Gal. libro de tuenda sanitate, & alibi, ad quatuor capita, ad quæ hæc, & plura alia, ut alibi diximus, possunt reduci, & hæc sunt, quæ assumentur, quæ sunt animo, vel corpore; quæ foris adhibentur, & deum quæ excernuntur & retinentur.

Istæ causæ extrinsecè longo aliquo tēporis tractu temperamenta immutant; & ita altas (si corpus dispositum sit) imprimere valent orbitas, vt inferant plagam in viscera, & parum disposita corpora disponant, & ad labem ducant.

Quare si de aere loquamur potest calefacere, refrigerare, exsiccare, & humectare, & ad omnes intemperantias corpus deducere. Præterea, Hipp. lib. de habitationibus ait multum conferre ad sanitatem scire quibus ventis loca aspicientur, quia auster humectat, aquilo siccatur. Legitur apud Vitruuium, & Laertium Empedoclem animaduertisse Agrigentum patriam suam à nonnullis ventis insigniter vitari eamque liberauit oculis quibusdam montium interstitijs, vnde mali venti spirabant.

Si præcessit æstuosus aer, igne penè emicans, facile erit colligere morbum calidum subsequutum esse; Si verò præter æstuum, aer non sit perflatus; sed ventis australibus expositus: tunc dupliciter calefacit, per se, & ex accidenti, per se quatenus calidus; ex accidenti, quatenus obstruens meatus insensibiles: vnde retinetur perspiratus illi halituosi, vt tandè incalescentur, & in melancholia degeneret. Similiter si loca fuerint palustria, & cænosa crassas exhalationes spirantia: horum locorum incolæ, vbi se colligent in aerem perflatum boreali spiritu, tunc tristitia, quæ est melancholici character, exui affatim sentient, quod obtingere solet Veneris melancholicis, dum è suis palustribus in rura secedunt: vt ego addere solem carminibus illis Lucretij 6. de natura.

Est Elephas morbus, qui Nilis flumina propter

Gignitur; ægypto in media, neq; præterea usquam

Atheis tentantur gressus oculique in Atheis

Finitibus —

Quod est lippitudinē Achæis; podagrā Athenis; elephantiasim ægypto sequi, & Venetijs melancholiam Hypocôdriacam præcipuè vigere: quare si præcessit aer æstiuus, morbi calidi sequuntur: si nubilosus, melancholicus ille effrenis; sic de cæteris frigidis humidis, & hæc qualitates poterunt per se, & per accides varijs mo-

dis officere, vt nimius feruor per accides quatenus resoluat, frigefaciat; nimium frigus quatenus obstruat, calefaciat; vt perpetuè spectanda sint ea, quæ per resolutionem, & suffocationem contingunt, non modo in aere: verum etiam in qualibet procacitica causa.

Si verò, ea, quæ ex aere colligere poteris, in vnum complexum coalescent cū cæteris fontibus, & cum ijs, quæ pertinent ad eundem; tunc facta syndrome colligere poteris morbum.

Nam si de alimento loquatur, tunc ex Galeno 2. ad Glauconem cap. 10. nonne habemus in Alexandria, & in Mysia, æquæ cochleas, carnes italitas, & lac, homines comedere, verumtamen quia in Mysia aer est gelidus, & in Alexandria summo æstuat æstui: idcirco in Alexandria affectus elephanticus grassatur, quippè in Mysia, & in Germania non videtur seuire.

Si aeri adiungamus alimentum; præcessit enim aer feruidus, & cibus calidus; ergo affectus subsequutus erit calidus, & quod de calidis affectibus inferimus, de omnibus subaudiendum erit.

Si verò aeri, & alimento adiuncta esset vigilia, vt æquè respondeat, atq; coherereat, certiores adhuc consequentias hauriemus; Vigilia exsiccat, somnus humectat. vnde ex Galeno 5. aph. com. 27. & 4. in 6. Epid. 23. somnus demulcet sitim, & lassitudinem illam vlcerosam ex bile factam: somnus nimius ad frigidos morbos; Vigilia ad calidos, & feruentes transfert corpora; Si præcesserint exercitia, & motus insignes, calidos morbos. Si vero vehementissimè anteuerit exercitiū, tunc poteris, si alijs fontibus correspondeat, colligere frigidos morbos ob resolutionem caloris, & quod de motu colligere valeamus, de quiete contrarium esse inferendum, secludendo semper id quod est per accidens, ab eo quod est per se: per accidens enim in procaciticijs variæ sunt causæ operantes, vt suffocantia, & resolutentia vniuersa.

Ad eundem modum animi pathemata omnia calfaciunt, ex Galeno in methodo medendi habemus non solum iram, sed irærorem, & mestitiam ad motum, vt ad causam efficientem caloris reduci. Quin.

nimò

nimo 12. Methodi c. 5. tener, animi affectus corrumpere spiritus. Inuenio duos modos, quibus animi passiones nos lædant. Alter ob spiritus corruptelam, quæ calorem facit. Alter ob calorem, quæ concitatur, tum ob maiores, tum ob gaudium, qui duo affectus sunt perturbationum animi initia: vnde, vt ait Plato in Charmide. Cuncta ferè mala corporibus adueniunt; sic in iram excurrere, vel percitus furores, furit adeo: vt flammens scintillet feruor; eodem modo mare in eadem concentrant spiritus: quippe arctè vnici solida adeo quatiunt, vt ardore & illo infestissimo miserrimi promptè premantur.

In calidis ergo affectibus præcognoscendis passiones animi maximam præbent notitiam.

Postremò si in hoc fonte coitus quoque conspiraret, eò coitus euaderet; Coitus enim calfacit: & imbecilla corpora refrigerat; Gal. 6. de morb. vulg. com. 5. tex. 23. Coitus calfacit; sed corpora imbecilla refrigerat; refrigerat enim debilitando, veluti habet Gal. 6. aphor. 28. dicens multam vini potationem debilitare, vt coitum, qui debilitat corpora, quæ robore non ita præstant, & exsiccat vsque ad hæcticam Tabem; hinc Gal. de Satyro dicit 8. in 6. de morb. vulg. 38. ob eiaculationem seminis repetitam tabidum factum fuisse, vt ex coitu nimio possis in diuersa corporum conditione, & contumacissimum, & effrenem colligere calorem, & summam haurire siccitatem, debilitatem, & aliquando frigiditatem. Democritus appellat, coitum paruum Epilepsiam; idè si nimius sit disponit homines ad legitimam Epilepsiam, quia si est nimius refrigerat, & obstruit, sicuti medioeris coitus calefacit. Pari modo Gal. in arte parua ex sententia Democratis asserit Venetrem caput maxime lædere, vnde convulsionem, quoniam omnes externæ causæ, nisi suffocent, & resoluant per se agunt: inferas ergo breuibus: aerem calidum, alimentum calidum, vigiliam, motum, passiones animi, & coitum, nisi resoluant, vel suffocent, calidos morbos: sin minus, frigidos parere: aerem frigidum, alimentum frigidum, somnum nimium, & quietem per se refrigerare, ex accidenti (qua-

tenus obstruere valent) calidos morbos facere posse.

Qua Methodo per viscerum dispositionem præcedentem ducamur ad cognoscendos affectus internos. Cap. X.

EX traditis in primo fonte in satis rectam semitam duci poterunt inuenciores morborum; at nulla necessitate hæcenus inferre aliquid valebunt, nisi ad secundum fontem, quem voco à proprietatibus, vel dispositionibus corporis, consecrant mentis aciem: iam diximus, neminem affectibus præter naturam posse illaqueari, atque irretiri, nisi præexistat in corpore dispositio: Hinc Hipp. lib. 1. de Dieta, dicit, morbos non statim concipi: sed diu conceptos statim *ἐλάμπειν*, idèst eripere.

Similiter Gal. 2. de Alim. fac. c. de Ciacum: habet hæc verba, ex frequentato vii prauorum eduliorum colligi prauos humores, qui deinde qualibet læuissima occasione accendant febres *κακῶς δίδει*.

Pari modo Arist. 8. Phys. tex. 23. reiiciens opinionem Heracliti dicentis omnia semper moueri, proponit quatuor exempla.

Primum in augmentatione, & diminutione dicens non semper esse motum, sed ante motum dispositionem præcedere.

Secundum exemplum est de excavatione lapidis à guttis cadentibus: dicit Ari. quod non quælibet gutta excavat, sed aliquas disponere, & aliquas paucas excavare.

Similiter exemplificat de arbore, quæ ex lapide nascitur, quippe crescens disponit, deinde post multos annos derepente scindit.

Addit tertium exemplum, quod est de congelatione, quæ non fit nisi post aquæ dispositionem. Demum proponit exemplum de egroto in sanitatem tendente, dicit non sepe fieri sanum, sed prius disponi, & post dispositionem introduci illam alterationem qua statim sanus fit. Aliquæ ergo erunt dispositiones antecedentes, aliquæ subsequentes: in feruidis affectibus quatuor sunt antecedentes, prima dicitur esse oriundum à parentibus, qui fuerint per se ipsi eundem affectum, qui hæreditarie eandem receperint luem. Secunda ex ætate: in iuvene scimus corpus dispositum esse ad ignitos affectus: in senè ad frigidos. Tertia, ex intermissa aliqua euacua-

tione, nam intermissio sanguinis per hæmorrhoidas melancolicum affectum; intermissio bilis ardentem indicat, & sic de cæteris. Quarta ex corporis habitu; nam obesum in frigidum, macilentum corpus in calidum est obnoxium.

Ex physionomicis signis; qui habet frontem rotundam, in bilem, qui maxillam inferiorem magnam, in pituitam, qui habent venas largas, in calidos: exiles, in frigidum, sunt proni.

Varia deinde obseruantur consequentia, quæ eandem dispositionem portentunt; quia si animales spectamus functiones, ut esse vigiles, mutabiles in sententia, celeri ingenio, in somnis videre arma, vel quæ iram incutunt, esse agiles in motu, bilem offendunt.

Ex vitalibus, si sint iracundi, & sint *duplens* & in Venerem præter modum excurrant, & pulsus sint veloces, sunt calidi.

A naturalibus, cibum non esse molestem, bilem fortiri multam, optimè digerere, & malè coquere, excrementis esse exutos, ut salua carere, & bilem in auribus esse plus debito, hæc omnia calidos affectus offendunt.

Si verò contraria obseruentur: ut videlicet sint in sententia constantes: aquam in somnis videant: tardo sint motu, non *duplens* sed *euduplens*, pulsus molles: & ferè suffocari, & coitus nimia sit abstinentia (obiter nimia coitus abstinentia ex Gal. 6. de loc. aff. 5. disponit ad sex mala, ad granitatem capitis, ad cibi fastidium, ad periculum febris, ad coctionem diminutam, ad torporem, & ad timorem.) Cibum paulo plus debito sumptum valde molestus, abundantia saluæ, somnus longus, non sitire, frigida corpora ostendunt, & si careret moribus (cum pituitosi ex Gal. lib. 1. de natura humana 30. non habeant mores) rãto magis frigidum, & pituitosum corpus inlicetur. Hæc & similia debent expendi, ut corporis dispositio cognoscatur; quoniam ut probabimus ex Galeno, solum disposita corpora in ægritudines proueniunt, propterea si exauries signum aliquod a primo fonte, & coniunges cum aliqua ex dictis dispositionibus, non erit difficile, ut cognoscamus, quo morbo quis iactetur: & tanto magis si hæc cū in-

ferioribus fontibus coniunges, quia tunc certam comparare poteris cognitionem.

Sequitur tertius fons, qui est ab humoribus, nullus. n. re vera potest esse morbus, neque ætius, qui corpora hæc nostra vexare solet, quin alterentur humores: Sed quoniam de humoribus omnibus peccatibus in 5. & 6. libris fuimus in illa speculatione admodum solliciti, cum duo libri in hunc finem editi sint, idcirco consilio in hoc loco omittimus hæc contemplationem.

Quantum igitur ad Quartum fontem spectat, ubi per symptomatum cognitionem procedimus ad latentes affectus cognoscendos: ante oculos collocanda sunt omnia egrotantis symptomata, eaque expendenda, & ad prima initia, ut superius sumus executi, transferenda.

Quare dicimus, quod omnia symptomata vel sint primi ordinis, vel secundarii: primi erunt actiones læsæ, quæ immediate insequuntur morbum; si erunt secundariæ, erunt excentia, & qualitates mutata; quæ mediata sequuntur morbum. Attamen primum exordium symptomatum est morbus, cum omnis læsio actionum, & omne exiens malum, vel qualitas mala aliquam constitutionem insequantur, sicuti superius probauimus, ut non sit quod hanc rem autoritatibus Galeni, & Arist. confirmemus.

Supponendum quoque erit, symptomata esse in fieri, & perpetuò pendere, eaque tolli non posse, nisi, quæ sunt in facto esse, adimantur; quoniam nil fit, nisi supposito subiecto, & efficiēte, quæ sūt in facto esse & veram permanentiam habent: resecemus ergo symptomata ad sua prima principia, & exordiamur hac methodo resolutionis: sunt excentia mala, ergo retentrix est diminuta, vel ablata: deinceps, ut peruenias per semitam inuisibilem ad veritatis apicem, est læsa retentrix, ergo vel per se vel per accidēs, quæ distinctio ambigit omne genus entis, & omnia cadūt sub hac vniuersalissima diuisione consideratione: si per se, est Gal. 3. de symp. causis primo, quod causæ lædentes per se retentricem, vel expultricem, vel cæteras corporis functiones, sint læsæ, vel propter obiecta externa, vel obiectam facultatē nō læditur facultas, sed eius instrumentū, quod est constitutio, quæ prædicatur de partibus

bus similaribus, & dissimilaribus.

Vnum igitur genus, quod per se efficit retentricem diminutam, vel ablatam, erit mala constitutio similarium, vel dissimilarium, si erit mala constitutio similarium, erit intemperies humida, quæ reddere potest fibras in orbem locatas eo usque flaccidas, ut nulla retinendi vi polleant; verò erit mala constitutio dissimilarium lædens hoc modo retentricem, erit nimia apertio vel per anastomosim, vel per diarrheam facta; anastomosis verò ex Gal. 5. met. 2. fiet, & vel ob acrimoniam, vel ob copiam vel ob imbecillitatem. Diarrheis quoque ob tres causas fieri solet, ob acrimoniam videlicet, ob copiam, vel ob externum ictum. Aliud verò genus, quod ledere potest per se operationes potest esse obiectum externum nulla etiam facta in facultatis instrumentum læsione, sicuti ob humiditatem ex continuis potatibus collectam.

Per accidens ledi potest retentrix, quantum expultrix irritata premit ita cum in petu, ut nulla naturalis virtus optime retentricis possit resistere.

Ad eundem modum de expultrice dicendum, quod per se, vel per accidens lædatur, per se irritetur à copia, vel à mala qualitate, quæ fixum effrenis bilem pungunt, & vellicant transuerfas fibras, quæ sunt instrumenta facultatis expultricis; vel per accidens læditur expultrix ratione alteratricis diminuta, quæ effectus adeo viribus exuta; ut non generaret bilem, unde partes similes destinata huic officio expellendi in suis obsequiis muneribus deficiunt, videlicet propter læsam alteratricem, quæ est omnium functionum naturalium tanquam princeps, & domina, & quæ immediate constitutiones primò similes, & deinde dissimiles respicit.

Hæ igitur functiones naturales cum aliquæ sint diminutæ, aliquæ ablatae, & aliquæ deprauatæ, dicam si erunt diminutæ, vel ablatae, tunc per se indicare passionem frigidam, quæ potest esse vel in obiectis vel in constitutione similarium partium. Nos autem tunc cognoscemus esse in obiectis, quando ex tempore sine aliqua precedenti corporis dispositione videbimus functiones diminutas, vel ablatas reddi; Cognoscemus deinde passiones frigidas esse in constitutione similiari, quando cor-


pus longo temporis tractu ad malam valetudinem redditur dispositum; quoniam ex Galeno passim intemperies, quæ sunt malæ constitutiones similarium, neque citò fiunt, neque citò desinunt.

Dicas deinde, si erunt functiones naturales deprauatæ, tunc per se indicari calidam passionem, quia contrariarum eadè est ratio, quæ affectio calida erit, vel in obiectis, vel in constitutione, cognoscemus esse in obiectis, quando sine precedentibus dispositionibus deprauatæ observantur: in constitutione verò, quando tractu temporis corpus ad illas passiones erit obnoxium. Hæc doctrina est Hippocratis aph. 7. secunde sect., quæ longo tempore extenuata sunt corpora Galeni in com. claris ostendit quod similarium intemperies tractu temporis fiant.

Quantum verò spectat ad actiones vitales, & animales; diminutæ vitales vel frigidam passionem indicabunt esse similaribus partibus, vel indicabunt esse angustiam in dissimilaribus; hinc pulsus plus debito tardus affectum frigidum ostendet, & pulsus inæqualis affectum in angustia, quæ pertinet ad dissimilarem partem, ut propterea Galen. 4. de loc. affect. 5. ult. cognouerit Antipatrum Medicum ex inæqualitate pulsus, & ex difficultate respirandi habuisse angustiam in læuibus arterijs.

Si verò de functionibus vitalibus, & animalibus deprauatis loquamur, aliquando calidos affectus significant, & aliquando frigidos, & præcipue functiones animales deprauatæ, sicuti obseruamus in Epilepsia, ubi deprauantur functiones animales, attamen affectus à frigidis oritur causis, & in phrenesi ubi actiones animales deprauantur, nihilominus affectus est calidus.

Si verò de functionibus animalibus diminutis loquamur, hæc potius frigidam passionem ostendunt, ut valeant hæc confectione in diminutis functionibus animalibus est memoria deperdita, vel diminuta, ergo est intemperies frigida, & humida, est catus ergo frigida intemperies, est niens hebes, ergo frigida intemperies; quare diminutæ functiones animales potius frigidum affectum, quam calidum; deprauatæ verò aliquando frigidum, &



aliquando calidum : calidum inquam nō solū in phrenesi, sed in alijs affectionibus, sicuti quæ obseruātur in illis, qui sunt vigilēs, qui obloquuntur, vel nugantur, vel in ijs, qui totis horis sunt sitibundi, vel à cibo abhorrentes : hæ omnes affectiones sunt in genere actionum deprauatarum, biliosos succos ostendentium, vt Galen. docet, de Historia Cleonactidis, de quo ægorante dixit, quod quamuis in aliam febrem habuerit, & biliosa vomuerit, quoniam nec sitiebat, nec abhorrebat à cibo, & non erat infornis, colligebat Cleonactidem febre oppressum abundare potius frigidis, quàm calidis humoribus.

Colligemus ergo ex læsis actionibus primas affectionum radices, & quando aliqua actio nos dubios reddet, confugiendum erit ad primum fontem vbi ex procatarticiis aliquid colligere possumus; Et ad secundum fontem, vbi ex dispositionibus antecedentibus, & consequentibus, qui sint affectus cognoscere valebimus, demum ad locos affectos, & ad iuuantia, & lædientia, quia simul vnitri fontes poterunt certissimam reconditi affectus cognitionem asserre.

Qua Methodo ducamur ad cognoscendos locos affectos. Cap. XI.

Postremo liberanda sunt ea, quæ ad quintum fontem spectant: ex Galeno 2. de loc. aff. 9. recepinus quinque loca, quæ ad cognitionem recondite, & delitescētis partis affectus nos vehere possunt, quorum locorum primus est ab excrementis; Secundus ab actione læsa; Tertius à situ accidentium, vt à situ doloris, caloris, tumoris, vel grauitatis; Quartus à proprijs accidentibus; Quintus à doloris proprietate. Ex his locis colligemus signa, per quæ nos locos affectos cognoscere valebimus: propter hæc loca vnita dignoscimus locum affectum, sed si his quinque locis inniximus præceptum Hipp. 4. aph. 33. reddemur certi de loco affecto: præceptū Hipp. est quod si ante morbum aliqua pars sit imbecillis, illa in morbo est mali sedes: quibus per cognitis non erit arduum affectus internos, & penitissimos haurire; & quemadmodum aliquando per vnicū signum, affectum locum cōsequimur, ali-

quando per plura; similiter ex loco affecto, quod est per unicum fontem procedere, morbum sepe comprehendimus nulla alia facta syndrome; Ages, exēpla, quæ animis lectorum persuadere possunt, proponamus; diximus ab excrementis locum affectum quandoque pernosci, veluti ubi sanies eijcitur per vomitum sine tussi, tunc dicimus ventrem esse ulcere afflictum; sed hætenus laret, an ætrophagus sit pars affecta, an vetriculus; hoc pernoiscatur, confuginus ad alia loca, ut ad situm doloris, dum cibum uidelicet ingerimus, si antequam ingestus sit, puncture sentiantur, est in ætrophago, si post immisum cibum excidentur puncturæ, est in Ventriculo. Alijs pergamus exemplis in locis affectis internis cognoscendis, cum non deceat alia exempla proponere, quàm locorum reconditorum; iterum ab excrementis exordientes.

Est pus permixtum ualde cum lotio, dicas ergo renes sunt affecti; quoniam eb distantiam locorum pus ualde permisceatur. Caterum non præstat infallibile cognitionem, nisi ad alia loca confuginus; quoniam etiam Hepar in parte gibba potest esse ulcere oppressū, & inde per urinam pus mixtum prolabi; Situs ergo exsoluere uidetur nodum, nam si dolor est circa lumbos, est in rene; si in regione Hepatis, est in Hepate.

Prætere si in lotio caruncula cōspiciatur, dicas renes esse affectos, solum hoc signum posset omnes dicere tenebras, quæadmodū dū aliquis patitur ulcus tracheæ arteriæ, tunc si per tissim eijciatur cartilago, hoc mirum in modum nos cogit ad credendum vlcus esse in trachea.

Diximus quoque ab actionibus læsis affectos locos nos assequi posse, ut hinc pulsus inæqualis, atque intercisus, quatenus est actio uitalis, membra spiritalia esse affecta, certò significat, sin uerò pulsus intercisio addatur difficilis respiratio, certissimam habebimus cognitionem tunc lenem arteriam affligitari, ut obigit Antipatro Medico leni arteriæ angustia correpto, quippe, & pulsus intercisus & difficilem respirationem habebat.

A situ cognoscere quoque poterimus affectos locos, ueluti si durities in dextro hypochondrio esset, quæ lunæ bicornis specimen

cimen & exemplar emularetur, tunc iecur tumore affici esset dicendum. Sin vero hypocondrii durities in longum esset exportata, tunc nō in Hepate, sed in niu-
sculis rectis affectio collocaretur: Ecce quod à situ tumoris inferre valeamus affectum locum, & deinceps internum, & reconditum affectum expeditius consequi.

Ad eundem modum, vt in eadem explorum luce insistamus, de Empyemate verba facientes dicemus, locum affectum esse partem pectoris dextram, nunc sinistram; quando mirabili illo. Auicēne experimēto obseruabimus, in qua parte collectum pus deliteat, quod fiet si lintēū madore suffusum superponatur pectori. Indeque post dimidie horę tractum videamus lintēi parte aliā quam pectus excidat, tunc si dextra citius madore exiit, in parte illa dicemus pus esse collectum: caula verò quod exciderit, & promptius humor lintēi in aurā abeat, est calor mordax à pure prodians: ecce quod præter extermetā, & actiones lætas, Situs valde conferre potest ad locum affectum cognoscendum.

Adfunt tamen præterea propria accidentia, & dolorum proprietates. Hinc diximus flautiū, vt in arqato, significare obstructionem, vel angustiam quaremus canales, & ductus ferentes bilem ad cistim felleam, sunt occlusi.

Similiter per propria accidentia cognoscimus vesicā calculo opprimi, veluti dū scalpunt pudenda, nihilominus nisi hanc proprietatem alia signorū syndrome castigemus, sicuti per sitū, per actionē aliquam læsam, hæc non prædicabitur per se. dicendum igitur præter pudendorū pruritus in calculo vesicæ, grauitatē quandam esse circa pubem, ecce quod situs ad iunctus illi proprietati ostēdit magis vesicam esse læsam, attamen hæcenus non consequimur infallibilem affecti loci cognitionem, quoniā obtingere posset grauitatem circa pubem à mola, à pudendorum scalptu, & ab alijs causis prodire, quare ad rectam syndromen faciendam meritorē pro calculosis cognoscendis, adiungimus mictionem modò esse deprauatam à perpetuò vrinæ ardore, modò esse ablata, dum patientes isti ex tempore

inprouisa suppressione illaqueantur.

Ecce quomodo variè in cognoscendis occultis locis affectus distrahēda est animi acies, & per plures fontes sit incedendū, qui tanta possēt virtute docendi affectūs, ac signa essent propria, & conuertibilia.

Postremo proprietates dolorum cum primis valent, nā pulsatiuus dolor arteriam, pungitiuus membranam indicat: vt in pleuritide discussum est, sola hac doloris proprietate distingui inflammationē Hepatis à pleuritide: Similiter dolor conuulsiuus tendines, & nervos esse affectos significat: contundens dolor, osium membranam, quam periostium vocant: laxus dolor, siue laceratiuus carnem affici significat: grauis dolor significat viscus aliquod, quod sit sensus hebetioris, vt sunt renes, hepar, pulmo, mēteriu, *alij* *alij*, id est stupor dentium est in substantia dentis: quare errant, qui putant dolorem dentium esse solum in neruis.

Triplex enim est dolor dentiu: primus est in neruis: secundus est in gingiuis: tertius in substantia: testatur Gal. 5. de comp. med. localib. se in dentis substantia, sensisse dolorem pulsatiuum, dicitur hic dolor congelatio dentium: de hoc dolore videtur Hippocrates meminisse 5. epid. in Historia vxoris Aspasie. Hec igitur erunt illa signa, quæ tantam efficaciam in cognoscendis locis affectis habent, vt aliquādo vnicū ex ijs signis in affectu partis suspensionem nos adducere possit, & tanto magis omnia simul vnita: vt inde cognitis locis affectis in cognitione affectus delitescētis perueniamus, vt ab initio inquirendum proposuimus.

Quinque ergo animaduersis fontibus, qui ad affectus penitissimū fastigium nos ducunt, sequitur sextus fons, dum per iuuantia, & lædentia incedimus. Ceterum, vt alibi diximus, ad internam re cognoscendam quinque tantum fontes Methodus nostra continet, & nō plures, vt contineatur hic sextus fons in quinque antecedētis, quoniam illa tantū antecedentia, & cōsequētia sunt ad cognitionē conferētia, vbi quæ res producat, vel quæ res ipsas consequuntur: veritas enim est equatio rei ad intellectū, & res sicut se habet ad esse, ita ad cognosci: Quæ constituunt morbum quemvis sunt causæ extrinsec-

ca, dispositiones patientis, & humores interni: Quae consequuntur, & à re procedunt, sunt symptomata, suntque loci affecti.

Quare iuuantia, & lædētia sunt quid extrinsecum: attamen pro illis, qui non sunt vel diligentissima scientia exculsi, & quia methodum sectam colunt, cum primis conserre poterunt, eritque perinde, ac lydius calculus in probi auri experimento, quare erit abundans rei probatio, & conformatio, verbi gratia, vt omnia exemplorum claritudine emineant, atque splendeant, vt nullo modo fluctuet, & pendeat animus; proponamus casum.

Erit aliquis lassitudine confectus: vis scire, quēnā sit ex illis tribus ideis, phlegmonodes videlicet, tensiva, vel vlcerosa: tunc si confugies ad iuuantia, & lædētia, & videbis ieiunium conserre, inferes lassitudinē esse tensiuam, nō vlcerosam, vel si videbis ieiunium aduersari, ergo (dices) esse vlcerosam; ex Galeno valet hæc consequētia secundo de ratione vict. 32. nocet huic ieiunium, ergo bilis peccat: Sed adesse animis, quod hæc iuuantia, & lædētia pertinent ad secundum fontem, qui est de dispositione patientis, quod iste patiens forsitan talem sit sortitus naturā, vt à ieiunio lædatur, vel pertinet, & magis propriē ad tertium fontē, vbi de causis efficientibus morborum agit; nam bilis vbi alicui corpori lassitudinem, vel alium morbum infert, tunc nimia inedia est fugienda; contrarium obseruatur in pituita, quæ tensiuam tantum parere poterit lassitudinem. Quocirca ex animo expendere oportet quinque illos primos fōtes, quoniam omnia signa ad illos bellicosissime reduci possunt; exempli causa in lassitudine tensiva, dū videmus cibi paucitate sitim tolli, & alimēta sicca nullam inferre sitim: nō statim cognoscimus lassitudinē propterea esse tensiuam, sed quia cognoscimus efficientem causam esse pituitam, est Galeni præceptum sexto de morb. vulg. 3. tex. 28. biliosos succos cibi paucitate suū intendere, & lassitudinem; pituitosos contrarium; vt hæc sint attributa causæ efficientis, bilis videlicet, vel pituitæ.

Ista vt percutrere per iuuantia, & lædētia non sit per alios fontes, quā per

quinque propósitos versari similiter videbimus acetum prodelle in calida intemperie, cur confert? quia illius dyscrasie causa erit bilis, quæ est causa efficiens intemperiei: Vnde ex Galeno 3. de ratione vict. 38. quibus amara bilis exsuperat, acetum prodest; ab ipso enim dissoluitur, & degenerat in pituitam: valebit ergo inferre, iuuat acetum, ergo bilis, tunc enim bilis præbet fomentum intemperiei calidæ.

Possē plura alia exēpla afferre, quod fons per iuuantia, & lædētia sit per quinque propósitos dispersus, sed in re manifesta non est vterius eundum.

Recipiatur igitur fons iste sextus, ac si esset lydius lapis, quo fieret breue, & immediatum experimentum pro cognoscendis oculis affectibus, veluti faciunt aurifices, qui habent ingenia cognoscendi aurum igne, dum illicet verò, & sine labore volunt experiri, ad eunt calculum, & breuiter experiuntur.

Quomodo cognoscatur veterinus affectus per syndromen signorum a sex fontibus collectam. Cap. XII.

PRæstat in præsentia Methodum iam traditam experiri, numquid in affectibus præter naturam inquirendis illud eniolumentum afferat, quod superius sumus polliciti: Age, in examen veterinum affectum conferamus. Sit aliquis igitur coïnquinatus lethargo, vis certò scire (si hælitus) affectum esse lethargum: ad fontes cōfugas, iam nosti lethargum esse inflammationem cerebri pituitosam, dicas ergo, quo ad primum fontem, vbi collocata sunt extrinsecæ nō naturales cause, ægrum non potuisse pituitæ copiam colligere, nisi in rebus illis non naturalibus deliquisset, & nimium prolixius poculentis, & esculentis pituitosis forsitan indulgisset; pituitæ enim magnus acruus non colligitur sine aliquo errore in causis nō naturalibus pituitam colligentibus, & in corpore, nisi esset collecta pituita, nullo modo in lethargum cecidisset.

Expendas deinde secundum fontem, vbi dispositiones patientis sunt propositæ, quæ vel sunt antecedentes, veluti esse ortum à similibus parentibus pituitosis, esse

esse senem, esse obesum: vel ex alijs signis cognosces (de quibus in sexto lib. cap. de pituita) corpus esse multo phlegmate circumfusum: vel sunt consequentes dispositiones, sicuti quando esset intermissa pituitæ evacuatio per vomitum, per nares, per urinam, per alutim, uel per alias partes, uel aliqua tantum ex his dispositionibus contingeret, quæ ostenderet pituitosum sanguinem, sine quo est impossibile, veterno, siue lethargo conflari.

Quare si coniugas primum fontem de causis extrinsecis cum hoc secundo de dispositionib. patientis, suaderi incipies affectum esse pituitosum: quia uel maxime possunt errores externi uniti cum dispositionib. indicare affectum. Ostendit Galen. primo ad Glauconem, & in Epid. in Historia Sileni; neminem incidere in acutissimum morbum ob errores in procatarcticeis tantum, nisi antea corpus esset dispositum ad illum affectum, & Arist. 1. phy. nō vult formam educi, nisi ē subiecto disposito, & simul priuato cum necessaria adaptione aduenientis formæ.

Sequitur Tertius fons; quod præter dispositiones corporis conferentes ad pituitam colligendam, debeat esse in sanguine pituitosi succi dominium, quod perbellè cognoscens ex methodo tradita in 5. & 6. libris: quoniam lethargus non potest fieri sine pituitæ dominio.

Accedit deinde quartus fons, qui est de symptomatibus, quæ à posteriori declarant, an quis sit obessus lethargo, & quinque afferuntur, quæ sola ferme vim habent docendi lethargi præsentiam, & existentiam.

Primum lethargi symptoma erit memoria diminuta, & deficiens.

Secundum erit somnus vigilis seu coma uigil.

Tertium signum, quod in lethargo interrogati, aliquando respondent, in tardo nequaquam.

Quartum signum: cognoscitur lethargus ex anhelitu tardo: quia facultas motrix est sopita. Hinc fit, quod ob pituitæ putredinem addatur quartum signum.

Quintum signum, quod pulsus sit magnus, donec perseverat irritatio pituitæ putrescentis, quem non obseruamus in comate: est quoque tardus ob distantiam

cerebri à corde, & ob pituitæ lentorem, ecce quam bellè hæc posteriora signa lethargum circumscribunt. Verumtamen quando deessent causæ extrinsecæ, quæ non generassent pituitosos humores, & non esset subiectum ad hoc dispositum, parum tuta, & constantia essent illa signa consequentia, quæ forsitan possent aliqua occasione tractu unius diei euanescere, quemadmodum dum ob insignem errorem in procatarcticeis occasionibus nascitur in corpore non disposito ad truciorem morbum ephemera, uel aliquod aliud symptoma duorum, uel trium dierum; ut placuit Galeno in corpore non disposito ad labem, in quo statim cessant omnia mala signa, ut sit necessarius omnium fontium concursus; quia in re ipsa constituenda antecedentia necessariò præcelunt, & in re constituta consequentia sequuntur.

Demum quo ad quintum fontem, qui est de locis affectis, in lethargo locus affectus est cerebri substantia non membranacea, sicuti docet Gal. 4. de causis pult. & alibi: cognoscitur enim esse cerebrum loci affectum à proprijs accidentibus, & ab actione læsa: actio læsa, quia obtusus sensus est, cum cerebrum careat sensatione: membrana uerò acutissima prædite sint. Cætera accidentia, & symptomata sunt propria. Ex his igitur quinque fortibus in exemplum lethargum expendentes cognoscemus Methodi nostræ præstantiam.

Quomodo signorum syndrome cognoscatur Empyema Cap. XIII.

Cognoscemus, aliquem esse Empyemate affectum ex antecedentibus, & consequentibus; & ne longius iusto euehar, strictim quæ ad summam Methodi nostræ sunt conferentia proponemus.

Ex procatarcticeis, si aliquis nimis comestationib. & symposiis se tradidisset uel se vêtis australib. exposuisset, uel uenericis stimulis esset incitatus, & libidinis blanditijs fuisset acersitus, promptèque in maximam uiscerum debilitatem incidisset, patientis huius uiscera, ut ventriculus, caecum, vel pectus viribus fracta, tali pacto redderentur disposita, ut in Empyema fa-

cil' negotio incurere possent.

Ex sic cūdo fonte coll'gimus, caput red-
di de stillationi obnoxium, & tali pacto
dispositum, vt peregrinos malos humo-
res missos à subiectis visceribus recipe-
ret, & inde pectus aptissimum redditum
sit ad recipienda ex capite pulsa recemē-
ta, vnde tussi inciperet angi, & ad Empy-
ema disponi: vel malas viscerum disposi-
tiones reciperet ab exordijs naturæ; vel
quia aliqua fuerit intermissa euacuatio
excrementorum.

Ex tertio fonte, ex causa efficiente ni-
mirum, patiens esse talis, vt pituitosis sca-
teret succis.

Quartus demum se offert fons, in quo
hæc consequentia symptomata collocan-
tur.

Primum est, sensum grauitatis in pro-
fundo Thoracis perferri, quod fiet ob-
copiam confluxi humoris.

Secundum: fit tussis in primis sicca, &
paulo post purulenta.

Hoc signum non semper apparet, quia
aliquando pus Empycoreum mouetur per
alium: aliquando per vrinam, & aliquan-
do per vrerum, & sæpè per tussim.

Erasistratus dicit, quod hoc modo per
urinam euacuetur pus, prius assumitur à
carne pulmonis: deinde mittitur per ve-
nam arteriosam in dextrum ventriculum
cordis, & postea in venam cauiam ad re-
nes & inde per vrinam.

Fallopium aliam viam inuenit: dicit esse
ramum prodeuntem à vena sine pari ad-
emulgentes, per quem ad renes, & vesi-
cam. Hæc opinio mihi magis probatur
Gal. 6. de loc. aff. 4. videtur sequi Erasistra-
tum quod scilicet a pulmone ad arteriam
venosam, & ad ventriculum sinistrum
cordis, inde ad arteriam magnam, & e-
mulgentes.

Tertium, fit fluctuatio ob pus conse-
ctum, & in pectore retentum.

Quartum, difficultas respirationis cum
fetore ob pus collectum in pectore.

Quintum, maciem hecticam habent,
quatenus ob vapores puris obrepentes
cor, natium robur lædatur; ex his con-
sequentibus symptomatibus certam co-
gnitionem habebimus, sed certio-
rem cōparabimus, si cum cæteris fontibus om-
nia ista contulerimus.

Postremum signum esset, si cognosce-
retur locus affectus experimento Aui-
cennæ, superposito nimirum linteo mada-
facto pectori, quia pars, quæ citius exsic-
cabitur, erit affecta; cum pus suo calore
peruadens exsiccat extrinsecum linteum,
qui locus affectus cognoscetur ex situ.

Cura Empyematis (& obiter) ex Hipp.
lib. de internis affectionibus, vbi agit de
hydropneumothoracis administratur terebel-
lo, videlicet terebrando tertiam costam à
nothis incipiendo versus spinam. Simili-
ter in Empyemate, Hippocr. imitatione
vtimur hac perforatione, per quam com-
modè educitur pus. Accedit, quod in per-
foranda costa neque nervi, neque venæ,
vel arteriæ læduntur. Cura diuinitus suc-
cedit, ut vidimus experientia, dummodo
seruetur hoc præceptum quod possumus pro
vice quotidie euacuetur, vel in illa quan-
titate, quam vires permittant: Ante mul-
tos annos Dux Pulsionus in Gallia hydro-
pe Thoracis detentus curatus est terebel-
lo proposito summa cū omnium admira-
tione à Reinerio Protomedico Regio.
Peruisis omnibus his, absolutam omnibus
numeris cognitionem consequeris, quod
patientes Empyemate conficiuntur.

*Quomodo per syndromen signorum cognos-
ci possit Peripneumonia. Cap. XIV.*

INflammatiō hæc pulmonis est à san-
guine pituitosa, ad differentiam pleu-
ritidis, quæ fit à sanguine bilioto: ergo ex-
ternæ causæ fuerint illæ, quæ sanguinem
pituitosum fecerunt: aliquis peripneumo-
nia correptus antequam corruat in hoc
vitium antea forsitan vltius fuit edulij
crassioris, & tenacioris succi, vnde im-
pressum fuit aliquod vestigium huius
morbi: & inde hoc modo disposito pul-
mone: omne malum secutum sit: quia si-
ne hac dispositione, vt dicit Gal. lib. de
causis morb. 2. nec gladius scinderet, nec
ignis combuteret.

Hæ dispositiones. Vel sunt antecedentes,
veluti esse ortum à parentibus simili-
lem affectum patientibus: vel consequen-
tes, veluti si aliqua intermissa esset eua-
cuatio sanguinis pituitosi.

Sequitur tertius fons in quo collocan-
tur peccantes humores, dicimus quod in
corpo-

corpore dominetur sanguis pituitosus, quem cognoscere poterimus ex signis traditis in quinto, & sexto libro, & demum consequentia omnia symptomata ob oculos erunt collocanda.

Primum symptomata erit difficilior respiratio, quam sit in pleuritide; quia maior est necessitas euentandi calorem, cum pulmo sit latus, qui occupat omnes partes thoracis.

Secundum, erit dolor grauatius occupans omnes partes thoracis, tum quia pulmo omnes thoracis partes implet, tum quia pulmo est obscurissimo sensu praeditus.

Tertium, tussis est magis molesta, quam in pleuritide, quia pulmo in peripneumonia afficitur per se, in pleuritide per accidens, uel per consensum.

Quartum; si facies rubicunda, tum ob euaporationem impetentem caput, cum totus pulmo inflammatione pituitosa sit obuallatus, tum quia tunica pulmonis per tracheam perrepat ad os, ut maximus quoque ratione illius tunicae sit consensus inter pulmonem, & faciem; tum quia arteriae furculus uentris faciem oritur immediate à magno arteriae trunco, qui ualde afficitur in peripneumonia.

Alia signa, quae non reduciuntur ad proposita uana ut plurimum solent esse; sicut uanissimum est illud relatum à Plutarco in quaest. naturalibus ex sententia Muesichei Medici, quod in peripneumonia seruentur illi qui cepas cupiunt; qui autem sicus optant moriantur.

Quomodo cognoscatur phthisis Signorum syndrome. Cap. XV.

Allestamenta non naturalia exsiccantia, quae prima imprimant uestigia praecedere debent, sint obsonia, aer, uel coitus, sint in turbulenta animi passione excursus, uel exandescencia.

Præterea dispositum corpus, ut omnes sciunt, ad patiendam tantam cladem, & tam truncem, & scelestum affectum, requiritur; dispositum est, si sint alati, quos Graeci uocant *σπυρδαί*. Quare licet externae causae, & dispositiones uiscerum ad hunc seuissimum affectum conspirent atrament sine humore exedente pulmo-

nem, non fieret Phthisis.

Debet igitur esse humor acris, ut pituita salsa, uel commixta cum bile, uel cura melancholia; de quibus humoribus in proprijs libris, quomodo quilibet humor sit praecognoscendus, egimus.

Postremo à quarto fonte symptomata scaturiunt. Primum symptomata est tussis ueluentissima, quia ob ulcus uel maximum irritatur pulmo.

Secundum est pus sine signis empyematis.

Tertium signum; affectus est sine dolore, cum pulmo non sit tanto sensu praeditus, quanto manifesti sentiantur dolores.

Quartum sit hectica febris.

Quintum sunt animi deliquia, & uaria consequentia ab alijs symptomatibus pendentia.

Sextum signum à locis affectis desumitur, cognosciturque locus affectus dum per tussim eicitur pulmonis parua particula. Haec morbum depositum, & conclamatum portendunt, quem soluere nec Gorgonei fontis defluuia sufficerent, uel Chitonias manus; cum usque adeo saeuat in rebus cordis collectum pus, ut propterea medicus confertim uideat in his egrotantibus titutem collabi; ut omnia intentent mortem praetentem, & excidium certissimum minentem, & certo certius è corporeis uinculis anima exilire debeat.

Quomodo ex signorum syndrome dignoscatur Tumor uentriculi à Flatu.

Cap. XVI.

SI de extrinsecis loquamur, in primis praecesserunt ex necessitate causae gignentes flatum.

Si de secundo fonte, id est de dispositione subiecti loquamur, requiritur ut antecellat hunc morbum uentriculus calore suo depauperatus, in quo chylus ingestus non arte complexus, & male dedolatus, in flatum, & clydones abierit, uel male à procatarctis dispositus.

Vel ex capite uiscidi humores pulsi in uentrem procumbentes ad flatum disponenter stomachum, uel ob alias causas talis facta sit uentriculi dispositio; sine his ob tensionem à flatu ortam uentriculus non

non ingrauescet.

Sequitur demum tertius fons de cognoscendis flatibus per propria signa, quæ traduntur in proprio capite sexti libri.

Demum signa à symptomatibus colliguntur.

Primum symptoma tumoris ventriculi à flatu orti est in regione ventriculi tensionem habere.

Secundum, non sentire sensum grauitatis.

Tertium, ventrem esse actu frigidum, & patientem sentire in ventre frigiditatem, quia status sua natura frigidi sunt.

A quinto fonte à locis affectis nimirum, ubi sit humor, colligitur tali pacto, si dum cib. ingeritur augetur dolor, tumor est in parte interna, & ratio est, quia per fibras rectas cibus attrahitur, si verò post quinque vel sex horas, quando videlicet cibus stomachum relinquit, & restagnat in pylorum, & mesenterium, dolor crescat, tunc in tunica externa erit tumor, quia fibræ transuersæ, quæ expellunt, sunt in tunica externa, & eo magis, quia dum spiramenta mesenterij sunt repleta chylo; tunc mesenterium imbutum suauis cibo, comprimit externam partem ventriculi, in quasi est tumor, ibi est dolor, si non est dolor, non est tumor.

A Sexto fonte: si discutiencia status iuuant, certo certior eris, tumorem ventriculi à flatulentis causis ortum esse: videas ergo quam necessariò conferant nostri sex fontes in cognoscendis internis affectibus præter naturam.

Quomodo eadem Methodo per syndromem communium signorum cognoscatur vlcus ventriculi. Cap. XVII.

EXterna causæ essent, veluti dum aliquis vteretur cibis acerbis, sicut dum se nimium obrueret alijs, cepis; vel tale medicamentum hauriret, euacuandi causa, quod corroderet, quale est euphorbium: vel cantharides quæ pro mictione ablata essent ei ex porrecte.

Ex secundo fonte, quod sit corpus dispositum, ut plagam facilius recipiat, ad sunt enim nonnulli habitus, qui tanta pollent resistentia, ut cantharides tunicas ventriculi non excederent, quoniam tuni-

cæ obduxere iam callum, ut strutij Cameli ventrem enularentur, corpus quoque dispositum habent, ut Hepar uirosos, & exedentes humores gignat; quod germine tam effrenem, & trucem qualiter nactum, uentriculum exinde corroderet: uel denum à capite falsus catarrhus missus in ventrem id efficiat, uel ab aliquo alio foco in uiscere interno scintillante, & efficiente hoc uirus quod parietes ventriculi sauciat, & ulcerosam plagam iniiciat, sine ijs dispositionibus nil sit in corpore hoc nostrò.

Sequitur tertius fons de acti humore, quem cognoscemus in capite de biliosis succis, & melancholicis.

Sequitur quartus fons de signis consequentibus.

Primum signum dum aliquid cibi descendit in uentriculum fiet dolor pungitur, nisi forte haberet anodynami uirtutem.

Secundum symptoma est magna inappetentia.

Tertium est Sitis, quia saniei spiritus exsiccat stomachum.

Quartum sunt ructus sætidi ob pus.

Quintum est sanies, quæ per uomitum eijcitur. Ex quinto fonte ubi sit ulcus cognoscitur, ut diximus de tumore uentriculi: nam immisus cibus in uentriculum, si illico pungat, est in tunica interna, si pungat post 5. uel 6. horas, quando nimirum chylus erit egressus uentriculo, in tunica externa ulcus erit: si uerò ulcus esset in oesophago, uel in gula, dolor erit in posteriori parte inter spatulas uidelicet, & à colo usque ad pectoris initium; & dolor intendetur tempore deglutitionis. Si uerò dolor erit circa umbilicum, & infra; ulcus erit in intestinis, & non erit dolor dum cibus missus erit in ventrem, uel dum coquitur. Quare ex lædentibus quæ in sexto sunt collocata fonte cognoscere poterimus locum affectum.

Præterea si acris & mordacia dolorem exasperant & contemperantia dolorem mitigant, est ulcus.

Quomodo cognoscatur nostra syndrome vlcus Renum. Cap. XVIII.

CVM ulcus à corrodentibus humoribus fiat, & humores acres exordium

dium sumant à lecore, & à Renibus, & ab alijs visceribus; ideo caloris feracissima debent esse viscera, vel sic à parentibus orta, vel ob intermissam euacuationem biliosi succi, vel aliqua occasione externa sic disposita, vel à præcedente calculo: vel ab aduentitio temperamento introducto à consuetudine sex rerum non naturalium: quæ viscera, & omnia facultatum instrumenta alterare solet, vt inde in tale vitium essent prolapsi Renes, et ulcere uiolarentur.

A primo fonte tanquam à primis occasionibus initium capiunt Renum ulcera, uel ob calidissimos cibos, uel ob libidinem ardore seuientem, atque furentem, uel demum ob animi passiones, dum quis ita percitus furit, & exandescit extra rationis limites, uel dum mœrores multo temporis spatio antecellant, uel qui præmiant altum corde dolorem, & summam iacentem pectore commotionem, quæ omnia procatactica adeo uiscera interna calfaciunt, ut corrodentem humorem gignant.

A secundo fonte colligimus, corpus esse dispositum ab externis causis enarratis, uel tale esse ortum à parentibus, ut non sit mirum, si tanti caloris uestigia imprimantur in uiscera, & in omnes humores, quibus si renes utrinque obducti atque obnati reddantur, uellicentur, mox exedantur, & in ulcus cedere cogantur.

Requiritur ergo contemplatio circa tertium fontem, quinam sint isti humores corrodentes cognoscendi in capite debile, & melancholia.

Postremo signa consequentia colliguntur.

Primum symptoma; pus mingitur per plures dies: quoniam per paucos dies posset esse abscessus sine renum exulceratione, de quo non loquimur.

Secundum est dolor circa lumbos.

Tertium cum dolore excernuntur arenae.

Quartum, pus non admodum foetet; quia ibi est maior calor, unde pus melius coquitur, quam in uesica, & per consequens minor fetor.

Quintum, pus est maximè permixtum cum lotio ob uiarum distantiam.

A quinto fonte, qui est de locis affectis: si qua renum portio excernatur per urinam, quamuis rarò id fiat, certissimè signum est, & solum ad iudicandum sufficiens, renes esse ulcere affectos.

An uerò ulcus sit in parte profunda renum, uel extima, & in superficie, cognoscemus hoc modo, si erit in profunda renum parte, pus erit copiosum, & permixtum cum sanguine; Si uerò erit in superficie renum, pus erit paucum, & sine sanguine.

Quomodo cognoscatur ulcus iecoris.
Cap. XIX.

VLCUS iecoris, uel à gallica lue, uel à succis acerbis prodit, uel succedit inflammationi, quæ ad suppurationem sit perducta, si igitur dicta methodo expendemus hunc casum, erunt externæ, & procatactica causæ depromendæ à primo fonte, quæ uariæ esse possunt: uel infectio morbi gallici: uel causæ nō naturales, quæ ingentissimum focum, & alta in iecur ardoris uestigia immitant, sicuti sunt, cæpæ, & meracissima uina: uel quæ inflammationi præbent fomentum, sicuti sunt, quæ amplè ualetudinarios nutriunt: ex his antecedentibus extrinsecis conspiciamus, addi aliquid ad generationem ulceris iecoris.

Corpus dispositum quoque conspirat: adfuit enim plures gallico spiritu circūuenti, & qui sunt hepate eodem tabo illaqueato, attamè parenchyma ad ulcus recipiendum non est dispositum, tum quia à fortissimis parentibus sit deductus patiens, tum quia temperamentum minus infestetur humoribus exedentibus, & demum omnia uiscera aliquin robore donata ad resistendum sunt aptissima, quamuis diutissimè gallicum morbum patiens tulerit; corpus ergo, uel ortum à debilibus parentibus, uel biliosum, & parum resistens erit ad ulcus præparatum.

Quo ad tertium fontem de humoribus; iam suo loco diximus.

Ad quartum fontem, ibi consequentia signa continentur, ed adire expedit.

Sit ergo primum symptoma desumendum ab exente cruento, & sanioso per urinam, uel per aluum.

Secundum erit grauitas sensus in regio-
ne Heparis.

Tertium, erunt punctura ratione mē-
brane in regione Hepatis, quę distinguūt
vltus icoris ab alijs affectibus, quoniam
cruenta fanies posset offendere dysente-
riam, vt hinc decipiantur plures creden-
tes vltus Hepatis esse dysenteriam.

Quo ad locum affectum, si sanies cum
æteris signis egrediatur per lotium, est
in gibba, si per aluum; in sima; grauitas e-
nim sensus est illud signum, quod deter-
minat esse in Hepate.

*Quomodo cognoscatur per syndromen si-
gnorum calculus vesicae. Cap. XX.*

Volens exempla affectuum cognitu
difficilia tradere; videret mihi quasi
ab officio desciscere si desererem modum
cognoscendi calculos tam vesicae, quam
renum; præcesserunt ergo, anrequam fiat
in vesica lapis, externi errores: edulia ni-
mirum crassa, & peruicacissimæ coctio-
nis, & vini polypheri seu generosi hau-
sus.

At nil fit nisi dispositum esset corpus
ad exitialem hunc casum; non enim sat
est crassissae onustus humoribus, vel ca-
lore renum premi, nisi dispositio esset in
partibus dissimilariis, vt videlicet mea-
tus essent laxi, & debito maiores, ut ha-
bet Galen. 14. meth. cap. 16. de qua re
alibi instituta est oratio; quot sunt quæso
homines in sacro co inquinati crassorum
humorum insidentium in imis corporis
partibus, & qui renes calidissimos sortiti
sint: attamen nullus sequatur lapillus, &
adsint, qui in renibus & Hepate ob ex-
tremam senectū habeant repressum, & fe-
rè extinctum calorem, qui gignere pos-
sunt lapidem: requiritur ergo dispositio,
quæ apud me est laxitas, & apertio mea-
nium, quam cognoscimus in vrinis, dum
citò, & multa, & crassa, vel sæpissimè ex-
cernuntur, quoniam humores, renes, &
vesicam sollicitant ob hanc apertionem,
& laxitatem, sed ad consequentia descen-
damus.

Primum signum est grauitas, circa pu-
bem, vt in mola: dum præcipue per loca
inæqualia scandunt, ut per scalas, &
montes.

Secundum: scilicet pudenda vel sæ-
pissimè.

Tertium: mictio arenularum.

Quartum: ardor lotij perpetuus: quia
semper mingunt cum dolore.

Quintum: cum candela perferuntur
quod vnicè affirmat.

Sextum: vrinæ repente supprimitur, &
liberantur suppressione, si iaceant supi-
ni, id verò contingit, quia lapis relinquit
meatuum ceruicis, & deinde suppressione
liberantur.

*Quomodo errent Medici Plebes dum cau-
sam generationis morborum referunt in
externos errores, quando in prenas di-
spositiones esset referenda Cap. XXI.*

TRadita methodo, eaque exemplis il-
lustrata, par est, vt in præsentia er-
rores illorum proponamus, qui in per-
quirendis affectuum ideis, huic propo-
sitæ methodo, & veris Medicinæ funda-
mentis aduersantur: in primis valde
conuenit, vt errorem illorum Empirico-
rum, vel circulatorum explodamus, qui
in tractandis ægotantium morbis om-
nium morborum generationem acce-
ptam solent referre in solas causas exter-
nas & ab ipsis solis in cognoscendis mor-
bis iudicium sumere, & indicationes cu-
ratiuas colligere, nullo facto præcedentis
dispositionis vicerum examine, quod
mirum in modum Galeno, Aristoteli, &
methodo nostræ reluctatur: quoniam
præter procatareæ causas in genera-
tione cuiuslibet affectus requiritur di-
positio subiecti, vnde omnia, quæ sunt,
& secundum naturam, & præter natu-
ram trahunt exordium.

Altius igitur de vicerum dispositione
est reperendum, quoniam vt aliquid fiat,
nisi subiecta sint disposita, & simul pri-
uata adueniente forma, cum necessaria,
& immediata adeptione nouæ formæ,
nullum agens quacunque virtute polleat
ex indeterminato subiecto poterit alte-
rare, transmutare, vel loco mouere.

Hinc est quod nonnulli deflectant in-
perquirenda morborum essentia, dum
vident aliquem in morbum labi ob ni-
miam vini potationem, vel ob æsum so-
lis, vel ob alias causas, autumant prin-

cipia, & origines totius lapsus solas esse, externas causas, illas in medium ferunt, illas detestantur, & totum ipsis acceptum referendum putant: nihilominus toto notus in orbe Hippocrates, & Galenus, occasiones has disponentes viscera ad labem, noluerunt vocare causas, sed occasiones, cum affectus præter naturam neque immediatè, neque necessariò trahant ortum ab his, neque istæ præbeant momentum principale, dum sit, vel factus est morbus, cum nullam teneant permanentiam, sed fluant, & resiliunt.

Quod enim causæ externæ occasiones, & non causæ debeant vocari, seriem verborum Galeni audiamus, tertio de morb. vulg. com. primo text. 15. quæ hoc ornate edita sunt, quæ ad labem disponunt viscera, ait non vocari causas, sed occasiones, ut Græcè vocentur ab Hippocrate *αἰτίαι* quia sensim, magis disponunt viscera, & alta imprimunt & vestigia, & dispositiones in ipsis, ob quas in morbo tandem erunt. pat. non propter illas occasiones externas, sed ob internorum viscerum dispositionem præcedentem, & ob morbosum apparatus, ut tota vis procatharticarum haud potis sit vnicui moliri morbum (abiecta viscerum dispositione) præter ephemeram, vel symptoma aliud brevissimum, ut placuit Gal. primo de morb. vulg. com. 3. text. 19. ubi de Sileno habet hæc, quando corpus non est ad morbum paratum, propter errores incidit in diariam, sed in Sileno erat præparatio morbofa.

Quare corpore non præparato, ubi ab æstu cõsistat ægroti, ubi poculis, præpotente maluitico ventriculorum infarcirent, & omnia edulia, quantitate, & qualitate peccati essent ingesta, tunc non proderet affectus vilis præter naturam: quoniam quodlibet non fit ex quolibet, sed ex suo determinato, incidit enim in hanc sententiam Galenus, ut occasiones externæ dumtaxat diariam, vel tale quippiam breue symptoma gignant, diariam, quoniam spiritus semper sunt dispositi, cum sint perenni motu moti, & alterabiles, aptissimi, ut efficiantur: hinc est, quod labes spirituum extemplo cessat, & quæ citò fiant, citò quoque (libentissimis omnibus philosophis) desinant.

Redeamus ergo ad Silenum, cuius hi

storiam Galadeo observat: dicens, quod ob potationes, & exercitium insignem incidit in gravissimum morbum, quia erat præparatus viscerum dispositiones, quæ sunt apparatus illi morbo, quippe sunt origines, & radices generationis morborum, in quibus fundatur principium ex quo, vel terminus a quo, & privatio; quæ licet apud Aristotelem sit principium per accidens respectu rei genitæ, attamen respectu generationis est per se.

Illi inquam apparatus morbofi (licet mihi digredi) diuersi sunt in similibus, & dissimilibus partibus: Verò causa, Silenus in malignam febrem prolabitur, sua natura conspirante, cum ob multas procatharticas causas, quibus comparauerat feruorem insignem in Hepate.

Calor insignis fit ex Galeno libro de causis morb. vel à motu, vel ab obstructione, vel ab alimentis, vel ab adhæsi, vel à putredine; quorum femina, nisi omnium, saltem aliquorum in corporis Sileni latebris delitescant: obiter hæc de causis caloris, ut ostendamus pèdere immediatam causam generationis morborum ex apparatu videlicet morbofo, qui varius, atque varius est, non solum in frigidis, siccis, calidis, atque humidis temperaturis: verum etiam in qualibet mala conformatione, nec tamen apparatus omnes sed tantum qui sunt immediati in culpam transcunt generationis morborum, quæ admodum non sanguis est factus privatio immediata, & principium per se generationis, & proximum; sed sperma tali pacto dispositum, ut transmutetur, & transmutatum in instanti ex necessitate cadat in sequentem formam.

Quare externæ causæ, quamvis vehementes, & seueræ sint, non lædunt suam naturam constitutionem: ratio bellissimè à Gal. refertur libro de causis morb. cap. 2. dum dicit, cur non semper ob quamlibet harum causarum externarum, & procatharticarum, ut vini portione, & similibus accenditur febris: subdit: quoniam efficientis causæ quantitas par non existit, & quæ constituta est ab eadem causa in corpore dispositio magna in eo quod plus, & minus varietatem admittit, ideo differunt animalia in hoc, ut facilius, vel ægrè recedat à statu naturali. Eadè vini portio-
ne

ne exardet Socrates, qua tamen non incenditur Plato quia aliter quam Plato est Socrates dispositus; magis, & minus recedere à statu naturali non trahit iugiter principiū ab externis efficientibus, poculentis enim calidis aestuat Socrates, non Plato, quoniam apparatus morbosus calidius altius agit radices, quam morbus ab externis occasionibus, prodies: Vos scitis maiorem angustiam pororum, & naturalem crassitiem, vel copiam humorum, quæ obstruunt esse in causa, ne calor perspiret, & ignescat: quo circa secundum magis, & minus dissidentes inter se internæ causæ, tūm continētēs quæ sunt similes, & dissimiles, tūm contenta ut humores, propterea maximam nasci varietatem. Sit per hypothesim quod in Platone apparatus, & dispositiones ad febrem sint, ut quatuor, & indulgeat maluit prolixè, & non febricitet; sit ex alia parte obstructio, vel alter apparatus, vel dispositio in Socrate, ut sex, & eodem pacto indulserit, ac Plato; tunc contingere potest, ut Socrates in febrem corruat, & tandem in exitum, nulla in Platone relicta noxa. licet eundem commiserit errorem: En, quod, ut agens agat in passum, exposcit subiectum dispositum in quod agat, ut suam introducat ideam.

Agit inquam agens in subiectum, non in eius formam; quoniam contrariū non agit in contrarium: agens calidū nō agit in frigidū, sed in subiectum frigidi disponendo, donec introducat suum simile; si vero deinceps contingant, ut corrūpatur forma, id fit quia materia disposita relinquit illam, & noua induitur, ita ut agentia dirigant suam vim in materiam, non in formas: hac ratione rerū omnium vicissitudo seruatur in hoc nostro orbe, ut probatum est ab Arist. primo phys. text. 67. dicente, à se inuicem cōtraria pati impossibile esse. En ergo Aristotelis monumenta, quomodo statim, & fixis sint plantata radicibus; quomodo sint summo artificio excolta: ubi vult requiri in qualibet generatione tria principia interna; materiam scilicet priuationem, & formā, & externa agentia non agere in formas, quia contrarium non agit in contrarium sed in subiectum determinatum priuatū proxima adueniente forma; nulla enim

contingere potest generatio sine priuatione. Hæc priuatio re vera non dicit tantum carentiam, esset nimum irritum, & futile principium, priuatio enim significat subiectum aptum, & dispositum cum potentia proxima, & immedata ad suscipiendam sequentem formam, & non aliam, ut vocauerit Arist. 2. Phys. 15. priuationem quasi formam per quandam concomitantiam, ut si forma, quæ immediatē antecedit adueniatur.

Neque alio pacto philosophari poterat diuinus philosophus, ut inueniret communissima principia, quæ essent prima, & omnibus competere generationibus tā substantialibus, quam accidentalibus; noluit hanc suam priuationem esse determinati subiecti, quod sit actu, quoniam destruerentur generationes substantiæ, veluti si cum Thalete diceremus, aquā esse primum principium, quia aqua est subiectum determinatum, & formæ aduenientes enti in actu essent accidentia; Altius Aristoteles crexit spiritum, quam philosophi illi veteres, altius quam Thales, quā Empedocles, quam Anaximenes, qui ponebant certa principia, & in actu, ex quibus omnia penderent, & fierent & in illa omnia abiret quia nō fieret noua substantia, sed omnes formæ essent accidentia, quia enti in actu aduenirent. Veteres ponebant principium materiale esse in actu quia putabant formas esse accidentia, & materiam esse totam essentiā. Democritus fuit primus (ut refert Arist. 1. de partib. ani. cap. 1.) qui dixit formam esse universam essentiā, & non materiam.

Alij verò; quia dicebant principia esse in actu, & materiam esse totam essentiam, & non formam negabant generationem, mixtionem, & augmentationem putabant enim mixtionem esse iuxta positionem.

Sed ut redeamus unde digressi sumus, dicimus quod morbus debet introduci terminum, a quo expedit cōstituere, & hoc debet esse subiectum dispositum, & priuatum, & tale, ut sequentem formam immediatē respiciat, non mediatē; Nemini ex ore excidet, perma fieri ex pane, quinimò neque ex sanguine, & spiritu, sed immediatē ex materia sanguinis, & spiritus cum formæ non fiant, ut ex principio ex quo

quo à formis, sed à materia, & subiecto, ut sanguinis forma sit priuatio disponens materiam sanguinis, quæ sanguinis materia erit principium ex quo oritur semen, & sic de omnibus.

Hinc Galenus subdēns loco proximē citatō, ait subiectū debere esse proximū, & non remotum, sed undequaque dispositum, hoc uerborū apparatū ostēdit illud subiectum esse proximū, quod prōpre patiendi habet naturam, quoniam & si hæc desint, nec ignis comburere, nec gladius abscondere ualere, signis qui est actiuorū primus, & potentissimus nō agit in subiectum non dispositum, (sphæra ignis non calfacit cælum, quia desunt omnes dispositiones vt cal fiat, nec gladius lapidē secare potest, eō minus animi passiones, ut ira, tristitia, succendicula hypocaumata, æt cænosus, palustris, & cætera non naturalia in homines non dispositos, non erunt causæ, ut morbi gignantur, sicuti optimē Galenus ore aperto quoque fateatur libro primo de diff. febr. capite 4. his uerbis, oportet hoc in toto sermone memoria repetere, quod nulla causarum dictarum sine patietis aptitudine agere potest, nisi in quoniam omnes commorantes in sole estate febricitarent, uel qui nimio motu exercentur, aut uini potu grauantur, ira uel tristitia: Nihil sanē excogitare possumus, quod Galenus summa eloquentia non tradiderit literis; tradidit, ut uidetis, procatarcticas non operari, & ipsis non nō esse morborum culpam attribuendā; sed dispositionibus corporis suscipientis morbos, ipsas demum procatarcticas esse occasiones, & nō causas, abeant ergo retrorsum nostrates circulatores, dū morborum causas tempus conterunt in perquirendo, quæ nam extiterit externa, hoc sine ut ab ipsis hauriant indicationes, ueluti dum quis ob maluatium, uel æstum incidit in cachexiam, inferunt ergo refrigerandum, quod esset cachexia correptum in Hydropem pellere; ipsas ergo occasiones procatarcticas ita respiciunt, ac tota ab ipsis penderet proluuius, cum ab uno, & eodem externo errore duo affectus contrarij possint prodire, à maluatico prodire potest ardens affectus, & à maluatico paralyticus; Gal. 3. de rem. 2. habet uinum copiosum gigne,

Sanctoryj Sanctoryj Pars I.

re affectus frigidos; habet hanc sententiam: sicut exiguae, & imbecillæ flammæ multo oleo confertim infuso extinguuntur: sic uinum ubi plus debito, quam ut uinci possit exhibeatur animal frigeſcit, & affectus frigidos fit.

Hinc Aristoteles 3. sect. prob. loquens de Ebris dicit, uinolentos non calere, licet uinum calidum sit, quia ualde calida superant naturam suffocando calorem, ideo uinolenti morbis frigidis uexantur, quare causæ externæ calefaciunt, eadem quoque refrigerant; prout corpus est dispositum. Hinc Arist. 3. sect. problematum 16. loquens de uino meraco habet hanc sententiam: tardos reddit mobiles, & è cōtra, uidelicet mobiles reddit tardos: in quibusdā risum; in quibusdā timorem: in quibusdā uinum meracum furorem facit, prout natura uaria est.

Quod dictum est de uino, quod affectus oppositos faciat, prout corpora sint disposita; idem dicimus de alijs causis externis.

Hinc qui aqua frigida in mari, uel flumine se lauant uel ob adiacentiam, id est prohibitam perspirationem febricitant, uel sunt attoniti, ut contigit Alexandro Magno (referente Galeno lib. de causis procatarcticas) qui lauās se tempore æstiuo in Cydno flumi. Cilicij statim factus fuit attonitus; idcirco altiores radices sunt inquirendæ, ut morbi idea intelligatur. Non inciderent sanē in hunc errorem, ubi ante oculos obicerent generationis affectus alicuius principia, quæ sūt forma morbi introducenda, subiectum dispositum, & priuatum, & causæ efficientes quæ sunt morbi iā facti exordia.

Hic aliquis obijcere potest. Nos incidere in sententiam Erasistrati, qui ab ordine causarum remouebat causas procatarcticas, qui à Gal. libello de causis procatarcticas reprehenditur.

Respondemus, quod istæ causæ possunt considerari dupliciter uidelicet absolute uel cum relatione ad subiectum dispositum: dicimus quod primo modo non possunt dici causæ, sed occasiones, quia effectus oppositos faciunt: maluatium enim modo febrem: modo paralyticum plus debito haustum inducere potest.

Cæterū quoniam omnes errores pro-

C

fun-

funditus speculando prodeunt ex ignorantia logica, videamus breuiter de hoc dicunt vel supponunt externas esse causas morborum infallibiles, vel referunt solū externis causis originē morborū, tunc si debet esse vera hæc propositio, oportet, vt sit per se, vel saltem omni, sed neque est de omni; quare eo minus erit per se, quod nō sit de omni, sic probatur, de ratione de omni est, vt prædicatū inherereat semper, & in omnibus, conspirent in generationem affectum præter naturam. vini potentis haustus febrem accendit in vno supposito, in altero nequaquam licet in altero tantum vini quantum febrem accensus sumeret, ergo neque semper externæ causæ prædicantur de ægritudinibus, neque in omnibus qui ægre sunt ob illarum causarum occursum.

Præterea neque procacitæcæ possunt dici causæ remotæ, quoniam saltem præstarent perpetuū cognitionē affectus, & fieri posset argumentatio in camestres, si cutidum probamus lapidem non respirare: quia non est animal, hoc modo omne quod respirat est animal, lapis non est animal, ergo non respirat, habemus saltē lapidē non respirare, sed causam non habemus, causa verò remota est animal, & semper in respiratē cadit, & in omnibus, cum omne respirans sit animal; de ratione causæ remotæ est, vt sit in adæquata, & proxima virtute, quia dicebat Auerr. in causa proxima, & adæquata omnes remotas virtutes contineri, sed nō ē contra: nō est vera hæc; omnis febris oritur semper ab externo calore, cum possit aliquādo ab externo frigore suboriri, vt febris non magis supponat procacitæcā calidam quam non calidam, respirans verò supponat perpetuū animal; & nō animal neutiquam, cum virtute continetur in adæquata, quia habens pulmonē pro genere sortitur animal, quod de omni, & per se prædicatur in primo modo. Et hæc est vera ratio, cur procacitæcæ non sint causæ, sed occasiones. Quare vnicō errore commissio optimus analyticus mille alios animaduertit, cum ex vno propemodum infiniti suerescere possint; propterea dicimus, si occasiones externæ non erunt

causæ proximæ, neque remotæ, ergo vbi ab illis causis quis inferret conclusionē, per medium extraneū procederet, quod adeo arguit, & refellit philosophus 2. post. 25. asserens tunc medium terminū non esse adæquatum, & primum vel quando est remotus: secundum vel quando est pars, & non tota causa, veluti si quis ostenderet lumen de Sole cum sit etiam ignis qui faciat lumen, vel quando medius est extraneus; in quo casu non est de omni propositio, vt hæc, maluiticum causat febrem: variē ergo aberrant qui sumunt quoque non causam pro causa.

Hæc methodo logica in sequentibus quoque procedemus, ne decipiamur: habet enim Gal. lib. de const. ar. med. cap. 9. quod omnes decipi possint præter eos qui in logica disciplina sunt benè exercitati, addit si cuiuspiam alteri, huius quāmaximē disciplinæ nauanda est opera. Primo de elem. cap. 6. habet hæc verba. Nemo vnquam decretum aliquid constituit potest absque opē ipsius logicæ disciplinæ, quæ in omni re dirimit omnes difficultates.

Quomodo errent Empyrici dum omnium internorum effectuum ideas appellant in temperies. Cap. XXII.

B Prædictas vel quemlibet ventriculi affectum; sit morbus, causa, vel symptoma, nostrates nonnulli in censum intemperierum reponere videntur, vbi scilicet (sputorum proluuiem, vbi diminutā coctionem, seu deprauatam, vel impeditam, vbi corrupti cibos conspiciunt, extemplo egrotantē illum intemperie consistari ventriculi putant, seu nullis affectibus coinquinari posset vtriculus, quā intemperie. Ceterum, vt aliqua methodo non modo in ventriculi affectionibus; sed in quoque viscere incedere valeamus, ne in scopulos, & in has syrtes incidamus, ad Galenum conuigiemus; & in medium adducemus præcipuas affectiones omnium viscerum, & præcipuē ventriculi; in quā diuisionem conspiciat, ē vestigio colligemus, quo morbo illaqueari cætera viscera possint.

Adeamus ergo Galenum 7. meth. cap. 12. vbi variis affectiones proponit ven-

triculi, quas cuilibet parti corporis applicare, poterimus: dicit ergo Gal. ventriculus afficitur vel quia solide partes intemperie affigantur, secundo vel quado humores affixi sunt tunicis: tertio vel quado sunt in cauo, & subdit aliquando primus affectus cum secundo, & secundus cum tertio, vel omnes simul copulantur. Adeste animus, quo pacto ista principia medicorum corrypleos proponit, quibus omnium viscerum affectiones distinguere valeamus, peroptima diuisionis lege obseruata.

Docet igitur Galen. ventriculum non semper intemperie vexari, verum sepe numero torqueri ab humoribus affixis parietibus, modò ob recrementa in cauo morantia, modò ob recrementa imbibita tunicis, & deum tribus his omnibus viscus conflictari posse: At nostratum Empiricorum plerique, vbi aliquis patiens prauè digerit, conueratque in sputa chylum, alium affectum animo fingere nesciunt, quàm intemperiem, perinde ac in cauo ventris consistant humores, qui faciant dyscrasiam in similaribus partibus: Quot sunt qui ob cibariorū *exalpiu* vel qui vino, obsoniisque se nimium obruant, hisce blanditijs rapti, ac voluptatis illecebris symposiorum pellecti, qui in manifestam ventriculi transferantur perniciem, quippe tunicis intactis, optimam, naturalemque temperiem sortiantur? nã illi non intemperie premuntur, cum vitium non se se in solidas insinauerit partes: interstitium, temporisque in teruallum requiritur.

Quinimò non desunt robustissimi in ventriculum tota die infarcientes esculentia, ploculentave, quæ non conficiunt, vnde fluctuationes, & clydones ex hoc non dedolato chylo prodeunt. Horum aliquos, non esse correptos intemperie vidimus, quando ijs exhibito medicamento ex aloë, recta illic viuenti norma instituta ventriculi proluvie liberantur, nõ traquilli, sed momento temporis, quod non visu veniret, vbi essent intemperie correpti; cum de ratione intemperiei sit, quod non citò desinat.

Errant itaq; non perpendendo, an ventriculi lesio sit ob eius dyscrasiam, vel prodeat noxa ab herentibus humoribus ventriculi tunicis, vel recrementa in cauo sint

illa, quæ vrgent ab hinc in aliam, & altiore cognitionem deberent se efferre; quia quod contigit ventriculo, alijs quoque visceribus omnibus vsu venire posse rationi est consentaneum; verbi causa si cuti ventriculus afficitur, vel quando solida intemperie afficiuntur, vel dumtaxat, dū humores affixi sunt parietibus viscerum; vel demum quia in cauo ventriculi excrementa degant; ut primus affectus cum secundo, & secundus cum tertio, vel omnes simul copulentur: Cur in hepatis affectionibus non explorant has differentias? non discutunt, quæ iecur premi possit nimis sanè ridiculum esse arbitror perpetuò credere viscera esse intempera: ta: omnes affectiones esse intemperies; cū sapientissimo sint malæ conformationes, sicuti sunt peccata in angustia, sicuti est obstructio, vel compressio, vel coalescentia; vel in iecoris cauo affixi sunt humores parietibus hepatis, nulla posita intemperatura in hepate: puderet me in longiorem discursum trahere orationem, cum videam non reperiri doctos viros, qui hoc abnuant, nec vt verum fatear illos alloquor; verum tyrones, & plebeos medicos, qui altissimis statiq; artis principijs, & fundamentis non sunt exultati.

Quo circa quod de ventriculo, & hepate tradidimus, itidem de cerebro admodum expedit: possunt enim humores in capite adherere similaribus partibus, nulla adhuc intemperie oborta: possunt etiã in anfractibus, colligi tanquã in cauo humores, & caput repleti, potest quinetiã esse intemperies in tunicis, & cerebri carne, quæ fomes, & origo sit catarrhi.

Quare nostrates hi non debent in qua: libet affectione cerebri, in qualibet distillatione, vel coryza assenescere caput dyscrasiam coinquinari: Sæpè accidunt tussis, distillationes, & varia symptomata circa aures, oculos, nares, nihilominus caput intemperie caret, potest quinetiam, perinde ac in ventriculo, & primus affectus cum secundo, & secundus cum tertio copulari, & omnes simul adesse; vt modò sit intemperies, & simul affixi sint humores tunicis; & aliquando nulla sit intemperies; atamē sint affixi humores, & in cauo multi morentur, & omnes simul in complexum quandam coeant; labūtur

ergo maximo perē nostratū aliquid in his explorandis methodi initij, dum putat omnes affectiones corporis nostri supponere intemperie, & dyserasiam affectorum locorum; Hic error est adeo cōmunis empiricorum, vt ciculatores etiam, quando doctrinam ostentant suam, efferrant hanc vocem, quam putāt sonoram, & scientificam, dicentes morbos esse intemperies, quoniā audiunt iugiter a paulo maioribus semper viscera esse intēperata, quasi omnia symptomata ex necessitate supponere debeant intemperie, seu dyserasiam. Sed licet huiusmodi controverfiaz negotiū sapientioribus non facessant, attamen, vt nemo hoc in dubium vocet, ad Galen. confugiamus secundo de differentijs feb. cap. vltimo, vbi quamlibet affectionem capitis non esse intemperie, ob oculos ponit his verbis, aliquando nil patitur caput, sed solum sanguine vitato fit affectus; ecce sine intemperie, caput affici posse; an ne Galen. primo ad Glauconem cap. 15. docet ob tres causas repleti caput; dicit enim, caput ob tres causas repleti posse, vel ob magnitudinē febriū, vel ob imbecillitatem capitis, vel ob plenitudinem totius; ecce quod nulla facta lēfione capitis; nulla cerebri existēte intemperie; sanguis peccans quantitate, vel qualitate caput perturbare potest; quantitate, dum ob nimiam plenitudinem erumpit in caput benē munitum in similibus partibus, quæ ita diu possunt consistere, & resistere, vt nulla dyserasia illaqueantur; Qualitate dum ob magnam febrem humores caput obrepunt, vel in anfractibus cerebri morantur, vel tunicis sunt adherentes, vt affectus in mala compositione plurimi facilius fiant; intemperaturæ verò ob robur fieri nequeat; ocyus enim malæ compositiones fieri possunt, quam intemperantiæ, quia intemperantiæ non citò, malæ compositiones citò fiunt.

Hæc igitur, quæ diximus de ventriculo, hepate, & cerebro, conferre possumus in alia viscera, & in omnes alias corporis partes instrumentales, veluti in splenem, in renes, in veficam, & ceteras partes, ita ut symptomata ex necessitate nō supponant intemperiem, nec mala compositio intemperiem; nec versa vice, & quando

est mala compositio, ad viuum est rescandum, an fiat, quia adherant humores viscosi, uel crassi tunicis; uel quia ob copiam præter naturam fiat mala compositio, quod est quando in cano stabulantur humores, uel quid aliud; Cautiores enim replentur à copia; hanc doctrinam, quod symptomata omnia non supponant intemperaturas, satis uberem apud Gal. habemus sexcentis in locis manifestissimam sanè, & si qua alia res claritudine emineat, hæc est cētenda, tanquam parva, fatæque à diuina methodo.

Pergamus ergo, ut ipsemet loquatur, ipsumq; Gal. in testem uocantes, ueluti 3. lib. de causis symp. c. 1. actio læditur, uel ob læsam facultatem, uel ob errorem externum; quare error externus potest esse causa lædens actionem non læsa facultate, quare si non est læsa facultas, non potest esse læsa constitutio, si non potest esse læsa constitutio, ergo non potest esse intemperies, argumentum, est intemperies ergo est mala constitutio, est mala constitutio, ergo est læsa facultas, est à positione antecedentis ad positionem consequentis, quod ualeat & redigi potest ad primam figuram, ut alibi ostendimus.

Quādo dicimus læsam esse facultatem, intelligimus per facultatem instrumentum, quod est constitutum, quia facultas, ut facultas est quid incorporeum, quod non patitur, ut iuremerito Aristot. 2. de anima loquens de potentia, & facultate dixerit, si tenex haberet oculum iuuenis uideret, ut iuuenis. Inferas ergo si error externus ex Galeno lædit actionem nō læsa facultate, ergo crimine ignorantie sunt inurendi, qui credunt in læsis functionibus semper intemperaturas partium supponendas esse; ergo in qualibet corporis parte potest esse læsis sine dyserasia, seu intemperie.

Amplius, ut melius excitemus iuuenū mentes, in medium proponamus Galeni loca pro roboranda sententia, cum multo maxima, & merito Gal. sit concredenda fides; Est locus primo de loc. aff. 3. ubi de uentriculi actione loquitur, dicensque tres primas generalissimas differentias corruptionis ciborum dari: Vnam esse per proprios morbos uentriculi. Secundā à uitiosis humoribus in ipso accumulatis. Ter-

tiam oriri ab alimentorū qualitate. Quid pluribus est agendum cum ijs, quibus ex ore excidunt semper infultissima Empyrea? propemodū erubescō huius opinio-
nis uestigia delere, sed cum uideam hos rudiores fallere egrotos illis dicentes er-
rores externos, & malas compositiones esse intemperie: non mihi uidetur igno-
rantia hæc ferenda, tanto magis, quanto symptomata ipsa, quæ per consensum le-
dunt, uocant intemperiem, transcen-
dentes de genere in genus fumentes per
accidens loco illius, quod est per se, cum
viscera modò per accedens, modò per
se lædantur, quemadmodum Galenus 5.
de locis affectis docet de uentriculo di-
cendo uentriculum lædi ob uitium alio-
rum uiscerum; & quod diximus de
uentriculo, de cæteris omnibus uisceri-
bus est intelligendum, dicimus cum Ga-
leno, congeri excrementa in uentricu-
lo, tūc eius uitio, tūc uitio aliorum
uiscerum; Subdit malè habente liene sæ-
pè ichores melancholici fluunt in uen-
trem, & excitant symptomata melan-
cholica; quare uentriculo illaeso, si humo-
res illuc confluant, & uentriculum in-
farciant, quam maximā inferunt noxam
uentriculo licet aliunde mala eius uale-
tudo pendeat, ut de ichoribus melan-
cholicis uidemus Galenum animaduertisse.

Similiter dum dixit Gal. 6. de tuenda
ualetudine c. 9. si ab hepate procumbant
bilioli humores in uentrem; tunc uen-
triculus per se non est malè constitutus,
sed per accidens, cum fomes morbi
sit in hepate; & alibi Galenus à capite
docuit restagnare in uentrem humores,
non libefactatis uentriculi similaribus
partibus, & nulla in tunicis relicta
dyserasia.

Quomodo ergo ex non percepta idea
poterunt affectibus manus præbere? qui-
nā remedijs incongruis exhaurient
robū, & demum trahent ægrotos in
uitia oppido maiora, ueluti si quispiam
sit calido uentriculo præditus, referto
tamen melancholicis ichoribus à splene
prodeuntibus, unde flatus, & insignes
rugitus huic uidimus, medicos aliquādo
uidere, ut induat uentris regionem
elli bus, uel panno ostro tincto, ut de-

Sanctory Sanctory Pars I.

glutiat diatrion pipercon, aromaticum
rosatum. Vidimus in læsione qualibet
uentriculi hos supponentes esse intem-
periem, consulere oleum mastichinum,
de absynthio, cotoneorum, astringentia
uaria supponendo perpetuò in omni ad-
uersa uentriculi ualetudine uentriculum
esse intemperie frigida oppressum: tales
Medicos aiebat Roma, vt nunc aluntur,
& ipsum audite 7. methodi, hoc uerborū
apparatu loquentem, vnica solū mihi
uidentur habere medici nostri temporis
intentionem; nam Empyrici pro imbeci-
llitate uentris confugiunt ad cibos
astringentes, calidos, amaros, ad uinum
de absynthio, de cotoneo, ad cerata, un-
guenta calfacientia, & astringentia;
Hactenus Galenus; quippe ubi his no-
stris temporibus foret non potuisset
melius Empyriam nostratum declarare.

Nunc Medici plerique unicum solum
habent intentionem in stomaci imbeci-
llitate, dum confugiunt ad cibos astrin-
gentes, calidos, amaros, ad uinum de ab-
sinthio, de cotoneo, ad cerata, & unguen-
ta calfacientia, & astringentia; errores
Empyricorum, qui erant Romæ Galeni
temporibus ne latum quidem unguem
discendebant à nostratum criminibus,
sic nostratum ab illis, ut aliquo modo he-
reditariæ in nostratum animos illorum
nugæ, & omnes lacunosæ opiniones ir-
reperiant.

Quis est enim in præsentiarum *Bra-*
*duas*ia correptus, & quauis affectione
per se, uel per accidens ad uentriculum
pertinente, cui non consulat calidum,
astringens, amarum, & unguenta huius-
modi, faicias, & panum illum ostro tin-
ctum? Innumerabiles Venetijs uentriculi
proluuie coinquinati, & præcipue hypo-
condriaca passioe illaqueati qui iugiter
nō fuerūt calida in regione stomachi, &
per os roborantia, & calfacientia deglu-
tiāt, rati intemperie frigida affligi; Nihilominus circumfusus habent icteru
feracissimo, & splen, & mesenterii
melancholia onusta, unde flatus in uentrē,
attamen credunt caldis his, & astringē-
tibus medicamentis iuuari: nihilominus,
Galenus clarissimè dicit in Methodo de
frigida aque potatione affectus uentri-

culi leuasse: hac verborum serie, vid' istin quosdam leuatos frigida potione? explo- damus ergo hac nugas quæ ægros dedu- cunt in manifestam perniciem, & hac methodo incedamus, vt superius dixi- mus. Cum modo, caput, iecur, & cæ- tera affligantur intemperie, modò hu- moribus adherentibus, modò in cato existentibus, & nò perpetuò intemperie frigida angî, & conficiari, cum imbecil- litas modò fiat à causa calida, modò à frigida, modò à sicca, modò ab alijs causis, ita vt non perpetuò morbi sint per essentialia, sed sæpius per consen- sium: ideo dicimus ideas affectuum pro- prias esse assequendas; alioquin nullius momenti, ac frugis esset Medicinæ artis conparatio.

*Quomodo errent vulgares Medici dum
abscessum mesenterij putant esse ul-
cus intestinorum Cap. XXIII.*

NON raro vidimus principes medi- cos summis difficultatibus premi, in consequenda abscessus alicuius partis internæ idea; tot enim sunt inuoluti in nostro corpore labyrinthi, vt nec mirer æcumen quoque ingenij non spernendi medici vadis illidere posse, & demum in falsa corruare dogmata, & liceat mihi in exemplum abscessus mesenterij per- quirere, & casum, quem semel tractauî proponere talem: obtigit mihi ægrotan- tem tractasse, cui ter, quaterve in die san- niei synceræ circiter selibra per aluû ef- fluere, aliquando fecibus confarcta, nonnunquam scorsum; & sine dolore, sine siti, nec appetentia deiecta, & lenta quadam febricula comitante; contingit mihi de hoc casu cû alijs medicis habuis- se consilium, & tandem mentem ita dis- tractam medicorum vidisse, vt casus im- plicitus, & inextricabilis cognitionis videretur, à quo nimirû principio pus illud copiosum emanaret, & vnde initium su- meret; plures credere ex intestino re- cto exisse, cum viderent modo pus mix- tum cum recrementis, modò scorsum, eiectum, sed ægrotantem omni prorsum vacare dolore: hoc ita animum reddebat ancipitem, vt toto sententia euaderet tor- tuosa, ac tergiuersans, cum m dispar longè

sit consilium, arbitrari partem sensu do- natam, veluti sunt vniuersa intestina, an- gi magno vlcere, & nullum ab ipsis per- sentiri dolorem, neq; antea animaduert- sum fuisse.

Adfuit medicus alter in illa concione qui tutaretur copiosam illam materiam non pariri, sed pituitæ cuiusdam putrefac- tæ naturam subire, & licet experiret vt est in more cum aqua, igne, & diuisione puris cum specillo: occurrit ille, experi- menta aquæ, ignis, & specilli non alio- quin, quam in pituita putrida per tussim egressa exerceri: O heberem, & stupi- dum ad quod examen debeam te reuo- care in pernoscenda sanie! Quod erit certius techmirion, quam uidere album pus in aqua tûdum petere, quam in igne tetrum redolere odorem, quam specillo diuidere, & nihil participare viscosi, & omnis tenacitatis experte perspicere san- niem: Hocine est consulere uestane; Hunc in modum thesaurum comparas? non flore uel eloquentiæ fucio, ut credis tu, sed, ut ego reor, uerbis tuis sexquiepe- dalibus, utoque pharisaico supercilio, facieque illa tua uultuosa, quib. conculcas bonorum medicorû ingenia, fallis egro- tos, & autoritate qua polles, & non in- genij robore in uitium uniuersam medi- cam physiologiam uocas, ueritatem uiol- ando gratia medicum socium obruendi, & conculcandi, ne tandem ueniat illa dies, in qua lucrum merito tibi arripiat: apage hæc mendacia, quæ in populi pro- spectum perpetuò eijcis, alioquin uel breui tibi polliceor fore, ut æterna apud Manes te expectet pœna.

Cæterum, unde digressi sumus, redea- mus; & in mediû proponamus methodû, qua tanti puris per sedem effusi proximâ & immediatam causam per signa conse- qui possumus, sed quoniam per unicum est impossibile abscessum occultum me- senterij peruadere, licet confulgere ad syndromen signorum antecedentium, & consequentium; quod uidelicet præces- s rint in edendo, & bibendo delicta, unde infarctus factus sit in mesereo, sed hæc nil indicant sola; quare ad secundum sô- tem, idest ad dispositionem patientis ac- cedendum, quod uidelicet ortus sit à simi- li parente; uel quod sua natura scnsu

grauitatem in ventris parte profundiori, dum cibum prolixè infarcit.

Sequuntur consequentia, veluti egressio puris copiosi, aliquando constricti fecibus, sine dolore, sine siti, nec tamen appetentia sit deiecta: hæc consequentia symptomata indicant esse Mesenterij abscessum.

Postremò ad cognoscendum locum affectum: cognoscemus locum affectum, tum per argumentum ex suff. par. enumeratione, tum ex signis propositis cognoscendis locis affectis, diximus enim signa locorum affectorum esse vel excrementa, vel actionem læsam, vel situm tumoris, vel doloris, vel tensionis; vel propria accidentia, vel proprietates doloris Mesenterij abscessum indicant pus copiosum sine læsione, vel sine dolore, situs tensionis in vtriusque parte profundior, & proprietas doloris potius grauantis: hæc omnia certam pariunt doctrinam, locum affectum esse mesenterium.

Præterea est alter modus per agumentum illud efficacissimum ex suff. par. enumeratione non omittenda probatione, vel nullo commissio petitoris vitio, quod adeo caliginem discuit, ut rem obscurissimam aperiat. Dicas, est pus copiosum; ergo à rupto abscessu, non supra septum transuersum, ergo infra, & licet visum fuerit pleuræ pus aliquando per inferna, & per sedē propulsus; id factum fuit cum magna febris præcedentis vehementia, sitis, & reliquorum accidentium: erit ergo infra, non in ventriculo, vel intestinis, quia in his sine dolore esse non potest; Non in iecore, aut liene, quoniam horum abscessus vires deiciunt, sitim, & reliqua pariunt symptomata, non in renibus; quia non per aluum, sed per urinam pus eijceretur.

Cogitemus ergo partem fermè sensu priuatam, alligatamve intestinis, conuertendo in hanc rem hunc stilum anatomici, vidisti mesenterium intestinis omnibus colligatum, & inter mesenterium, & intestina, summā sympathiam per venas mesenterij, quibus obducta sunt vsquequaque intestina, in quæ restagnant, l'quati succi? deinde, an ne mesenterium ferè sensus omnis est expers, ut cognoscunt in vulnerebus chirurgi, & incisso-

res: qui non apertè obseruant neruos surculos, quibus sensus celebrari in mesenterio possit, cum exilis surculus à sexta cerebri propagine prodians sit ille, qui circumuestit mesenterium; dicendum ergo est per partem imam mesenterij transcolari saniem expedite admodum ad intestinum rectum; & deinde omnia solui phenomena; quare cum sit ruptus abscessus non est mirum, si pus sit copiosissimū; quod ex vicere tantum non dilabitur, si neque est mirum, si aliquando cum facibus, aliquando seorsum sit, cum modò feces sint in recto intestino; modò absint, ut hinc, nunc misceri pus, nunc syncerum prolabi videamus.

Hinc dolores non vexant, cum solum mesenterium ex omnibus inuolueris, exili, & minime sit contextum neruulo, ut sensu ferè sit orbatum, nec sitis intèditur, cum valde distet ab ore ventriculi, nec appetentia tollitur, cum tetri vapores non percutiant stomachum; leuem tamen febriculam concitant; quoniam contextum est mesenterium venis, quibus recipitur spiritus aliquis sanies, & ad superna viscerum delatus inhsit eorum simili methodo progressus est Gal. 5. methodi 7. de inflammatione mesenterij; ubi dicit cum non sit inflammatio in hepate; quia tunc excernunt cruenta sanies, sequitur quod sit in mesenterio. Idem Avicennas lib. 3. fen. 11. tract. 3. cap. 11. de apostemate mesenterij dicit leuem esse febrem, & esse grauitatem cum extensione profundiori ad ventrem exporrecta, & quandoque esse tensionem, & saniem albam, ad differentiā inflammationis hepatis, ubi cruenta, & ad rubedinem vergens, redditur; Ceterum signis his adiungas, neque sitim vexare, neque prostratam esse appetentiam, nec febrem fieri effrenè in mesenterij inflammatione.

Error logicus est paralogsismus in forma peccans, dicendo sanies egreditur sine secuti mixtura, ergo ab intestino recto, vel musculo spinæ, est à communibus signis, & ad secundam figuram ex duabus affirmatiuis redigitur, & vocari potest analogismus empiricorum, quem arguendi modum in libro de analogismo, & experientia ostendimus, in forma, & in materia multifariam peccare.

*Errant dum confundunt ideas morbosas
credentes inflammationem ieco-
ris esse pleuritidem.
Cap. XXIV.*

Qui vno tantum aspectu contemplatur signa pleuritidis pathognomica illa quatuor à Galeno 1. sect. aporismorum comm. 12. allata; quæ sunt acuta febris, spirandi difficultas, tussis, & dolor lateris; & scorum non expendant distinctius dictorum signorum magis specificas, & particulares differentias, sicuti de lateris dolore, an dolor ille sit pūgitiuus, vel grauatiuus, & de tussi an sit sicca vel cum materia, & cetera omnia signa consequentia inflammationem hepatis, vel pleuritidem non distinguunt, in errores vt plurimum incidunt.

Quoniam patientes correpti hepatis inflammatione necessariò debet infestari tussi, febre acuta, difficultate respirandi, & dolore lateris: tussi enim tentantur ob tumorem hepatis comprimētem diaphragma; acuta febris, quoniam sicuti inflammatio pleuræ acutam febrem parit; simili modo inflammatio hepatis acutam febrem excitat: spirandi difficultate, quoniam septum transversum ob tumorem inflammatorum commodè dilatat non potest: dilatur septum, dum inspiratur. Si verò ab electione dilatetur magnus persentitur dolor: dupliciter .n. dilatur vel *κατὰ ἀποαισιν*, idest secundum electionem, vel *κατὰ ὄππλην*, idest ab instinctu; prima fit in vigilantibus; secunda in dormientibus: utraq; inspiratio est difficilis, sed difficilior est secunda: dolore lateris; quia lateri dextro iecur est alligatum, vnde vinculis iecoris tēsis ob inflammationem excitantur lateris dolores, vt tam pleuritis, quàm inflammatio hepatis quatuor illa signa communia habeant.

Methodo nostra inflammationem hepatis ab inflammatione pleuræ separare debemus, dicētes (si de extrinsecis causis loquamur) quod similes concurrant procatartici errores, quoniam pleuritis, & vinculum hepatis inflammatio eandem affectus ideam obident, eandemque dispositiones præcedunt, & eandem causæ antecedentes: diuersa tamen sunt symptomata specifica, quomodo dolor lateris

in pleuritide est pūgitiuus, in hepatis inflammatione grauatiuus, quæ doloris differentia oriū à diueritate locorum affectorum: quinimò locus affectus, vt superius retulimus capite de loc. affect. cognoscitur sæpe per proprietatem doloris: quando igitur dolor erit grauatiuus, locus affectus non potest esse membrana, quæ acutissimo sensu est prædita, & quæ dolores pūgitiuos facit, sed viscus aliquod exigui sensus particeps esse læsum, quod sit in codē fere situ collocatum, & tale nō potest esse, nisi iecur, quod vinculis suis alligatur costis, & sensu adeo obtuso est præditum, quod dolores solum grauatiuos, & nequaquam pūgitiuos experiri possit.

Variis signis pleuritis ab inflammatione hepatis separatur. In pleuritide tussis est cū spū colorato, in hepatis inflammatione est tussis sicca: in pleuritide color faciei patum mutatur, in iecoris inflammatione valde vitatur, vt hinc Gal. 2. de loc. aff. 9. his verbis distinguat hos duos affectus: si dolor est in nothlis costis, & tussis cum spū colorato, valet, ergo est pleuritis, & aliquādo fit dolor ob hepatis inflammationem repletis vinculis internis, quibus alligatur iecur costis, sed differentia est in pulsus, ac sedimentis: porrò sensu agri grauitatem: dum est tumor, comprimitur diaphragma, & fit tussis, & color alteratur, vbi iecur vitatum est: differētiæ ergo sunt pendēte à doloris proprietate, proprietas enim doloris pleuræ est cum puncturis: proprietas verò doloris hepatis, & omnium viscerum tenui sensu præditorum est cum grauitate.

Cæterum cum possit aliquando fieri pleuritis ob materia sanguineæ affluentiam, & tunc dolorē grauatiuum habeat, distinguemus hoc modo, vt cum grauatiuo dolore in pleura sit quoque iunctus pūgitiuus, in hepatis verò inflammatione sit solum grauatiuus. Hinc Galen. 5. de loc. aff. 3. habet, in pleuritide continenter observari dolorem pūgitiuum. Adiunt similiter differētiæ in pulsū, quia in pleuritide est durus, & serratilis, quoniam dum membrana aliqua est affecta, totum genus membranarum seu tunicarum eandem habent passionem: tenditur ergo pleura, quæ est membrana septum, & totum pe-

ctus circumuoluens, & vique ad eor perreptans: sequitur etiam quod arteria circumuoluta ab eadem membranâ eandem tensionem patiatur.

Sumuntur quoque alia discrimina à tussi, à faciei colore, à sedimentis, & ab alijs, & omnia hæc colligimus ex Gal., & Auicennâ: tussis, quia in hepatis inflammatione est sicca perpetuâ, cum fiat ob compressum diaphragma ab hepatis tumore: In pleuritide solum primis diebus est tussis sicca, & deinde exsudat pleura materiam ischorosiolem, quæ in pectus colligitur, & condensatur à calore, & per tussim ei aculatur. Si verò contingeret ob materiam infarctum contumacissimum in pleuritide tussim siccam conseruari; petenda aliunde est alia differentia.

A colore vitio videlicet, seu à pallore, habemus apud Galenum 2. de loc. aff. vitio hepate consequi necessariò vitiatum colorem, in pleuritide verò esse colores parum distantes à statu naturali: En quo pacto per plura symptomata cognoscuntur differentie morborum.

Præterea ab excretis, quoniam in hac hepatis labe sedimenta specimen referunt loturæ carnis, quia chylus in portam præcipitans ab hepate ob eius infirmitatem non attrahitur, & retrocedens malè dedolatus procumbit per eandem spiramen-

ta in ventrem, & per secessum foris dilabitur ad instar aquæ carnis maceratæ.

Vt valeant tandem istæ consequentia, est dolor grauatiuus, & non pungitiuus, & in parte dextra, & cum tussi sine sputo, cum spirandi difficultate, cum febre acuta, cum vitio colore, ergo est hepatis inflammatio illa exportecta ad vincula vsque, quibus costis alligatum est hepar. Hæc signa vberimè cognitionem hepatis illaqueati hac colluie inflammatoria ostendunt. Ad eundem modum est dolor pungitiuus cum tussi, & sputo; est spirandi difficultas, febri acuta, ergo pleuritis; quare dum non distinguuntur signa propolita, nihil intelligunt.

Error logicus committitur, quia quatuor illa signa pathognomica vniuersaliter sumpta constituunt argumentum à positione consequentis ad positionem antecedentis, veluti si est homo, est animal, sed est animal, ergo est homo, quod non valet, est enim in secunda figura ex duabus aff. & multis modis peccat, ut alibi ostendimus, est dolor lateris, tussis, difficultas spirandi, & febris acuta, ergo pleuritis, non valet, nisi sic fiant conuertibiles termini, est dolor lateris pungitiuus, ergo pleuritis; & cætera limitentur, & coarctentur signa propria, ut infra, si velimus certas inferre consequentias.

Signa pleuritis pathognomica de prompta à Galeno.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| { 5. de loc. aff. capite 3. | 1 Febris acuta. |
| | 2 Dolor lateris pungitiuus. |
| | 3 Respiratio frequens, & exigua. |
| | 4 Pulsus parvus durus, & tensus. |
| | 5 Tussis cum sputo colorato. |
| { Prima sect. aph. com. 12. | 1 Acuta febris. |
| | 2 Spirandi difficultas. |
| | 3 Tussis. |
| | 4 Dolor lateris pungitiuus. |

Signa inflammationis hepatis cum tentione vinculorum.

- | | |
|--|--|
| { Apud Gale. 2. de loc. affe. 9. cognoscuntur. | 1 A pulsu vndoso non ferrino. |
| | 2 A dolore grauatiuo, & non pungitiuo. |
| | 3 A tussi sicca & sine sputo colorato. |
| | 4 A Colore citrino faciei ob iecur vitiatum. |
| { ab Auicenna, Fen. 3. li. 3. c. proprio. | 1 A pulsu vndoso. |
| | 2 A dolore grauatiuo. |
| | 3 A facie citrina. |
| | 4 A tussi sicca. |
| | 5 Ab egestione epatica. |
| | 6 Ab vrina simili hydropici lotio. |

Alia

Alia ab Auicenna proponuntur signa, sed hæc sunt potiora, & sufficiunt, quoniam & per actiones læsas, & qualitates mutatas, & excrementa propria declarant, & demum ex proprietate doloris cognoscitur, hepar esse coinquinatum, & non pleuram.

Quomodo errent, dum ex sanguine spumoso secundum omnes partes per tussim eiectione colligunt, in pulmone esse vlcus.
Cap. XXV.

ERrare videntur nonnulli dicentes sanguinem ei aculatum per tussim, quando apparet spumofus secundum omnes partes tam intimas, quam extrinsecas, immediate prodire à pulmone, & ex hoc signo in hoc casu confundit ideas morbosas & maxime lædunt. Quod, ut cluceat ratione, & autoritate erit certandum: an ne sanguis dilabens à capite, & in pectus procurrentes secundum omnes partes fieri potest spumofus, si paucio temporis spatio firmetur: aer enim inspiratus, & expiratus agitare possit illum, & totum aere repletum, deinde spumescere; quare falsa est consequentia: est spumofus secundum omnes partes, ergo in pulmone est vlcus.

Sed cum ipsi subnixi sint autoritate Hippocratis 5. sect. aph. 13. expendamus illam sententiam, quæ his verbis declaratur; Quicumque spumofum sanguinem expuunt, ijs è pulmone educio fit; sententia autem in consilium vocanda est, adeunribus nobis Galeni commentum, ubi expressè negat verè, & ex necessitate concludi in vlcerato pulmone expulsi spumofum, his verbis, non verè vlcerato pulmone ex necessitate spumofum expulsi, & subdit, se vidisse sanguinem eiectione à pulmone ob disruptum vas bene coloratum, cum tussis, sine dolore, & non spumofum. Quod idem repetit Galen. septima sect. comm. 30. hoc verborum splendore, sed neque semper spumofum sanguinem expuunt ex pulmone: videtur itaque, cum ex propria sub-

stantia visceris simul quicquam effertur, sanguinem esse spumofum; sanè, & qui laterali laborant, spumofum expuunt, & floridum sanguinem, ut est ille, qui à pulmone fluit, ut omnino apud Gal. non teneant consequentia; est spumofus, ergo à pulmone, est à pulmone, ergo spumofus & ratio subiecti optima potest, quoniam, & sputa ob agitationem, & sanguis lateralis nullis pulmonis locis violatis spumofum aspectum secundum vniuersas partes clarissime referre possunt. Quid verat, posito efficiente spumæ, quod est agitanus, & materia, quæ est humor, fieri intimius humorem ipsiuscentem, sicuti in sanguine è pleuritide per tussim ei aculato oculis ipsis sæpè vidimus. Quinimò, neque altera valere consequentia: est à pulmone, ergo spumofus, cum aliter Galenus sentiat, ut uidit 30. illo aphor. 7. sect. 10is.

Idcirco sibi constans Galen. 4. de loc. aff. 5. dixit, tunc signum esse efficacissimum, quando simul cum particula pulmonis eijcitur spumofum quippiam: Adidit, & diligenter considerare oportet, an spumofum quippiam simul educatur, id enim efficacissimum fuerit indicium, quod ex pulmone facta sit excretio, ut si pulmonis pars, uel particula, aut arterie, aut uenæ tunica reijciatur, quasi diceret, spumofus sanguis ita est signum efficax, pulmonem esse abrasum, ac si tunica, aut bronchij pars esset reiecta.

Quare in hunc sensum uertere debet, spumofum sanguinem à pulmone reiectari, si à parenchymate exeso, & rupto prodit, tunc uerè, si sanguis eijcitur, est spumofus; sed si est uas ruptum, ut uena pulmonis, sic non est necessarium esse spumofum, opus est ad hoc, ut sit spumofus, propriam substantiam esse exeam, & ruptam, & cum sanguine, uel tunica, uel bronchij partem ei aculari foris per tussim, ut ualeat ista consequentia, effertur à propria substantia, uel à parenchymate pulmonis, ergo, si erit sanguis, necessariò erit spumofus secundum omnes partes; quoniam pulmonis substantia est rara, & spungosa, per quam perenni motu aer transiens ad compescendum æstum cordis, ita iugi motione cribratur usque ad minimas partes, & ita tollitur in spumam,

nam, vt efficiatur similis substantiæ pulmonis, & inde in illam substantiam conuertatur : Quod non euenit in sanguine vasorum pulmonis ; quia in vasis sanguis fluit, & refluit : sicuti in arteria venosa, & vena arteriosa, vbi sanguis collectus non firmatur, sed in alias partes se colligit ; vt non illam subige videatur sortem vt comminuatur vsque ad minimas partes, & per consequens spumescat.

Colligas ergo non valere, est spumofus, ergo à pulmone, nec ista valet absolutè ; est à pulmone, ergo secundum omnes partes spumofus, quia exedi potest vena pulmonis, & ab illa effluis sanguis expers spumosi aspectus secundum omnes partes.

Cæterum si velles infallibilem cognitionem habere, quando spumofus sanguis per tussim eiectus sit à substantia pulmonis, melius tibi consulere non possem, quam vt confingeres ad traditam methodum. Et in primis ad diuisionem generalissimam vt inuenires locum affectum de quo lis est, dicendo, sanguis hic spumofus vel à capite in pectus est pulsus, vel est à pulmonis substantia, vel à vase thoracis rupto, & sic enumerabis omnia, ne cadas in scopulum illum inferrendi cum principij petitiōe, quod satis ubique est à nobis explosum : quare si præcesserint causæ lædentes caput, vt grauitas capitis, rubedo, & grauitas oculorum, fluxus sanguinis narium incipiens, & deinde intermissus, colliges ex ijs à capite prodire, & deinde ad secundum fontem, ad dispositionem uidelicet illius capitis, veluti, an sint orti à similibus parentibus, an intermissa sit aliqua euacuatio, ut inde sit dispositum, & an alias similia sint perpeffi ; & deinde ad symptomata ; ad locos affectos, & ad iuuantia, & lædendia confuges.

Similiter si præcesserint causæ rupturæ vasorum, & æger huic casui sit obnoxius, & symptomata rupturæ sint consecuta, veluti si sanguis non coaguletur ; tunc dicere poteris non coagulatur, ergo à vasis pulmonis prodit ; quia sanguis pulmonis ob bilis permixtionem non coagulatur.

Si uerò à capite sanguis proueniat, coagulatur ; si uerò à parenchymate pulmonis

tunc præcessere causæ abradentes pulmonem, vt falsus catarrhus, inde consequuntur hæc symptomata, spumosi sanguinis excretio sine dolore, vel particula aliqua pulmonis, vel tunica per tussim eiecta : si verò neque à capite, neque à pulmone, sed à thorace initium trahat sanguis ; tunc sanguis degenerat in thrombon : videas ergo quomodo in arte medica vnum signum sæpè malè sit accommodatum in significandis affectuum ideis, vt in omni obscura, & perplexa affectione præstet ad syndromen signorum communium consultò properare, quæ veritatem præbet infallibilem.

Error logicus erit, dum dicunt, est spumofus secundum omnes partes, ergo à pulmone, & vocabitur enthymema ex signo solubili, quia Gal. fatetur in pleuriticis egredi spumofum secundum omnes partes 7. sect. aphor. 30. dicens qui laborant morbo laterali spumofum expuunt, quamuis rarò, & non spumofum secundum superficiem, sed secundum omnes partes : similiter est à pulmone, ergo spumofus, est per totalem causam, ut dicendo, est lux, ergo sol ; cum ignis quoque luceat, quoniam si exesa est vena pulmonis, potest esse, ut non sit spumofus secundum omnes partes : uera tamen est illa, excusum est parenchyma, ergo spumofum quod egreditur, cum dicat Gal. 5. sect. aphor. 13. egredi, & sanguinem spumofum, & particulam aliquam carnis, vel tunicas cum sanguine spumoso.

Errant, qui credunt catarrhum semper esse vitium capitis. Cap. XXVI.

INter exeuntia symptomata, catarrhus principem locum tenet, & quoniam receptum est, exeuntia uniuersa insequi actiones : Hic breuibus expendendum, an catarrhus perpetuè insequatur capitis vitium : Compertum igitur est in exordio huius libri, ubi egimus de resolutione symptomatum in suas radices, exeuntia uniuersa insequi actiones, quæ bifariam lædi dicuntur, per se, & per accens, quando ergo caput erit læsum per accens, siue per aliud, quæ uerba in idem recidunt ; tunc si catarrhus uexabit, vitium sanè nõ erit in capite, sed aliunde trahet initium.

Bre-

Breuius hoc confirmatur Galeni testi-
monio 2. de differentiis feb. capite ultimo
vbi habet aliquando nil pari caput, sed
solum sanguine vitiatum fieri catarrhum,
ergo valebit apud Galenum consequen-
tia, est catarrhus, ergo aliquando ob san-
guinem vitiatum, nulla existente læsione
per se in capite fiet catarrhus, quare nullo
modo potest dici absolute loquendo, ca-
tarrhum esse vitium capitis, quia senten-
tiæ absolute prolatae sunt in potiori signi-
ficatione intelligendæ; & potior signifi-
catio est vniuersalis, & per se, & quæ sunt
per se debent esse ex necessitate, vel sal-
tem de omni, id est semper, & in omnibus
quare cum non semper catarrhus fiat ob
vitium capitis, sed aliquando ob sangui-
nem vitiatum: non poterimus dicere ca-
tarrhum magis esse vitium capitis, quam
vitium hepatis.

Ad hæc confirmatur quod subiecta vi-
scera vel sapissimè totum præbere possint
fontem catarrho, capite manente prorsus
illæso; quia catarrhus modò exoritur
à corporis plenitudine, modò à subiecto-
rum viscerum calore, & demum à capitis
debilitate, quam haurire possumus cog-
nitionem à Gal. primo ad Glauconem
capite 15. vbi habet: caput repleti posse ob
tres causas, vel ob plenitudinē totius, vel
ob magnam febrem, vel ob debilitatem.

Ecce quod subiecta viscera, dum copio-
sis sunt reserua excrementis in destillatio-
nē suæ catarrhi productionem conspira-
re possunt; vel quia longotemporis tractu
viscera fuerint malè disposita; vel quia in
prima coctione error aliquis fuerit com-
missus, ueluti dum uenter esset completus
excrementis, quoniam copiosis edu-
lijs longo temporis cursu essent laxatæ
habena, unde catarrhus, nulla tamen in
capite noxa per se relicta, sed caput tunc
optima sanitate donatum solum esse re-
pletum, ut diximus, uel à viscerum subie-
ctorum calore, uel à totius plenitudine.

Cum igitur hoc eluceat autoritate, ex-
peritiâ, & ratione, labi illos tyrones cre-
dimus, qui catarrhum vitium capitis sem-
per inconsideratè vocitant, & uel maxi-
ma reprehensione dignos esse, quâda ad-
iungit auxilia medici capiti tantum per
consensum læso, sicut dum proponunt
stillicidia, lotiones, & alia id genus, quan-

do subiecta viscera, quæ sunt causæ, de-
stillationis, essent curanda, & non caput,
quod ex se est sanitate præditum.

*Dum catarrhus non dependet à læso cere-
bro, errant, si dicant semper à secunda
coctione læsa exordia trahere.*

Cap. XXVII.

Symptomatum idæ, nisi ad sua initia
rescendant nequitiam cognoscuntur:
rescimus autem bellissimè traditæ me-
thodi opificio in limine huius libri: Cadi-
hic, ut de hac præcipui exentis idea phi-
losophemur; nunquid catarrhus, quando
non dependet à læso cerebro; nunquid
semper à secunda coctione læsa exordia-
tur: quia si Galenū legamus, uidimus ip-
sum dicentem ob sanguinem vitiatum fieri
catarrhum, non dicit ob repletum stoma-
chum, uel ob malè dedolatum chylum,
quare cum dicat ob sanguinem vitiatum,
si non erit caput læsum per se; causa ca-
tarrhi accepta referenda erit secunde co-
ctionis: sanguis enim est secunde coctio-
nis partus.

Verumtamen cum tres sint in animato
corpore coctiones; prima, quæ fit in uen-
triculo; secunda, quæ in hepate; tertia, quæ
in cæteris corporis partibus. & in qualibet
coctione ex Gal. 2. method. duorum ge-
nerum excrementa consurgant, tenuis
nimirum, & crassum, sicuti in uentriculo
crassum sunt feces; tenue sputum; in he-
pate, crassum sit melancholia, tenue bilis
& urina; in tertia crassum sunt sordes, quib.
indusia maculantur; tenue est illud quod
perpetuò egreditur a qualibet corporis
uientis parte, & est illud quod miscetur
cum aere, & cuius ope canes suos agnos-
cunt dominos, & amissos perquirunt, &
feras explorant atque uenantur: eni du-
bium, quod excrementa harum trium co-
ctionum qualitate, uel quantitate peccā-
tia poterunt catarrhum producere: nec
obstat Galeni autoritas; ubi dixit loco ci-
tato, 2. de differentiis feb. capitulo ultimo
aliquando caput nil pari; sed solum san-
guine vitiatum fieri catarrhum, quia uoluit
ostendere catarrhum fieri; quamuis caput
non sit læsum per se, & dixit aliquando
ob sanguinem vitiatum; non obstat hæc
uerba, quominus catarrhus non depen-
deat

deat aliquando à cæteris excrementis prodeuntibus quoque à prima coctione, sicuti ab humiditate illa excrementosa primæ coctionis, quæ per fibras œsophagi ascendit, & percollatur in guttur, & deinde scandens partes superiores supra os superioris maxillæ, quod palatum componit, coalescit, & illis vacuis repletis, sensum sibi viam struens sub osse iugali in latissima oculorum foramina colligitur & inde spargitur per totum cerebrum; ecce quæ facili, & patenti viâ excrementum primæ coctionis à ventriculo descenscens in caput ingruere valeat.

Ad hæc ventriculi excrementa in auras vaporosas abire possunt, & caput inde replere, quod cum sua natura frigidum sit densat, vnit, & halitus in pituitam conuertit.

Neque in hoc Aîgenterius in comm. artis med. rectè sentit, quod videlicet spiritus vaporosi eleuati à ventriculo cedere non possint in pituitam, ad instar pluuiæ, quia (vt dicit ille) ex vapore res crassa, & viscosa, cuiusmodi est pituita, fieri nequit, præsertim in cerebro actu calente, quoniam nos dicimus, ab illis vaporibus non gigni viscosam, vel Praxagoræ pituitam, sed aquosam, & quamuis caput sit actu calidum, similiter actu calidum est alembicum in illa parte, qua condensantur vapores.

Præterea contra Ar genr. est sent. Arist. 2 de par. animaliu ca. 7. his verbis loquens de ijs corporibus, quibus cerebrum frigidius est, quam temperamentum modicum postulet, cum enim alimentum per venas, sursum respirat, vbi excrementum ob, eius loci vim refrigeratum est, fluxiones pituitæ saniesq; mouet, quod simile, generationi imbrui euenire intelligendum est, quoad magnum cõferre cum, paruo licet. Cum enim ex terra vapor, exhalat, afferturque in sublime à calore, vbi supernum aerem subierit frigidum, consistit denuo in aquam propter refrigerationem, atque in terram, defluit, eæce quod Arist. vult cerebri frigiditate condensare vapores aliunde missos, eo modo quo vapores terræ, & aquæ eleuati à solis virtute in media regione aeris cõdensantur, vt nihil clarius sit apud Arist. quam quod cerebrum denset vapores,

& in pituitam conuertat.

Ventriculū verò terræ vicē in animalibus subire, quæ comparatio est Hippocratis lib. πρὶν χυμῶν, vbi dicit, qualis terra arboribus sic venter animalibus.

Dicimus pituitam viscosam fieri, tum à sanguine coctionem subterfugiente, tum ab illa pituita ventriculi, quæ ab œsophagi fibris attrahitur, & ascendit, & deinde prætelabitur in paristhmia, in guttur, & supra palatum, vbi per nares emungitur.

Dicimus tenuem fieri pituitam, vel ob nimiam cruditatem vel ob liquefactionem à calido; & hanc pituitam duplici modo descendere, vel per mediam viam vasorum, vel per tunicas: est Galeni 4. methodi cap. 7. his verbis, si humor iuxta tunicas asperæ arteriæ ceu iuxta muros aqua descendit, tussis non fit, si verò per mediam viam excrementa labuntur tussim statim excitat.

Errant quoque, qui credunt pituitam, quæ emungitur per nares, dum homines sunt in latitudine sanitatis, esse excrementum tertie coctionis cerebri; quoniam à tertie coctionis cerebri alia non habet excrementa, quam vapores, & sordes: præterea si esset excrementum proprium, esset perpetuum, sed dicant mihi quævis, quot sunt, qui vitam ferè totam sine hac capitis destillatione traiciunt: qui catarrhis, & capitis destillationibus non sunt obnoxij, intermittunt per menses, & annos, non conflictari coryza? quare cum non conueniat semper, & in omnibus hæc per nares destillatio, non erit per se, neque propria tertie coctionis cerebri, neq; in latitudine, neque extra latitudinē sanitatis.

Causa ergo catarrhi erit aliunde petenda, quæ cum varia sit, redigi poterit ad commune quodam innominatum, quod erit per se causa destillationis, quod modò tantum per syndromon describere possumus: cum videamus, modò à stomachi repletionem, modò à copioso sanguine pituitoso, conspirantibus erroribus in procatartæis, conspirante dispositione patientis, & locis affectis, fieri, & hæc sunt antecessoria, quæ coryzæ esse possent originis; vt modò ab errore primæ coctionis, modò ab errore secundæ, modò ab errore tertie, & modò à ventriculo, modò ab hepate, modò à toto corpore, & aliquando

quando à cerebro ipſo fiat, quæ omnes cauſæ catartici proprijs ſignis ſunt declaranda; nor tamen dicere poſſumus eſſe proprium excrementum cerebri, niſi per acciſſens aliquando contingat.

Errant, dum volunt prægnantem ex urinis cognoscere. Cap. XXVIII.

Conſtituimus clarioris doctrinæ cauſa exempla errorum proponere, qui fieri poſſunt in morborum, & ſymptomatum ideis genericis cognoscendis, ut melius addiſcere poſſimus methodi rectum uſum; & ſimulque de erroribus, qui ſiunt à rudioribus in cognoscendis affectibus ſimiliarium partium, & diſſimiliariū; & tandem de pertinentibus ad actiones læſas, & ad exeuntia, vt illis percognitis cætera eandem rationem ſubeuntia, & errores vniuerſi, qui fieri poſſunt in ſymptomatibus petquirendis, cognoscere-ntur.

In præſentia de ſignis mulierum prægnantium eſt agendum, vt empiricorum errores omnium generum noſtra methodo aduertere poſſimus: reiſciemus plura ſigna, quæ creduntur poſſe certo indicare mulieres eſſe prægnantes, quæ cum ſint falſa, & à natura rei aliena non debent omitti.

Dignoscere enitran mulieres in illis primis menſibus vtero gerant valdè proſpicere poteſt, quoniam ſi erunt oppreſſæ vomitu, ſaſtidio, inappetentia, & ſimilibus ſymptomatibus, & fatum geſſent, non erit forſitan aliquod incundum conſilium illas euacuandi, & purgandi, ſed ſperandum fore, vtrum puerperijs in partu omnes mali ſucci euacuentur.

Cæterum ſi hæc ſymptomata prodiret à cæcechyμία, vel ab alijs cauſis morbiſicis, eſſent proponenda cathartica, & alia auxilia, ne veſtigia morboſa penitus aggere poſſint radices, & inde aded vexaret, vt vel breui in ſauiffimos erumpant morbos: quamobrem in conſilium vocari ſolent medici, vt difficultatem dirimant, vel ſi non vtero gerant, morbos antevertant, arceantque cauſarū præternaturam impetum, ne ex morbo morbi ſæuiores ſuccreſcant, vel ubi ſunt prægnantes fetum enutriti permittat, leuio-

ribus tantum adiunctis remedijs.

Medici plebei tamen dum tractant hūc caſum, an videlicet vtero gerant nec ne, plurima obſeruant ſigna tum ridicula, tum abſurda, quia aliqui proſequeſcuntur cognoscere prægnantem ex lotij aſpectu, aliqui ex nauſea, vomitu, ex appetitu eſculentorum quorundam, aliqui ab egreſſu vmbilici, vel à lacte mamillis inſidente, & ab alijs multis. Hinc conueniunt medici, hūc obſtetrices, quæ proſequeſcuntur digitis cognoscere, an vterus propter conceptum clauſus ſit, & quod miſerrimum eſt, medici aliquando inueniuntur, qui ſordidas has mulierculas conſulunt, earumque audiunt verba, perinde ac ab aliquo dinini ſpiritus aſſlatu eſſet ſententia expectanda.

Aduſant quin etiam, qui credunt cognoscere Hippocratis artiſcium, an vtero gerant, necne, quado potionem hydromellis aqua pluuiali conſecti ebiberent mulieres, & dolorem ventris, vel tormina perſentirent, quia dicunt, nec torminibus nec ventris doloribus ſætu carentes mulieres ob hydromellis potionem affici poſſe. Vel experiuntur aliud Hippocratis artiſcium, quod eſt, dum vtuntur ſuſſumigio acuto per pudenda aliquo, dicunt, ſi ad nares peruenire poteſt odor, illas non eſſe prægnantes: Hæc & ſimilia infra proponenda ſunt ſigna, quæ vagantur pro cognoscendis prægnantibus, quæ cum decipiant, & ſint communia, à quibus nulla certa cognitio colligi poſſit, ſunt prorsus reiſcienda.

Sunt in primis, qui dicunt vrinam ad albedinem vergentem, vel claram, conceptum ſignificare, & tanto magis ſi poſt redditum lotium in vitrea inatella coſpiciantur bulloſa quædam granula miſij figuram imitantia, quæ ſint ſtatu plena, & ſint aſcendentia, & deſcendentia; Ex his colligunt mulieres vtero gerere: rationem autem cur ex albedine vrina hoc colligi poſſit, dicunt eſſe hanc, quia in prægnante hepatis, renum, & velicæ calor (cuius proprium eſt vrinam reddere coloratam) ad vterum ſit contractus gratia ſouendi conceptum, vt inde vrina ſua natura tinctura priuata mulierem vtero gerere oſtendat.

Adduntque in prægnantibus claram, & per-

perspicuam vrinam reddi, quia in mulieribus vtero gerentibus clauditur vterus, vnde cessat illa iugis excrémentorum proluies, quæ ab ipso tanquam à cloaca egredi, & permisceri solet cum vrina. Denum dicunt bullas illas minimas ascendentes, & descendentes in vitreo vasculo post vrinæ mictum ostendere flatum, & crassæ materiæ sobolem, & denique caloris viscerum imbecillitatem, quæ aliud dicunt habere momenti ad credendum calorem esse vterum contractum ob factus & nutritionem.

Cæterum breuibis diluenda sunt hæc mendacia, tanto magis cum nullos unquam elegantes medicos deprehenderim, qui ex vrina prægnantem cognosci posse defenderent, cum vasa vrinæ adco sint habere momenti ad credendum calorem sympathiam habeant.

Dicunt ergo albam vrinam, & granula illa flatulenta, quæ conspiciuntur in vrina, significare calorem viscerum esse diminutum, & nullam aliam causam imaginari possunt, nisi quia calor contractus sit ad vterum, sed dicant mihi quæso, quænam sint istæ consequentiæ, lotium est album, ergo calor viscerum est debilis, est debilis, ergo contractus ad vterum? nunquid in qualibet cacochymia calor est debilis, est contractus in varijs corporis partibus, vnde albescere lotium potest? an ne alba vrina sit quoque ob nimiam potationem? ob vigilias? & ex altera parte, an ne plures prægnantes coloratam reddunt vrinam?

Quare per lotium decoloratum, & album se conferre in hanc cognitionem, quod vtero gerant mulieres, est per medium extraneum, quia neque est signum, quod conueniat prægnanti per se, neque de omni, nec sæpe, vt sit de illis accidentibus vt plurimum separabilibus: quare qui hoc modo discuntur necessariò in illos paralogismos incidunt, qui vocantur enthymemata ex signis solubilibus, de qua re agemus in libro de analogismo, & de falsa experientia.

Quando verò conceptum colligunt ex claritudine lotij, vt signi huius vanitatem noscant, deberent persæpe inspicere, & annuaduertere non prægnantium vrinas, quæ sæpe clarissimæ esse solent, dum verò

afferunt causam, cur in prægnante sit clara, dicunt, quia clauso vtero, non percolliatur sordities perturbantes vrinas, illi hæc dicentes nobis dant occasionem istos redarguendi, vt anatomie imperitos, quoniam meatus vrinarius nihil habet cum vulua, & sordities vteri nullo modo possunt misceri cū urina, cū meatus vrinarius promineat in parte externa vuluæ, quinimò clausa vulua tangi, & conspici possit.

Accedit quoddam factus est adeo prius primo mentie, vt Arist. 7. hyst. anim. 3. d. eae uix magnitudinem fornicæ masculuæ superet, ita ut tunc sordes non portolletur ab utero.

Quod aiunt de granulis, fieri nimirum causa debilitatis calor viscerum, & ob nullam aliam esse quam propter concentrationem calor viscerum ad vterum: occurrunt imbecillitates viscerum ob innumeras causas fieri, non solum ob conceptum, uerum ob quodlibet viscerum eratum, unde urinae albedo, uel granula sequi possunt.

Hinc in mola, & in recentis mensibus, uel in muliere cachexia correpta, & in mille alijs occasionibus calor est debilis, uel contractus, modò ad vterum, modò ad alias partes, & alba utina cū granulis obseruatur, quare hæc signa proposita, omninò sunt aliena à natura conceptus, rationes verò cur vrina vteri conditiones non significet, sunt, quia utina non fluit per uterum, neque per nulum, sed habet ductus, & canales separatos, ut milue, uel uteri colluies nullo modo possit cū lotio misceri.

Causa demum tanti erroris est, quoniam carent methodo tradita pro cognoscendis locis affectis, de qua Galenus in libris de loc. aff. & nos in proprio capite huius libri uerba fecimus, & ostendimus nullum signum partem affectam ostendere posse, nisi sit de promptum uel ab actione propria, uel ab exente, id est à proprijs excrémentis, uel à qualitate mutata, uel demum à situ accidentum; at urina neque actiones uteri ostendit, neque uteri est excrémentum, & per consequens nullam qualitatem uteri patefacere potest. Quid multa? numquid Galenus apertissime fatetur lotium solum indicare humores existentes in uenis, & non in omnibus, sed illos tantum humores significare qui sunt in uena caua; ut in historia illa de mulie-

re apud Pantimidem testatum reliquit.

Præterea causa illius tanti erroris, dum credunt ex urinis posse cognosci conceptum, non solum prodit ex conditionum locorum affectorum inscitia, verum etiã, quia syndromen signorum communium quæ cognitionis *diagnosis* parere solet, ex suis fontibus parum accuratè colligunt.

A methodi nostri empirici coacti in plurimos labuntur errores, quia nec proprijs nec communibus signis per syndromem collectis incedunt: ostendimus enim superius affectus penitissimos, quando per propria signa non cognoscuntur, tunc per illa signa communia, quæ prodeunt à principijs, quæ necessariò concurrunt, cognosci posse: diximusque in cuiuslibet affectus productionem necessariò conspirare hos fontes, externos nimirum errores, subiecta disposita, causas efficientes, symptomata consequentia, & loco afficiendos, quando ergo aliquid erit occultum, & ab omnibus istis fontibus aliqua signa communia vnam tamen naturam significantia, & ostendentia colligemus, poterimus, quod caligine circumseptum est expedire cognoscere.

Dicant igitur mihi quæso empirici, quo artificio velint ab vrina conceptum colligere: quando enim vrina conceptum significaret, vel esset signum proprium, vel commune hauriendum ex illis quinque fontibus: sed sic est, quod neque vrina proprium est signum, ut omnes consentiunt; neque commune, quia illa tantummodo debent vocari signa communia, quæ vel antecedit, vel subsequuntur affectus producendos, sed vrina nullo modo prodit à causa, quæ vel est externa, vel antecedit conceptum, neque vrina ad uasa spermatica pertinet, neque est causa efficiens, conceptus, neque à loco ubi fit conceptus prodire potest, neque inter alia consequentia signa vrina collocari potest, quæ conceptum significant, valet enim consequentia, non sunt antecedentia, ergo non sunt consequentia, quia posterius supponit suum prius, & quando non erit aliud prius, non erit suum posterius, cause enim urinam facientes non concurrunt ad conceptum, quia uasa illa loco, & natura inter se distant, ergo signa, quæ sequuntur conceptum, ex urinis non colligetur.

Errant, qui prægnantes volunt cognoscere ex mensibus suppressis, & ex alijs quibusdam signis. Cap. XXX.

Semper miratus sum illos qui prægnantes à suppressis mensibus cognoscere uolunt, cum menses supprimantur ob plures causas, quinimò mulieres utero gerentes inueniuntur, quæ suos lunares menses habent per uenarum furculos illos exiles extra orificium uteri collocatos, per quos uirgines exonerantur. Quo pacto ergo ex mensibus suppressis cognoscere poterunt utero gerentes!

Præterea menses, nūquid supprimi possunt ob mille causas: sicuti ob morbos in mala compositione ob angustiam nimiam, ob compressionem uenarum uteri à tumore aliquo factã, uel ob nuntiam pinguedinẽ, uel ob crassos humores obstruentes uenas illas, quæ totum uterum intertexunt, uel ob inopiam sanguinis, & demum supprimi possint ob nimiam copiam, ueluti quando sæminæ sunt defides, & otiosæ, quæ tam copiosum sanguinem colligunt, ut expultrices facultates illum expellere non possint, & inde menses supprimantur.

Non ualent ergo consequentiæ, sunt suppressi menses: ergo mulier est prægnans neque ualet negatiuè, habet menses ergo non est prægnans, quoniam dari potest mulier grauida sanguinis tamen feracissima, cuius plenitudo fœtus indigentiam exuperet, & inde, quod redundat excernat, non tamen per uterum, quia in prægnante oclusus est, sed per uenas extra uterum, per quas uirgines terro hoc excremento exonerantur.

Ceterum cum menses in fœtus generationem necessariò concurrant, cum ex nuntium purissima parte nutriatur embrio, inter illa signa communia menses suppressi ponuntur, quæ syndromem sufficientissimam ad significandum conceptum constituere possunt: quam syndromem conceptum ostendentem paulò post declarabimus.

Præterea adest alia Methodus, quæ in prægnantis cognitionem ex mensibus suppressis nos ducere potest, enumerando nimirum omnes causas, quæ menses

sup-

supprimere valent, & deinde demonstratione aliqua à posteriori excludenda excludere, & demum colligere, an purgationes sint retentæ propter conceptum, uel propter alias causas, de qua re in fine huius primi libri.

Præterea certissimi nunc signum conceptus esse putant, si in mammillis lac colligatur nec vident in multis mulieribus lac colligi, & non esse prægnantes, & plurimas quoque esse in primis mensibus prægnantes quæ lac non colligunt, & ratio est, quia lac ob copiosum, & crassum sanguinem generatur, in illis uero mulieribus, in quibus non est tanta copia crassi sanguinis non ita colligitur.

Hic non semel uidi in mammillis marium collectum aliquid lactis, quod contigit tum ob sanguinem crassum, & copiosum illuc transmissum, tum ob naturam debito frigidiorē, raro tamen in maribus colligi potest ob eorum uergetum, & intensum calorem, qui non solum attenuat sed etiam euacuat excrementa superflua, quoniam calor sua uirtute omnem humorum crassitiem liquat, & liquatos excrementosos succos uel sensibiliter, uel per transpirationem fallentem sensum nostrum euacuat.

Calidi enim proprium est dilatare, & patefacere omnes meatus ut peculiare sit, & intrinsecus nature caloris liquefacere, patefacere, & in halitus resolvere humores.

Hinc fit, quod sexus fæmineus diminuto calore donatus virtutes coquendi, & expellendi habens magis repressas, copiosiora excrementa colligat, quæ deinde partim in lunares purgationes, & partim in glandulas mamillares decumbunt; lac enim in prægnantibus fit, quia menses, qui retinentur ob clausum uterum prægnantis, sunt copiosiores, & crassiores quam fetus requirit; ideo in glandulas mamillares transmittuntur, ut fiat lac.

In non prægnantibus simili ratione lac quoque generatur, uel ob copiam sanguinis, uel quia singulis mensibus non purgatur, quare sæpius errare possunt, qui ex lacte in mammillis collecto inferunt mulierem utero gerere, quia re uera sæpè uidimus mulieres mensibus carere, tumorem uentris habere, lac quoque esse collectum in mammillis, & ipsi certo cre-

dere utero gerere, at tamen transacto non mense, & decimo mutant opinionem, & cognoscunt non conceptum, se aliquem alium affectum præter naturam, illas uerare: Quare ex lacte, & quibusdam alijs signis nullum certum indicium habere possumus, nisi coniungantur plura, quæ absolutam syndromem facere possint.

Præterea ex Aristotele usus primarius mammarum non est lactis generatio. Imò Aristoteles de historia animalium affirmat, lac in uiris generari posse. Idem dicit Albertus, & Auicēnas. Hieronymus Cardanus scribit lib. de subtilitate se hominem uidisse 34. annorum, cui tantum lactis ex eius mammis fluebat, ut ferè infantem alere poterat. Hinc est quod uirgines interdum lac generent. Vius uero primarius mammarum non est lactis generatio sed factæ sunt ad tutelam cordis inde patet ex lactis generatione non colligi posse mulierem esse prægnantem.

Ad hæc pulsatio arteriæ gulæ, quæ sit plus iusto manifesta, fallere quoque solet obstetrices, quia hæc pulsatio debito crebrior ob multas causas obtingere solet, hinc si ex hoc signo conceptum collegerint conficiunt paralogismum ex communibus signis, uel ex ijs, quæ sunt per accidens, quæ nihil docere possunt: pulsant enim velociter ob retentos menses, ob tumorem splenis, ob tumorem uentris, atque ob pituitam in pectore collectam: ratio uero huius pulsationis tam manifestæ est, quia dum inspirant, non distenditur valde septum transversum, ut propterea fiat anhelitus frequentior, & ex consequenti pulsus celerior, & cum in celeritate arteriarum concitetur calor, propterea arteriæ in maiorem attolluntur mollem ob ingem inspiratum: præsertim arteriæ gulæ motus obseruatur, cum ibi maxima sit arteria, & valde prominat: His igitur constitutis, quis diuinabit ex gulæ arteriæ motu celerimo feminam esse prægnantem, cum isdem effectus à mollia, à tumore splenis, ab hydropico affectu, & à retentis mensibus suboriri possit.

Amplius aliud circumfertur signum prægnantium, ex eo quod lentiginis oriatur in facie mulierum, quod signum neque omnibus, neque semper competit, & per consequens nullum uexum necessa-

rim, & per se cum prægnantibus habet: Nescio mēte fingere quod signa possint rerū naturas ostendere, nisi sint per se secundo, vel quarto modo, in quibus supponitur nexus necessarius passionum cum subiectis, quare quando logicis documentis philosophantes reluctentur, necessarium in scopulos impingunt: Arist. enim solo logico artificio omnium præcorum sententias torsit, quare cum lentigines nunc sunt in prægnantibus, nunc abunt, nunc inuadant mulieres ob retentos menses, nunc cacochymas, & melancholicas, tantum nexum necessarium cum utero gerente habebunt, quantum luna cum crustaceis.

Præterea, qui ex appetitu deiectos, atque prostrato, & ex vomitu ante prandium colligunt prægnantem, in eandem vanitatem incidunt, quoniam omnia hæc accidentia fieri possunt ob retentos menses, & ob plures causas præter naturam; sunt in gravidis: quia meliori sanguine fetus enutritur, & quod deterius est in sanguine, ab utero non attrahitur, sed à facultate expultrice hepatis, & aliarum partium propellitur ad ventriculum; unde vomitus, unde appetitus prostratus; & si contingat, quod venæ sint repletæ sanguine melancholico terrestri, & humor iste terrestri transmittatur in ventriculum, & os ipsius coinquinetur, excitatur pica, seu *maleditas*: si verò sint repletæ biliosis humoribus qui transmittantur in ventriculum, vomitus, & aliquando cardiacæ cōsurgunt; eadem tamen excitantur symptomata aliquando ob menses suppressos, & ob multas alias causas.

Anipius sæpe decipiuntur, dum ex tumefactis mamillis, & à fusco colore capiti mamillarum conceptum colligunt quod argumentum neque est ex proprijs, neque ex communib. signis ad cognitionem conferentib. quoniam sunt extranea & sine aliquo fructu æquiuocam intelligentiam pariunt, quia tumefactæ mamillæ, & capita fusca sunt communia retentis mensibus, & prægnantibus.

Decipiuntur quoque, & dum ex pōdere circa pectinem gravidationem colligunt; quia in retentis mensibus, in mola, & in vesicæ calculo pondus illud obiectatur: Idem colligunt conceptum ex eo, quod vter, dum mulier anhelitum trahit, non

multum detumescat, quod signum sanè non solum gravidis, sed omnibus ventris tumoribus, & plurimis alijs morbis superuenire potest, & precipue ijs, quibus colligitur inter peritoneum, & omentum mala humorum soboles, vel flatus hypochondriaci.

Porro sunt obstetrices, quæ, dum in dies magis egreditur umbilicus, & maior euadit, pollicentur conceptum, quippe à quibus, & quot causis præter naturam promovere possit, ex dictis superius facile est videre.

Postremò dicunt nonnulli prægnantem cognosci ex tumefactis venis illis, quæ videtur in narium angulis iuxta lachrymalia, dicuntque illas venulas magis apparere, quia partes infernæ, & vena cana à conceptu comprimuntur unde sanguis supernas partes excurrans inflat venas frontis, & præcipue illas angulares, in quibus copiosus sanguis commodius colligi potest, quod signum, cum insequatur abdomen compressum, & compressio fieri possit à fetu, à mensibus retentis, & à quolibet abdominis vel splenis tumore, signum nullum erit.

Quod obstetrices tangentes vterum digitis nullo modo cognoscere possint prægnantem. Cap. XXX.

Multi omisiss omnibus signis conceptus confugiant ad obstetrices tamquam ad summos indices, quæ digitis experiantur, an vteri officium clausum sit; quoniam si ab ipsis inueniatur oclusum, putant non esse amplius de conceptu dubitandum.

In hoc tamen munere obscuro fallaces istæ mulierculæ, cum optimè scient, ab illis nō posse cognosci, an sit vterus clausus, quānnis manibus internas illas partes traclent, nihilominus, quia de re sua agitur, proferunt palam hoc perfectè cognoscere quarū obstetricum impossura non modo cognosci possit ab ijs, qui an te anatomica sunt exculti, verū etiam à quolibet viro uegeti ingenio prædicto, quē si seorsum multæ conuocentur obstetrices, ut tangāt vteri officium, an sit oclusum, faciliter omnes cognoscēt ut ibi ipsarum ab animo dissimulare, quia loquentes

tes titubant, & ipsarum sententię contrarię obseruantur, quod est certissimum incitia, & imposturę signum.

Periti verò anatomia altioribus principijs cognoscunt, orificium vteri in parte, vbi tangitur ab obstetrice, nō posse claudis, sed ita apertum conservari, sicuti erat in muliere antequam vtero gereret, quia in pręgnantibus solum in parte intima, est obstructum à quodam mucilaginoso, infarctu, qui adeo conglobatur, & vteri foramen illud intimū operit, vt iure Gal. dixerit de pręgnante, quod adeo orificiū vteri internū illud, quod videlicet nullo modo digitis tangi potest, sit clausum, quod acuum cuspides non peruaderent.

Hoc verò quod diximus de vteri orificio, possumus experiri in brutis animalibus, & præcipue in capris fetum gerentibus, quas si discabimus, in parte vteri interna iuxta orificiū obseruabimus floccum quandam mucilaginosum cooperientem, & velantem totum vteri orificium sine aliqua orificij clausura, quare vanissimum erit credere labia ceruicis matricis coalescere, & claudis, cum semper tam in pręgnante, quam in non pręgnante aperta, & reclusa sint.

Si quis verò non crederet, eat, & experiat in mulieribus pręgnantibus, quia proprijs manibus inueniet in vuluę apice particulam quandam oblongam, & duriusculam, quę exprimit exigui penis puerorum imaginem, quę si pene humano confricetur, vel digitis tractetur, concitantur mulieres ad semen ciaculandum, sed nō ocyus aura, vel ocyus æstro, vt dicit Columbus, profluet semen, sed breui aliquo temporis intervallo: in hac igitur parte oblonga, & duriuscula explorabit orificium vteri, & idem foramen inueniet eodem modo conformatum in pręgnante, perinde ac in non pręgnante, magna ergo sine dubio erit obstetricum incitia, vel impostura, dum ope digitorum manus proficentur cognoscere, an vterus oclusus sit, cum semper in externa parte maneat apertus. Et multo maior erit nonnullorum medicorum incitia, qui preta anatomia deserunt hoc negotium summū momenti fordidis hinc obstetricibus.

Præterea aliud circumfertur signum,

quod mulier iam conceperit, si in coeundo contigerit, hominem coeuntem percipisse ab orificio matricis penem fuisse constrictum, colliguntque ex illa penis coarctatione sperma ab vtero fuisse receptum, vnde conceptus habuerit initium, quod vteri conditionibus non potest conuenire, quoniam orificiū vteri nullo modo in coeundo aperiri potest, vt amplectatur penem; causa verò, cur virga in coeundo aliquando cōstringatur, prouenit à tensis vuluę carunculis, quas nymphas vocant, quę caruncule inflantur, & tumescunt, vt tumet penis, & inflata penem coarctant; signum vero certissimū, quod constrictiones illę non fiant ab orificio vteri, colligitur ex hoc, quia si coitus exerceatur cū pręgnante (cuius vteri orificium ex omnium consensu aperiri non potest) eadem constrictiones, vel coarctationes virgę in coeundo aliquando obseruantur, quare vanissimum erit illud signum, quod ex constrictione illa penis desumi possit argumentum, quod ab vtero sperma sit attractum, & inde conceperit mulier.

Vierrant, qui freti auctoritate Hippocratis dicunt conceptum cognosci, si post cenam epoto hydromelle sequantur tormina. Cap. XXXI.

PLurimi medicorum profitentur cognoscere pręgnantē, si post cenam epoto hydromelle, inde mulier tormina ventris sentiat; desumuntque ab Hippocrate sect. 5. aph. 41. vbi hac verborum serie videtur docere quomodo cognosci possit mulier vtero gerens, si velis noscere, an conceperit mulier, cum dormitura est, ei aquam mulsam portandam da, & si alui tormina patietur, concepit, sin minus non concepit; Galenus in commento reddens rationem huius aphorismi dicit, ob cōceptum fieri angustationem, vt flatus, qui fiunt ab hydromelle permeare, non possint, vnde flatus retenti distendētes ventrem sunt illi, qui tormina faciūt, subditque Galenus reddens rationem, cur à sumpta cena, & nō ante debeat dari hydromel, dicit vt magis manifeste obseruentur tormina, quia si fuerit epotus à cena, duę concurrunt causę angustationis,

nis, altera ob cibum replentem, altera verò ob conceptum comprimentem ventrem.

Caterum quantum valeat hoc signū, ex superius dictis quique cognoscere poterit, quia non solum conceptus comprimit ventrem, sed mola, menses suppressi tumore interiorum viscerum sicuti sunt tumores splenis, hepatis, & demum tumores musculorum abdominis, & plurimi alij affectus sunt, qui compriment, & coarctant ventrem, ob quas causas hydromel liberè nō transiens pariet flatu, & tormina inde sequuntur: Quomodo igitur erit proprium pręgnatium à cæna sumpto hydromelle tormina fieri, si æquè in hominibus, ac in mulieribus hydromel aliquando tormina excitet: numquid homines fortasse possunt vtero gerere? & ex alia parte interdum obseruetur in pręgnante hydromel nullo modo tormina facere, vt ego millies obseruaui.

Videns propterea Auicennas experimentum hydromellis pollicitis Hippocratis frustrari, animaduertit hydromel nō facere tormina in illis pręgnantibus, quæ sunt assuetæ potioni hydromellis; ab assuetis enim non fit passio; Quæ Auicennæ expositio est insufficiens, quoniam in non assuetis pręgnantibus, & non pręgnantibus mellicratum excitare solet tormina; quomodo ergo poterimus distinguere mulieres pręgnantes ab alijs, quando æquè potionem muliæ, seu hydromellis torminibus lacerentur.

Alij quoque videntes Hippocratis aphorismum non esse æternæ veritatis, conantur interpretari alio modo aphorismum, dicentes mellicratum in vtero gerentibus solum vermina, seu tormina intestinorum (quod idem est) excitare, si aqua pluuiali consueciatur; quæ expositio experientiæ non respondet; cum non semel sim expertus mellicratum hoc modo paratum in pręgnantibus ijs, quæ tamen non sunt assuetæ huic potioni, tormina nulla obseruata fuisse.

Alio modo igitur est aphorismus Hippocratis à nobis interpretandus, dicendo cum Galeno, aphorismos aliquos nō esse æternæ veritatis, sed magna ex parte esse veros, quæ Galeni sententia habetur in

commento aphorismi 38. sextæ sectionis, vbi Hippocrates dicit, Si Omentum exciderit, necessariò computrescat, Galenus in commento habet hæc verba, si aliquis viderit omentum, quod paucotempore extra prodierit, & inuisse reductum ad suum locum, & non putrisse, ostendet ille non esse perpetuò veram sententiam Hippocratis, sed non tollet, quod magna ex parte vera sit, audias deinde Galeni verba, quæ sequuntur; commune est huic aphorismo, & alijs, vt perpetuum ex figura dictionis ostendatur, quamuis res ipse non semper eodem modo eueniant, sed licet rarò, interdum etiam alter accidat, quare Galen. fatetur hunc aphorismum non esse perpetuæ veritatis, quod videlicet quamuis omentum excidat, non necessariò, & semper putrescat, quamuis clarissimè loquatur Hippocrates, quia dicit, si omentum exciderit *ἀνὰ χρόνον*, idest necessariò computrescit.

Adeo enim Galenus constanter credit plures aphorismos non esse æternæ veritatis, quamuis magna ex parte veri sint, vt voluerit aliquomodo reluctari Hippocrati dicenti non necessariò excisum omentum computrescere, quanto magis etiam nos amulantes Galenum, poterimus interpretari illos aphorismos, qui perpetuò experientiæ non coherent, sicuti est ille de hydromelle, & ille de suffitu aromatum pro cognoscendis pręgnantibus, poterimus inquam interpretari, vt plurimum esse verum, hydromel sumptum à cæna excitare tormina in pręgnantibus; sed non semper; quare si non semper verus erit aphorismus, non erit inter signa perpetua collocandus, quæ sola nos ab initio inquirenda proposuimus.

Vt igitur confirmemus hanc nostram sententiam à Galeno deſumptam, quod nimirum satis sit aliquos aphorismos esse veros vt plurimum, & omnes non esse æternæ veritatis; aliquos afferamus in mediū similes: Hipp. 6. aph. 18. dicit scētō cerebro vetriculo esse lethale, tamen aliquando vulneratur cerebrum & sanatur Gal. 8. de v. p. decimo dicit naturā fecisse duos vetriculos in cerebro, ne vno fauciato subito animal pereat. Gal. refert ea-

sum inuenis Smyrnei, qui vulnere accepto in dextro vetriculo, coaſit, quia ſiniſter erat ill. eſus: ecce quod Hippocratis aphoriſmus non eſt ſemper verus: ſatis eſt quod aphoriſmi, vt plurimum veri ſunt.

Parimodo Hipp. lib. de natura pueri dicit in utero nutriri lacte, quod eſt falſiſſimum: poteſt tamen defendi, quòd ſententia hæc fuerit ab aliquo inſerta: quia Hipp. bene ſciebat nutritionem factus fieri per uafa umbilicalia.

Amplius Hipp. 4. aphor. 64. dicit icteritiam ante ſeptimum malum: nihilominus Hipp. 4. de ratione vict. in ac. tex. 81. loquens de icteritia ait ante ſeptimum, bonum: tollitur contradicſio: quia icteritia ſi cum rigore fiat ante ſeptimum, bonum: ſi ſine rigore, malum: quia rigor eſt quædam criſis ſpecies.

Præterea ſexto aph. 28. dicit eunuchos podagra non laborare, nec caluſi fieri: Hoc tamen reſtatur experientia: quia ſæpè viſi ſunt eunuchi calui, & podagra laborantes.

In ſuper Hipp. lib. de genitura dicit ſemen à cerebro in lumbos per ſpinalem medullam, & inde in renes diffundi & à renibus in teſtes, quæ ſunt omninò falſa, lib. verò de oſſium natura dicit, venas iugulares, quæ ſunt iuxta aures ab vtroque latere excurrere ad teſtes & in ipſo ſenſe deferre, quòd repugnat anatomia. Imò Ariſt. 1. de generatione animalium c. 17. & 18. reiſcit hanc opinionem: Idcirco dicimus aphoriſmos eſſe ſententias Hippocratis vt plurimum ueras.

Nunquid æternæ ueritatis eſt ille 41. quintæ ſectionis, dum dicit, ſi mulier grauida marem gerat, eſt colorator, ſi feminam decolor, quis defenderet hunc aphoriſmum ſemper eſſe uerum, quot uidimus feminas prægnantes marium decolores, & feminarum coloratiores.

Similiter 5. ſectione aph. 31. ſi mulier grauida morbo quopiam acuto corripitur læthale, quis defenderet hunc? quis non uidit aliquando gravidas acuto & periculo affectas morbo ſæpè euaiſſe?

Ad hæc 4. aphor. 79. habet, quibus in urinâ ſubſident ſabuloſa, ijs ueſica calculo laborat: nemo ſanæ mentis defenderet, hunc aphoriſmum eſſe perpetuò uerum, cum ſæpiſſimè obſeruentur ſabuloſa

ſubſidentia ſine calculi ſuſpitione.

Similiter 4. ſectione aphor. 70. quibus urina turbata ut umentorum, ijs dolor capitis, uel adeſt, uel aderit: Quid prohibet dolores capitis neque adeſſe, neque, venturos eſſe, quando ſpiritus ille igneus in uenis ardens, & maſſam ſanguineam turbans non obreperet in caput, ſed in urinam totus ignitus ſpiritus contenderet? vt ſæpè uidimus ægrotantes cum, urinis ſubiugalibus, qui nunquam in tota illa ægitudine paſſi ſunt dolores capitis: Ecce quam ſæpè Hippocratis ſententia non ſit æternæ ueritatis: Quare, ut iterum redeamus ad hydromel, & ad ſuffitum aromatum, negamus hydromel ſumptum poſt cenam ſemper in prægnantibus tormina facere.

Simili ratione negamus odorem aromatum per ſuffitum adminiſtrandum per pudenda in non prægnantibus poſſe ad nares ſemper excurrere: quoniam claudi poſſunt meatus uteri non ſolum à conceptu, ſed à mola, à retentis menſibus, à pinguedine, à tumoribus, & à ſexcentis alijs cauſis, ſicuti experientia cognoscere poſſumus.

Quomodo per ſyndromem cognoscatur conceptus occultus. Cap. XXXII.

CÆterum quid poſt tot ſigna communia minimè concludentia dicit poſſit vt conceptum occultum cognoscamus; arbitror, quod inter cæteros modos cognoscendi prægnantem, methodus, quæ fieri poſſit per ſyndromem ſignorum perpetuò in hærentium ſit illa, quæ nos commodè ducere poſſit ad huius cognitionis apicem.

Signa uerò, quæ ſufficientiſſimam hanc ſyndromem conſtituere poſſunt, omnia ſunt deſumenda tū n. ab antecedentibus neceſſarijs, tū ab ijs, quæ neceſſario conſequentur conceptum.

Antecedentia uerò omnia, quæ neceſſario ad concipiendum concurrunt, reducantur ad cauſam efficientem externam, quæ conſiſtit in uiro ſecundo, & ad corpus mulieris diſpoſitum ad conceptum formandum; quam ſecunditatem uiui, ſeu mulieris, ſi certis quibuſdā ſignis cognoscamus, & cum alijs quibuſdā ſignis ne-

cessariò insequentibus coniungamus, infallibilem sine dubio cognitionem conceptus consequi poterimus.

Signa verò, quæ necessariò consequuntur, duo mihi videntur sufficere ad hanc cognitionem, vt primum sit præcognoscere an orificiũ vteri internum sit obturatum (vt diximus) flocco illo mucilaginoso, quod mitrenchita infra proponenda est cognoscendum, quia hoc signum perpetuò insequitur vtero gerentem, quinimò quando contingeret, quòd orificium vteri illud internum esset diminutè obturatum, necessariò esset expectadus abortus.

Secundum signum consequens conceptum est aliquis ventris tumor, qui tamen diligenter est obseruandus, cum interdiu vix cognosci possit.

Hæc igitur sunt signa necessariò consequentia conceptui, vt valeant consequentia, est conceptus, ergo orificium vteri internum est obturatum; est conceptus, ergo aliquis tumor: non tamen valent istæ, est conceptus, ergo menses sunt suppressi, ergo lac incipit apparere in mammillis, ergo mammillæ tumescere, incipiunt, ergo pulsant plus iusto iuguli arteriæ, & alia similia in superioribus capitibus reiecta, quæ vt plurimum, sed nõ necessariò insequuntur conceptum.

Colligamus ergo breuiter signa, quæ sufficentiissimam syndromem facere possunt, & in primis à causa efficiẽte externa, probantes prius vterũ illius mulieris esse secundum; signa igitur fecunditatis ab aliquo ex tribus his fontibus sunt colligenda; à primo, quod alias expertus sit fecunditatem, vel quando non esset expertus, à secundo colligere saltem possumus, quod à fecundissima prole ducat originem; à tertio quòd tali pacto sit constitutus, vt in hoc munere obeundo nihil appareat deficiens.

Simili modo cognoscemus corpus mulieris esse dispositum ad conceptus formandos, vel quia alias passa sit conceptũ, vel secundò, quod à fecundissimo stipite ortum trahat, vel denum nullum cognoscatur impedimentum in muliere ad hoc munus præstandum; impedimenta varia sunt, vt ætas senilis, vel puerilis, vel tali modo sit constituta, vt nunquam habuerit menses, & alia plura.

A consequentibus colligimus illa duo enarrata, tumorem videlicet aliquem ventris, & orificiũ vteri internum flocco illo obturatum, quæ nos certissimos reddere possunt esse prægnantem: Quare tumorem obseruare possumus rectè inspicientes mulierem stantem, vel ambulantem, & vbi videbimus ventrem eo modo tumidum, & tensum, vt proportionẽ quadam tumor ad mammas vique euectus sit; tunc ex hoc aspectu totius ventris, si cætera antecedentia, & consequentia non relinquantur, magnum sumere poterimus argumentum, quod illa mulier necessariò vtero gerat.

Aliud signum, quod necessariò consequatur grauidationem, & quod vnicè ferè demonstrat, est summa cum diligentia prius inquirere, an orificium internum vteri sit occlusum; non enim cognoscitur per relationem obstrui: cum tangentium partem externam vteri, quæ nos fallunt, & decipiunt, vt superius ostendimus, quia in parte illa externa, quæ in viuente tangi potest, perpetuo manet apertum orificium tam in prægnante, quàm in non prægnante, vt omnes sciunt, qui diligenter anatomia sunt exerciti; sed cum intrinsecum vteri orificium in prægnante sit solum occlusum (vt diximus) flocco illo mucilaginoso, illud est inquirendum, quoniam quando aliquo ingenio possemus percipere, quod sit occlusum, coniungentes deinde hoc signum cum antecedentibus, in certissimam cognitionem duceremur, mulierem illam vtero gerere.

Ego autem cum diu mecum cogitassẽ quo pacto possemus perfectè scire, quando esset clausum orificium illud internum; inueni nos posse ad hanc cognitionem peruenire auxilio mitrenchite accommodatæ, quod instrumentum apud veteres erat vel maxime in vsu, quando liquores volebant in vterum injicere, ad hoc igitur cognoscendum sumimus hæc mitrenchitam ad hunc vsũ accommodatam, cuius apicem immittimus in foramen externum vteri summa cum dexteritate, in primis oportet digito indice, sinistrẽ manũ inuenire foramiẽ illud externum vteri, quod tamen non quilibet inexpertus inuenire sciet, quo inuenito

firma-

firmatur digitus iuxta orificium vteri, vt volentes dextra manu specilli, vel mitrenchicę nostrę apicem immittere, non erremus, apice deinde specilli immisso statim exprimitur liquor aliquis suauissimus, sicuti esset vini tenuissimi pauxillũ, ne fortę cõceptu existente, aliquis sequatur abortus, quo expressio hoc modo cognoscemus an sit obturatum, quia si leue aliquod fastidium post expressum liquorem persentiet mulier, tunc, vt experientia cognoui, illa non erit pręgnans, quia hac de causa fastidiũ persentiri arbitror; quoniam liquor penetrat in vterum, & vellicat parum partę illam maximo sensu donatam, si uerõ post immissam vini exiguum portionem mulier nihil persentiat, tunc erit oclusus vterus, & per consequens erit pręgnans; De cuius specilli, & mitrenchicę schemate in proprio libro de instrumentis medicis nouiter a me inuentis diffusę agemus, quem librum post hac imprimendum duxi.

Concludimus ergo si ea signa, quę colliguntur a causa efficiente, & a corpore disposito mulieris coniungantur cum ijs, quę necessariõ consequuntur, fore, vt nos certissimam conceptus quantumuis occulti cognitionem consequamur.

Quomodo ex signis non necessariõ consequentibus conceptum possimus pręgnantem cognoscere. Cap. XXVIII.

PRæstat hic aliam methodum proponere, qua per signa non necessariõ sequentia possimus pręgnantem cognoscere; quoniam vt plurimum conceptus supponit retentos menses, vomitus, appetitus deprauatos, & similia iam superius enarrata; arbitror ex his signis quoq; nos posse in conceptus cognitionem peruenire, si argumẽto ex sufficienti par enumeratione cum aliqua demonstratione coniuncto signa illa communia expurgemus, & omnem abijciamus cõtingentiam, dicendo: sunt suppressi menses, ergo uel ob inopiam sanguinis, vel ob tumorem aliquem præternaturam comprimentem, uel ob nimiam pinguedinem, uel ob crassos & viscidos humores obstruentes, vel ob nimiam copiam infarcientem meatus, vt fluere non possit sanguis.

Perpendas primõ, an ob inopiam sanguinis illud accidere possit, cum sanguinis penurię signa satis sint manifesta, si non inuenis illud inuenire ob sanguinis inopiam: excutiat deinde an ob tumorem præternaturam comprimentem, vel propter alias causas non naturales fiat, quas causas cognoscere poteris virtute methodi traditę in c. 6. huius primi libri, ubi omnia symptomata docuimus, quomodo reducantur ad vnum, quod sit infacto esse; ea verõ methodo vti hoc pacto poteris.

Omne retentum immodicę supponit actionem expultricem læsam, hæc functio expultrix, vel erit læsa ob facultatem, seu constitutionem læsam, vel ob errorem externum: facultas, vel constitutio lædens expultricem per se, si est in similibus debet esse intemperies sicca, si in dissimilibus, angustia.

Deinde signa angustię omnia sunt cõsideranda, quę tradita sunt cap. 6. citato, quare quando inuenies non esse ob causas morificas, tunc poteris inferre, suppressos esse menses ob conceptum.

Id quod diximus de suppressis mensibus, idem dicendum de lacte mammillis insidente, de appetitu mulierum deprauato, quę omnia signa licet de omni non prædicentur, cum omnibus pręgnantibus non compentant, attamen adeo indicare possunt, conceptum, vti habeant vim propriorum, & certum ex illis signis indicium colligere possimus, mulieres vtero gerere.

Ex his enarratis in hoc lib. poterimus omnes affectuum præter naturam ideas, vel formas genericas occultas inuenire, quia in exordio libri diuisionem omnium morborum, & omnium symptomatum tradidimus; deinde ostendimus viam diuisionem per se solam in cognoscendis affectuum formis occultis esse mancã, & diminutam, cum processus diuisionis semper fiat cum principi ppetitione.

Erat igitur necessarium, vt inueniremus occulta, vltcrius philosophari; ideo incepimus capite 6. methodum tradere, qua possimus non solũ omnium symptomatum coordinationes cognoscere, sed omnium affectuum, qui sunt in fieri primas radices per symptomata propria pe-

netrare, cuius mirabilis methodi resolutionis virtute ad quemlibet genericum affectum cognoscendum peruenire possumus.

Deinde capite 8. tractauimus de methodo magis particulari, & quæ nos per signa propria ducere posset ad reconditos affectus cognoscendos in qua methodo quinque proponebantur fontes, in quibus omnes morborum proprietates conuertibiles, quæ ab humana mente cognosci possunt, collocabantur, sed quoniam persæpè signa propria morborum delitescunt, vt in centum internis affectibus vix vnicus sit, qui per vnicum proprium signum cognoscatur, huc totam curam totamque diligentiam inflectimus, vt methodum de signis communibus per syndromem à sex fontibus colligendis inueniremus, quæ perpetuò

in omni affectu recondito nobis posset formas, & ideas morborum aperire, & ob oculos collocare, qua deinde inuenta nouem affectibus præter naturam internis, & occultis illam applicauimus, & ostendimus solum per sex illos fontes non posse ad tam occultos affectus peruenire.

Demum exempla errorum medicorum vulgariū, qui in quouis affectuum genere sine hac methodo incedunt, reijcienda proposuimus, vt illis erroribus elisis, eadem methodo in finitos alios, qui fieri possunt in affectuum ideis reijcerentur. Tandem ostendimus per eandem syndromen signorum & cognosci conceptum occultum, & affectus præter naturam, & illos, qui inter limites sanitatis continentur, ut inde nullus error committi possit in cognoscendis morborum, & symptomatum ideis.

FINIS PRIMI LIBRI.





SANCTORII SANCTORII

Olin

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIVM

In Morborum, & Symptomatum Ideis perquirendis.

LIBER SECVNDVS.

Quod qualibet corporis pars modo per essentiam modo per consensum affici possit. Caput Primum.

CVM in primo libro Methodum pro vitandis erroribus, qui fieri possunt in formis, & ideis affectuum genericis præter naturam indagandis, tradiderimus, cuius traditæ Methodi virtute nos sanè omnes morborum, & symptomatum formas, quæ ægrotantes lacerare possunt, hæcenus cognoscere valemus: Sequitur in præsentia, ut aliquam inueniamus methodum, quæ tenebras has discedat, & quæ nos perfectè edocere valeat, quando istæ affectuum formæ iam traditæ corporis particulis per se, & quando per consensum competant.

Quoniam re vera pro hauriendis indicationibus non satis est scire tantum

has formas, vel ideas affectuum, nisi præterea sciamus an per consensum, vel per essentiam hæc morborum ideæ miseros premant patientes, quia possumus assequi affectum aliquem perturbantem ventriculum, caput, & alias partes, per hypothesim, esse dyscrasiam calidam, & siccam, verum, an hæc calida intemperies sit per consensum in ventriculo, & in quavis alia parte, vel per essentiam; atque an affectus per essentiam sit protopathia, vel idiopathia, hæcenus re vera hoc nos latet, & tenebrarum uallo est obuolutum.

Exordiemur ergo à diuisione affectionum per essentiam, & per sympathiam, & has per sympathiam, siue per consensum in suas species diuidemus; mox accedemus ad hanc exoptatam methodum quæ docebit quando, & quomodo affectus sint per essentiam, & quædo, & quomodo per consensum; tandem, ut hæc me-

methodus exemplorum luce magis splendet, plura Empiricorum errata, & præcipue anatomica subnectemus, quibus ostendetur, methodo hæc spoliata ad hanc cognitionem de Idiopatua, & Sympathia se eleuare non posse.

Hoc est supremum illud caput in progymnastio voluminis propositum inquirendum, ad quod innumerabiles nostrorum errores redigi possunt, dum persæpe falluntur in contemplatione formarum, credentes ægrum morbo aliquo per essentiam vexari, cum tamen affectus ille sit per consensum, & sympathiam alterius labefactæ partis.

Nemo in ægritudinem prolabitur, quin cadat in varias affectuum ideas, tanta in hoc nostro corpore est harmonia, & partium consensus: si aliqua pars est læsa, eadem extemplo, vel paulo post pleraque plures in consortium allicere solet labefactetur aliquod viscus, sit ventriculus, sit iecur, sit caput, sint denique ex illis, quæ non ita principem locum tenent, protinus variæ in consensum ob hanc partium sympathiam cadere videntur, unde diuersas in quolibet ægotante mixturas affectionum suboriri videmus; propterea quæ in tanta affectuum confusione per se, quæ per accidens partibus nostri corporis conueniant, & quæ primo, & quæ per consensum, hoc talem inquisitionem effragitat, ut nisi considerationis huiusce cardinem prius consequamur, affectuum curatio, vel notitia implicita, & inextricabilis reddetur, & milles tunc incedendo in laqueos incidemus, & ægros ad exitum usque deuetberare persæpe poterimus.

Sed quoniam in hac contemplatione hoc est sumendum pro principio, quod omnes partes corporis nostri lædi possint vel vitio proprio, vel alieno: aliqua lucidioris doctrinæ gratia in hoc capite sunt afferenda exempla de visceribus passim à Galeno proposita, quod quælibet affici possint modo per essentiam, modo per consensum; quoniam exemplorum luce rudiores adipisci medicæ artis fastidium, & per hanc semitam oculis ad exoptatum terminum peruenire poterunt.

Proponamus exemplum de ventriculo desumptum à Galeno 5. de loc. aff.

dum habet: congeruntur excrementa in ventriculo tum eius vitio, tum vitio aliorum viscerum: cum male habente liene ichores melancholici possunt in ventriculo confluere, & symptomata melancholica excitare: tunc si quis ventriculo totis horis medellam adiungeret, cum in ipso affectio sit in fieri, & dependens, & in consortium à splene trahatur, tempus prorsus contereret.

Similiter dum corrumpuntur edulia in ventriculo ob aliud transmissum succum, nulla existente noxa in ipsius tunicis, sed simili succorum diluuiæ perenni motu foueatur, quam medellam stomacho adiungere poteris, nisi fixam in alijs partibus radicem elidas, atque euellas? Audias Galenum de generalissimis differentijs corruptionis ciborum primo de loc. aff. 3. dicentem generalissimas differentias corruptionis ciborum, vel per proprios morbos ventriculi, vel à vitiosis humoribus; vel ab alimentorum qualitate fieri.

Hanc Galeni præceptionem applicare quoque poterimus cuilibet parti læsæ; quoniam quæcumque corporis pars corrupta sit, illud accidit, vel quia à proprio morbo lædatur, vel quia ab humore accumulato, vel ab alia corporis parte transmissio læsio partis dependeat, vel à causis procatarteticis; ut oculos vigiles in omni afflictione habere præstet in has tres differentias, & illas expendere, & ad ipsas totum reuocare examen, quoniam sub his omnis mala valetudo, sit propria, sit per consensum, continetur.

Sed alia afferamus exempla, ut est in more nostro, quoniam video singularium lumine ad doctrinam vniuersalem expeditius euahi nos posse, & studiosos ad apicem huius considerationis melius deferri: afferamus Galeni testimonium in exemplo de cerebro 2. de differentijs feb. ultimo, dum habet, aliquando caput nil pati, sed catarrhum fieri ob sanguinem vitiatum: tunc caput cum omni propria affectione spoliatum sit, si omnia auxilia medica, quæ sunt sub orbe lunæ, capiti adiungeres, nullis irritis frustrare pollicitis, quia affectus in fieri tantum potest tolli, quantum umbra non ablato corpore, quod dictum, & factum est impossibile.

Insuper dignus obseruatione est casus de Athleta secundo propositus à Gal. 4. de loc. aff. 4. & lib. 1. de loc. aff. Hic vir sentiebat imbecillitatem in septo transuerso: ideo mouebat musculos intercostales sine intermissione, dicit Gal. esse difficile explicatu, an imbecillitas pertineat ad musculum septi, vel ad neruos, vel ad aggregatum ex utrisque: poterat igitur esse primaria affectio in ceruice, vnde nerui vestientes septum prodeunt: poterat quoque esse in septo, nisi igitur exactè locus affectus cognoscat, de eura actum est.

Alium casum affert Galenus 1. de loc. aff. cap. 6. de illo iuene Grammatico, qui ob læsionem oris ventriculi in comitalem incidebat: hæc ferè sunt Gal. verba, Grammaticus quidam iuuenis quoties vel vehementer doceret, vel cogitaret, aut in ediam sustineret, vel irascere, comitali morbo corripiebatur. Addit per consensum ab ore ventriculi id euenisse: Curatus fuit à Gal. dando ei tertiam vel quartam horam panem rectè paratum, & vinum album modicè astringens, vt os corroboraretur.

Postremò ne prætermittamus hepar, quod quam sepius in consensum aliarum partium corporis degenerat, asseramus locum Gal. 5. de loc. aff. 7. vbi sympathiam vicinitatis cognoscimus, ostendendo quot modis afficiatur hepar per consensum vicinarum partium, hoc verborum ornatu refert Gal., hepar afficitur per consensum vel lienis causa, vel ventriculi, vel intestinorum, & maximè causa ieiunii, & mesentericæ venæ habituali intemperie refrigerare possunt omnes venas summatum partium iccoris, vnde intemperies peruenit ad totum iecur. Dum per consensum à pulmone, vel à septo transuerso, vel à rene: primò, quæ in gibba afficitur, & tractu temporis totum iecur, & nemo inficiabitur, nisi sit natura contentiosus, & indoctus.

Per relata exempla eleuari nos possumus ad cognitionem affectuum per consensum, qui contingere possunt in qualibet corporis particula, cum à Galeno sit hepar tanquam exemplar propositarum affectionum, quas per consensum à partibus circumiacentibus recipere potest; Quoniam respiciens ad consensum

vicinitatis dixit, quòd lien, ventriculus, mesenterium, & intestina partem hepatis concuà ledere possunt: dixit & præcipuè causà ieiunii. Refert enim ipse Galenus 6. meth. cap. 4. causas ob quas intestinū ieiunium sit sanatu difficile ait, tum quia ex omnibus intestinis est iccioris maximè vicinum, tum ob magnitudinē & multitudinem vasorum istius intestini: tum quia eius tunica est prætennis & neruosa, vnde bilem facile recipit; pulmo verò, renes, & diaphragma partem conuexam in sympathiam trahere valent; ad eundem prorsus modum, & eò expeditius cætera viscera, & cætera corporis partes, quæ non tanto pollent valore poterunt quoquouersum à partibus vicinis læsis malè verò, & totam malam sortem vicinarum partium suscipere.

Sed quoniam consensus multifariā sit, cum diuersorum generum existat; iactò hoc fundamento quod quilibet corporis particula ex se sana possit infortunium aliarum partium suscipere, & alieno morbo iactari; præstat in sequenti capite proprios affectus, siue idiopathias (quod in idem recidit) in suas partiri species; & sympathias ad eundem modum diuidere in suas differentias, vt deinde methodo certiori venari possimus specificas affectuum differentias in quouis ægrotante contingentes.

De Diuisione propriarum affectionum in affectus per essentiam & in affectus per essentiam, & per consensum simul
Cap. II.

Compertum est vniuersas nostri corporis partes afficiari posse, vel propria affectione, vel aliena, quæ vocatur per consensum: præstat hic breuibus exordiri à propriorū affectu diuisione. Dicimus ergo propriam affectionem, quam Græci idiopathiam vocāt, partiri in propriam cum dependentia, quæ partim sit facta, & partim fiat, vel in propria sine dependentia, quæ solū sit facta, quā primariā affectionem seu protopathiam appellant, quam diuisionem à Gal. 1. de loc. aff. 3. desumpsimus; & in hanc nostram iatrogiam collocauimus, quam Gal. hac verborū serie tradidit litteris, proprius affectus

fectus dicitur idiopathia, quem vocant etiam protopathiam id est primarium affectum; contingit tamen aliquando aliquem simul & per consensum, & propria affectione laborare cum in affecta particula per consensum permanens sit dispositio, neque dicemus ipsam primario, sed proprio, & secundario affici.

Admonet Galen. diligentissimum esse faciendum examen in affectibus complicatis, cum ferè semper corpora hæc nostra his complicatis sint perturbata affectionibus, quia modò videmus in vno, & eodem ægotante passionem propriam, quæ partim est in facto esse, & partim in fieri (in fieri vocatur passio quādo est facta, vel alia ab alia alterius visceris principali affectione, quæ nullam dependentiam habeat) modò verò videmus in eodem ægotante passionem aliquam, quæ omnino sunt in facto esse, & principales, & hæc alias, & separatas agunt radices, quæ à Galeno protopathiæ vocantur.

Admonet ergo Galenus, vt disquiramus in omni affectuum complicatione, quæ nam sit illa affectio principalis, quæ solum est in facto esse, & ab alia nō fouetur, & quæ sit propria, & dependens, quia sine hac cognitione de diagnostica, & therapeutica medicinæ parte actū esset; verbi causa sit ventriculus intemperie obsessus frigida, causa fouens sine recrementa frigida, & pituitosa à capite in ventriculum procumbentia, quæ tractu temporis adeo refrigerent, vt affectum proprium in ventriculo constituant, tunc intemperies ventriculi dicitur propria, sed partim in facto esse, & partim in fieri, vel partim per se, & partim per consensum, quod idem est; Cerebri verò affectio vocabitur protopathia, quia solum est in facto esse, & independens, & tunc si tractabitur, à qua affectione esset curatio incipienda, sine dubio erit ab illa, quæ fouet quæ est in facto esse, quæ est in cerebro, quia illa est causa fouens, & independens, vt iure merito protopathia vocetur, alioquin illa ventriculi passio redderetur indecibilis.

Præterea ægri inueniuntur sine febre adeo viribus prostrati, vt vix digitos moueant. Notat Gal. 4. de loc. aff. 4. primariam affectionem interdum esse ecrebrū,

interdum spinam esse intemperatam; qui igitur, vellet illos sanare, nō ijs, quos plene alunt, sed auxilijs adiungendis cerebro vel spinæ: Hæc sunt ferè verba Gal., imbecillitas interdum cerebri vitio, interdum spinæ primario laborantis ob intemperiem toti, vel diuersis partibus communicatur, quam vulgares medici non comprehendunt.

Hinc Galdoctissimè pro hac re discursus, à qua nimirum affectione in mixtis, & complicatis sit cura incipienda, 4. meth. cap. 4. habet hæc verba, morbus, qui iam permanens est, vel adhuc fit, vel nō: si adhuc fit (vt videlicet partim sit factus, & adhuc habeat fomentum, quo fiat, & conseruetur) à causa auspicandū, eamque remouendū; si non amplius fiat, ab effectu.

Similiter sibi consentiēs 7. methodi, ait si duo affectus coniuncti sint, vt vpus sine altero non auferatur, primo ille sine quo alter non tollitur, debet auferri, quā sententiam ubiq; reperit & præcipue in arte medicinali in ultima parte, dicens prius esse causam fouentem tollendam; verbi causa fiet catarrhus ob sanguinis acrimoniam, & à capite pulsus obrepet in artus, in pectus, & in alias partes; tunc non est rationi consonum, ut cōfugas in illa pectoris affectione ad penidiam, ad liquiditiam, & ad cætera expectoratiā, ut est in more empiricorum, qui nunquam nisi fortuito protopathiam cognoscunt, quia irritū redderes negotium, & nunquam curares; quare par est tunc ad protopathiam confugere, quod esset corrigere acrimoniam sanguinis, & viscerū calorem compescere, & demulcere, unde tota proluius suum trahere uidetur exordium.

Cæterum cum materies hæc uniuersa uberius tractanda sit in libro de indicantium æquilibrio, in proprio loco, & multis exemplis ibi sit illustrata, non est, ut de hac re in præsentia ulterius proueamur, cum satis sit hic colligere affectus proprios alios esse tantum in facto esse, & principales; alios uerò in facto esse, & in fieri, & curationem esse incipiendam à principali, & independenti affectione, quam Græci protopathiam uocant.

Methodus Breuissima, qua in cognitionem affectuum propriorum, principalium, & per consensum ducimur. Cap. III.

IN præsentia opus est methodum aliquam perquirere, quæ nos docere possit, quando affectio propria sit principalis, & quando sit dependens, & per consensum: Quinque igitur mihi uidentur constitui posse fontes, à quibus colligere possimus, tanquam à sufficientissima signorum syndrone hoc summi momenti quesitum.

Vt primus fons sit habere cognitionem partium primo loco affectarum, nam scientes, quæ pars prius læsa fuerit, illico sciemus affectionem illius partis esse independentem, & non fieri ab alia affectione, & hanc sæpe inuenimus esse protopathiam, vel principalem affectionem in illo ægrotante: Quomodo autem cognoscatur aliqua pars læsa, & quando lædatur, egimus in primo libro, in capite de signis locorum affectorum, unde facile possumus colligere, quæ pars sit affecta, & quæ primo loco afficiatur.

Cæterum, quamuis valde conferat ad congoscendos proprios affectus hæc prima conditio, quæ primū fontem constituit, attamen non sufficit ut huius primi fontis cognitionem habeamus, quoniam aliqua corporis particula prius potest lædi, & deinde eadem læsio alteri parti communicari, ut ab hac secundo loco affecta parte plura, & lethalia symptomata possint emergere, quæ nullam fomentationem habeant à parte primo loco læsa, quinimò affectio, quæ est in parte secundo loco læsa, sit in facto esse sit independentis, & principalis in illorum affectuum complicatione.

Exempli causa ventriculus læditur à nimis eduljis, ob quam læsionem caput ingrauescere incipit, & ab ipso capite incipit falsa distillatio procumbere in pectus, interim inedia, vel aliud leue auxilium illam primariam ventriculi affectionem reprimit, tunc si ageretur de statu illius ægrotantis, & de falsa distillatione: ubi poneres protopathiam? non in ventriculo, quamuis primo loco fuerit læsus; quia

placido adiuncto auxilio, stomachi labes est ferè ablata cum stomachi illa prima ægritudo malam valitudinem capitis non amplius fouet, ergo principalis, & independentis causa erit in cerebro, quod secundo loco læsum est; valebit tamen consequentia, est affectus partis primo loco læsæ, ergo est independentis, sed non possumus semper inferre, est affectio partis primo loco læsæ, ergo est principalis; ecce ergo quod præter primam conditionem requiritur alter fons, vel altera potius animaduersio, quæ determinet, & magis distinctè declaret hanc affectionem principalem, quam protopathiam vocant.

Erit igitur secundus fons, in quo conditiones, & proprietates locorum affectorum collocabimus, sicuti si de falsa distillatione proposita in pectore collecta loquamur, tunc quamuis ventriculus primo loco sit læsus, attamen non est ventriculi proprium distillationem falsam mouere in pectus, sed est capitis proprium; caput enim ob eius alteratricem læsam potest colligere grandem pituitæ acerrum, quippe si diutius moretur, falsedinem recipiat, & inde à capite in pectus procumbat: ecce quod capitis conditio hæc, quæ est in pectus mouere catarrhum, nos quoque docere potest principalem affectionem, quare non solum conferat ad cognitionem protopathiæ cognoscere, quæ pars primo loco læsa sit, verum etiam cognoscere conditiones, & proprietates viscerum.

Amplius, ut alijs abundemus exemplis, sit caput primo loco læsum, & ob distillationem perpetuam tussim faciat, & deinde perennis motus factus à tussi excitet magnum feruorem in partibus naturalibus, in hepate præcipuè, quod igne ferè emicans redditum sit, inde diarrhœa incipiat patientem opprimere, tunc non satis est percurrere per primam conditionem, quæ est cognoscere partem primo loco læsam, ut cognoscamus principalem affectionem, quia caput est læsum primo loco, attamen non est protopathia in capite, sed in hepate, quare per secundum fontem percurrentes, quod est expendere, quænam sint conditiones, & proprietates partium læsarum poterimus tutius principalem affectionem adsequi: nam si cuti proprium est capitis pellere in pectus humo-

humores salios, sic proprium hepatis est gignere bilem, & inde facere diarrhoeā; quare, quamvis in hoc ægrotate sit lesum primo loco caput, & deinde pectus, & tertio loco iecur, & demum venter; nihilominus omnium horum affectuum principalis erit ille, qui est in hepate, non in alijs partibus.

Sed quia non sufficiunt adhuc hæ duæ conditiones, scire nimirum partem primo loco læsam, & viscerum proprietates, & conditiones, quoniam posset accidere; quod hepatis faciens diarrhoeam propositam habeat fomentum ab aliquo errore externo, vel ab errore alterius visceris, ut propter ea hepatis affectio non sit principalis, sed per consensum, & per accidens.

Propterea præter duos fontes requiritur tertius fons, vel tertia animadversio, quæ nos maximè docere potest protopathiam, quæ in hoc consistit, ut examē instituamus, an affectio illa, de qua agitur sit per se, vel ut clarius loquar, sit in facto esse, & permanens, quia affectio non potest esse principalis, & in facto esse, vel protopathia; nisi sit permanens, & per se, Galenus 2. de loc. aff. ultimo dicit tunc affectum esse proprium, quando permanere incipit. Dat exemplum de delirio in laterali affectu dicens si permanear singulis horis, factum esse affectum. Dat exemplum de bubone ob aliquid vlcus; si mitigato ulcere, mitigatur, est per consensum, si non mitigatur est proprius: pro qua contemplatione facimus caput sextum primi libri, ubi docuimus resolvere affectiones omnes in fieri, & dependentes ad affectum aliquem principalem, qui sit in facto esse, vel qui indideret, & medicum alliciat; ibi enim ostendimus quo pacto ab infimis, & notissimis symptomatibus, quæ sunt qualitates mutatae, euchi nos posse ad cognitionem exeuntium, & rerentorum præter naturam: ab ijs ad actiones læsas, & ab actionibus læsis ad constitutiones præter naturam, quæ ex necessitate sunt affectiones propriæ, & quas solas medicus curare debet, quia sunt permanentes, & in facto esse.

Hinc decisum est, neminem vocare posse affectum in fieri, principalem, vel proprium; & merito, quia quis vocaret

icteritiam, vel fluxorem muliebrem, vel gonorrhoeam affectus proprios, & per se, vel principales; ratio enim vnica, & singularis est, quia eximentia non habent proprias radices, cum sint in fieri, & supponant actiones retentrices læsas, à quibus dependent.

Similiter quis vocaret phrenesim, vel epilepsiam, vel tussim, & alios similes affectus, qui sunt in fieri, affectus proprios, & per se, cum pendeant ab alia radice, quæ in partibus similibus, & dissimilibus sita est? quare cum actum sit in primo libro capite citato de methodo cognoscendi affectus per se, & qui indicant; non est, ut iterum eadem repetamus.

Sed quoniam constitutiones partium corporis possunt esse læsæ per se, & simul per accidens, vel per consensum, quod idem est, debemus ut consequamur hanc cognitionem, quando videlicet pars sit læsa tantum per se, & quando per consensum constituere alium fontem, in quo duo signa collocentur, quæ certò determinent, quando passio sit per se; alterum est temporis diuturnitas, alterum est corporis habitus mollis, & fragilis; temporis diuturnitas requiritur, quia si aliqua pars diutius passa fuerit affectionem aliquam per consensum, consensus versus erit in affectionem propriam seu per essentiam, & per se; deinde requiritur habitus fragilis, & mollis; quoniam si præter diuturnitatem temporis habitus quoque fuerit mollis; affectio sine dubio reddita erit permanens, & per essentiam: Si uerò altera conditio desit, ueluti si multo temporis tractu pars corporis affectione esset correpta; atamen habitus illius corporis fuerit fortis, credendum est ob resilientiam patientis affectionem non esse per essentiam, quare colligimus temporis diuturnitatem; & habitum mollem significare affectionem esse per essentiam, temporis uerò breuitatem, & habitum forte in significare affectionem esse in fieri & per consensum.

Demum cum ad cognitionem affectuum, qui lacerant partes uiuentes per sympathiam, ualde conserat cognitio cuiusque sympathiae, constituimus quintum fontem in quo collocare possumus omnes sym-

pathias, dicendo omnes consensus, vel sympathias fieri, vel propter vicinitatem partium, vel per continuitatem partium, quæ à Gal. vocatur consensus generis, vel continuitas propter operis familiaritatem; de qua triplici sympathia in capite sequenti agemus.

Expediit ergo ad cognoscendas affectiones proprias, per se, & principales, præter alias animaduersiones confugere ad inquirendos consensus hos, de quib. in præfenti libro diligentissimam faciemus considerationem, quoniam quando cognoscemus nullos esse consensus inter partes aliquas, tunc tractantes de affectuum complicationes, quoniam affectio sit principalis, & quæ per consensum, non errabimus; & rem claram reddemus his exemplis.

Si contingeret, quod intestina, splen, mesenterium, hepar, & os ventriculi læsa sint, & deinde exurgeret aliquis tremor in extrema manu, tunc si ageretur de affectione principali, quæ efficeret tremorem manus, deberes illico expendere, an sit consensus inter hepar, mesenterium, intestina & manus, & quando nullus esset consensus non possemus dicere, stomachum esse principaliter affectum; unde tremor manus traheret ortum.

In hoc casu Lyeus valde errauit, quia dicebat à stomacho tremorem manus oriri, cuius sententia rursus à Gal. quoniam nullus seruari pot. si consensus inter ventriculum, & in manus, non generis, quoniam tremor pertinet ad facultatem motuam, quæ à stomacho non prodit, cum nullus mittatur neruus à stomacho ad manus: non consensus vicinitatis, & tanto minus operis familiaritatis: infert ex cognitione sympathie Galenus radicem se i protopathiam tremoris manus in alijs locis sitam esse, sicuti in vertebis ceruicis, vnde mittuntur nerui ad manus, quam cognitionem principalium affectionum, & earum, quæ per consensum fiunt nullo modo sine anatomia comparare possumus.

Quo pacto verò completa consensuum cognitio sit comparanda, in alijs capitibus omnes consensus difficiles tum neruorum, tum musculorum pertractabimus, & infini os ferè empyricorum errores

hac cognitione anatomica adiuti corrigere poterimus.

Colligimus ergo nos, protopathiam tunc attingere, quado quinque videbimus conspirare fontes, vt primus sit cognoscere, quæ pars primo loco læsa sit: secundus animaduertere proprietates partium læsarum: tertius cognoscere, an affectio conueniat per se parti læsæ, quod cognoscetur per tertium, & per quartum fontem. Quinto, & vltimo exactè cognoscemus affectionem esse principalem, quando nullus erit consensus illorum, qui consistunt in vicinitate, in consensu operis familiaritatis, & in consensu generis, ex quibus animaduersionibus promptè admodum affectiones colligemus, quæ sunt in facto esse, quæ indicant, & quæ sunt principales.

De diuisione consensus in suas differentias. Cap. IV.

OMnis partium corporis sympathia, vel consensus à Gal. tum in propria disputatione aduersus lycum, tum in lib. de morb. vulg. vbi casum pythionis declarat, in tres differentias commodè diuiditur, aliam dicit esse sympathiam generis, aliam esse operis familiaritatis, & aliam vicinitatis: per sympathiam generis intelligimus illum consensum, qui communicatur alteri parti ob eiusdem partis viuētis cōtinnitatem, sicuti læsa ceruice ladinur manus, quoniam neruus vestiēs manum à ceruice depēdet, & consensus per eiusdem nerui continuitatem seruatur; quod dicimus de neruis longis, idem dicendum de musculis longis, & de venis, veluti si ventriculus coinquinaretur, vel repleretur ichorib. melancholicis transmissis à splene per fureculum venæ portæ, quippe à splene ad ventriculum mittitur, quæ sympathia generis nō erat à ventriculi orificio ad manus, vt propterea dicat Galenus, toto celo errasse lycum asseuerantem, tremorem manus à stomacho prodire, cum nullus neruus prodeat à ventriculo in brachia.

Neque approbamus illum consensum inter iecur, & manus. Rasis lib. 17. & Auicennas secunda primi doct. 3. cap. 1. & 14. secundi tractatu primo dicunt bre-

uitatem manus indicare paruitatem iccoris & manus longitudinem iccoris magnitudinem. Vanus est iste consensus, quia venæ non oriuntur ab hepate, vt ostendimus. Hinc Auer. 4. colligit 4. irritet Auicennam de hac re.

Cōsensum verò, qui fit ob familiaritatem operis, refert Galen. esse veluti inter vterum, & mammas; & inter omnia viscera, quæ sunt ordinata ad opus aliquod commune; & quamvis dicant aliqui, consensus operis familiaritatis fieri necessarium per venas, vel per vasa alia communia sensibilia, & dicant, venas prodentes ab utero, & à mammillis vtrinque coire, vt propterea consensus iste, qui dicitur operis familiaritatis in idem recidat cum generis consensus atramen, qui diligentius anatomiam intuentur, nullos videbunt furculos à mammillis prodentes cum vteri venis coalescere; quare cōsensu operis familiaritatis omnino est distinctus ab alijs; sed quicquid de hac re, si quis aliter sentit, non certet nobiscum; sed erigat disputationem aduersus Galenum; & innumerabiles eius assecclas, cum quibus hoc habebit fastidium: nos enim ab ipso recepimus hanc differentiam cōsensu operis familiaritatis, & quævis nulli vas sensibile commune existat, & merito, cū possit sympathia per insensibilia vasa seruari, tanto magis, quanto Epigastrica vena nullo modo coir cum māmāria: Epigastrica enim à ramo illiaco cauæ descendēris, & aliquādo à crurali oritur: māmāria verò à ramo cauæ ascendēris, quem ramum subclauium vocant; hæc solum capillari modo mammas attingit.

Consensus verò vicinitatis est differentia notissima, quia mutuo consentiunt partes vicinæ tum per meatus sensibiles, tum insensibiles; totum enim corpus est transpirabile, & per vasa nobis latentia, natura admodum promptè mouet, vt partes vicinæ, quamvis nulla essent vasa manifesta, vel opus aliquod commune, intercederet, videntur tamen quotidie ob viciniam solam sine alijs ductibus manifestare partes alias corporis nostri in sympathiam, quam citissime trahere, sicuti obseruamus inter vesicam, & intestinū rectum, inter intestina, & anchas, inter os ventriculi, & cor, inter stomac-

chum, & pulmonem, magnas videlicet esse vicinarum partium sympathias, quæuis nullum vas intercedat commune.

Numquid in affectibus vesicæ, vel in ischiade enemata varias afferunt utilitates? & in affectibus cordis, ore vetriculi medicato, cor emolumentū recipit? Sicuti vidimus in Matrona illa præclarissima Sophia Priola malis boletis fere suffocata, quæ animā, vt inceperat, efflasset, nisi oleo è corticibus citri extracto ei præstato fuisset; quia tunc vix respirabat, tantū viæ illæ, per quas meare solent spiritus vitales, crassissimo malorū boletorū hialitu erat occlusæ, attamen ore ventriculi illo interno roborato oleo de citro per os assūpto ad quinque guttas, tale inditum, fuit robur cordi per partem vicinam, vt crassissimo flatu illius olei virtute secto, atque extincto, eius cor statim sanatum fuerit.

Ad eundem modum seruatur consensus inter tracheam, & tracheam, inter ventriculum, & pectus; quoniam si poculenta frigida, atque glaciata hauriantur, illic tussis ob viciniam excitatur, si edulia crassa fumantur, orthopneam asthmaticis pollicentur. Simili modo expectorantia, non solum quia laryngem emollient, sed etiam postquam in ventriculum regesta sunt, vijs nostrum sensum fallentibus, ob viciniam manus aliquas pectori dare vidimus.

Ceterum insudabimus in sequentibus capitibus huius libri potiora aliqua exempla proponere de consensu quolibet, & præcipue plura ab anaromia desumpta de consensu generis, qui obseruatur in longis musculis, & neruis, & cæteris corporis partibus, vnde ob magnum anatomie fructum nos in cognoscendis causis, & morbis, magnum quoque haurire poterimus emolumentum; sed à nonnullis exemplis auspicabimur de consensu vicinitatis, & operis familiaritatis, quibus explicatis ad sympathiam generis totum discursum dirigemus.

Errant, dum dicunt magnum iccoris calorem extinguere caliditatem ventriculi, vt lumen manus extinguunt manus. Cap. V.

OB iccoris incendium ventriculum calore suo priuari, & inde frige-

re, tota propemodum medicorum scola uideret asserere. Plurimi enim credunt in unico homine esse incompatibile, quod iecur, & uenter simul calida sint, neque alium modum quo id fiat imaginari possunt, nisi quod calor maior extinguat minorem, sicuti lumen maius destruere solet minus: rationem afferunt; quoniam lumen maius pabulum minori attrahit, & absumit; unde minus laquet: Ad eundem modum dicunt iecur caloris feracissimum omnem ventriculi caliditatem destruere, quatenus ipsius pabulum absumit, quo absumpto, deinde languet ventriculi caliditas, sicuti languet candela lumen ob solis praesentiam.

Ceterum, cum, haec ventriculi frigida lates ab hepate calidissimo re vera prodeat, & ex altera parte nullus sit consensus inter caliditatem hepatis, & frigiditatem ventriculi, excutienda est materia haec, ut assequi possimus, cur ventriculus imbecillus, & frigidus fiat à caliditate intentae iecoris. Prius tamen par est fundamentum salum radicitus euellere, dum dicunt, quod maior calor tollat minorem, sicuti lumen maius destruit minus, quod tumentum si de medio leuabimus; deinde plures alios errores consequentes primam hanc radicem extempore euellimus.

Quod uero lumen minus re vera non patiatur à maiori, sed oculis nostris hoc solummodo appareat, aliquam experimentorum seriem proponamus; Numquid remi pars immersa in aquam curua videtur? tunc enim decipitur sensus circa sensibile ob impedimentum medij, sic lumen minus coram maiori nobis occultatur, nulla facta mutatione in minori ob medium alteratum; at hoc non dicitur tolli, sed obscurari, & sensibus nostris occultari.

Præterea quemadmodum ubi quis voce summissa canit, ubi quam plurimi clamore obstreperunt, prorsus non auditur, attamen illa vox ex se non diminuitur, vel de medio tollitur; quinimò in medio viget, & eo modo conseruatur, veluti quando auribus percipitur.

Ad eundem modum ubi esset aliquis reter odor in cubiculis, exemplo excitantur vapores, & fumi odorati, neque

Sanctiorij Sanctiorij Pars I.

ultra sensus noster percipit malum odorem; non propterea species noxij odoris, quamuis ab arabico, & suauissimo halitu supprimitur, de medio est ablata, quemadmodum Gal. lib. 3. de humoribus cōm. vltimo dicit dolorem vehemetiorem obscurare minorem, non tollere continui solutionem: ut merito ex Aristotele sensus, & sensibile, scientia, & scibile sint re latiuæ extra suum genus, quæ vocantur secundum dici, & nequaquam secundum esse, ut non valeant consequentia, non sentitur, ergo non est sensibile; non scitur, ergo nō est scibile, vel tali pacto sentitur, ergo tali modo est, vel taliter est, ergo taliter scitur; quoniam forsitan datur quadratura circuli, attamen nescitur, quare, & sensus circa sensibile, & intellectus circa intelligibile sæpius decipi possunt.

Sed alia afferamus exempla; vina potentissima aqua castigata, quæ iuxta positionem; & non vera mixture miscentur, licet respectu nostri gustus videantur diminuta, attamen vires non auferuntur vini, quoniam illa meri portio in ventre dissociatur, & suas nullas perdere potest vires, quia virtute caloris naturalis vinum ab aqua seceratur, & inde nutrit vinum, ac seorsum eorum esset.

In tactu demum non desunt exempla, quibus possumus hanc materiam illustrare, ut de aqua feruente, quæ mixta cum frigida reporem acquirit, non quia feruor euanescat, sed quia vnitus diffunditur, & nobis solum occultatur; & simili modo aqua frigida mixta cum feruida operatur, non tamen in nihilum abit, sed diffusa conseruatur; quare frequentissime aliter res se habent, quam sensus nostri percipiunt.

Simili modo dicendum est de lumine maiori, quod nullo modo tollere possit minus, sed dumtaxat ob praesentiam maioris sensibus nostris minus lumen occultetur, quare inferimus ex his caliditatem iecoris nullo modo refrigerare posse ventriculum, quinimò caliditatem iecoris necessario ventriculum re vera calfacere.

Quomodo autem res se habeat, quod ventriculus videatur refrigerari à calidissimo iecore, ne pluribus verbis tempus conteramus, adeamus Galen. 2. aphro. 35.

E

qui

qui perfectè nos docebit quo pacto accidat, ventriculum refrigerari a iecore calidissimo, ubi habet hæc verba, Quædam hypocondria sunt tenuiora, quædam crassiora, & hæc sunt meliora, tenuia sunt mala, vt signa, & vt causæ, signa sunt imbecillitatis in partibus eliquaribus, causæ verò, quod coctio bona non fiat in ventre, neq; sanguificatio in hepate est, quia à crassitie hypocondriorum concafactum vtrunq; venter & hepar iuuantur. Sciendum itaque est ad bonam coctionem comparandam non solum tunicas ventriculi conspirare, verum etiam consentire in hunc finem viscera omnia circumiacentia, quæ suo calore, ac si essent focî, & carbones, qui ollam ebullientem circumducerent, fouent inditos cibos.

Adiunt circa partem supernam ventriculi, cor, pulmo, diaphragma, quæ suo motu, & continuato calore coctione opitulantur: circa infernam est iecur, & proxima sunt hypocondria, omentum, & intestina: sunt quoq; venæ maiores, renes & splen, vt omnia hæc quo magis calida sint eo potius in concoquendi negotio se gerant, vt talis coctionis causa nō sit sola alteratrix illa sita in vetriculi tunicis: quia hæc munia concoquendi iuuantur ab omnibus circumseptis igniculis, & focis, perinde ac tot carbones lebetem quandam circumuenerent: quare quemadmodum manus calor carbonum non refrigerat lebetem, similiter iecoris incedium nullo modo poterit ventriculum refrigerare, omnes enim partes circumdantes vetriculi iuuant vt ocyus elixet, ocyusq; attenuet quod est in ventre ingestum: chylus tamen amulatur in colore præcipue vetriculi tunicas, quæ sua natura albæ sunt, ut obseruetur effarū philosophicum, quod agens proximum, & immediatum introducat pro posse suum simile, & propterea albescat chylus à tunicis vetriculi, & non ab alijs visceribus.

Simili modo pus cum fiat ab humore, incluso inter spermatikas partes sua natura albas, albescit quemadmodum, ut fiat pus perfectum, & album hesis partibus adiunguntur tegumenta, uel emplastra calorem retinentia, ne abeat foris calor, & adiunguntur calidas, & humida fouentia per similitudinem qualitatum, simili-

ter dum ventriculus fouetur ab hypocôditijs calidis, humidis, & crassis, quæ sunt ueluti tegumenta, ocyus concoquit, cum ob crassitiem prohibentem, ne calor exiliat, tūm ob calorem pinguedinis, quia simile gignit & auget.

Dicimus ergo cum Galeno, quod hypocondria multa donata pinguedine tūm calfaciunt & humectant, tūm prohibent, ne amittatur calor; iuuant enim per similitudinem calorem naturalem multiplicantiā dum calfaciunt, & humectant; quia concoctio est elixatio, & elixatio nō potest fieri nisi à calido, & humido; nulla certè inueniri potest caliditas, & humiditas magis proportionata concoctionibus viscerum, quam illa, quæ insita est in pinguedine; quinimò dum ad coctionē apostemata uolumus reducere, sumimus pinguedinem; quia aliud auxilium hæcenus non est intentum, quod magis possit ad saniem moliendam, quam animalium pinguedines, quare tanto magis hypocondria, omentum, & omnia circumiacentia viscera propria pinguedine referta in uisceribus ipsis summam poterunt afferre opem in concoquendi negotio.

Neque uera est opinio illorum qui putant, uentriculum ali chylis propria nutritione: quia nihil nutrit, nisi prius transierit primam, secundam, & tertiam, coctionem.

Neque accipimus Auicennæ opinionem, quod interna tunica vetriculi nutriatur chylis, & externa sanguine.

Neq; Zoar rectè sentit, quod superior pars vetriculi uersus orificium alatur chylis, inferior sanguine: quia etiam in superiori parte est uena coronaria, quæ subministrat alimentum stomacho.

Neq; opinio Thomæ à Veiga, Ioberti, & Valesij uera est, dum dicunt, uentriculum ali chylis, quia Gal. 4. de u. p. & 3. de naturalib. fac. dicat, uentriculum ali chylis & refici: quia dicimus refici & ali nutritione uoluptuosa, & non uera & propria, illo modo uidelicet quo alitur lien succo meli chol. & uesica felea ipsa bile.

Ex traditis superius proponimus hæc conclusiones: Prima conclusio, quod iecur ualde calidum non relucetur alteratri vetriculi, nisi mediātē, & per accidendū. Secunda conclusio, quod iecur ualde calidum

dum per se impertiatu primæ coctioni emolumentum : Tertia, quod ventriculus sua natura, vel suis tunicis calidus non possit probè concoquere chylum tenuissimis existentibus hypocondrijs.

Prima, & secunda conclusio est Gal. & Aristotelis dicentium similia similibus conservari.

Tertia est Gal. 2. aph. 35. qui nullam in medium attulit causam, cur iecur calidum officiat ventriculo, nisi quia hypocondria ob iecoris incendium reddantur tenuia, ratio cur nō pinguescant est, quia à seruore viscerum liquefit seuum, quare falsum est dicere caliditatem iecoris eo modo ventriculū destruere, quo lumē maius extinguit minus, vel propterea destrui calorē ventriculī, quia maior calor hepatis absūmī pabulum, & humidū radicale ventriculī; de qua re ne verbum quidem Gal. eum rotam causam, cur ventriculus sit imbecillus, quando calor insignis est in hepate, referat in tenuia hypocondria, crassa enim calfaciunt ventriculū per se, & per accidens; per se, quia pinguedo cum habeat vim calfaciendi potest suo calore magnum præbere emolumentum; per accidens, quatenus ob crassitiem hypocondriorum, conservatur calor vnitus ventris, & omnium viscerum circumiacentium.

Errant, qui vtuntur remedijs calfacientibus in ventriculo rugitibus pleno laeso ob caliditatem hepatis: in quo exemplo observantur affectum protopathia, idiopathia, & sympathia. Cap. VI.

DVum hypocondria prorsus sunt pinguedine destituta ab hepatis incendio, ventriculus adeo robore spoliatur, vt non solum munus suum coquendi perfectè explere possit, sed quod deterius est, reddatur, tanquam sentina, & cloaca excrementorum hepatis, splenis, & aliarum partium circumiacentium, vt hinc leuissima data causa, angore, & varijs passionibus vexetur.

In hoc casu vel maximè errare solent nostrates empirici, qui neque dubitant, nec animo cōcipere possunt, aliquem affectum curandum esse in alio loco, quam ubi symptomata vident, & semper illum

affectum primo curant, de quo patientes conqueruntur, siue sit morbus, siue symptoma, siue sit affectus per essentiam, vel per consensum, siue sit proprius, vel principalis: propterea si in ventriculo reddito imbecillo ob iecoris nimiam caliditatem vident dominari statum, & rugitus, & plurima incocta, vel supernè; vel infernè excerni, illa ventriculi symptomata curant, neque credunt in alijs visceribus esse posse veram causam, vnde symptomata pendent.

Sed quod valdè deterius est, credunt symptomata, & omnem ventriculi imbecillitatem prodire à causa frigida, & miseros hos patientes calidis alterantibus tractant, quem errorem reieciimus in primo libro capite 22. vt non sit, quod de hac re amplius loquamur, nisi quantum pertinet ad perquirēdas sympathias, & idiopathias dependentes, vel independentes: propter quam cognitionem secundum hunc librum composuimus.

Dicimus ergo, si ob incendium iecori, reddita sint hypocondria tenuia, & inde redditus sit ventriculus imbecillis, quod primaria affectio, seu protopathia, quæ prius omnibus debet curari, sit in hepate: affectio verò quæ dicitur idiopathia, quæ partium est in facto esse, partium in fieri sit in hypocondrijs: sympathia siue affectus per consensum, qui sæpè nihil indicat, sit in ventriculo; ratio est, quia caliditas illa insignis hepatis est prima causa, quæ colliquans pinguedinem introducit affectum proprium in hypocondria, quippe qui quatenus pendet ab hepate, est in fieri, quatenus verò iam reddita sunt diminuta hypocondria, est in facto esse, denum per consensum huius affectionis ventriculus redditur imbecillis, vt propter affectum hepatis primarium, & propter affectum hypocondriorum proprium, ventriculus malè coquat, & in frequentem sputorum proluuiem cibum conuertat, vel alia parit symptomata, prout corpus vario modo dispositum est.

In aliquibus enim hæc incocta, excernuntur per alium; in aliquibus per vomitum; in aliquibus illa excrementa petunt caput, & in alijs, qui in paulò deteriori statu sunt, faciunt tumores in splene, vel ventriculo, vel in alijs cir-

cuiacentibus partibus.

Quare si horum omnium symptomatum prima causa, & origo est iccoris incendium: qualis error maior esse potest, quā non distinguere idiopathiā à sympathia, & cæcorum more in hoc casu calida; & sicca alterantia præbere ijs ægrotantibus hoc modo dispositis, vt diximus? heu miseris, quorū his oculis vidi co inquinatos rugitibus, & flatibus perpetuis, inuenesq; emaciatos, qui horū medicorum consilio perciti china, salsas, guaiaco, iusculo galli, aquis tercij, stillicidijs aquarū thermarum, vel oleis calidis, confectione diatrion pipereō, & similibus sint vsū, quorū omnium vsu deinceps redditi sunt ita emaciati, & graciles ob liquefactam omnifariam pinguedinem omenti, & cæterarū partium, vt nullo vnquam tempore, quod perdidere medicamentorū maleficio sint amplius cōsecuti, sed in dies prolapsi sint in maiorem ventriculi ruinam. Hipp. 2. sectione aph. 35. habet hanc sententiam, in quouis morbo partis, quæ ad vmbellum, & imum ventrem attinent præstat esse crassiores, & merito, quia calor naturalis à partibus crassis fit vegetior: pinguedo enim est tamquam puluinar fouēs calorem: ideo in omnibus morbis crassitudo abdominis commendatur: tales non ita lædantur à pharmacis, vt illi, qui habent emaciatum ventrem, quibus medicamenta efficacia summè nocent.

Ex alia parte nonnullos alios noui ad eundem modum emaciatos ob easdem causas, qui, sprete, medicamentorum consultatione, indulserint prolixius poculentis, esculentisve, qui obsoniorum omnium blanditijs, qui symposijs dominorum erant dediti, attamen temporis intervallo hilari suo animo meliorem, & tandem optimam sibi comparauerint valetudinem, vt maiorem medelam receperint ex ferculis fortuito haustis, quam ex consilio rudiorum medicorum.

Quare videas quantum expediat discutere, vnde prodeant symptomata, & expediat refecare affectuum omnium, complicationem ad methodum, quæ doceat distinguere affectus per consensum à proprijs, & proprios dependentes, à protopathia.

Nec obijciant frigida non posse con-

uenire imbecillo, & infirmo ventriculo, quia contra hanc suam sententiam clarissimum est Galeni testimonium in methodo his verbis prolatum 7. metho. 4. vidisti tu quosdam vno die, vel potius hora frigida potione leuatos fuisse imbecillitate ventriculi?

Ad hæc numquid plures inueniuntur tales, qui sunt temperamenti calidi, & sicci cum hypocondrijs his tenuissimis, & iuuenes a liquin fortes, & optima sanitate præditi, optimis alti ferculis, non crapula obruti, non libidinis blanditijs dediti, qui ob insignem hepatis calorem ob ortu naturæ comparatum his symptomatibus ventriculi cruciari solent.

Nec mihi dicant Empirici isti, qui credunt omnem imbecillitatem ventriculi prodire à frigida causa, esse prorsus impossibile icore calidissimo existente ventriculo calidum conservari; quoniam in primis contra illos est Galeni auctoritas 7. meth. iam citata, vbi ostenditur imbecillitatem ventriculi aliquando prodire à calidis causis.

Causa verò cur in hepate calido, & in corde, & ventriculo calido oriatur imbecillitas, vt diximus, sunt tenuia hypocondria, nō ventriculus ipse, quia non fit coctio in ventre sine concursu cæterorum membrorum, nec sanguificatio in hepate sine valetudine cordis, & cæterarū partium, nec spirituum generatio in cerebro sine subiectis visceribus adiuuantibus, vt totum hoc corpus animatum mihi videatur perbellè assimilari posse Testudini, vel Fidibus, quæ instrumenta tot requirunt cordas ad rectam harmoniam edendam, vt quæque edat sonum proportionatum, si verò vnica laxetur, vel nimium tendatur, omnium evertitur harmonia, vt quælibet videatur dissona, & inæqualis, attamen ex vnica tantum nō omnis incōsonantia prodit. Ad eundem modum, ventriculo solo, vel alio viscere lacessito omnia aliquid patiuntur per sympathiam, vel per cōsensum, attamen primo correcto errore, omnia desinunt pati, cum omnes partes in vnam actionem, & in vnum concentum conspirent.

Similiter natura in venis posuit humores acutos & crassos, seu graues quasi modularentur sanguineā massā: adeo vt
dum

dum solum continentia sed etiam contenta muscalem harmoniam emulari uideantur.

Sed ad nostros fontes conferamus hunc casum propositum in primo fonte expeditum an sit pars primo loco læsa, quam notitiam de locat. cognoscendis explicauimus in 1. lib. cap. 17. quare si cognouerimus iecur passum fuisse affectionem calidam, anrequam uenterculus passus sit imbecillitatem, inferemus aliquo modo, ergo imbecillitas uentriculi erit dependens ab hepate.

Sed non sufficit primus, nisi secundum fontem contemplerur, in quo collocantur conditiones, & proprietates locorum affectorum, quare cum iecoris calidi sit proprium reluctari uentriculo, sed non, ut lumen maius tollit minus, sicuti ostendimus, sed ut docuit Gal. extenuando hypochondria, ualde melius ex his duob. fontibus, qui sunt ex parte primo loco affecta, & ex proprietate uiscerum inferre poterimus, dicendo iecur passum est calidum affectum, & inde extenuata sunt hypochondria, & demum est facta imbecillitas in uentriculo; ergo alio modo tolli non poterit imbecillitas uentriculi, nisi refrigerantibus, quia si unicum uiscus alterius casu cadet, nisi alteri opem præstamus curare ægritudinem non possumus.

Deinde accedimus ad tertium fontem, ubi inquirimus, an affectio cõueniat per accidens, uel per se; cognoscemus autem affectionem aliquam non conuenire per se parti affectæ, quando illi parti non cõueniet sepe: quare si uelimus cognoscere, an hæc imbecillitas sit per se in uentriculo, uel p̃deat ab alio uiscere, & per accidens uentriculo cõpetat, est maxima diligentia obseruandũ, an læsio, quæ p̃deat ab imbecillitate, semper, & quæ conueniat uentriculo, dum exercet suum principale officium, quod est chylicare: si uerò per aliquot dies melius, & aliquando peius habeat, tunc imbecillitas non cõueniet per se uentriculo, sed ab alio uiscere trahet originem, ratio est, quia læsio per se erit in ipsa met uentriculi cõstitutione à qua pendet, ut umbra à corpore, ut ualeat cõsequencia, est læsa cõstitutio, ergo operationes pendentes à cõstitutione sunt semper læsæ, cum argumentum sit necesse.

Sanctory Sanctory Pars 1.

sarium à per se de omni, ut propterea perpetuas læsionis sit signum peroptimum pro cognoscenda particula per se læsa; & quod de uentriculo dicimus de cæteris uisceribus intelligendum.

Demum ad quartum fontem accedimus, ubi cõsideramus duas illas conditiones, quæ faciunt affectus esse proprios, quæ sunt tēporis diuturnitas, & habitus corporis mollis, & infirmus; nam si aliquo temporis tractu in habitu molli affectio per consensum morabitur, fiet affectio per essentiam, si uerò habitus est fortis, scias, quod quamuis multis uoluentibus annis esset laceffus uentriculus à calore hepatis, quod affectio illa nullo modo posset fieri propria, & per essentiam.

Demum in quinto fonte collocantur sympathiæ sive consensus, quoniam affectus per consensum, uel sunt generis, uel uicinitatis, uel operis familiaritatis, & hos consensus expendere oportet, ut sciamus quem consensum præter naturam patitur tunc uentriculus; & de quibus consensibus diligentissime tractabimus in toto hoc libro, ut simul hanc methodum, & anatomiam perdiscamus.

Errant dum putant quamlibet situm positionibus auferri posse, in quo exempla obseruari poterunt sympathiæ generis, & uicinitatis Cap. VII.

CAusa, cur eadem ægritudo in eodem ægrotante eodẽ remedio non semper tolli possit, est, quia modo ægritudo conuenit læsis partibus per consensum, qui se uera non potest auferri, nisi auferatur radix, & modo ægritudo conuenit per essentiam; & est facta propria.

Accidere potest, ægritudinem esse factam propriam, at tamen fomitem alium de recipere, quam nisi auferamus, sanare est prorsus impossibile.

Idem accidere solet in hoc exemplo desiti, cum sit passio oris uentriculi: modò os uentriculi siti uexatur per consensum modò per essentiam; Gal. 6. de locat. aff. 3. & præcipue 4. de ratione uictus communi, primo dicit, situm fieri & per consensum ab hepate, icinno, æsophago, & alijs partibus. Si uerò sitis in ore uentriculi est per se, id est ob læsam cõstitutionem seu

per essentiam, tunc ex omnium consensu potationibus potest auferri, si verò est per consensum cordis, vt in febribus ardentibus, est impossibile potationibus eam auferre, quamuis maximam aque quantitatem eger hauriret.

Si verò sitis est per consensum pulmonis, non aque potio, sed (solummodo) aeris frigidi inspiratio sufficiens est ad demulcendam ingentissimam sitim, vt testatur reliquit Galen. pluribus in locis, sitim causatam ab inflammatione pulmonis non potationibus, sed aeris frigidi inspiratione auferri; affectio ergo hac, methodo tradita in 3. capite huius libri est considerata, atque examinanda, quando est per consensum, & quando est propria, & independens; quoniam nullo alio modo affectuum exactam notitiam consequi possumus, nisi per hanc methodum, quæ erit clarissima, & facillima, si exemplorum luce eam explicabimus.

Agentes igitur de siti in qua parte primario fixa sit, accedere debes ad primum fontem, qui declarat quis sit locus affectus primarius; & cognosces ex ijs, quæ dicta sunt in primo libro capite 11. locos affectos, & quis locus prius fuerit læsus.

Ex ijs verò, quæ dicta sunt in capite 3. huius libri, cognosces quis affectus sit primarius: deinde ex methodo per syndromen signorum communium tradita in primo libro inuenies pulmonem correptum esse calida intemperie, & deinde subsecutam fuisse sitim.

Videas quomodo ex ijs hæcenus traditis inferre commodè poteris protopathiam esse in pulmone: præcognito hoc, quod sitis oriatur primario à pulmone, cognosces necessariò ad caliditatem, & siccitatem pulmonis auferendam, potationes non posse conferre, quia non possunt ingredi tracheam sine suffocationis periculo, inferas ergo illud solum remedium refrigerans, & humectans sitim à pulmone inflammato ortam compescere, quod per tracheam immitti potest, & tale erit aeris frigidi, & humidi inspiratio; quia nullum aliud dari atque inueniri potest, quod per tracheam ad pulmonem excutrat, nisi aer.

Si verò in secundo fonte examini facias, ubi agitur de potentia partium læsa-

rum, videbimus per duplicem consensum, pulmonem posse communicare affectum siccum ori ventriculi, per consensum nimirum vicinitatis, cum pulmo sit valde proximus ori ventriculi, & per consensum generis, qui per continuas partes sit, ad eam pleura vctusque pulmone, quæ perrepat per tracheam ad guttur, & a gutture usque ad æsophagum, deinde æsophagus suis villis continuis illam siccant, & calidam qualitatem sumptam à pleura desert ad stomachum.

Postremo non satis est cognoscere protopathiam esse in pulmone, & sitim esse per consensum in stomacho, sed opus est expendere an sitis, quæ sit per consensum in stomacho, facta sit propria, vt partim sit facta, partim ratione lomentationis à pulmone sit in fieri, quoniam non solum auxilia refrigerantia, & humectantia essent applicanda pulmone, verum etiam stomacho, si verò solum esset in fieri, esset ridiculum credere potationibus auferri posse sitim.

Quare, vt hoc perfectè cognoscatur, ante oculos obijciendæ sunt illæ duæ cõditiones, quæ declarant idiopathiam, quæ in alio fonte sunt propositæ, altera est temporis diuinitas, altera verò habitus mollis, quoniam omnis sympathia, si diutius in parte aliqua corporis moretur, & pars affecta sit mollis, evadit idiopathia. Similiter ubi habitus est fortis, vel paucò temporis spacio ægrotudo vexet partem affectus erit adhuc per consensum, vel sympathiam, quibus omnibus cognitis ad eum apicem peruenies, supra quem (ni fallor) in arte medica ascendi non potest.

Errant extensione musculorum rectorum colligere mesenterium esse obstructum; offenditur nullam esse sympathiam inter mesenterium, & musculos rectos. Caput VIII.

In immensum cresceret volumen, si medicorum vulgariū errores omnes carpere vellem: malui ego suprema capita, quibus corrigi possint errores, ante oculos obijcere, & ad methodum varijs exemplis hanc de erroribus medicorum cognitionem redigere, vt methodi huius virtute infinitos alios præcauere errores possimus.

Afferatur illud commune erratū, dum sine ullo cōsensu spreta, vel omīssa omni cognitione anatomica dicūt, obstructiōne, vel tensionem illā abdominis vtrīnque in longum exportectam, quā re vera est rectorum musculorum, esse mesenterij, vel hepatis; & ab externa hac tensione, vel obstructiōne non solum putredines foueri, verum etiam inde præcipuum suum trahere exordium.

Error sanè est inexcusabilis, quoniam nullus omnino est cōsensu, vel sympathia inter musculos rectos, & mesenterium: non vicinitatis, quia mesenterium iacet sub intestinis, & nulla mesenterij pars supra intestina ascendit, quæ possit in abdomine manibus tangi, & cōtrectari: musculi verò isti recti non modò sunt superficiali, verum supra omentum, & peritoneum, & supra transuersales ventris musculos; quare nemo tangendo quamuis partem abdominis, poterit de statu mesenterij nisi esset aliquis tumor qui illud attolleret, aliquid certò decernere.

Nimium sanè distat sicu, & origine hæc duæ corporis partes, quia musculi recti a medio ossis pubis in externa parte pronascuntur, & rectis fibris ascendunt, vsq; & supra mucronatam cartilaginem & desinunt in sternum coherentes 6. & 7. costis, mesenterium verò est inter dorsum, & intestina collocatū, deinde supra intestina sequuntur omentū, peritoncū, musculi transuersales, quæ omnia mediāt inter musculos, & mesenterium: quomodo ergo cōsensu vicinitatis tensio hæc externa ostendat læsum esse mesenterium, & hanc tensionem transire in culpam putredinis, & diuersarum februm? eo magis quod millies in hominibus alioquin optima valetudine præditis tensio ista in longum extensa quæ est rectorum musculorū, inueniatur, licet nulla febris vel obstructiōne mesenterij obfessi sint, & integra fruatur valetudine.

Nec dicant inter musculos rectos hosce, & mesenterium esse cōsensum generis, quia forsā musculi isti recti sint inter texti surculis venarum eiusdem generis cum venis mesenterij, quoniam musculi abdominis circumuoluti sunt ramis proceduntibus à caua vena, mesenterium totum à portæ venæ surculis sit irrigatum,

vt nulla sit sympathia generis inter abdominis musculos, & mesenterium.

Ad hæc dato, & non admissio, quod ipsæ venarum surculi à vena porta proceduntibus ambo gaudent, & fieret propterea cōsensu generis, quid tamen, nūquid durities, vel tensio musculorum rectorum sit ex materia existente extra venas? nullus fieri potest tumor, nisi ab humoribus fluentibus à venis ad extra venas ad spatia nimirum, vt hinc optinè dicant, qui afferunt, venas non apostemar; quare cum tensio fiat à materia extra venas, & procul distet musculi recti, & mesenterium, nullus erit cōsensu generis: neq; est demum cōsensu operis familiaritatis, vt ad opus vel officium aliquod commune conspirent, quoniam partes, & muneris mesenterij discrepant valde ab officijs musculorum abdominis: Quopado ergo ex duritie ista externa in longum exportecta in epigastrio, de statu mesenterij iudicium forte poterunt.

Ceterum quando stat error tantūmodo in cognitione, & nō trāseat in operationem, & nihil prorsus ob insectiam medicæ, periclitetur æger, vt sit de hominum opinione, vnusquisq; æquo animo, compati errores potest, cum hominis propriū sit errare, & præcipuè Medici, cuius insectiam libèter pati possumus, cū plura ad hanc artem pertinentia sub innemsa caligine delitescat. Plura requiruntur, vt medicus non erret: Gal. lib. de const. ar. med. c. 7. dicit septem requirū primū vt sit natura perspicaci, secundū educatio à teneris annis in primis disciplinis, vt in Geometria, & Arithmetica: tertium quod habuerit optimos præceptores: quartū quod sit laboris patientissimus: quintum quod sit amator veritatis: sextum quod intellexerit methodum; qua verum à falso discernitur: septimū vt methodum ita tritam habeat, vt non solum noscat, sed uti etiam valeat: Qui igitur non possidet hæc requisita facili in errorem cadent: inde vno commisso errore in mille alios labetur: At falsis his principijs, egros Medicinis, vnguētis, & topicis varijs ad rē minime conferentibus, quæ sæpè laceſcunt, malè tractare; id sanè nequitiam est ferendum, sed pro viribus explodendum, cum acies oculorum præcipuè dirigenda

fit, ne (cum medicus aliquid opis ferte nequeat) saltem noceat: ut optimè admonuit Diuinus senex.

Idcirco summopere semper miratus sum non solum, quia ex musculis istis tensis colligunt mesenterij esse crassissimis recrementis obstructum, sed quia propter hanc causam dant soluentia medicamenta, & alterantia aperientia, oxymel, & decocta ex agrimonio, citrach, & alia id genus pro obstructionibus his, quas animo fingunt esse mesenterij, cum nullo modo topica hæc conueniant, quauis inunctiones peruenirent ad mesenterium ipsum.

Non conueniunt pro hæc tensione rectorum musculorum inunctiones calide, uel temperate, non aperientes, uel emollientes, sed neq; roborantes, non calide, quia per calida aliunde noua trahitur materia, & pars calore exurit, atque torretur: non temperate inunctiones, quoniam si erunt emollientes, partem laxabunt; non in ipsam tamquam in cloacam excitabitur proluuius; non astringentes, uel roborantes, quia hæc anteuertent euacuationem illam sensus nostris folentem.

Errant in primis, quia credunt tensionem illam esse mesenterij, cum sit musculorum rectorum; Errant, quia credunt tensionem illam externam causare febrē & pitredines; cū homines absoluta omnibus numeris sanitate præditi hanc sepius habent tensionem; Errant, quia credunt, febrem tolli ob inunctiones illius partis; Errant, quia credunt infarctum illū pituitosum musculorum rectorum citò posse tolli linimentis insensibiliter euacuatibus; Errant, quod credant emollientia opem afferre posse, cum laxando possint efficere affectus maiores; Errant credentes calidis oleis prodesse, cum calida indurēt magis, dum resoluunt tennes partes; Errant denum, dum non purgato corpore his localib. tractant abdomen induratum, quod reluctatur Galeno 2. ad Glau. 2. sic dicēti, in tumoribus duo esse maxima errata, alterum est non habere plius prouidentiam totius, secundum calfacere, & humectare locum affectum, ut methodici faciebant, & sicuti contingit impudentissimo Atalo Medico, cui nimis laxantibus hepati applicitis & incauit Theaginē

Cynicum philosophum, ut refert Galca. 12. methodi capite 15. Errant denum, quod credant hanc tensionem tolli posse oxymellite, decoctis aperientibus. ex agrimonio, citrach, & similibus, cum adeo distent uenę ferentes alimentum ad rectos hos musculos, ut omnino alteratia amittent suas in itinere vires: Nec tamen, amittendum in febricentibus, ut tangantur hypocondria uel sepius, sicuti erat mos Hippocratis, ut in agrorum Historia lib. de morb. uulg. est uidere, quoniam ad notitiam ualde hoc confert, quia distinguemus tensiones uiscerum ab illa, quæ est musculorum rectorum.

In historia Sileni Hippobseruauit tertia die tensionem hypocondrij ex utraq; parte oblongam uerius umbelicum, quæ tensio pertinet ad musculos rectos, & non ad omentum, ut putat Mercurialis in suis prælectionibus pilanis; omentum enim non habet oblongam figuram. Interim tamen ex hac Sileni historia colligimus, Hippocratem quotidie trigisse hypocondria hoc sine ut certum iudicium de idea affectus præferret, & ut consultus interna auxilia præscriberet.

Nostris corporis varia arcana que cognoscere possunt per sympathiam Generis.

Cap. IX.

Cum dixerimus triplicem in hoc nostro corpore esse consensum, Generis nimirum, operis familiaritatis, & uicinitatis, & cum proposuerimus methodum uniuersalissimam, quæ nos docere posset, quando aliquis morbus sit proprius, & quando per sympathiam; reliquum erat ad sympathias particulares descendere, ut simul methodum, & anatomiam perdiscere mus: Sed quoniam affectiones, quæ sunt per consensum familiaritatis operis, & uicinitatis, ex traditis, superius, ni fallor, breui speculatione interiecta conspiciunt, & prænitentes sunt. Idcirco tota erit stectenda cura in affectiones illas, quæ per generis consensum fieri solent.

In hac affectu sympathia pernosceda nemo excellere potest, nisi prius in anatomia officina limatus sit, sicuti esset scire, unde neruorum, & uenarum longæ pro-

pagines, & musculi eminus deducti suatrahant initia, quos habeant progressus, quibus partibus implantentur, & quæ demum expleant officia; si quidem persæpè obtingere solet, morbum esse in vno loco, & in alio longè diuerso ob consensum, & continuitatemq; neruorum, siue musculorum, & aliarum partium, videri illius symptomatis imaginem, vel actionem lesam.

Similiter sæpè videmus dolorè esse in vna parte, & affectum dolorem facientè aliam sedem tenere; sicuti possumus varijs exemplis hoc sic comprobare: Nunquid à Galen. relata est historia primo de loc. affect. 6. cuiusdam Romani venientis ex casu è vehiculo icti, & percussii circa septimam vertebra[m] cervicis, & sensum trium digitorum amisisse? audiatus Galenum sic loquentem, tres digiti sensum amiserunt ex casu è vehiculo cum Romà quidam homo proficisceretur, & coniecturâ feci in exortu nervi post septimam vertebra[m] prodeuntis, partem fuisse inflammata[m] ob ictum, & inde scyrrhosam acquisivisse dispositionem: nunc quod initia neruorum, & quibus nervi ancillerentur pernoscere, quam grâdem vtilitatem in medendo habere possimus, Galen. enim cognita inflammatione ob ictum facta, quæ in scyrrhosam dispositionem degeneravit, è vestigio auxilia septimæ vertebrae adiunxit, & curata scyrrhosa dispositione, vnde furculi nervi, qui præstant sensum tribus illis digitis sumunt initia, ad pristinam summa cum omnium admiratione sanitatem miserum reduxit, quod nunquam id præstare potuerunt Romani empirici, licet inunctionibus perpetuò superhincirent manum: videas ergo secundum essentiam affectum esse in vertebra cervicis, secundum apparentiam esse posse in digitis, quippe ex se alioquin optima sint constitutione donati.

Nec miretur quispiam, quod sensus deficiat manente motu illis: causa est varietas neruorum: vel quia deficiat iudicium.

Parimodo in epilepsia sensus tollitur, & non motus; in phreneticis motus sunt vehementissimi: sensus tamen deficiunt, sic dormientes moventur, & non animadvertunt, Galen. 2. de motu musculorum

ca. 4. dicit si somno oppressum integrum fere stadium fecisse dormiendo: in his obiectum sensus abest & obiectum sensus ideo fortis imaginatio adest.

Neque neruorum varietas sensum & motum efficiunt: sed idem nervus præsentè obiecta motus movet & non sentit absente obiecto sensus.

In idem nervus respectu substantiæ medularis movet, & sentit ratione diuersorum obiectorum.

Neque defendi potest Fernelius 5. lib. physiologiæ cap. 10. dum dicit, motum omnem à cerebri medulla prodire, sensum verò à membranis. Hæc opinio est contra Galen. 7. de placitis cap. 3. ubi dicit, facultatem mouendi & sentiendi in cerebri medulla solum contineri: membranas verò fuisse constitutas ad vestendam & nutriendam medullam. Idem dici debet de nervis.

Hæc, & simili veritatis voce Galenus castigauit Lycum dicentem tremorem manus pendere à stomacho; cum nullus esse possit consensus inter stomachum, & manus, non vicinitatis, vel operis familiaritatis, vt omnes consentiunt; sed neque Generis; quoniam nulla nervi propago quæ est in manu dependet à sexta nervorum coniugatione, quæ mittit neruum ad stomachum, vt propterea fieri non possit tremor in manibus per consensum stomachi; quod sanè non dixisset Lycus, si studium in Anatomiam adhibuisset. Similiter in alijs furculis vidimus essentiam esse in vno capite, & alibi apparentiam.

Sed liceat digredi in alias corporis partes, vt in exemplorum more artem hanc vitandorum errorum sinul, & anatomiam perdiscamus. An ne à quarta, quinta, & sexta vertebra cervicis missus est furculus nervus ad septum transversum, vnde diaphragma motum desumit gratia respirationis; quare, si diaphragma amitteret, vel deficeret in motu ob huius nervi caput affectum, quæ affectio facta esset vel obtemi angustia, vel ob compressionem, vel obstructionem, vel ob ictum, vnde suborta esset dispositio scyrrhosa, tunc vt septum transversum in bonum statum reducere, mus, esset cõsugendum ad cervicem, & non

non ad peccatus: quid magis potest, quam hoc exemplum suadere, quantum referat generis consensus? videre affectum in collo, & eius apparentiam esse in septo transuerso?

Ad eundem modum in membranis, & musculis vidimus inflammationem esse in pleura circa medium pectoris; atque persentire dolorem in iugulo, cui alligatur hæc membrana, ubi nullus est humor dolorem efficiens: videas ergo quantum à veritate abhorreant plebei à Medicis qui pertinaciter tutantur illam sententiam, ubi dolor, ibi morbus, dolor enim est in iugulo, morbus in pleura, quæ cubiti ferè tractu, distat à iugulo.

Similiter si de musculis exempla proponamus, adest in primis musculus ille, quartus brachij, qui etiam oritur à dimidia parte ossis sacri, quare posset esse aliquis affectus in clunibus circa mediam ossis sacri partem, & affectus apparentia in brachio; munus istius quarti musculi est deorsum brachium trahere, quare ubi medicus anatomia orbatu videret affectum hunc esse in brachio, & causam circa nates; & videret dogmaticum adiungentem localia natibus brachio suppetias afferre, adeo se confunderet, ut de sua empiria in posterum nec verbum vnum mouere auderet.

Tale quippiam observatur in plerisque alijs musculis, sicuti in illo lato musculo in collo posito, qui labium infernū deorsum obliquè trahit, quippe est intertextus nervis propaginibus à tertia, quarta, & septima cervicis vertebribus prodeuntibus, ut possit obtinere, latum istum musculum suo spoliati officio trahendi deorsum labrum infernum ob affectum insidentem tertiam, vel quartam, vel septimam vertebra: Quis empiricus anatomia spoliatus diceret, si videret labiorum affectum curari per topica adiuncta cervici? Quomodo hanc causam diuinare, posset ruditer limacus in secandis corporibus.

Similiter quando aliquis non posset brachium ad pectus adducere, quod munus est primi paris musculorum brachij, an ne posset vñ quandoque venire, ut hic musculus primus brachiorum suum hoc officium non expleret, quia in quinta tho-

racis vertebra aliqua esset facta angustia in nervica illa propagine vestiente hunc musculum? quid ergo videretur empirico si dogmaticus brachium ad naturalem statum transduceret inungendo quintæ vertebribus thoracis locum?

An ne posset præterea vñ venire, quod facile est, ut accidat, digitos manus amittere motum, quia musculorum origines, quæ sumunt exordium ab humero sint contractæ casu, vel vulnere obfessæ, vel aliquo humorum infarctu circumfussæ, ut hic motus digitorum vel diminuat, vel extinguatur: tunc vellem videre cui parti empiricus topica applicaret. Quinimmo millies vidi in hunc errorem incidisse, ut in simili casu inuoxerit digitos, quos si in superliniendo pergeret annorum centum tractu, opus irritum, atque futile redderet, & tempus, oleum, & opus contereret. Quod diximus de motu digitorum manus, idem dicendum de motione digitorum pedis, qui mouentur à musculis exortis à femore, de quibus distinctius in hoc libro agemus, ne in eisdem laqueos cum empiricis incidamus.

Postremo ad pudenda missi sunt nervi scirenti ab ossis sacri, vertebribus secundæ tertiæ, & alijs, & aliquando à secundâ lumborum, & tunc ubi intentigo penis ob res soluros, vel compressos hos sursulos in capitibus accidit, medela erit adiungenda vertebribus, & nequaquam peni, qui patitur tunc per consensum generis, qui sit in lōgis nervis aliunde deductis. Possem vltius pleraque plura exempla de hoc consensu afferre, sed meum est hic tantum notissima proponere, ut inde consideret medicus perpetuò an affectio sit per consensum, & quomodo sit per consensum.

Sed ne prætermittam summam quandam sympathiam generis, quæ contingere solet inter oculum, & musculum temporalem, quæ est cur læso musculo temporali lædatur oculus, & vice versa læso oculo lædatur musculus temporalis per consensum, audias rationem antequam huic capiti imponam coronidem: secundum par nervorum cerebri fertur ad quinque musculos oculis famulantes, & ad duos palpebram recludentes, & in quibusdam huius secundi paris ramuli in musculum temporalem inferuntur, quare non erit mi-

mirandum, si læsis oculis, in aliquibus lædi videatur musculus temporalis, tunc non est opus adiungere localia temporis, quoniam nervi in temporibus contrahuntur ob læsos oculorum mûculos, vt propterea consentiant temporales mûculi, nulla in ipsis existente læsione.

Symphathia obseruatur inter sternum, & Laryngē in anginosi dum rubor extenditur vsque ad sternum: causa est continuïtas mûculi, qui à summo sternuo oritur, & in latera thyroïdis idest susi formis inseritur. Hipp. in prognosticis & coacis prænotidicit si rubet sternum in angina est salutis retractio est quia Larynx onere & sarcina qua premebatur liberatur.

Nec obstat quod dictum est 2. Epid. ab Hipp. de muliere anginosa decumbente apud Bitonem, quæ erat cum rubore pectoris, quæ quarto die perit, quia rubor salutaris est dum angina non est maligna quo casu humor existens circa laryngem descendit ad sternum & factus est rubor ex morbi vel causæ permutatione non ex propagatione: omnis enim permutatio humoris à parte nobili ad ignobilem est salutaria.

Symphathia inter renes & lienem per arteriam à liene ad emulgentes excurrentem sæpè euacuatur humor contentus in liene summo cum beneficio, sicuti obseruat Hipp. 2. in secundum Epid. tex. 27. in casu Bionis, qui multum minxit & liberatur timore lienis.

Hinc Gal. 5. de vsu par. & lib. aduersus Erasistratum docet per arterias expurgari serum in renes propterea arterias à natura esse factas amplas vt possint cõtinerè multum seri, si arteriæ solum gratia spiritum vitalium essent constructæ, exiguæ fuissent factæ, & non ita magnæ.

Sed ad exem pla anatomica singillatim expendenda confugiamus, & distincte de quolibet mûculo, & nervo procul deductis differamus.

Errant, dum labijs illorum, qui non possunt labrum infernum deorsum trahere, & ad latius mouere ob læsionem factam in lato mûculo, apponunt localia, quando iugulo essent apponenda. Cap. X.

Diximus, affectiones per consensum generis fieri omnes ob partium cõ-

tinuitatem, & læsiones omnes in loco, in quem inferuntur mûculi, vel nervi prius apparere, & manifestari; quoniam ibi mûculi videntur sua explere officia, ne enim vero ubi apparent hæc functionum læsiones, vt plurimum, ibi nulla est noxa, & nulla constitutio mala; quoniam accidit sæpissimè, vt radices affectuū sint vnde mûculi, vel nervi suum ducunt exordium, uel in alia mûculi parte, & in loco, in quem inferuntur, manifestari (ut diximus) affectiones præter naturam.

Quare, cum sæpè initia mûculorū, & nervorū eminus locata sint, nõ erit mirū, si empirici Anatomix arcana non habentes, quæ essent, scire vnde oriuntur mûculi, vel nervi, quales progressus, quam figuram, & substantiam sortiuntur; in quolibet ferè functione læsa per consensum generis in sexcenta cadere possint errata.

Exordiantur ergo à mûculis superiorib. & ab illo mûculo lato in collo posito: Aliquis ergo labium infernum deorsum oblique nõ trahet ob factam læsionem in exordio huius lati mûculi, quod est circa iugulum; empiricus lumine anatomico obsecratus, videns labia vexari, veluti cõtigit in spasmo cynico, & similibus affectibus; labijs localia, sicuti vnguenta, olea formentationes adiungit: Adiunt alij, qui consulunt masticatoria, gargarifmata, cerata demum labijs apponere, rati aliubi nõ esse affectu, nisi vbi apparet eius symptoma, spreto omni generis consensu, vel sympathia; errare tamen omnes possunt, quia in illa iuguli parte potest esse humor quidam pituitosus, qui sensum distendat sine dolore: solutio enim continui sensum facta, est sine dolore vt est videre in hydropicis, in quib. tensiones maximæ fiunt sine dolore in pedib. & in toto corpore, quia sensum fiunt; & quæ sensum fiunt, nullos efficiunt dolores.

Similiter fieri potest tensio in hoc mûculo lato, vbi est iugulum sine dolore, qua facta tensione, deinde contrahatur mûculus, & inde sequatur, quod labium non possit deorsum trahi, quamvis nulla existat læsio per se in labijs ipsis, quare cur volunt labio adiungere medellam, si radix, & causa est circa iugulum? ibi sanè erit medicandum, cum labium iners sit factum iuguli maleficio.

Tale quippiam obseruatur in pleuritide, in qua iugulum caret humorib. dum inflammatorius tumor in pleura trahit, & distendit membranam eamque lacerat à iugulo diuellendo, unde in iugulo maximus perferri solet dolor, causa procul existente, vt hinc colligere possimus, quā fallax sit communis illa sententia, vbi dolor, ibi morbus; nisi melius, quis eam interpretetur, cum in pleuritide dolor perueniat ad iugulum, nullo in iugulo existente humore faciente dolorem, quinimo sæpè vidimus pleuriticos aliquando conqueri de iuguli dolore; & de punctu in costarum regione spatio duorum, vel trium dierum non conquerantur; quāuis inflammatorius tumor sit sub pleura succingente costas, & non in iugulo, ecce quod causa dolorem faciens potest esse circa costas, & dolorem circa iugulum.

Qua methode cognoscatur labium obliquè non posse trahi à lato musculo ob morbum existentem, tum in tertio pari nervorum cerebri, tum circa tertiam vertebrae cervicis. Cap. XI.

CAusa, cur musculus aliquis non fungatur suo officio, varia esse potest, quia modò est ob humores existentes in carne musculosa, modò ob nervos laesos, & modò ob sympathiam vicinatis alterius laesæ partis; quare si de labio loquamur, potest contingere, labium non posse trahi obliquè deorsum, quia ramus tertij paris à maiori principio enatus ille in quā qui vnitur cum furculo illo quinti paris, qui tortuosus nervum facit, sit laesus, & quia ille nervus hunc musculum ingreditur; propterea si accideret, vt conuelleretur musculus, non posset trahi deorsum labium, & labium quo ad apparentiam videretur lesum, quando nulla noxa in labio existeret: quis ergo tunc iungeret labium? cum latus musculus conuulsus sit ob defectum in ramo tertij paris nervorum cerebri.

Amplius potest in labio eadem affectio contingere propter causam existentē uò in labio, sed in ramo tertij paris nervorum cerebri, vel per causam existentem circa tertiam colli vertebrae, quoniam ab hac tertia quoq; vertebra deducitur perueus

furculus, qui ingreditur latum hunc musculum, cuius officium est trahere deorsum obliquè labium.

Sed audias, qua arte sit incedendum, vt cognoscamus, quando musculus latus in collo positus sit laesus ob laesionem prodeuntem à tertio pari nervorum cerebri, & quando ob laesionem à tertia vertebra cervicis, & hæc est, si dum est laesus latus musculus, insimul laesus sit musculus temporalis, & musculi frontis; tunc inferas, laesionem pendere à cerebro; & ratio est, quia tertium par nervorum cerebri, antequam pertineat ad latum musculum, irrigat musculū temporale, & musculos frontis varijs propaginibus, vt nullo modo possit ledi latus musculus à morbo existente in principio tertie propagationis nervorum cerebri, nisi prius lædantur isti enarrati musculi. Gal. ait 4. de loc. aff. 4. dñ omnes musculi læduntur læsio dependet à causa communis potest etiam esse quod vnus nervus communis multis musculis afficiatur, licet cerebrum non sit læsum; id cognoscas ex læsis officijs illorum musculorum; quare sine anatomia nihil sciri potest.

Si verò cum musculo lato læsio insimul lædantur musculi septimus, & octavus dorsis, qui constituunt quartum par, cuius officium est extendere superiorem partem dorsis, & lædatur quoque secundum par musculorum capitis, cuius officium est trahere caput in posteriorem partem, inferas necessariò affectionem lati musculi pèdere à tertia vertebra, & ratio est, quoniam, antequam nervi prodeuntes à tertia vertebra perveniant ad latum musculum prius mittuntur ad septimū, & octavum musculos dorsis, & ad secundum par musculorum capitis; quare per officia horum musculorū malè acta poterimus inferre ex necessitate originem esse læsam, verbi causa, si esset facta percussio circa tertiam vertebrae, veluti contingit homini venienti Romam, qui, vt dicit Gal. 1. de loc. aff. 6. ob scyrrhosam dispositionem circa septimam vertebrae, amisit sensum trium digitorum, tunc post percussioneem circa tertiam vertebrae si videris, nō posse extendi superiorem partem dorsis, & caput attrahi in posteriorem partem & deinde, videas consequi laesionem lati musculi in collo

collo positi, dicat necessarium in tertia vertebra esse morbum, quia prius irrigatur quartum par dorsi, & secundum par capitis illismet nervis proceduntibus a tertia vertebra, antequam latus musculus irrigetur.

Præterea, ut plures consensus cognoscamus, dicimus non solum posse accidere lesionem in labio ob nervos tertiæ coniugationis cerebri, vel ob lesionem factā circa tertiā vertebra ceruicis, verū etiā illudmet posse accidere, quia in tela carnosā, vbi vtrinque latus musculus cum suo coniuge in ossē pectoris vnitur, sit ali- quis humorum obstru- tus, qui fibras lati musculi adeo contrahat, ut labia ad latus turpiter moneretur; quam affectionem cognoscemus ex timore aliquo in ossē pectoris, videas ergo quā varia esse possit radix, & causa affectionum, & quam temerē empirici suis topicis auxilijs agant, dum symptomati perpetuo occurrunt; videas quam turpiter errent nonnulli, ex illis, qui proficentur dogmaticam scolarum dum in omni actione musculorum lesa, si primis inunctionibus non tollatur affectus confugiunt ad capitis purgationem, ad stillicidia, ad errhina, & similia; ad quæ auxilia Galenus non ita in omni motu amisso confugiebat, ut vidimus, dum curavit hominem venientem Romam percussum post septimam vertebra, cuius digitus, licet non possent curari vnguentis, & alijs topicis auxilijs adiunctis empiricis, attamen non est usus purgationibus stillicidijs, masticæ, oris, errhinis, fonticulis, quemadmodum nostratum plures causam proximam ignorantes confugiunt ad caput euacuantia, tamquam ad sacram anchoram, sed adiunxit post septimam vertebra ceruicis emollientia, quæ tollerent scyrrhosam dispositionem, & illud ipsum liberauit.

Similiter Galenus 4. de loc. aff. cap. 4. citat casum cuiusdam, qui amiserat sensum pericranei quia ambulando sub vento impetuoso, & pluvia circa ceruicem pallio madefacto, & refrigerato, refrigerati fuerint nervi ceruicis, qui excurrunt ad pericranium ut præbeat sensum, medici vulgares calidis topicis inungebant pericranium & frustra, quia locus affectus primarius erat ceruix, quā a Gal.

calesfacta statim sensus pericranei fuit restitutus.

Quare nisi diligentissimè perquiramus partium nostri corporis sympathias, non video quo pacto in musculis, & nervis lesis aliquid boni facere possimus: quia semper in genericis persistere, & statim inferre ex motu musculorum læso, caput illius affectionis esse originem, est paradoxissimum alibi a nobis in libro de analogismo non semel reiectus; non valet sane musculus latus est læsus, ergo caput expurgandum, quando affectus principalis est circa tertiā vertebra, qui potest tolli sine purgatione neque valet, si musculus latus est læsus, ergo purgandum caput, quando est læsus ab humoribus collectis, & induratis in ossē pectoris, vbi vtroque latius musculi iunguntur, quæ humorum durities potest tolli sine capitis purgatione; quare non sufficiunt indicia generica, ut placet medicis plebeis, qui ad pauca capita, & illa parum tutam medicandi peritiam transferunt, & eam adeo facilem reddunt, ut non sit mirum, si tonsores, mulieres, & rustici homines hæc auxilia medica, quæ circumferuntur, sciant, consulant, & in medium proponant.

Errant, dum qui inferiorem maxillam, constringere non possunt ob læsum musculum temporalem, inungunt semper maxillam, quando tempora essent inungenda. Cap. XII.

Temporalis musculus, cuius munus præcipuum est edendo frangere res duras, enascitur à bregmate, vbi est serē summū capitis fastigium, quare si hic musculus in capitis vertice vbi enascitur, læderetur, & adeo impotens euaderet, ut nullo modo inferiorem maxillam constringere posset, tunc, ut inferiorem maxillam ad pristinum officium salubre reuocaremus non esset curanda vnguentis, linimentis, inunctionibus, emplastris, oleis lumbriatis, vel demum pinguedine humana; sed esset consulendum, quomodo affectionis huius radices essent euellendæ, quoniam plurimæ affectiones musculo temporali in parte eminenti sitæ possent contingere, quæ essent in

causa, cur aliquis cōstringere maxillam, & per consequens mandere non possit.

In primis illa affectio obseruatur, dum tēpora inflammatione aliqua corripuntur, si post suppuracionem inflammationis relinquatur scyrrhosa aliqua dispositio, dicimus, illam duritiem scyrrhosiā posse tollere, & auferre villis, & fibris musculi temporalis virtutem constringendi maxillam; tunc si affectus hic præter naturam esset curandus, auxilia induritiem existentem in principio musculi, vbi est bregma, essent dirigenda, eamque auferri oportet optimis localibus emollicentibus, & non tractanda inferior maxilla topicis auxilijs, alioquin de hoc munere obeundo actum esset.

Præterea possent tempora transuersim vulnerari, vel chirurgus imperitus possit transuersim altè ad carnem vsque temporū abscessum aliquem aperire, & aperiendo, fibras transuersim secare, & illico musculum hūc inertem reddere in claudendo maxillam, quod dignum est animaduersione; quoniam fibræ descendentis deorū non sunt transuersim incidendæ: sed secundum rectam lineam.

Accedit quod caro transuersim secta magis dolet quam in longū exporrecta, quia fibræ magis sentiunt: excitato maiori dolore fit maior confluxus, & maiora symptomata sequuntur.

Amplius imperitus chirurgus vulnera temporalis musculi possit adeo dilatare, vt volens facere grandius foramen in cōsideratè fibras abscindat, & circa reliquas fibras durum quidpiam callosum, inde ingeneretur, vt ob fibrarum incisionem, seu impotentiam deinde deficiat, vel cesset musculi officium.

Ad hæc tēporalis musculus possit aliquem malum habitum, & cachexiam acquirere, vnde humoribus collectis in maiorem accerū tenderentur fibræ, & tandem tendo implantatus mento tensus, & cōtractus redditus magno in edēdo cruciaretur dolore, empiricos tunc in duo errata propria incidere vidimus, alterum est dum credunt symptomata esse occurrendum, veluti dum iniungunt mentum, quando reuera tempora sunt inungenda; alterum est, dum decipiuntur com-

muni i, & vulgata illa sententia, vbi dolor

ibi morbus, quia dolor in hoc casu potest esse in mento, morbus qui est doloris causa in temporibus, vel vbi enascitur musculus temporalis.

Qua via cognoscatur aliquem non posse constringere maxillam inferiorem ob lesionem musculi temporalis factam in neruorum exordijs. Cap. XIII.

Nemo est, qui nesciat, motum à neruis pēdere propterea cum musculus tēporalis varijs neruis surculis à cerebro prodeuntibus sit contextus, atque irrigatus, poterit esse morbus in exordio neruorum, & symptoma esse in maxilla inferiori, in primis enim à secunda neruorum cerebri compagine ramus ad musculos oculorum mittitur, deinde ad duos musculos palpebras recludentes, tandem idem ramus peruenit ad temporalem musculum.

Ex altera parte adest alter ramus prodiens à quinto pari neruorum cerebri, qui flectitur versus anteriorem partem serpentis inftar, & ingreditur temporalem musculum, vt neruus durior euadat, sicuti Gal. iudicat: En quod læsis quibuslibet ex ijs propaginibus potest hoc officium constringendi inferiorem maxillam cessare, vel diminutè agere; quando ergo causa huius lesionis erit attribuenda neruis hisce, volueris ne mento, vel inferiori maxillæ inunctiones parare, & topica diuersa adiungere? volueris curationem dirigere in partem, vbi nulla est noxa, & nullus est morbus, quamuis appareat ibi symptoma? Erit ergo ad neruos prodeuntes à capite dirigendus spiritus, vel caput ipsum corrigendum, idcirco, vt quā diligentissimam compares cognitionē, quādo lasio in hoc musculo fit ob ramū tertij, vel quinti paris, & labefactatio contingat in musculo, & per consequens in mento appareat hoc symptoma, quod patiens non possit, vt opus est, mandere.

Audias quomodo virtute anatomie id cōsequi poteris, an ne diximus, ex anatomia ramum tertij paris vestientem temporalem musculum nullum esse ad musculos oculorum, & ad musculos duos palpebras recludentes? quare si erit introducta in tēporali musculo aliqua mala dispositio

cau-

causata, vel à conuulsione, vel à paralyſi propter læſam originem tertię coniugationis neruorum, colligere neceſſariò poteris eandem læſionem eſſe in oculorum muſculis, & in muſculis palpebras conſtringentibus, cum ſit maximus conſenſus, & maxima ſympathia inter hos muſculos per eundem ramum communicata, vt nullo modo poſſit eſſe læſus temporalis muſculus à cauſa exiſtente in exordio ſuorum neruorum; quin læſi ſint quoque illi muſculi palpebrarum, & oculorum.

Si demum malus iſte affectus muſculi temporalis erit factus ob ramum quinti paris neruorum, tunc eſt impoſſibile muſculum temporalem lædi à læſione neruorum quinti paris, niſi auditus quoque læſus ſit propter maximam ſympathiam, quæ eſt inter ramum quinti paris perſeptantis ad muſculum temporalem, & ramum expanſum auditum formantem, cum ab eodem ſtipite proximè deducantur.

Audias Gal. 12. methodi cap. ultimo de ſympathia quæ eſt inter oculos, aures, & dentes „ Scire autem licet medicamentum quod recipit Caloreum non ſolum atriū ſedare dolorē, ſed etiam oculorum, & denium, ſi auribus inſtilletur: uideas ergo quantus ſit conſenſus, & ſympathia in hoc noſtro corpore, quā ſi exactè medicus poſſet adire, uno aſpectu omnia in altiffimis corporis latebris deliteſcentia peruaderet; Sed cum datum non ſit, niſi aliquarum partium ſympathias cognoſcere, pergamus in alias pleraſque quæ cognoſci poſſunt, ut, quantum fert tenuitas noſtra, ad certitudinem medicant accedamus; transferamus igitur cognitionem ſympathie muſculi temporalis cum alijs in uſum medendi.

E traditis iam ſcimus, muſculum temporalem per neruum prodeuntem à tertio pari neruorum cerebri conſenſum habere cum oculis, ergo iuuabit, ſi muſculus per huius nerui læſionem perderet ſuum officium, deriuare per nares, & per os humorem in neruis imbibitum; quoniam maximus eſt conſenſus, inter nares, oculos, & os, & à nulla parte commodius dilabi poterit excrementum imbibitum in tertio pari neruorum cerebri, quā ab ocu-

lis ad nares, & à naribus ad os, cum ob nicitatem partium, cum quia adſunt inter has uicinas partes foramina communia, cuneali, & ſuperiori maxillæ, per quæ natura medicamentis adiuta promptè excernere poterit excrementa.

Si ex altera parte uideamus muſculum temporalem læſum eſſe ob defectum ramī à quinto pari prodeuntis, quod cognoſcemus ex auditu læſo, tūc nullo modo per nares, uel per os poterimus tam commodam deriuandi occaſionem ſortiri, & ratio eſt, quia quintum par neruorum eſt aliquantulum remotum à foraminibus illis latiffimis oculorum, narium, & oris.

Colligas ergo eſſe proſus impoſſibile ſine cognitione conſenſus, & ſympathie partium, nos ſcire deriuare, reuellere, & euacuare peccantes humores; quis enim ſine anatomia ſciret, quādo eſſet læſus auditus, an eſſet melius deriuare per occipitium, quam per nares? quando tamen ſciret originem quinti paris neruorum cerebri uerſus poſterioſiorem partem uerge- re, tunc in læſo auditu ob neruum in ſuo principio læſum, ſciret locum, per quem commodè reuulſio, uel deriuatio fieret, de qua re, cum alibi actum ſit, non eſt, ut hic ulterius philoſophemur.

Errant empirici, dum illis, qui non poſſunt inferiorem maxillam aperire, oleis maxillam inungunt. Cap. XIV.

Certum eſt, ad muſculum illum quartum à ſtyloide proceſſu ortum hoc munus aperiendi maxillam inferiorem pertinere, qui deſertur ſub aure, & ad ſummum mentum, ut buccam aperiat, implantatur.

Vbi tamen datur in ægrotantibus hoc infortunium, ut os aperire non poſſint, quod ob quamplurimas cauſas obtingere ſolet, tunc empirici in conſuetam erumpunt inſcitiam, quæ eſt ut perpetuò ſymptomati occurrant, non cauſæ, tunc enim inungunt mentum oleo amigdalino, ſupponentes alibi non eſſe localia medicamenta apponenda, quam ubi ſymptomata apparent.

Sed age: tãtani inanitatem arguamus, An ne poteſt eſſe inflammatio parū manifeſta,

nifesta, seu pituitosa iuxta aures, vtque imbibito musculo, vbi exoritur, inde non possint contrahi musculi fibræ? & per consequens non possit inferior maxilla aperiri? attamen persæpè vidimus empiricos errare in hoc casu, quia in hominibus parotide obfessis non valentibus deorsum trahere maxillam semper inungunt mentum, credentes causam, quæ maxillam non aperiat esse in mento, & non in parte superna: sic conterunt olea, & vnguenta omnia, dum obliniunt partem illam summam, quæ aliquando (vt diximus) læsi potest per consensum musculi læsi solum in parte superna.

Amplius sæpè numero, nulla noxa per se existente in styloide, accidere solet talis impotentia aperiendi os, non ob læsum mentum, sed ob aliorum musculorū adhærentium compressionem, vt in anginis, & in capitis vulneribus, & in parotidibus vidimus, quorum occasione tanta confluat circa aures humorum diluies, vt comprimat vniuersam illam partem, & per consequens quartum musculum (cuius vsus est os aperire) nō possit muneri sui officium explere.

Præterea, an ne possit in destillationibus capitis contingere, vt glandulæ post aures repleantur catarrho, vt propterea vix aperiri possit maxilla: tunc oblinientes mentum frustra conterunt olea, & vnguenta; quia essent tunc inunctiones dirigendæ versus processum illum capitis styli imitantes, quæ pars pituita viscosa obducta est.

Præterea contingit sæpissimè in parotidibus dolorem perferri, non solum in maxilla; sed descendere vsque ad iugulum: quomodo ergo sine hac de sympathia partium cognitione poterimus difficultates has diluere? audias ergo, quo pacto per consensum vicinitatis id fieri possit, iste quartus musculus in maiorem molem elatus, ob repletionem comprimitur superiacentem, qui est latus ille musculus, cuius munus est labium deorsum obliquè trahere, & iste musculus exoritur à iugulo, vt hinc distenso musculo perferantur dolor iuxta clauiculam; quamuis causâ doloris sit in parte superna; vides ne tunc clauiculam inungere? en quomodo parum tuta sit illa senten-

tia; vbi dolor, ibi morbus.

Ad eundem modum læditur musculus latus malè agens suum officium trahendi ad latera deorsum labium ob eandem compressionem factam à quarto musculo maxillæ; attamen integra est sanitate latus musculus donatus, cum solum per accidens, & per consensum offendatur.

Postremò, vt videas quot modis affici possit vna pars per sympathiam generis; scias, neruum inferuentem maxillæ motui, deduci à septima coniugatione neruorum cerebri, quæ versus occipitium magis habet suum principium, & per foramen obliquum occipitis egreditur, & scinditur in complures propagines, quarum maior discurrit sub maxilla hac inferiori, & ad linguam vadit, vt thorium, & sensum ei tribuat: Ex hac concepta veritate colligimus, si hæc maxillæ inertia, seu impotentia os aperiendi pendet à neruis lætis, nos potius debere occipitio, ubi obliquum foramen situm est, adiungere topica, quam mento, uel alteri maxillæ parti.

Sed uideo lectorem summo desiderio incensum querentem, qua uia possit incedere, ut certò sciat musculum hunc quartum carere hoc officio ob neruorū offensionem: Colligimus nos ex consensu generis omnia; in primis neruus qui reddit musculum motus, & sensus participem, reddit ille quoque linguam sentientem, & mouentem; quare si neruus erit læsus, uidebimus non solum musculum quartum labefactum esse, uerum etiam linguam; & ex hac læsionum syndrome ob generis consensum in hanc reconditam cognitionem peruenire poterimus & exinde ubi agendum sit certò cognoscemus: nam diximus per foramen obliquum occipitis discurrere septimam coniugationem neruorum, ergo ubi deiriare esset opere pretium, in occipitio auxilia, ut phenigmata, fonticuli, setacea, essent administranda: uideas ergo quanti facienda sit anatomia hæc artificiosa, sine qua est impossibile affectus cognoscere, & rectè administrare remedia.

Errant; dum illis, qui non possunt brachium pectoris adducere ob funis tormentum, topica applicant brachys, & non pectori. Cap. XI.

Officium adducendi brachium pectori in parte superna, media, & infima pertinere ad primum musculorum brachij, nemo anatomicorum est qui nesciat, & hunc pronascei à media iuguli sede, ab osse pectoris, progredientemque versus sternon, anteriorem thoracis partem occupare, exploratissimum est; deinde implantari in partem humeri anteriorem sub eius ceruice: qui experiuntur ergo motum huic primo musculo contrarium ob funis tormentum, tunc hic musculus in exordijs laceratur, & ferme diuellit tanta cum violentia, ut quammaximos miseri in pectore experiantur cruciatus, tunc nihilominus videbis chirurgos ambo brachia, & humeros utrobique lanare, succida, vnguentis, & oleis obducere, credentes humeris occurrendum, & suppetias toti brachio afferendas esse, quod faciunt, quia re vera sunt anatomia ipoliati nescientes à quibus partibus musculus trahant originem, & quæ partes nostri corporis consentiant; esset enim tunc circa sternon in parte anteriori thoracis medicandum; quia ibi nascitur iste primus brachij musculus, & ibi facta esse laceratio, & pars illa cruciatur vehementissimum passa est.

Amplius, si in anteriori hac pectoris parte inflictum esset vulnus, & post sanatum vulnus, præter cicatricem, scythosum quidpiam in fibris esset relictum: vel tonsor volens aperire, & diatære vulnus, vel abscissum pectoris in longum secuisset musculi fibras; tunc certè musculus in hoc munere adducendi brachij pectori mancus redderetur: nihilominus ob quilibet causam accidat; Empiricus, si musculus iste non expleat partes suas, consuevit, ut brachium luto Patavino vinaceis, fonticulis, & varijs vnguentis, quæ tunc imaginatur, tractetur: quamvis brachium per se optima sit constitutione præditum, & in omnib. peroptimè, quæ ipsum immediate constituunt, se habeat; quam læsionem factà, ob fibras malè incisas in pe-

Sanctory Sanctory Pars I.

ctore, vbi est principiū & exordiū huius musculi, si omnia vnguenta adiungeret empiricus, & sexcenta inureret cauteria, de medio non tolleret musculi defectum.

Ecce igitur quam sæpe empirici sine anatomia ægrotos fallant, continenter occurrentes parti, vbi videtur symptoma; symptoma est in brachio, causa est in pectore; quare nisi ad examen anatomicum omnem malam affectionem corporis nostri reuocemus, & expendamus ex animo omnes consensus, & partiū sympathias, de re medica actū erit, quinimò circumforaneis his remedijs medicorum vulgarium haustus de triuijs, & circulis additur potius aliquid ad morbi molestim, quam detrahatur.

Cæterum, ut melius nostratum empiricorum inscitiam cognoscamus, sit per hypothesein musculus iste brachij latus, vel in loco, vbi est humerus, vel vbi est iugulum, vel in pectore, atque dolor affecti musculi perueniat vsque ad os pubis; tunc libenter viderem, quo se vergerent isti. Empirici in administrandis remedijs, scio enim illa consueta moneri sententia, quod ubi dolor, ibi sit morbus, quam tamen falsæ medicinae sementem nō semel reieciimus; quoniam os pubis inuenerunt, quia ibi viderent symptomata, & in humeri cernice delitesceret causa doloris.

At audias ex anatomia: cur hoc sæpe obtingere soleat; & est, quia carnosa membrana huius musculi adducētis brachium pectori arctatur cum primo ventris musculo illo, cuius officium est premere intestina, & est ille, qui descendendo excurret usque ad os pubis, quare potest contingere, morbum existentem in brachio adeo distendere membranam carnosam in illo loco, ubi arctatur cum primo ventris musculo, ut musculus quoque eo modo distendatur, ut dolor usque ad os pubis descendat.

Sicuti de pleuritide dici potest, in qua inflammationis materia est in pleura costas succingente, & dolor peruenit ad iugulum, ubi nullum est inflammationis signum: videas ergo morbum esse in pectore, & dolorem circa os pubis, in morbum esse in primo musculo ventris, & dolorem per membranam carnosam comparati brachio, pectori iugulo; & dum pre-

F mun-

muntur intestina dolorem ad humerum, ad iugulum, & ad partem anteriorem pectoris, ad mammillas, per consensum, & sympathiam generis communicari.

Coerceant igitur temeritatem; quoniam vis anatomica mirabilem virtutem obtinet in euellendis his erroribus, & deponant illam vulgarem sententiam; ubi dolor, ibi morbus, nisi alio modo explicetur, & nunquam symptomati occurrant, nisi urgeat.

Postremo, ut de nervis artificium exequamur, animaduertant (quod istud de consensu generis in hoc primo brachij musculo contingat) musculus deficere posse ob nerveas propagines læsas prodeuntes à quinta thoracis vertebra; quia ab hoc loco prodit nervus, qui tandem excurrit ad mammillas, & ad hunc musculum; quare volentes nos curare hanc musculi læsionem ob læsos nervos in origine, ad quintam vertebra confugere debemus, quæ est origo, & causa, cur musculus non possit ad pectus brachium adducere.

Hoc modo coniiciendum est, quando hoc acceptum referendū est nervis quintæ thoracis vertebrae, quoniam antequam furenti nervei excurrant ad mammillas, prius irrigant deltoidem, id est secundum brachij musculum, officium cuius est attollere brachium, & primum scapulae, cuius usus est trahere scapulam versus pectus, quartum brachij, & secundum ventris, & propterea non potest in quinta vertebra læsionis exordium esse, nisi omnes dicti musculi quoque lædantur; ex quorum omnium læsione caudicem, & truncum deficere, præcognoscemus, tunc æmulantes Gal. emollientibus adhibitis quintæ vertebrae varias læsiones brachij, pectoris, ventris unā amputare poterimus.

Errant Empirici, dum localia auxilia applicant brachijs per sympathiam læsis, quando potius natibus deberent applicare. Cap. XVI.

Tanto consensu partes totius nostri corporis conditæ sunt, ut mirandū non sit, si læso capite, aut vertebra, inde digiti manus, vel pedis consentiant; quoniam à cerebro, à corde, & ab hepate, tan-

quam à primis radicibus tales enascuntur propagines, ut quælibet semè corporis pars per nervos animalem virtutem, per venas alimentum, & per arterias vitam recipiat; hæc est principalis ratio, cur mala vel bona vicerum valetudo tam promptè extremis, & summis partibus communicetur.

Præterea alter obseruat consensus in longis musculis, de quibus modò loquimur, in quorum exordio, si læsio aliqua recipiatur, illi cetera mala illorum valetudo partibus, quibus musculi inseruntur, communicari solet. Hinc observamus mirabilem sympathiam inter os sacrum lumbos, & brachium factam à quarto brachij musculo illo longissimo, & latissimo, cuius munus est brachium deorsum trahere.

Causa igitur huius sympathiæ est longitudo, & latitudo huius quarti musculi; quoniam habet exordium, & originem à vertebra, incipiendo à sexta thoracis vertebra vique ad dimidiam ossis sacri partem, & se tendens utrinque versus axillas implantatur parti anteriori cervicis humeri; ubi inseritur quoque primus musculus; inter quos duos relinquitur axillæ cavitates.

Quare supposita hac quarti musculi origine, valebit consequentia ab officio læsio ad musculum læsum; veluti si dicerem, brachium non potest trahi deorsum, ergo quartus iste musculus læsus est, ergo nihil prohibet, ne huius læsionis causa possit quoque esse in exordio huius quarti musculi, quod est in dimidia parte ossis sacri, ubi sunt quoque nates; proinde contingere potest, ut aliquando morbus sit circa os sacrum, & eius morbi apparentia in brachio; pro cuius curatione remedia non brachio essent adiungenda, sed potius natibus.

Quare si hunc in modum res se habet, cur Empiricus semper partem secundum apparentiam affectam remedijs tractat? cur semper symptomati occurrit inuentionibus, fomentationibus, & similibus?

Occasiones enim, & causæ, quæ possent hunc usum quarti musculi auferre, variæ esse possent de illis, quæ re vera in brachio ipso nullas habent radices, veluti si contingeret inter sextam vertebra thoracis & dimidium ossis sacri, fibras musculi (qui-

quibus fibris collocata est uirtus mouēdi esse læsas, uel propter humores aliunde missos, uel quia fibræ illæ ab aliquo inextincto tonfore occasione uulnus, uel apostema aperiendi, uel dilatandi, transuersim fuerint incisæ, unde tēdo musculi ob fibras excisas uirtute priuati in suo obeundo officio, quod est trahere brachium deorsum, deficeret: quare, si propter has causas brachium esset læsum, & enipiricus brachio unguenta applicaret, esset prorsus ridiculum, cum brachium per se carcat mala ualeitudine.

Similiter si consilium dabit Empiricus (sicut nuper uidimus) ut brachium hoc modo læsum per cōsensum induatur pelliculis leporinis, uel ceratis, uel lana succidadiacit miliis: in qua re magis rēpus coneretur: brachium sanè optima sanitate est constitutum, & quamuis in hoc officio trahendi deorsum brachium læsa sit brachij functio; attamen hæc mala causa est in quarto musculo brachij, qui totus est in dorso, in lumbis, & in osse sacro, & nō in brachio, quia nulla istius musculi portio brachio hærret, nisi tendo, quia ad axillas tantum discurrit.

Cūr igitur Empirice, si quartus iste brachij musculus esset læsus ob excisas fibras, uel ob scyrthosam dispositionem existentem in dorso, in lumbis, & in osse sacro, & nequaquam in brachio; cūr inquit audes, quando unguenta non iuant, consulere, ut brachium experiatur luta Patauina, & uinaceas, & denum, si hæc auxilia nullas afferunt suppetitias; cūr credis illicd caput, & alia interna uiscera esse malè constituta; & quod deterius est, incipis agrū pharmacis uexare, stillicidijs, ceratis exciccantibus, & lotionibus aggrorantis caput aliquin sanum deuerberare, & in malam dyserasiam transferre sine aliqua spe, quod brachium horum remedium ope curetur: quoniam morbus tunc est in dorso, uel circa lumbos, uel os sacrum, & per sympathiam tantum in brachio, & non in capite.

Hinc duo propria empiricorum errata obseruantur, quæ sunt multorum errorū radices: alterum est, dum dicunt, quod ubi est dolor, ibi sit morbus, quod est falsum, & hæctenus reiectum; alterum, dum symptoma est perseverans, & difficilis

curationis, siue sit dolor, siue motus diminutus, uel ablatus musculorum, credunt semper omnia hæc symptomata à capite pendere.

Sequitur deinde illorum falsam sententiā aliud erratum, quod uidelicet debeat purgari caput, quod est optimè constitutum, & ex hoc errore in aliū longè maiorem incidunt, & est, de facto sanum caput purgare; adduntque nullum aliud auxilium inueniri posse, quod melius caput purget, quam decoctum falsæ, uel ligni, quare, si contingat, hæc functionem brachij diminutam reddi à dispositionibus scyrthosis existētibus in exordio quartii musculi, a deo uirtute decocti falsæ exciccant scyrthosum affectum, ut tenuioribus partibus per virtutem sudorificam absumptis, tumor lapideam duritiem subire incipiat, & paulò post in verum lapidem cesseret, ut nulla armoniaci vis tanta polleat facultate, quanta opus esset pro euellenda duritie illa existente in ossis sacri, uel lumborum regione.

Errant igitur multifariam: in primis errant, dum ob musculum læsum in osse sacro à scyrthosa dispositione adiungunt capiti stillicidia, quæ potius podici connent. Errant, quia proponunt fonticulos alteri brachio, quando esset inurendū potius circa os sacrum. Errant uentes erthinis, & masticatorijs, & ceratis exciccantibus caput, quando caput optima sanitate donatum est. Errant, dum uolunt caput sanum roborare, & eos non pudet craneum humanum in pollinem redactum præbere, ut per similitudinem roboret caput. In primis errant, quia caput nō est læsum. Deinde errant, quia craneum humanum puluerizatum (dicat Trallianus quidquid uult) est remedium ridiculum, ut experientia cognoscitur.

Si denum musculus iste quartus non fungeretur suo officio ob neruorum surculos ortos à vertebra, quibus alligatur, cognoscemus hac methodo; quia ipsdem ramis neruorum irrigatur musculus lumborum, & sextus femoris & musculi capitis, & sextus iste musculus brachij, quare si uidebimus, brachium non posse trahi deorsum, & simul uidebimus solum sextum musculum femoris, cuius usus est trahere sursum femur, & musculos lum-

borum in suis obeundis officijs vna deficere (de quorum officijs quoque paulò infra tractabimus) tunc certò dicere poterimus, brachium non trahi posse deorsum non ob caput laesum, non ob humores existentes in brachio; sed ob laesos nervos in vertebis lumborum, & ossis sacri, quippe qui dant motum, non solum quarto huic musculo brachij, sed etiam sexto femoris, & lumborum musculis, & capitis.

Ratio enim, cur in vertebis sit causa, vel protopathia, & non in capite, est, quia si esset in capite protopathia, non solum musculus sextus femoris, & musculi lumborum essent laesi, sed omnes musculi totius corporis; quia à capite virtus totalis dependet.

Quo pacto verò animalis hæc virtus à cerebro in nervos mittatur est adeo difficile, vt Gal. liberè fateatur se ignorare. Septimo verò de placiti scap. 4. dicit inceptius nervos permeare spiritus animales, quia credidit esse perforatos: in alios tamen nervos fatetur se nescire quomodo virtus animalis permeet: Idem dicit 1. de loc. aff. 6. & 7.

Septimo verò de plac. capite 3. ait facultatem animalem influere in substantiam medullarem & dat exemplum de sole & luce: similiter 1. de semine ait „qualis lux est, talis est cerebri vis, quæ influit in substantiam medullarem nervi.

Errant nonnulli dicentes, spiritus animales descendere per nervorum tunicas; quia Galenus clarissimè dixit descendere per medullam nerueam: sed quicquid sit de hoc influxu: Nos in toto hoc libro de sympathia supponimus cum Gale. facultatem animalem à cerebro in nervos transmitti.

Dicimus hanc facultatem animalem esse diversam à vitali & reiecimus opinionem Argenterij in commentarijs nostris artis parvæ & prima sen. quam disputationem quilibet inspicere potest.

Errant, dum topicis tractant cernicem lissam per sympathiam à morbo existente circa quintam thoracis vertebra. Cap. XVII.

Non semel vidì aliquē fuisse percussum circa quintam thoracis verte-

bram, vnde post curatam inflammationē à percussione ortam, aliqua durities relicta sit, quæ deinde erat in causa, ne caput ad posteriorem partem, vel in latus commodè attrahi posset; empiricus chirurgus tamen conuocatus, videns caput neq; ad posteriorem partem, neq; in latus attrahi posse; illicò in erectum consuetum incidit, quod est occurrere symptomati, & misero consilium dat, vt ceruix tractetur inunctionibus, credens semper causam morbi esse, vbi videntur symptomata, & accidentia, nulla facta consultatione de hac partium nostri corporis sympathia.

Chirurgi partes erant in primis perquirere, ad quem musculum minus hoc attrahendi caput ad posteriorem partem rectam pertineret, deinceps vnde musculus sumeret initium, demum contemplari, quæ musculi pars esset oppressa malorum succorum infarcta.

Sciendū est ergo, dimissis altercationibus in re clara, ac prænitente, vt est anatomica facultas, hoc officium attrahendi caput recta ad posteriorem partem pertinere ad primum par musculorum capitis, & ad secundum; sed cum hoc discrimine, quod primi paris musculi ambo vna attrahentes id præstant, quia à quinta vertebra pronati ascendunt ad tertiam cernicis, & inde extrorsum obliquè ascendant, idè ambo concurrunt, vt trahant caput ad posteriorem partem recta: si verò alter musculus tantum trahat, caput in latus circulariter vertit, & non recta: si verò de secundo pari loquamur, vnus tantum sine suo coniuge attrahet caput recta in posteriorem partem, quia hic insertus est in medio occipitis.

Sciendum quoque est, quod secundum par musculorum capitis exoritur à transverso processu quartæ, & quintæ thoracis vertebra, & recto situ ambo ascendentes occipitis ossi inferuntur, quare totum hoc spatium inter quintā thoracis vertebra, & occipitum est considerandum, & ante oculos collocandum; quoniam cuilibet parti illius spatij causa, quæ impedire potest motionem hanc capitis, adhærescere posset, vt aliquando circa quintam vertebra sit morbus, & imago ipsius, vel symptoma in capite, & durities sit circa quintam vertebra, & dolor in occipito.

Quare,

Quare, cum ita res se habere possit, vt dictum est, cur vis tunc inungere ceruicem, cur vis, vbi circa quintam, vel alias superiores vertebrae duresceret humor, consurgere ad falsam? ad decocta chinæ? quorum vsu abeunt tenues humores, & crassiores lapidescent: vel proponere aude massicatoria, stillicidia super commissuram cronalem, & crurina, vt mala doctet consuetudo cæterorum empiricorum qui in omni morbo difficili ad purgandum caput perpetuò confugiunt: deberet sanè Galenum æmulari, qui in homine veniente Romam non decoctis, non irris, sed emollientibus adhibitis septimæ vertebrae scyrthosam dispositionem sustulit è medio, & motionem & sensum tribus illis digitis reddidit; & hoc est mædici, agnoscendo ante curationem corporis nostri fabricam.

Propterea vti illis, qui adeunt empiricos anatomia priuatos: nam iure merito ego soleo empiricam hunc assimilare infano illi, qui, cum, numquam vidisset ædificiorum connexum consulere, quomodo ædificiorum recoditæ maculæ essent delendæ; vel & melius, cum nunquam uidisset quomodo internæ horologij partes sint compositæ, attamen vellet, si motus cessaret, consilium dare, quid intus esset agendum: Verum quis eius consilium reciperet? ego sane, licet in maxima essem angustia, semper in ijs rebus floccifacerem illum, & ad artifices, qui scirent omnium incimarum partium officia confugerem.

Est Gal. lib. de sectis ad eos qui introducuntur, quod internæ ægritudines non possint addisci sine corporum incisione, sine philosophia, & dialectica.

Ad eundem prorsus modum in vitiatis corporis nostri functionibus, nisi Medicus, quem adire intendimus, anatomia excultus sit, & calleat origines, substantiam, meatus, situm, figuram, & per consequens vsu omnium partium corporis, quamuis multo diligentissimus esset in receptis præscribendis, in cognoscendis pulsibus, & vrinis, & in recta viuendi norma, quod plurimum esset, exercitatus, illum in re medica parui facerem, & despicerem; quoniam talis nasci potest occasio, vt spoliatus anatomia, aliquod dete consilium adeo aduersum, vt consilij

Sanctory Sanctory Pars I.

maleficio, ægrum ad manifestam perniciem adducat.

Hæc doctrina tota colligitur ex Gal. lib. de constitutione art. med. ca. 3. vbi ait esse aliquas artes, quæ res ipsas consiciunt, vt ædificatoria, & alias esse artes, quæ refarciunt vt illæ quæ labefactata ædificia corrigunt: dicit Gal. quod vtraque ars debet cognoscere particulas, quæ substantia constet, quæ figura, quæ magnitudine, quo numero & quam habeat compositionem.

Idem addit Galenus Deum & naturam esse instar illius, qui ædificium fabricat. Nos verò esse illos, qui extructum domum contemplantur, qui pernoctare debent quæ magnitudine, quæ substantia, quæ figura, quo numero partes conditæ sint, quæ cognitio nullomodo perficitur, nisi ex anatomia humani corporis: nihil igitur est clarius apud Galenum quam necessitas anatomie in qualibet ægritudine sananda.

De sympathia musculorum ventris: & quomodo dolor esse possit in testiculis, causa doloris existente circa sextam costam. Cap. XVIII.

Vidimus durum tumorem cum indolentia circa sextam costam, & dolorem peruenire ad os pubis, ad testiculos, & ad lumborum vertebrae; in hoc casu tamen empiricum uidimus innumeras partes dolore affectas omni humore, & mala qualitate carentes: sed potuisset sanè mensium, & annorum cucriculo testiculos inungere, quod nihil ad dolorem auferendum boni fecisset: ratio deducitur à partium sympathia, quoniam musculus primus uentris oblique descendens ita in longitudinem, & latitudinem se extendit, ut non sit mirum, si humorum infarctus unam partem oblidere possit, & alia patiatur dolorem, quoniam musculus oritur à sexta, septima, octaua, & nona costis, antequam in cartilagine cesset, & deinde abdomini toto constituit inuoluerum: oritur quoque à uertebri lumborum, & à dimidia appendice ossis ilij, & implantatur utrobique cum suo coniuge alteri parti appendicis ossis ilij, & ossi pubis, & terminatur in candida

E 3 linea

linea in medio posita, tamquam in termino horum musculorum omnium abdominis: eius officium est intestina comprimere constringendo inferiora thoracis.

Ex huius musculi officio, & ex situ tumoris circa sextam costam in illa parte, antequam in cartilagine cesset, colligimus primum hunc musculum ventris esse hoc tumore affectum; & quia ossi pubis alligatur, non erit mirandum, si ad partem illam peruenierit dolor ob generis consensum, qui fit ob distensas fibras in aduersa, & eminens sita eiusdem musculi parte: neque erit mirandum, si testiculi maximo sensu præditi consentiant, & patiantur intensum dolorem, quia musculi isti ventris in duplici loco sunt perforati, circa umbilicum, & prope os pubis, per quæ foramina, vasa semen testiculis præparata descendunt, & ascendunt deferentia, quæ in glandulas parastatas inseruntur, & per quæ foramina herniæ fiunt, quare violenter tensis vasculis semine præparantibus, & deferentibus, cum acuto sint sensu constituti, acutissimo premi possunt dolore, quamuis careant omni morbo, cum ille dolor accidat per consensum, quatenus videlicet tumor superior circa sextam costam distendit cum violentia perforatos tendines.

Ad eundem modum descendit dolor vsque ad lumbos, quibus alligatur musculus iste; quare nisi origines, figuras, & terminos longarum partium corporis pernoſcamus, non video, quomodo possimus diuinare affectum per consensum initia, & causas; & nisi perfecte sciamus quomodo fibræ horum musculorum quoque uersus perreptent, non video, nos posse in hanc cognitionem peruenire, quando erit per essentiam, & quando per consensum iste affectus; & versa vice; quoniam vidimus aliquando tumores, & hernias in testiculis distendere vasa deferentia, & omnes musculos ventris, attamen dolorem ascendere ad origines, & principia musculorum.

Quare poterit esse tumor in testibus, & dolores ascendere ad sextam costam, vsque ad umbilicum, ad os pubis, ad lumbos, ad os ilium in linea candida; sicut in Aſcite, sentitur dolor in osse sacro, ubi ita distenditur epigastrum, ut lumbi, quibus mu-

sculi alligantur, summum ob distensionem patiantur dolorem.

Videant ergo omnes, an verum sit hoc dictum, ubi dolor, ibi morbus, morbus erit in testiculis, dolor vero circa costas sextam, septimam, octavam, & nonam, & versa vice: morbus circa costas, & dolor erit in testibus, vel in osse pubis.

Præterea cognito vsu musculorum intestinorum, sed non satis est solum vniuersaliter illi cognoscere, quia omnes sciunt octo musculos ventris in hunc finem esse conditos, ut compriment intestina gratia eijciendi feces: proprius vsus non ita facile ab omnibus cognoscitur; quare sicuti de descendibus musculis, quorum officium est inferiora Thoracis constringere diximus valere, inferiora thoracis non constringuntur, ergo erunt læsi musculi obliqui descendentes, ergo in his potest esse morbus vsque ad sextam costam, unde nascuntur, quando dolor erit circa pubem; similiter de ascendentibus musculis est dicendum quorum munus proprium est constringere intestina trahendo quatuor inferiores costas deorsum, quibus alligantur.

Hic obiter scias, quod dilatatur thorax, quando trahuntur deorsum coste, contra aliquos, qui credunt tunc dilatari, quando iursum coste efferuntur: dicas ergo, coste istæ quatuor infernæ diminutæ trahuntur deorsum, ergo musculi hi ascendentes sunt læsi, ergo potest esse dolor in istis quatuor costis, quibus alligantur isti duo musculi, ascendentes, & morbus in ilibus, unde sumunt principium.

Rectorum vero musculorum proprium officium est sternon, & macronatam cartilagine trahere deorsum, & simul comprimere ventrem, & dilatare thoracem: si deficiet hoc munus, crunt læsi isti recti musculi, & morbus poterit esse in medio ossis pubis, quando dolor erit circa sternum, vel versa vice.

Transuersalium denique musculorum munus proprium est constringere hypocondria, quia suis transuersis fibris amplexantur tota hypocondria, & oriuntur a vertebris lumborum, & inseruntur ossibus ilium, & pubis, quare si deficiet hoc munus constringendi hypocondria, isti musculi erunt læsi, ergo poterit esse mor-

bus in lumbis, & dolor circa ilia, & circa pubem, uel versa vice, & hūc in modum peruenies tandem ad cognitionem sympathiæ musculorum ventris.

Errant empirici, dum pubem dolore affectam tractant anodynis, quando causa doloris pubis non est in pube, sed inter sternon, & mucronatam cartilaginem.
Cap. XIX.

F Vir quodam malo infortunio percussus amicus in parte illa, quæ sita est inter sternon, & mucronatam cartilaginem, & eique contigit post hanc percussionem, dolorem ab ipso persentiri circa umbilicum, & circa medium ossis pubis; & quando post curatam inflammationem ob percussionem factam sperabat omnino fore doloris expertem, tunc relicta dispositione scyrrhosa in patiente particula cum indolentia, aliubi dolores ab ipso persentiebantur.

Tunc empirici semper applicabant remediæ ossi pubis, & umbilico fomentationes, emplastra, & topica omnium generum, cuius erroris occasio fuit anatomix insectia, quia res hunc in modum se habet, musculi recti à medio ossis pubis enascuntur, & rectis fibris ascendunt vsque, & supra mucronatam cartilaginem, & desinunt in sternon coherentes sextæ, & septimæ costis; his rebus fiebat, ut, tensis fibris rectis in parte superna, & induratis ob scyrrhosam dispositionem fibrarum horum musculorum rectorum, quæ ad pubem pertenuiunt magis aptæ ad cognoscendum dolorem, quam illæ, quæ in parte, ubi est scyrrhus factus indolens, dum amicus premebat partem anteriorem abdominis trahendo thoracem deorsum, quod est munus, & officium horum rectorum musculorum, magnum patiebantur dolorem non circa sternon, sed ubi est pubes.

Quare cum musculus in parte inferna per consensum generis, & per accidens, quod est ratione alterius partis superioris patiantur, cur in inferna parte ubi non est morbus, vis topica adiungere? esset perinde ac velles umbram auferre non ablato corpore, quare debemus nos respicere ad id quod per se indicat, &

non per accidens, & per consensum, ut altioribus principiis ostendimus in libro de indicatione, nec valet ubi dolor, ibi morbus, quia hæc propositio est in materia contingente, ubi ambæ contrariæ propositiones falsæ sunt, veluti si diceremus, semper ubi est dolor ibi est morbus, hæc est falsa, falsa quoque est contraria: numquam ubi est dolor, ibi est morbus; quare inserimus, subalternas esse veras, quod aliquando ubi est dolor, ibi sit morbus, & aliquando non sit dolor, ubi est morbus.

Error explicatur quorundam, qui topica applicarunt pectori, cervici, & brachijs, quando ossi sacro lesa à morbo existente in exordio quarti musculi thoracis erant applicanda. Cap. XX.

Aliquando vidimus patientem constitutum fuisse aliquo dolore circa os iacrum, & paulo post consequutam fuisse lesionem respirationis; quia ob consensum musculi extensi ab osse sacro ad cervicem lasso fuerit communicata; unde patiens non solum in difficilem respirationem incidit, verum etiam in illo inceperunt brachia stupore aliquo affici, quis posset causas tantæ sympathiæ, atque consensu diuinatæ, nisi ex animo prius expenderet huius quarti musculi thoracis initium, progressum, quibus partibus implantetur, & officium, quod ab ipso debet expleri?

Est enim quartus musculus thoracis adeo longus, ut sit verum exemplar illorum affectuum, qui per consensum generis sentiuntur eminus à radicibus, atque morborum exordijs; quoniam oritur ab osse sacro, & ab interno osse ilium, & scādens per lumborum vertebrae pertinaciter adheret decem primis costis, quæ huius musculi ministerio atctantur causæ, constringendi thoracem, & exprimiendi fulgines; & tandem inseritur septimæ cervicis vertebrae: ut hinc non sit mirum si dum in exordio afficitur hic musculus tumore, vel dolore, vel lassitudine aliqua, quæ sit tensiva, vel vlcerosa, vel phlegmonodes, necessariò lædantur partes, quibus annectitur.

Huius enim quatuor musculi usus est

ligamentorum munere, quibus alligatur decem superioribus costis, coarctare thoracem; quare, læso huius musculi exordio, necessarium sequitur, vt cum aliqua difficultate coarctetur thorax, vnde fuligines ob diminutam coarctationem thoracis retineantur, & inde tantam passionem illis retentis experiantur miseri, vt sentiant propemodum suffocari; tunc quis risum teneret, videndo empiricos nostrates in tali symptomate vti oleo amygdalino causa iungendi pectus, cum in pectore nulla sit noxa, nulla mala causa, vel morbus confideat? potius enim ipsi deberent superlinire nates, quam pectus, quinimo, si fomentationes adiongeretur lumbis, & vbi causa hæc adesset, aliquid opis illico patiens consequeretur: quoniam contingit, vt ob hanc musculi longitudinem, causa esse possit circa lumbos, vel circa os sacrum, & circa ilia, vnde nascitur, & aliquando læso principio cervicem dolere, cum in septimam cervicis vertebram musculus inseratur.

Præterea ex hoc quarto musculo læso in exordio, vbi est os sacrum, fieri potest motus brachiorum diminutus, & audias cur, quoniam nervi inseruientes brachio, & manibus exoriuntur à vertebra cervicis, quorum nervorum capita aliqua, si comprimantur à distenso hoc quarto musculo, qui peruenit usque ad septimam vertebram cervicis, potest esse, vt propterea langueant brachia; & digiti manus semistupore afficiantur, causa tamen existente in osse sacro; ecce igitur, quod ob consensum vicinitatis, quatenus nimirum musculus comprimit vicinos, & adherentes nervos, deinde brachia, & manus languent, & adeo in nonnullis digiti patiuntur, vt resoluti videantur? en quo pacto morbus est in clunibus, attamen adeo potest sympathia, vt digiti manus aliquando bene constitutæ partes non expleant officiorum suorum munera.

In simili casu vidi conuocatos à præclarissimis viris empiricos, qui videntes in ægrotante respirationem difficilem, & illi dolere cervicem, & lumbos, & insimul os sacrum, brachia, & manus semiquodam stupore aliquando affici: asseruerunt anedicta symptomatica omnia à capite prodire, & caput à subiectis visceribus

humorum malam sobolem recipere, deinde tot pharmaca pro corrigendis capitibus, & hepatis affectibus proposuerunt, & applicarunt præclarissimo patienti, vt interim priusquam posset vniuersa propostita medicamenta haurire, accesserit Vexula pharmaceutria, quæ, tempore crisis non ossi sacro, vel lumbis, vbi erat opus, sed brachijs, & digitis manus, & pectori fabulosam quædam innunctionem adiunxit, & tunc natura superante morbo, vultus gratias patiens egit, & non medicis, qui medicinis vexarunt interna viscera alioquin optima sanitate donata, quoniam nullus erat alter modus tollendi illa symptomatica in ægrotante illo melancholico, nisi adiungendo fomentationes lumbis, & ossi sacro; soliti enim sunt melancholici homines, ob halitum crassum in musculis existentem, sæpe lacerari; quando accidit, vt quartus iste musculus thoracis spiribus istis melancholicis corripatur, tunc tendines istius musculi, qui sunt affixi costis gratia constrigendi pectus, vt fuligines expellantur, impotentes, & inertes à flatibus reddantur, vt hinc tendines, cum non probè coarctent, atque constringant pectus, aliquando per aliquod breue temporis spatium melancholici isti videantur suffocari.

Similiter quatenus tendines distensi sunt flatibus, cervix, cui affixi sunt contrahitur in posteriore partem, vnde oritur cervicis dolor.

Ex alia parte tendines huius quarti musculi thoracis, quatenus sunt tensi, comprimunt capita nervorum à septima ceruice procedentium, & alia sequentia nervorum capita, vnde brachia, & digiti manus ipsorum nervorum furculis induti semistupore affici videntur.

Demum tendines huius quarti musculi comprimunt musculos dorsis, & capitis, vt totum dorsum, læso hoc quarto, videatur læsum; hinc fit, vt, quarto læso, lædatur sextum par dorsis, quod maximè arctatur huic quarto musculo, cuius officium est, dorsum, lumbos, & thoracem dirigere, vt possit contingere læso hoc musculo quarto à flatibus melancholicis, lædæ respirationem, cervicem, musculos dorsis, nervos brachiorum, & digitorum manus: Colligas ergo ex sympathia vicinitatis cogni-

cognita in quarto musculo, quam multa cognoscere, & quam promptè remedia adiungere poteris.

Error quorundam qui topici tractarunt cervicem, dum non poterat flecti ob pretopathiam existentem in quinta thoracis vertebra.

Cap. XXI.

Contingit misero cuidam seni, ut ob casum ab alto, ictum in dorso circa quintam vertebra[m] thoracis in exortu primi musculi dorsi reciperet; evenit tamen, ut post multos dies dolores in ceruice eum infestare inciperent, nihilominus percussam partem, siue accideret ob indolentiam scyrrhosæ dispositionis, siue ob resolutum locum, nullo premi, & uexari dolore obseruabatur, hinc ab optimo isto sene accersiti empirici, qui semper faciles sunt ad credendum, ibi esse morbum, ubi videntur symptomata, adiunxerunt non dorso icto, atque percusso; sed ceruici dolenti olea, unguenta, & fomentationes, quæ re uera nullam opem præstare potuerunt, & meritò; quia cernix non erat læsa per se, sed per consensum alterius partis.

Erat igitur operæ pretium perquirere partē affectam, in qua erat causa, & propathia illius doloris, quare, cum ego quoque essem accersitus, ea methodo incedendū mihi proposui, quæ primariam affectionē posset docere, quod ut facerē, incepti prius expendere, quodnam officiū in dorso illius senis deficeret, ut possem ex officio læso in cognitionē loci affecti peruenire, quare uidens patientem non posse flectere superiorem partē dorsi, ex hoc læso officio statim inueni lesum esse primum dorsi musculū, quia ad hunc musculum pertinet ex omnium medicorum consensu hoc munus flectēdi superiorem partem dorsi; exinde, cū hic musculus oriatur à quinta vertebra thoracis & subiectus stomacho, & œsophago ascēdat per internas partes usque ad occipitium, & in primam ceruicis vertebra[m] inseratur, ex hac cognitione originis, & totius progressus musculi, mihi non fuit difficile inuenire in musculo omnia loca, in quib. posset esse hæc primaria affectio,

poterat .n. esse, uel in principio, unde nascitur musculus, uel in musculi itinere, siue progressu, uel in parte, in quam inseritur; cognitis deinde locis, quæ affici possunt, non fuit similiter mihi difficile, ex præcedentē cōfusione dorsi facta in illa quinta vertebra, unde oritur iste musculus, colligere, symptomata illud ceruicis certò trahere ortum à quinta vertebra thoracis, & in quinta illa vertebra, quānis dolore, & tumore careret, esse primariam affectionem, quam primariam affectionem sanè non potuisset inuenire empiricus; qui origines, progressus, & termini, nos musculorum non cognouisset.

Præterea, ut perfectissimè scirē, an in exordio huius primi musculi dorsi esset primaria causa, cur ceruix non poterat flecti, opus erat, ut excurrerē hūc nodū, an in exordio musculi affectio esset per se, uel per consensum uicinitatis alterius musculi; cognoui autē affectionem esse per se in hoc primo musculo dorsi circa quintā vertebra[m] hac potissima ratione, quia nulla alia alterius musculi functio incepti prius deficeret, nisi ista, quæ est flectere partem dorsi supernam; quare ex actione primo loco læsa cognoui, primū musculum dorsi esse principaliter lesū, sed non in ceruice, quoniam ibi nullum erat signum lēSIONIS permanentis; sed in alia parte istius musculi, ubi erat ictus factus; læpē enim cōtingere potest: ut causa lēSIONIS sit in uno capite, & in alio lōgē diuerso illius lēSIONIS signū appareat, sicuti evenit illi misero patienti, qui ob percussionem circa quintam vertebra[m] thoracis comparauit scyrrhosam dispositionem, & inde indolentiam, quæ scyrrhosa dispositio dorsi erat in causa, ut ceruix nō posset flecti, uel dum flecteretur, magnus ab ipso persentiretur dolor.

Sed quoniam potest cōtingere, ut colulum non possit flecti ob lēSIONEM huius primi musculi dorsi, factam, non solum ab hac scyrrhosa dispositione, uerum etiā à paralyti neruorum, qui irrigant hunc primum musculum dorsi; expedit breuibus docere uirtute artis anatomicæ modum cognoscendi, quando iste musculus sit lēsus ob paralytism.

Methodus ergo, quæ nos docere potest, an primū par musculorum dorsi deficiat

ficiat ob resolutionem, vel ob paralyſim, in obeundo ſuo munere, quod eſt fleſtere dorſum, & ceruicem eſt, quia ubi accideret reſolutio vel paralyſis, quod idem eſt, nonnulli alij muſculi neceſſariò eſſet reſoluti, quoniam, cum reſolutio fiat per neruos, & nerui veſtientes primum hunc dorſi muſculum enaſcitur à tertia vertebra cernicis, & à quarta, hoc ſequeretur, quod cum à tertia prodeant quoque nerui veſtientes ſecundum par muſculorum capitis, & muſculum illum quadrangularem trahentem deorſum obliquè labia, & iſdem neruis irrigetur illud par muſculorum, cuius officiũ eſt trahere ſcapulã ſuſum, neceſſariò, ſi fieret hæc reſolutio in hoc primo dorſi per generis conſenſũ, qui ſit per eoſdem neruos, eandẽ reſolutionem paterentur omnes iſti in aliqua parte, & per conſequens in ſuo obeundo munere deficerent; vnde ex horum muſculorum læſione certò colligere poterimus, neruos veſtientes primũ muſculũ dorſi eſſe læſos in origine, & per conſequens illum paralyſi eſſe affectum.

Similiter ſi eſſet hæc reſolutio in hoc primo muſculo dorſi per neruos à quarta vertebra prodeuntes, tunc cũ iſdem neruis ab eadem quarta prodeuntibus ſit contextus cucularis muſculus, & ab eadem quarta vertebra enaſcatur propago neruorum, quæ vnita cum alijs proficiſcitur ad mouendum diaphragma reſpirationis gratia, neceſſariò aliqua læſio ob hanc paralyſim obſeruaretur, vel in cuculari, vel in diaphragmate; ſi verò ex alia parte cognoscemus virtute anatomiz, non eſſe ob reſolutionem neruorũ: inferendum erit, factam fuiſſe diſpoſitionem ſeyrthoſam in principio, vnde enaſcitur muſculus, cui parti appoſitis emollientibus tandem duci poſſet paſſens ad priſtinam ſanitatẽ.

Oſtenditur exignorata ſympathia inter ſeptimam thoracis vertebra, & ceruicem, empiricos poſſe in plures prolabi errores. Cap. XXII.

PViſi ex capite pituitoſi humores aliquando per ſuperiorem ſpinæ partẽ deſcendunt, & vſque ad ſeptimam thoracis vertebra perueniunt, & ibi conſiſtũt,

atque firmantur ob ſuam viſciditatem, cõtingere deinceps poteſt, vt ob hunc pituitolum inſarctum ceruix, & caput nõ poſſint extendi; In quo caſu aliquãdo vidi empiricos localia adiungere ceruicis, morbo exiſtẽte in hac ſeptima vertebra, ubi quantum hoc par muſculorum extendentium ceruicem ſumit initia.

Sed errant nimium ſanẽ, quoniã ſymptomaticus iſte affectus in ceruice exiſtes cubito ferè diſtat à morbo, qui re verò agit radices non in ceruice, ſed in thorace circa ſeptimam vertebra; eſt igitur operæ prætiũ in omni mala valetudine muſculorum præſcire, quodnam officiũ deſiciat, & ex officio ad muſculi læſi cauſam progredi, ſicuti eſt faciendum in præſenti caſu, in quo oportet perpẽdere, ad quem muſculum pertineat erigere dorſi ſuperiorem partem, & ceruicem, & caput per conſequens extendere; deinde cognitò, hoc officiũ pertinere ad quartum par muſculorũ dorſi, illicò cognoscemas ex anatome, vel ſaltem ex Veſalij, & aliorũ obſeruatiõne muſculum illum oriri à ſeptimæ thoracis vertebrae ſpina, & ascendere per intermedia vertebra, & deſcendere peruenire ad ſecundam vſque ceruicis vertebra.

Quibus præcognitis, facilè eſt videre, quomodo res ſe habeat; nãſi circa ſeptimam vertebra eſt inſarctus pituitoſus, facilè cõtingere poteſt, vt ceruix propterea extendi non poſſit, nõ tamen ceruicis tunc ſunt aſſignanda localia, ſed ſeptimæ vertebrae, poteſt .n. eſſe morbus in vno loco, & in alio eius ſymptomata apparere.

Poteſt quoque dolor ob hunc inſarctum partis internæ dorſi excitari in ceruice, nullo humore in ceruice exiſtente, quod fieri poteſt, dum maxima diſſenſio fibrarum ab inſarctu humorum facta diſtendit ceruicem, & ipſi communicatur affectus.

Poteſt quoq; cõtingere, vt circa ſextam vertebra abſcindantur à chirurgo imperito tranſuerſum muſculi fibræ, & inde ſequatur, vt non poſſit eligi collum, in quo caſu collum nõ eſſet inungendũ.

Poteſt etiam cõtingere, vt ſint ibi humores indurati, quorum maleſicco fibræ non habent facultatem erigendi thoracis partem ſuperiorem, collum, & caput;

in quo casu solum emollientibus, vel deriuantibus administratis sextæ vertebræ thoracis symptoma apparens in collo optime curari possit.

Potest denique vsus istius quarti paris musculi dorsum & cervicem extendentis, non solum tolli ob scyrthosam illam dispositionem, verum etiam ob semiparaly- sin, quæ potest fieri ob compressionem alterius musculi adherentis, quod cognoscitur per vsu, & officium aliquod primo loco amissum, & inde ab vsu, & officio in notitiam musculi lesi ad cognitionem affectus pervenire possumus.

Diximus, quod possit esse semiparalysis causa, cur extendi non possit pars superior dorsii; & ratio est, quia, cum sit circumuectum istud quartum par musculorum dorsii propagine nervea prodeire à tertia, & quarta vertebra cervicis, si in his vertebrais est scyrthosa dispositio, non permeabit facultas animalis; & fiet paralysis; cognoscemusque hos nervos cervicis esse læsos ob paralytim, quando ceteri musculi circumuecti iisdem nervis, eadem mala valetudine erunt correpti, veluti musculi quadrangularis mouens oblique deorsum labia; musculi capitis, & ille, qui mouet sursum scapulam, quippe qui iisdem nervorum surculis prodeuntibus à cervice sunt irrigati, & si eadē mala valetudine prematur diaphragma, & propterea obstruatur aliqua difficultas respirationis, certissime colligemus quartum musculum dorsii esse læsum, ob morbum existentem in exortu nervi, & ratio est, quoniam à quarta vertebra ramulus missus est, qui cum alijs iunctus ad diaphragma pergit, ut moveat illud respirationis gratia, à qua parte ceteri nervi vestientes alios musculos quoque, prodeunt.

Potest demum contingere idem affectus, non propter læsos nervos cervicis prodeuntes à tertia, vel quarta vertebra, sed quia hic quartus musculus dorsii deficiat in explendo officij sui munere ob nervos à sexta, & septima vertebra thoracis semiobstructos.

Tunc quomodo cognoscere poteris si ne optima anatomia, quando ob initium horum nervorum à sexta, & septima vertebra prodeuntium deficiet quartū par musculorum dorsii? quare, ut hoc cognos-

cas, scias, eosdem ramos irrigare secundum par musculorum scapulae, & quintū musculum thoracis, & postquā circumuectum est illud quartum dorsii ijs surculis nascentibus à sexta, & septima vertebra thoracis, deinde circumuectire, quartum brachij, cuius munus est trahere deorsum brachium; inferas ergo, et læsum quartum par dorsii, & nullus cognoscitur tumor, vel infarctus, ergo ob semiparalytim quæ non erit in nervis illis cervicis, sed in illis sexta, & septima thoracis vertebrais, quoniam quartum brachij quoque deficiit in suo obeundo munere, quod iisdem nervis induitur, & nequam nervis prodeuntibus à cervice.

Errant, dum cervicem inungunt, vel dorsum, quando postrema ossis sacri pars esset inungenda. Cap. XXIII.

Frequentissime dorsum totum mala valetudine primi observatur, quoniam nunc in rectum ægrè extendi, nunc malè flecti, nunc dolores vnam partem, nunc aliam obsidere videmus, & præcipue in senibus, vel melancholicis hominibus, in quibus iugiter halitus melancholicus petens dorsum musculos distendit, unde excitantur dorsii dolores, unde malè flectitur, vel extenditur; nihilominus causa harum omnium passionum, quæ totum dorsum tot modis infestat, in vna tantum parte suam sedem tenere potest, ut modò sit in parte ima ossis sacri, modò in parte interna ilium, modò in musculi exordio, vbi maxima musculi virtus est collocata, & inde per totum dorsum hæc symptomata diffundantur.

Empirici tamen, dū vident læsum dorsum, incidunt in consuetum errorem inungentes vbi symptomata vident, quavis radix, & causa symptomatum dorsii ob longinquitatem musculorum esse possit in vna parte, & in alia eminens locata symptomata appareant, quod præcipue observatur in musculis duobus sexti paris, qui sunt ceteris omnibus nostri corporis longiores, quia exoritur ab imo ossis sacri, & ab interna parte ilium ad primam thoracis vertebra, & ad caput usque aliquando extenduntur.

Contingere ergo potest in postrema parte

parte ossis sacri aliqua mala humorum, soboles, quæ replens musculi initium, atque exordium distendat cum violentia totum musculum, donec dolor perueniat ad tensiones huius musculi affixos vertebra thoracis, & ceruicis; tunc si dolor esset in toto dorso, in ceruice; & circa primam thoracis vertebra; humor verò excitans dolorem esset fixus dumtaxat in imo ossis sacri, quis opem feret inungendo dorsum totum, quod caret humoribus, vel flatibus, quippe qui sunt collecti tantummodo in osse sacro?

Quare, ubi videris, dorsum in rectum non posse totum extendi, inferas effectum esse in sexto pari musculorum thoracis; dicas deinde, ergo erit in illo musculo, vel per essentiam, & per se, quod est secundum omnes partes, vel per accedens, quod est dupliciter, vel per consensum generis, vel vicinitatis; si verò per consensum alterius musculi vicini contingat, cognoscemus ex læsa aliqua actione, quæ nos docebit, quis sit ille musculus læsus; per hypothesim, si prima affectio, vel dorsi læsio, quæ inuasisset, fuisset, quod non extenderetur dorsi pars superior, tunc quartus musculus esset origo, cuius officium est partem superiorem dorsi extendere, & quia vicinus est sexto pari, quod potest ab eodem quarto comprimi, dicimus hanc lesionem, dum non dirigitur totum dorsum, pendere à sexto pari musculorum dorsi læso, quod tamen læsum sit per consensum vicinitatis quarti musculi, qui antea erat læsus, quare tunc erit considerandum, vnde exoriatur quartus musculus, & cui parti inferatur, & deinde contemplandus est progressus totius illius musculi, quoniam hoc modo erit tibi admodum facile originem morbi peruestigare.

Simili modo, sicut dictum est de vicinitate quarti musculi, de alijs omnibus musculis adiunctis, & vicinis sexto pari subaudiendum est.

Si verò in hoc sexto musculo, non in qualibet parte, quia sic esset per se, & per essentiam, & non per sympathiam, de qua loquimur, sed in aliqua tantum parte, quod est per accedens (quoniam statutum est ab Aristotele 8. phyl. 27. omne per aliud esse per accedens) erit aliquis hu-

morum infarctus, & in altera parte valde distanti perferentur morbi symptoma, veluti contingit, dum est tumor, vel flatus, vel alia cauiā extendens principia musculi in osse sacro, vnde contrahantur in se fibræ, & in longum ad supernas partes extendantur; tunc haud bubie dolor vsq; ad ceruicem perueniet, & ibi sentietur non per consensum vicinitatis; sed per consensum eiusdem musculi: quæ omnia cognosci poterunt ex officijs læsis.

Nisi promptè medicus omnia officia musculorum, & neruorum sciat, & memoria teneat, est impossibile, vt sciat mederi; cognitis deinde officijs primo loco, vel secundo læsis, cognoscuntur musculi, qui sunt læsi per se: cognito musculo principaliter læso, illico omnes eius partes illius musculi sunt ante oculos obijciendæ, & manibus tangendæ, & contemplandæ, quia hoc modo faciendo, adeo promptè inueniemus locum affectum, quamuis distet à symptomate, vt digito ostendi possit.

Si denique noxa sexti paris musculorum dorsi altiores ageret radices, & à semiparalyti dependeret, cognoscemus, hoc contingere ob semiparalytism, quando nullo dolore existente, non poterit extendi totum dorsum, quod eueniet vel per compressionem neruorum, vel per capitum neruorum angustiam.

Sed audias, quomodo in huius recognitionem peruenire poterimus, n erui; quibus irrigatur sextus musculus, sunt ex illis, qui oriuntur ab vndecima vertebra thoracis, & à lumborum vertebra, & ab osse sacro, & eadem propagines, deinde vestiunt quartum musculum brachij, quartum musculum pectoris, & tandem quatuor primos musculos femoris, vel duo prima pars, quod in idem recidit, inferas ergo, læsi sunt isti nerui huius sexti musculi dorsi, de quibus loquimur; ergo noxa, & affectus debet perferentur in quarto musculo brachij, quæ noxa est non posse brachium deorsum trahi: & in musculo quarto pectoris, cuius vsus est constringere thoracem expirationis gratia: & in primis quatuor musculis femoris, quorum vsus est semur extendere; quare colligas, læsionem in sexto musculo, nullo modo

modò accidere posse ob lesionem neruorum prodeuntium, ab osse sacro, & à vertebis lumborum, & ab vndecima vertebra thoracis, nisi quartus brachij, musculus, & quatuor primi femoris in læsione propriorum officiorum consentiant.

Errant, dum cubitum, quod non potest flecti ad pectus, inungunt; quando scapula, vel collum esset inungendum.
Cap. XXIV.

CAsus hic animaduersione dignus est, dū humores à cap. fluentes colliguntur in scapula, & inde, si ob humorum sarcinam, vel impedimentum cubitum non potest flecti, vel trahi ad pectus, tunc haud dubiè morbus est in scapula, eius verò symptoma in cubito.

Vel contingere potest, vt scapula percutiatur, aut vulneretur in processu ancyroide, vel in parte superna supercilij acetabuli, à quibus partibus enascitur primus musculus cubiti, qui vulgariter dicitur *el pescetto*, & radio implantatur, & propterea tollatur musculi officium, & vsus qui est flectere cubitum ad pectus.

Vel alio modo contingere potest, sicuti sæpiè vidimus in melancholicis, quos sæpiè hælitus feriunt; vt flatus, qui debito sunt crassiores tenaciter adhaereant musculorum exordijs, & spatio aliquo temporis musculorū officia maximopere à flatibus diminuantur, & impediuntur; propter similitudinem casum vidi, non semel esse conuocatos chirurgo vt ipsi læso cubito suppetias afferrent, & causas doloris demerit, vel redderet melancholicum patientem sospitem; vidi tamen semper eos topica omnium generū cubito adiūxisse, & non scapulæ; quia adhuc non peruenerunt ad ipsorum aures, quod alia corporis pars cubitum moueat, & flectat, quam ipsummet cubitum, & propterea; si cubitus non fungitur suo officio, medellam cubito, & non scapulæ esse adiungendam, credunt; quorum hominum inscitia, & temeritas quanta sit, sciunt anatomistæ, qui longitudinem musculorum, & progressus summa industria obseruant; sagax enim, & prudens natura in animantibus tot instrumenta composuit, quæ possent vniuersa officiorum suorum munera explere; neque erat possibile in

eodem puncto, in quo officia expleantur, omnia instrumenta vniui secundum omnes partes.

Hinc opus est, vt Medici per musculorum officia, progressum, figuram, substantiā, & exordia incedant, & summa vtantur industria, vt possint peruenire in cognitionem instrumentorum læsorum, & ex ijs colligere suas consequentias: valet enim, cubitum non potest flecti, & ad pectus trahi, ergo musculus præcipuè primus cubiti potest esse læsus, sicuti in cadaveribus secundis videre possumus; & cum primus cubiti musculus à scapula oriatur, accidere potest, vt aliquando, læsione existente in scapula, & non in cubito, tollatur cubiti flexio; quod cum ita sit, cur tunc cubito adiunges localia, cum morbus sit in scapula?

Amplius tolli potest hoc officium flectendi cubitum per consensum vicinitatis; nam, si inflammatione musculus tertius, & quartus sint correpti, quorum officium est, cubitum extendere (de quibus, cum sint inter breues musculos, non est, vt loquamur, cum symptomata non possint in his distare loco à morbis) isti poterunt in consensum trahere musculo primum, & secundum, quorum officium, vt diximus, est flectere, & quamvis nulla mala valetudo sit per se in hoc primo cubiti musculo, esse tamen potest per consensum vicinitatis tertij, & quarti musculi, quibus re vera medicina esset adiungenda.

Similiter aliquando in ijs, qui ferunt cauteria, excitatur inflammatio, & omnes cubiti motiones, & vsus tolluntur nunc diligenter esset nobis perpendendum, cuiusnam musculo per se, & cui per accidens, & per consensum conveniat læsio illa ab humorum diluuiæ facta, si per consensum; expendere tunc debemus, an sit consensus generis, vel vicinitatis quæ quidem cognitio est impetrabilis, nisi originem, situm, figuram, & progressum musculorum calleamus, vnde enascantur, & quibus implantentur terminis; quorum omnium debet medicus exactissimam, & omnibus numeris absolutam tenere cognitionem; nam illis ignoratis, quis poterit diuinare, quibus partibus topicis sit occurrendum?

Debet

Debet igitur chirurgus prudēs conuocatus pro curanda aliqua malo musculorum ualetudine progredi per officia læsa, seruando quinque conditiones enarratas in capite tertio huius libri pro cognoscenda protopathia, quæ nos certò ducunt in cognitionem primariæ affectionis expēdendo prius, quæ officia sint illa, quæ primo loco læsa sint, per hypotesin in cubito hoc modo læso, dum æger agrotare incipit, primo loco officium flectendi, & trahendi cubitum ad pectus deficit, deinde contingit, ut cubiti aliud munus deficiat, quod erit cubitum non posse extendi; hætenus nostri per primum fontē iam traditum in huius libri exordio primariam affectionem esse in musculis trahentibus cubitum ad pectus; & præterea nostri ex anatomia, horum duorum musculorum flectētium cubitum primum oriri à scapula duobus initijs, & inseri in radium.

Amplius cognita figura, & situ fibrarum, & progressu, tunc ex dolore, tumore, & percussione poteris conijcere, ubi collecti sint mali humores.

Insuper ex eodem fibrarum situ colliges, non esse incidendum transuersim, ne pereat musculi officium.

Postremò ex anatomia habes, secundum musculum flectētē cubitum latere sub primo, & esse carnosum, & in ipso delitescere posse humorem, quem ubi cognoueris non esse in primo, ac percipies, hoc munus flectendi magis deficere, quàm extendendi, & primo loco fuisse læsum; magnum momentum habebis inferendi in secundo cubiti musculo latitare humorem, quod dignum est inquisitione, quia humores in alta ista parte collecti, dum in pus conuertuntur, & inde excitantur dolores truces, atque secelesti, tunc qua in parte sit incidendum, ex ortu, situ, & fibrarum progressu poteris colligere.

Quæ cum ita sint, quo pacto sine hac anatomica cognitione empirici, uel Medici dogmatici in simili casu scient unum uerbum mouere.

Postremò, ut redeamus ad consensum factum per neruos, asserimus, cubitū officium flectendi ad pectus amittere, non solum, quia in capite musculi sit morbus, sed quia possit esse morbus, uel impedimentum in neruis, nam potest esse læsum

secundum par neruorum manus, & propterea hic musculus primus cubiti, qui est indutus, & circumuolutus eodem neruo, obire non possit suum munus; quare, cum hoc secundum par neruorum enascatur à sexta uertebra ceruicis, potest euenire, ut in sexta uertebra sit aliquis morbus, & eius symptoma in cubito appareat; ab hoc enim secundo pari neruorum ortu à sexta uertebra mittuntur duo surculi nerui ad huius musculi principia; quare, si circa sextam uertebam erit inflammatio, uel tumor, uel scyrrhosa dispositio, quæ impedirent, ne cubitum flecti possit, non cubito, sed sextæ uertebrae remedia essent adiungenda.

Cognoscemus uerò, neruum hunc in ceruice esse læsum, quando ceteri musculi eodem neruo irrigati erunt læsi, cum igitur primus cubiti musculus hoc neruo irrigatus, & deinde neruus idem descendat usque ad digitos, & præcipuè secundo articulo pollicis det motum; nalebit consequentia, cubitum non potest flecti nulla existente causa manifesta, quæ nobis philosophandi occasionem leuaret, ut sunt uulnera, casus ab alto, &c. & insimul cum hoc musculo primo cubiti secundus articulus pollicis non fungitur suo officio, ergo, si cubitum non poterit flecti, illud eueniet ob læsam nerueam propagationem, quæ deducitur à secundo pari neruorum manus, & quæ tandem exordium trahit à sexta ceruicis uertebra.

Errant, dum digitos manus illorum, qui non possunt flectere secundos articulos, inungunt, quando causa huius symptomaticus est in humero, uel in rete, uel in collo. Cap. XXV.

Frequentissimè errant empirici, dum ob istū in humero, uel in ceruice accidit, ut digitum nec flecti, nec per consequens aliquā manu apprehendi possit; summā enim manum, & digitos inungunt, & non humerum, uel ceruicem, ubi est causa, & radix huius symptomatici, digitosque ipsos tractat uinaceis, luteis Patavini, oleisque deinde limbricatis, & alijs plerisque emplastris; deberent sanè mirabilem nostri corporis sympathiā pendere, quæ in longis musculis, & neruis præcipuè ob-

serua-

feruari solet; & per officia lesa peruenire ad partem affectæ cognitionem; inde perquirere, in quo loco musculi, & nervi malè constituti sint; quoniam cuenire sepe solet, vt ceruix, vel humeri internum tuberculum percuriatur, vel baculo cedatur, vel casu cõstringatur, aut vulneretur, & inde digitis procul valde locatos per hanc generis sympathiam sua mouendi officia amittere; in quo casu circulatores isti chirurgi semper obliniunt digitos, credentes in digitis esse humores, qui motum tollant.

Amplius consulunt, dum flecti nõ possint digiti, causa in humero, vel in collo existere, vt in læsa manu teneatur, & manu apprehendatur pila, vt in assidua, & iugis flexione digitorum, & apprehensione pilæ amoueant digitorum defectum, rati alibi nõ esse causam deperditi motus digitorum, quam in digitis. Quinimò licet ab ipsis ægotantibus aliquando sint cõmonestati de humeri, vel ceruicis contusione, nihilominus adduci non possunt, vt credant, morbum non esse in digitis, cum ipsos læsos videant.

Cæterum non est opus multis verbis, vt tantum errorem rejiciamus, cum error ipsorum adeo certus sit, vt manibus ipsis tangi possit; quoniam hic musculus flectens secundos articulos quatuor digitorum enascitur ab interno humeri tuberculo, deinde factus carnosus iuxta longitudinem cubiti, & radij defertur, & vbi medium cubitum præterijt, tendens in angustum terminatur in quatuor tendines perforatos, qui dumtaxat implantantur secundis articulis quatuor digitorum, gratia ipsos flectendi; quare, cum res se habeat, cur, si post læsum internum humeri tuberculum secundi articuli quatuor digitorum flexione sua priuentur, volueris tunc auxilia digitis adiungere, & in vola manus pilam ab ægris gestari? esset opus tunc musculi initijs, & humeri tuberculo interno, vel ceruicis suppetias afferre, quia in humero, vel in ceruice est morbus; in digitis verò nihil aliud, quàm morbi symptoma, cui symptomatici, vt symptoma, nunquam est occurrendum.

Potest quoque esse, vt morbus non solum in humero, sed etiam iuxta cubiti, radijque longitudinem habeat suam sedem, per

quam partem defertur musculus iste, & ibidem fibræ, quæ deinde cessant in tendinè sint laceratæ, vel à vulnere, vel à tōsore imperitos, qui eas transuersim secussit gratia aperiendi apostema, vel callo aliquo durissimo ita sint obductæ, fibræ illæ non amplius diffundere possint suam vim in tendinem, & per consequens digitum non flectantur; tunc, si digitos inungeres centum annos, oleum, & tēpus conteres.

Sed audias casum, quē nuper vidierat inflammatio in parte carnosâ musculi paulo post à suo principio, tandem collecta penitus fuit sanies, quæ truces, & insignes dolores faciebat, tunc tonfor inersperatus transuersim profundè secuit musculū, & sectis fibris, musculus inde amisit motum secundi articuli quatuor digitorum, vnde casus factus deinde fuit deploratus ob fibras transuersim excisas.

Nõ errant tamen si solâ cutim transuersim incidere; quia sepe excisio transuersim facta dum cutis naturaliter sibi applicatur est melior & vtilior: Gal. 15. meth. 3. de inguine dicit quod cutis excisio debeat fieri transuersim: quia dum membrum inflectimus naturaliter cutis sibi applicatur, videas igitur, quæ imminent pericula, dum tractantur hæc nostra corpora ab empiricis, vt propterea peritissimis Medicis, & Chirurgis, & non tonforibus sit concedendum, quia sciant & longitudines, & latitudines musculorum, & in quas partes extendantur, & quibus partibus implantentur.

Alium similem casum uidimus cuiusdam icti, atque percussus in humeri interno tuberculo, qui motionē digitorum amisit, & postquā empiricus multorum dierum curriculo olea, & unguenta digitis adiudixit sine salutis spe, tandem æger bono spiritu percitus tradidit se medico anatomico, qui factis fomentationibus in illa humeri parte læsa, & exinde eidem parti ammoniaci in aceto dissoluto cum quo essent mucilagines radicum altheæ comixtæ, applicito; breui temporis spacio fuit ad portum salutis translatus.

Præterea, cum musculus iste flectens digitos possit vires suas amittere, nõ solum ob læsum musculum in exordio, uerum etiā ob nervos læsos in ceruice, unde oriuntur nervi uestientes manus; propterea

pterea est inuenienda methodus anatomica, quæ ex officiis læsis nos perfectè doceat, quando morbus existens in exortu nervorū manus à ceruice in prodeuntium sit in causa, cur secūdi articuli quatuor digitorum non flectuntur. Audias igitur, quomodo sit comparanda hæc cognitio; ad sunt furculi isti netuei, antequam ingrediantur primum hunc musculum flectentem hæc secunda ossa quatuor digitorum, prius peragant per secundum musculum flectentem cubitum, & deinde inferuntur in istum primum, de quo loquimur, & post istum tandem peragant per musculos flectentes tertia ossa quatuor digitorum, & tertium articulum pollicis.

His ergo positis, talem possumus demonstrationē formare, non possunt flecti quatuor ossa digitorum, pollice excepto, & simul cubitum non flectitur, neq; tertius articulus quinque digitorum, ergo morbus lædēs hæc officia nullo modo poterit esse digitis, neque in musculo illo flectente digitos, sed in altiori exordio, quod est in capite tertij paris nervorum manus, quod par est commune omnibus illis musculis, cū ab ipso facultas motrix, & sensatrix trahāt originē, quod par immediatē oritur ab illa nervorum rete, cuius imago perbellè exprimitur in Cardinalium galeris; sed demum tamquam à trunco, & stipite proprio à uertebis ceruicis trahit suum principium.

Ex quo discursu optimè colligere possumus, quando digiti nō possunt flecti, an hæc mala ualetudo digitorū proveniat à morbo existente in digitis, uel in exordio musculi, uel in ceruicis uertebis; & inde quoq; animaduertimus, quando in digitis hoc modo læsis sint adiungenda topica digitis, quando exordio musculi flectentis secundos articulos, & quando uertebis ceruicis. Gal. 3. de loc. aff. 10. eadem philosophia incedēs persecutus est locum affectum in Pausania Syro Sophista: qui Romam ueniens cadens è uiculo ictus est in dorsi initio & amisit sensum duorum digitorum minimorum si-

nistræ manus. Addit alios medicos adaptasse remedium digitis, & in peius Pausaniam incidisse; dicitq; se initio dorsi percussū apposuisse, & breui sanitati restituisse.

Hinc quoq; facile est uidere, quo pacto nosstrates nonnulli, qui se dogmaticos faciunt, in errorem incidunt, dum in omni officio læso musculorum, si primis inunctionib. læsio non tollatur, uolunt cerata, stillicida capiti adiungere, perinde ac solū à capite prodirent omnes causæ lædentes officia musculorum, & nervorū: ut hinc sæpè frustra administratis his suis medicinis caput, & cætera ægrorum uiscera in egritudines longè maiores trahant.

Errant, dum digitis illorum, qui tertium articulum quatuor digitorum, pollice excepto, flectere non possunt localia, applicant, quando alijs longè diuersis partibus essent applicanda. Cap. XXI. I.

VT magis eluceat hæc generis symptomathia, quæ fit per musculos, & nervos continuatos, & in longitudinem extensos; agendum proponimus de longis digitorum musculis, ut errata empiricorum de consensu generis (quantum fert reuinita nostra) anteuertamus, & corrigamus, quia licet de omnib. consensibus, qui accidere possint, non sit possibile, cū sint ferè infiniti, pertractare; attamē nos expergefacti horum exemplorum luce, non tam facile in errorem corruemus.

Contingere ergo potest, ut tertius articulus quatuor digitorum, pollice excepto aliquando non flectatur propter consensum morbi existētis in parte anteriori, & interna articuli cubiti, unde hic musculus oritur, quiq; descendens, atque ad brachiale perueniat; diuiditur in quatuor tendines, qui cum sint subiecti tēdinibus primi musculi, ante radicē secundī digitorum internodij perforant eos tendines, & deinde inferuntur in tertia ossa digitorū, gratia flectendi, & trahendi digitos, ut optimè constringantur; uidētes ergo empirici tertia internodia horum quatuor digitorum nō flecti, ob imperitiā anatomie tanta non pollent cognitione, ut sciant, uel credāt, digitos immobiles posse esse sanos, & morbum efficien-

clētem hoc symptoma esse in cubito, qua sympathia horum longorum musculorum ignota, ceterorum more symptomaticum occurrūt oleis, & ceteris remedijs, quae aliquid opis praestarent, si cubito ea adiungerent, ubi est radix, & causa symptomatis digitorum.

Sed quando digiti non possent flecti, quia in exordio musculi flectentis tertium articulum sit morbus, ob vulnus, vel ob alias causas, tunc si digiti topica, quamvis peroptima sit, adiungantur, nullam conciperemus spem ex topicis adiunctis, digitis: vel si cubitum ictum ob casum, vel ob alias causas reciperet, quomodo inungendo digitos curati poterit, vel demum si ronsor aperiendo apostema circa cubitum, vel supra brachiale transuersum incidere hunc musculum, & inde digiti non possent flecti; quis risum teneret videndo empiricos digitis applicantes localia?

Potest quoque contingere hoc symptoma in tertio osse quatuor digitorum, pollice excepto, quia nervus vestiens hunc musculū sit angustia aliqua oppressus in origine prodiit enim ramus vestiens hunc musculum a tertio pari nervorum brachij, & a quinto tamquam a primo stipite, sed magis proximē deducitur a rete imaginem exprimentē cordularum Cardinalium galeri, cognoscemus autem affectum existentem in digitis a nervorum exordijs prodire, quando musculi illi, qui priusquam isti, ipsidem nervorum ramis induuntur, erunt laesi, sicuti est musculus flectens cubitum, nec non illi musculi qui irrigantur post istos, qui trahunt tertiam internodia quatuor digitorum, quique movent pollicem, ipsiunque ab alijs separant, ut omnis ferē motus digitorum ab istis furculis tertij, & quinti nervorum brachij exoriatur; valebit ergo hac consequentia, non flectuntur internodia tertia quatuor digitorum, ergo morbus potest esse in tertio, & in quinto paribus nervorum brachiorum, ergo potest esse morbus in rete illo nervorum, vel in vertebis cervicis; ergo dabitur occasio, ut digiti amittant motum ob morbum existentem in ceruice, vel in rete; ergo tunc ad curandos digitos remedia collo; vel sub iugulo, ubi est rete, erunt applicanda; quae cum ita sint, quid diceret empiricus hac

Sanctory Sanctory Pars I.

cognitione priuatus, numquid non admiraretur, quando oculis proprijs aspicceret probum anatomicum post factam hanc consequentiam, quod digiti haberent amissam flexionem ob vitium in capitib. nervorum, in vertebis colli, vel in rete, fortamentationibus adiunctis vertebis, digitis motionem dare?

Nos faciemus denique hanc consequentiam, amotis percussionibus, & vulneribus, & similibus manifestis, si musculus iste flectens tertium internodium quatuor digitorum deficiat, & insimul cubitum, flecti non possit, & ceteri motus digitorum quoque deficiant, ergo in capitibus nervorum erit morbus, qui efficit hoc symptoma in digitis.

Methodus verò, qua distinguere possumus, an causa, & radix symptomatum digitorum sit in collo, vel in rete, vel demum in cerebro ipso, est, quia si primaria affectio est in rete, & non in ceruice, vel cerebro, symptomata aliubi esse non possunt, nisi inter digitos, & iugulum; si in ceruice, inter digitos, & ceruicem; si in cerebro, inter digitos, & ceruicem illius, & alterius lateris observari possunt symptomata; qua methodo Gal. progrediens peruestigavit causam, cur in homine illo veniente Romam digiti amiserint sensum inuenitque scyrrhofoam dispositionē circa septimam vertebrae ceruicis ob ictum factam, fuisse causam, cur digiti non sentirent, & inuento loco ceruici topica adiunxit, & paulo post sensationem digitis reddidit summa cum omnium admiratione.

Errant, dum inungunt quatuor digitos, pollice excepto, qui non possunt extendi ob morbum existentem in humero.

Cap. XXVII.

Non rarè accidere vidimus, ut digiti non possint extendi, quamvis in digitis nullus humor, vel alia causa praeternaturam observetur, quae motionem digitorum tollat, nihilominus non desunt empirici, qui digitos hos laesos per consensum vexant vnguentis, pinguedinibus lana succida, nec non etiam obliniunt ipsos oleo de iunipero, de terebentina, de ammoniaco, oleo phyllophorum de la-

G teri-

teribus vocato, & alijs plerisque tractant linimentis, horum omnium localium administrationem ipsimet empirici irrideant, si proprijs oculis in secandis corporibus origines musculorum intuerentur, ut quotidie vident anatomici qui in cadaueribus, suis manibus trahentes hunc muscolum sub externo humeri tuberculo, mouent mortuorum hominum digitos; musculus enim extendens hos digitos oritur ab hoc humeri tuberculo, quippe qui si lædatur in illa superna parte, digiti alioquin sani immobiles ferè reduntur, quare si hæc scirent, & deinde viderent post percussum humerum digitos amittere motum, ipsi quoque non digitis, sed parti illi superiori localia applicarent.

Ideo non datur alter modus cognoscendi symptomata moritricum facultatum, nisi per cognitionem ortus, & progressus musculorum, & neruorum. Hinc si de ortu, & progressu primi musculi externi digitorum, cuius vsus est, quatuor digitos extendere, pollice excepto loquamur; dicimus, hunc muscolum in primis nasci ab hoc externo humeri tuberculo, & deinde incedere per cubitum, & radium, & in quatuor latos tendines cessare, qui inferuntur deinde à primo vsque ad tertium articulum quatuor digitorum sub vnguibus.

Ex hac concepta veritate colligimus cur non extendantur digiti, & est, quia huius symptomatis digitorum causa, & propterea habere potest radicem, tum in externo humeri tubere, quo læso digiti desinunt extendi, tum inter cubitum, & radium, tum iuxta brachiale: videas ergo, quomodo causa, quæ motum digitorum tollit, varijs in locis, & procul à digitis esse possit; quæ cum ita sint, quomodo vnguibus, linimentis digitis adiunctis, causa læsis existente in humero, vel inter cubitum, & radium, vel ante brachiale, volueris digitis opè ferre? pergas toto anni curriculo inunctionibus orientalibus opobalsami, & omnium generum, quod nihil facies, & totum amittes opus.

Præterea contingit aliquando, ut digiti isti quatuor non extendantur, non quia sit causa præter naturam in digitis, vel inter cubitum, & radium, vel in humeri externo tuberculo; sed quia sit in

parte longè magis remota, sicuti quando est in quarto coniugio neruorum brachij à quo sulculi vestientes hunc muscolum extendentem quatuor nominatos digitos prodeunt.

Methodus autem cognoscendi, quando digiti non extendantur ob morbum existentem in capite quarti paris neruorum à ceruice prodeuntium, erit hæc, quia omnes musculi circumuicini ipsidem neruis prodeuntibus ab hoc quarto coniugio sentient eundem defectum, & tales erunt musculi cubitum flectentes, & extendentes, qui irrigantur sulculis eiusdem quarti paris neruorum manus, antequam induatur iste musculus, de quo loquimur.

Præterea deficit in suo officio musculus extendens brachiale, & musculi præbentes motionem pollicis, qui ab eodem neruorum stipite motum suscipiunt; valebimus ergo ex omnium istorum musculorum læsione (supposito prius, causas alias euidentes non esse, quæ motum impediunt, veluti essent vulnera: & tumores) colligere, quantum par neruorum manus morbo uexari in ceruice, quare pro digitorum curatione remedia non digitis, sed ceruicis vertebri tunc essent applicanda.

Præterea contingere potest, ut digitus minimus non possit separari à reliquis, vel ob tumorem existentem in externo humeri tuberculo, factum à fractura, vel ab aliqua destillatione, vel ob morbum existentem in neruorum rete, vel in ceruice, propter quas causas si digitus minimus ab alijs abduci non possit, nunquam unguentis admotis digitos curari poterit.

Præterea causa, cur minimus iste digitus ab alijs non separetur, & palma tota fieri non possit, ubique in spatio illo ab humero ad brachiale potest hætere, nullo humore in digito minimo existente; tunc sanè digitus, vel palma tota non esset inuulgenda, sed locus, ubi confidet humor, siue sit in humeri capite siue inter cubitum & radium, per quem locum defertur musculus, quos locos læsos promptè admodum quisque cognoscere poterit, si anatomica facultate erit excultus, quoniam per officia læsa cognoscet muscolum læsum, cognito uero musculo læso, cognosceat illico omnes eius partes, in quibus

causa principalis posset agere radices, & cognosceret, in quas partes eius symptomatica possent diffundi, quæ partes illud occupant spatium, quod est ab externo humeri tuberculo usque ad minimum digitum.

Demumque virtute methodi traditæ in hoc libro inueniet, an per se, vel per consensum alterius vicini musculi affectus lædat corporis nostri operationes; Hæc sunt principia, per quæ optimè poterimus cognoscere, ubi sit in musculis morbus.

Demum, si vis scire, quando minimus digitus non possit separari ab alijs per nervum læsum in exordio quarti paris nervorum manus, scias ab hoc quarto pari nervorum, non solum prodire nervos vestientes hunc musculum separantem minimum digitum ab alijs digitis, verum etiam prodire ab eodem pari nervos vestientes musculos flectentes cubitum, & musculum extendentem brachiale; quare si digitus non poterit separari ob vitium in capitibus nervorum, necessarium musculi cubiti, & brachialis non poterunt fungi suo officio, & eo magis hæc consequentia valebit, quia nervi à quarto pari nervorum manus prodeuntes prius irrigant musculos flectentes cubitum, quam musculum istum separantem digitum; quare per hanc singularem methodum, cognita protopathia, poteris, si erit in collo, ibi adiungere auxilia topica, & non digitis.

Errant, dum digito indici, qui non potest extendi, adungunt topica, quando causa lesionis est in cubito, vel in ceruice. Cap. XXVIII.

SI videris hominem, qui non possit digito indice indicare, vel indicem, quod idem est, oblique extendere, illicd ex hoc læso officio dicere poteris, tertium musculum externum, qui prodit à medio cubito, ubi est linea illa aspera, & oblonga, esse læsum, quia huius musculi munus est extendere digitum indicem; quare poterit contingere, ut in medio cubito, unde oritur musculus, sit morbus, & index alioquin sanitate præditus patiamur per sympathiam cubiti: poterit

esse morbus in vlna, vel in cubito, ubi linea oblonga, & aspera existit, vel in brachiali, per quem locum transit musculus; vel poterit esse impedimentum in musculis vicinis, quatenus musculi coherentes, & vicini sint onusti, atque referti materia humorum (sarcina, vel quod tumidi tacti sint ob œdema, vel propter alias causas, & horum omnium morborum signa solum apparere in indice; quare loca affecta sunt inveniendæ, & ijs adiungenda sunt localia, & nequaquam indici per consensum læso; quo pacto uerò omnia hæc loca læsa cognosci possint, ex traditis in primo libro, & ex officijs lætis facile cognoscere poterimus.

Si uerò musculus huic destinatus muneri extendendi indicem integra gauderet ualitudine, & motio huius musculi diminuta, uel ablata prodiret à nervorum originibus; audias methodum, quæ ad huius cognitionis apicem nos certò transferre potest: à quarto pari nervorum manus propagines vestientes hunc musculum exoriuntur, & ab eodẽ trunco prodeunt nervi furculi irrigantes musculos flectentes, & extendentes cubitum, & musculos brachiales, & cæteros pertinentes ad digitorum extensionem, quare si index non posset extendi, & simul cubitum neque flecti, neque extendi possit; & similiter brachiale in suo obeundo officio deficiat, ex ijs semper consequentiam inferre poteris; quod in communi trunco nervorum, qui consistit in uertebis ceruicis, unde oritur quarta coniugatio nervorum, sit radix, & causa, propter quam index non possit extendi; quare si uolueris tunc indicem læsum subleuare, non erunt medicamenta indici, sed uertebis ceruicis, uel reti apponenda, quod empirici irriderent.

Quomodo autem cognoscatur an causa lesionis digiti indicis sit in rete, uel in uertebis, animaduertas, hoc cognosci posse ex præcedentibus alijs signis, quem admodum cognouit Galen. scyrthosam dispositionem post septimam uertebam ex ictu habuisse ortum: cognoscemus similiter ex ijs, quæ tradita sunt in primo libro capite 11. quod est de locis affectis cognoscendis.

Errandum digitum pollicem, cuius tertius articulus non potest extendi, inungunt, quando causa lationis, est in cubito, vel in ceruice. Cap. XXXI X.

Chirurgi in nulla corporis parte maiori diligentia uti debent, quam in cognoscenda, & curanda affectione digitorum; quoniam xpe accidit, ut digiti ob muscutorum suorum longitudinem, nullo morbo premantur, attamen amissam suam motionem habeant ob morbum in alia remota parte habentem radicem, unde digiti propter illius partis sympathiam munera sua explere non possint; quare, quories videris tertium articulum pollicis non posse extendi, neque ab alijs digitis abduci, inferas, ergo quartus musculus externus digitorum est male affectus, cuius vsus est extendere tertium articulum, & est ille, qui à cubito egreditur pnes tertium muscolum, quique deferitur supra radij appendicem, & inseritur tertio articulo pollicis; quare contingere potest, ut in cubito sit morbus, & in pollice tantum appareat hæc functio læsa: an ne inflammatio cubiti, vel cubiti percussio, vel vulnera in illa parte possint auferre pollicis motum? cur ergo vis empirice aux illa adiungere pollici? quando pollex non est alicuius malæ causæ particeps, & functio sit læsa in ipso per consensum eiusdem musculi in alia parte læsa.

Postremò potest tolli hic motus pollicis ob nervos læsos in capitibus, quæ capitis sunt in rete, & in vertebis cervicis, unde omnes nervi digitorum dependet, quoniam virtus movendi pollicem pendet à rete, & à vertebis; musculi verò existentes supra rete, quæ supra iugulū sunt, à vertebis tantum suam movendi virtutem trahunt, quare si videris, dum tertius articulus pollicis non possit extendi, illos musculos tantum esse læsos, qui infra rete sunt, morberit in rete; si vero videris, non solum musculos, qui sunt infra rete, sed etiam supra rete non extendi, tunc morbus tollens extensionem tertio articulo pollicis erit in vertebis colli, unde oritur quartum par nervorum. His igitur positis, quomodo si morbus erit in partibus supernis, &

symptoma in pollice, volueris empirice digitum pollicem inungere, vel fascijs, ligaturis, pinguedinibus obducere ac obvoluere: quo nil ineptius esse potest, & à rectis phisiologie principijs magis abhorrens; nihilominus his nostris temporibus plurimi sunt empirici, qui in hæc syrtis incurunt: quoniam nullo modo sibi persuadere possunt, quod symptomata perpetuò non sint in eadem parte cum morbo coniuncta.

Musculus in ordine quintus, qui extendit totum pollicem enascitur ab eadem linea cubiti propè quartum muscolum, cuius progressus est obliquus pollicis versus, & in quatuor ut plurimum tendines degenerat, ut propterea plures videantur musculi, cuius primus tendo inseritur in tertium pollicis articulum; alter in secundum, tertius verò tendo in primum articulum pollicis, quartus in os brachiale, quo pollex fulcitur. Quare quis esset adeo rudis, qui, læso cubito, unde enascitur musculus, ob quam læsionem pollex non posset extendi, pollicem inungeret? quis in læsa tendinum origine, vel in læsione facta in obliquo progressu, vel in osse quo fulcitur pollex, digitum inungeret? superliniret ammoniacum in aceto dissoluto, & similibus? nonnulli ex empiricis nostris faciunt, qui, inter cætera auxilia quibus tractant digitos utuntur chirorecis quibusdam ex pelle, vel lana succida intus obuoluris, & alijs vanissimis topicis vexant miserum patientem, quando originis musculi, & cubito, unde musculus oritur esset localibus proportionatis succurrendum. Si verò in nervis esset læsio, eadem methodo primarium affectum poterimus venari, ut superius docuimus, quæ est in primis expendere hunc quintum muscolum extendentem pollicem, & ceteros omnes musculos, qui ipsi nervis sunt irrigati, quia est impossibile in rete, vel in vertebis cervicis, unde prodeunt nervi dantes motum, ut pollex extendatur, esse primariam affectionem, & primariam causam, cur pollex non extendatur, nisi cæteri musculi ipsi nervis furculis irrigari deficient in suo obeundo officio.

Errant, dum semper brachiale illius, qui non potest ipsum extendere, topicis trahant, quando lœsionis causa est in humero. Cap. XXX.

VIdimus sæpe numero, dum patientes non possunt extendere brachiale, nostrates brachiale, & rotam manum simul obuoluere linimentis, vnguentis, lutis, & demum vinaceis, permanentes perpetuò in hac inscitia, quod symptomata loco à morbis separari non possint; Vidimus tamen patientem, qui nullo modo poterat brachiale extendere ob morbum non in brachiale, sed in humeri externo tuberculo, existentem; in brachiali verò ipsius erat affectus per consensum, in fieri, & dependens, qui insequabatur morbum humeri, vt umbra insequitur corpus.

Pergamus igitur nostra methodo, & dicamus brachiale, vel manus ipsa non potest extendi, ergo læsus est sextus, & septimus musculus manus; quoniam ab his duobus musculis extensio brachialis proficiiscitur, ergo lœsionis causa posset esse tum in principio, unde exordium hi musculi trahunt, tum in alijs partib. supra brachiale; quare si in principio & origine esset morbus, vel impedimentum, necessariò appareret læsio in brachiali: perpendere igitur oportet musculi principium, & progressum, vt huius musculi sympathiam cognoscamus.

Scias ergo, quod sextus iste musculus oritur à radice externi tuberculi humeri, & cubito connectitur, & amplectitur, & per cubiti longitudinem perrepat, quando verò ad caput peruenit, degenerat in tendinem validum, qui desertur supra cubiti appendicem in sinum quandam iuxta styloidem (est autem stylois cubiti processus) & ab hac parte suscipit suum ligamentum, deinde in os illud postbrachialis inseritur, quod minimum digitem sustinet: ecce ergo quod potest esse morbus in externo humeri tuberculo, qui impediatur, ne extendatur brachiale,

Amplius potest esse morbus in cubito, & in eius longitudine, & in sinu iuxta styloidem, & eius morbi symptoma in brachiali.

Sanctory Sanctory Pars I.

Sicuti quando cubitus, & humerus vulnerantur, vel ob casum, ictum recipiunt, vel percutiuntur, tunc statim potest contingere, vt brachiale non possit extendi ob morbum in cubito, & humeri externo tuberculo existentem.

Præterea posset dolor concitari in brachiali ob musculos in cubito contractos ob callum, vel scyrrum, & morbum esse in cubito, vbi nullus sit dolor.

Præterea brachiale aliquando non potest extendi ob lœsionem factam in origine septimi musculi, quem vocant bicornem, iste enim nascitur ab inferiori humero supra articulum, deinde supra radium repit, & circa mediū radij cessat in tendinem validum, & biffidum, cui propterea nomen bicornis impositum est, qui postquam supra brachiale iter fecit, inseritur in ossa postbrachialis, quibus ossibus index, & medius fulciuntur, læso ergo isto, vel altero musculo in cubito, vel in humero, ex necessitate non poterit extendi brachiale, quare si affectus crit factus in parte inferiori humeri, vnde bicornis nascitur, poterit, esse symptoma in brachiali, & morbus in alijs partibus quia sæpè accidit, vt actio læsa non sit, vbi sit morbus.

Errant, dum inungunt brachiale illorum, qui non possunt manum supinam reddere, & flectere brachiale, vel ob tremorem non possunt scribere. Cap. XXXI.

Per sæpè contingit, vt manus non possit reddi supina, vel flexio brachialis læsa, & impedita sit, vt obseruatur in ijs, qui in scribendo tremore manus afficiuntur, qui licet in cæteris operationib. omnibus brachiale fortissimum habeant; in actu tamē scribendi adeo redditur infirmum, vt nullo modo suo fungi possint officio; causa verò istius tremoris nulla alia esse potest, nisi imbecillitas musculorum flectentium manum, & brachiale.

Musculi verò flectentes brachiale duo sunt, alter est inter externos ordine octauus, & est ille quem vocant longissimum qui nascitur ab humero, & deinde peragrans obliquè radium membranco tendine inseritur in radij appendicem; quare

G 3 dum

dum manus non potest reddi supina, & brachiale non potest flecti, causa esse potest non solum in brachiali, sed etiam in varijs locis, & presertim in humero, unde oritur iste musculus, qui flectit brachiale.

Alter verò musculus flectens brachiale est nonus musculus, qui exortitur a copula, quæ cubitum humero connectit, & qui è superiori parte cubiti obliquus progreditur, & in medium radium inferitur, ut moueat manum supinè, & moueat radium exterius, ut flectat brachiale; & in qualibet istius musculi parte potest esse morbus aliquis impediens hanc brachialis flexionem.

Videas ergo quopacto brachiale tremore afficiatur per consensum à morbo existente procul à brachiali, potest enim esse morbus in humero in copula connectente cubitum humero, & in progressu istorum musculorum, & brachiale esse lesum quamuis per se careat omni morbosa constitutione: quo pacto ergo Empirici audient, quando quis non potest flectere brachiale, & in actu scribendi maximo tremore afficitur, inungere manum brachiale? digitos? quamuis videant nullo tumore, uel alijs affectibus manifestis partes has esse affectas.

Amplius non solum in humero potest esse causa tollens flexionem brachiali, verum etiam potest esse in rete nervorum sub clauicula existentium, & demum potest esse in vertebtis ceruicis: ratio est; quoniam musculi isti octauus, & nonus contexti sunt furculis missis à secundo, & tertio paribus nervorum manus.

Sed, ut certa methodo cognoscas, quando brachiale suum munus flectendi non exerceat ob nervos lesos in trunco nervorum tertia coniugationis, debes respicere an secunda, & tertia internodia omnium digitorum possint flecti, quoniam; si ipsa quoque non poterunt flecti, inferre poteris, esse in tertia coniugatione causam, cur brachiale flecti non possit, & ratio potissima est, quoniam musculi flectentes secundos, & tertios articulos omnium digitorum ipsidem furculis tertij paris nervorum manus sunt inditi, & ab ipsius virtute morticem recipiunt; quare amoris alij morbi sensibus manifestis ut sunt vulnera, vel fractio brachialis

vel humeri, ob casum ab alto, inferas ex ijs hanc consequentiam secunda, & tertia internodia omnium digitorum, & insimul brachiale non possunt flecti, ergo à communi nervorum origine læsa prodit vitium, quod potest habere sedem in rete sub clauicula, & in vertebtis ceruicis, unde oritur tertia coniugatio nervorum manus.

Quare dabitur occasio in ijs, qui malè flectunt brachiale, & in ijs, qui difficulter admodum ob tremorem scribunt, ut topica remedia, quæ possent aliqui opus afferre, non brachiali tantummodo, sed clauicula & vel axillis, sub quibus nervi omnes, qui mittuntur ad manus transeunt & demum ceruici tamquam primo trunco conveniant.

Si denique brachiale non flecti potest ob morbum existentem in capite secundi paris nervorum, cognoscas tali pacto, quia tunc neque cubitus poterit flecti, quia ipsdem furculis nervorum secundi paris inditur, ut brachiale, neque secundus articulus pollicis, qui similiter recipit motum ab hoc secundo pari; quare si fuerit in hoc secundo trunco morbus tollens flexionem brachiali, neque cubitus neque secundus articulus pollicis poterunt flecti.

Errant, dum topicis tractant tibiam, quæ non potest trahi sursum versus inguen: alterius tibiæ ob morbum existentem in ilibus. Cap. XXXII.

CAusa, quæ possunt impedire; ne tibia trahi possit sursum versus inguen alterius tibiæ, modò possunt esse in tibia, modò extra tibiam in loco quoque valde remoto, & precipue in parte anteriori, & suprema istius ilium, unde oritur primus tibiæ musculus: quoniam potest contingere, ut in hoc principio, & origine musculi sit aliquis morbus, qui tollat usum primo huic musculo tibiæ, & eius symptoma precipue se ostendat in tibiam, quam dicemus tunc esse læsam per consensum ab illo, veluti si contingeret, ut musculus esset vulneratus in sua origine, & excisus esset fibre, vel post inflammationem talis factus esset callus, vel post casum ab alto talis relicta esset dispositio scythosa; ut propterea musculus amplius nullas habe-

ret vires, empirici tamen in hoc modo læso officio inungunt tibiam, & genua, & non ilia, credentes morbum solum esse in parte illa inferna, quia non vident consensum inter genua, & ilia feruari, quoque posse per primum tibiæ musculum, illum longissimum, & gracillimum, qui ab ilibus oritur, & tibiæ inferitur; lædi enim potest (vt diximus) hic musculus in exordio, quod est in appendice anterioris partis ilium, & symptoma apparere in tibia, quæ est in loco valde remoto ab anteriori ilium parte.

Valebit ergo consequentia, tibia non potest tolli versus inguen alterius, ergo potest esse læsus primus musculus ille longissimus, qui oritur à suprema, & anteriori sede ilium; & deinde oblique secundum internam femoris partem ductus anteriori parti tibiæ inferitur, cuius musculi officium est (auxilio tamen musculorum femoris, & aliorum tibiæ) trahere tibiam sursum versus inguen alterius tibiæ; diximus aliorum auxilio, hunc musculus edere hunc vsum, quoniam adeo est gracilis, vt ex se tantum pondus commode non possit attollere.

Hic obiter animaduertatur error Galeno adscriptus dicenti, vsum istius musculi esse tibiam supra tibiam deferre, vt pueri ludentes facere solent, quod non est receptum, quoniam oporteret, vt esset insertus in mediam tibiam, vt tibiam supra tibiam deferret, sicuti re vera hic musculus est insertus in mediam tibiam simiarum; vt ponit obseruare Galenus, sed non in medias hominum tibiæ; his igitur positis, nunquid non facile cōtingere potest, vt causa, cur tibia non possit trahi sursum versus inguen alterius tibiæ, sit in anteriori ilium appendice, eius verò symptoma in tibiæ; quare, si nostrates hi, qui mordicus tenent, vbi sit symptoma, ibi esse morbum, tunc inungerent tibiam, an ne esset ridiculum, videre homines summa industria adiungere vnguenta sanæ, & bene constitutæ tibiæ, nō per se læsæ, sed solū per consensū ilium?

Denique tantus est consensus in hoc nostro corpore, vt morbus possit esse circa tertiam vertebra lumborū, eius verò symptoma appareat solum in tibia, quāuis per se sit optima constitutione dona-

ta, vnde sequatur, quod tibia non possit sursum versus inguen trahi.

Audias rationē ab anatomia depromptam, cur hoc aliquādo cōtingat. A tertio pari neruorū lumborum oritur neruus, qui deinde peruenit ad illam neruorum implicationem, quæ imaginem retis exprimit, quique tandem mittit surculum, in primum hunc tibiæ musculum, quo præcipuè musculus habet facultatem motricem; quare potest accidere, vt motus sit circa tertium par neruorum pedis, quod à tertia lumborum vertebra prodit, & symptoma in tibia; quare, si propter hanc causam tibia non poterit sursum tolli, non erit iniungenda, sed inuenienda erit radix, & protopathia symptomaticis existentis in tibia, & si fuerit causa, & origo symptomaticis in lumbis, ibi inunctiones, quæ possent prodesse, essent applicandæ.

Vt igitur methodo aliqua cognoscas, quando per tam longinquum consensum id accidere possit in primo hoc tibiæ musculo, scias à tertio pari lumborum enasci propagationem prius vestientem primum hunc musculum tibiæ, & aliam propagationem deinde dantem motum septimo, & nono musculis tibiæ, cuius munus est tibiam extendere secundum rectam lineam, quare valebit consequentia, non potest tibia rectè extendi, quod munus pertinet ad septimum, & nonum musculum, & non potest trahi sursum versus inguen alterius, & nullus ictus, nullus tumor, vel vulnera præcesserunt, quæ potuerint manifestè tibiam lædere, ergo tibiæ læsio habebit suā originem in tertio pari lumborum, vnde oriuntur isti nerui dantes motum musculis illis citatis.

Præterea, enim innumerabiles possint esse in hoc nostro corpore consensus, & sympathiæ, quas mente vix assequi possumus, ego illas dumtaxat perquirendas mihi proposui, quæ quotidie in humanis corporibus experientia obseruantur, & quæ rationibus desumptis ab arte anatomica cognosci possunt.

Audias igitur antequam capiti finem imponam quandam consensum vicinitatis, qui frequenter obseruari solet in musculo, de quo loquimur; aliquando contingere solet in musculis lumborum ali-

quis infarctus humorum ab alijs partibus missus, vel per congestionem collectus, quippe qui tollat officia primo, septimo, & nono musculorū tibie, quod hoc modo contingere potest: primum par nervorū, quod oritur a tertio pari laborum, & deinde a rete descendit ad femora, & decidēs adheret, & annectitur musculis laborū, qui si propter scyrrhosā dispositionē, vel infarctum tumidi aliquantulum sint facti, necessarii compriment hūc nervorum truncum, quo compresso virtus motrix, non amplius diffundetur, vel transmittetur ad musculos mouentes tibiam, vnde sequetur, quod tibia versus inguē alterius attolli non possit, nec in rectum extendi ob illum infarctum pituitosum existentem in musculis lumborum.

Amplius in hoc primo, septimo, & nono musculis tibie obseruatur alter affectus per consensum vicinitatis, qui fit a morbo existente in sexto musculo femoris, quoniam quando cōtingit, vt in tēdine forissecus sexti musculi sit aliquis pituitosus infarctus, illico primus musculus tibie (cuius vsus est trahere tibiam versus alterū inguē, aliorum tamen musculorum auxilio) comprimitur, & tollitur eius vsus; cognoscemusque affectum horū musculorum tibie esse per consensum sexti musculi vicini, quando videbimus prius officium sexti musculi deficere, quod est trahere femur sursum, & flectendo, femur introrsum mouere: quare si post hunc perditum vsū femoris sequatur amissio primi musculi, nec non etiam septimi, & noni tibie, erit inferendum, tibiam esse lesam per consensum factum a sexto musculo femoris, cui auxilia essent adiungenda, & non musculis tibie.

Errant, dum topicis tractant tibiam illorum, qui non possunt tibiam supra tibiam deferre ob morbum existentem circa os pubis.

Cap. XXXIII.

VAlere optimē potest hęc consequentia, tibia supra tibiam non potest deferri, ergo causa huius potest quoque esse in parte anteriori pubis propē cartilaginē iuxta longitudinem ossis pubis, quia ab illa parte secundus musculus ti-

bie exoritur, cuius munus est tibiam supra tibiam deferre, vel superequitare; quare si hoc principium musculi esset morbo aliquo in mala compositione, vel in soluta vnitāte oppressum, non video (cum in origine, & initijs musculorum maxima sit virtus) cur nō possit quoque contingere, vt tibia, quę longē distat a pube, lædi possit non a morbo existente in tibia, sed in principio musculi, quod est in superna, & anteriori parte ossis pubis.

Quare colligere possumus, si in exordio musculi virtus est collisa atque collapsa, ex necessitate tendinē insertum in tibiam trahere non posse tibiam supra tibiam: quomodo ergo tunc empirici ita audacter ope inunctionum, & fomentationum tibie, agris polliceri poterunt salutem? & quomodo eos non pudeat, quando suis frustrantur pollicitis, iterum versari inter illos, quos tōies deceperunt?

Cæterum animaduertant lectores, nō solum posse esse morbum in anteriori parte pubis, & eius symptoma apparere in tibia, alioquin sana, & optima constitutione prædita; verum etiam, quod maiori admiratione est dignum, posse esse morbum inter quartam, & quintam vertebram lumborum, & in tibia apparere hoc symptoma, quod est tibiam supra tibiam non posse deferri; quoniam ab illis vertebris nascitur nervus, qui descendens irrigat secundum hunc musculum tibie; quare si in capite istius nervi erit morbus, eius symptoma haud dubiē apparebit in tibia.

Methodus verò, qua cognoscere poteris, quando illud caput nervorum inter quartam, & quintam vertebram sit læsum, erit hæc, quia, antequam hic nervus perveniat ad hunc secundum musculum tibie, prius peragrat pes septimum, nonum, & decimū femoris, & deinde surculos mittit ad penem, merito quorum penis habet motum voluntarium tum in extramittendo semen, tum in alijs exercendis officijs, deinde ad secundum hunc tibie, de quo loquimur; demum exoritur alter nervus ab eodem trunco petens quintum musculum femoris.

Quare, quando videbis vsū septimi mu-

musculi femoris, qui est trahere femur sursum, magis tamen intorsum, quam sextus, esse læsum; & videbis quoque; læsum esse vñum noni musculi, qui est femur in gyrum intorsum mouere, & decimi cuius vsus est extrorsum in gyrum vertere, & simul cum ijs quintum musculum femoris esse læsum, cuius vsus est femur extendere in rectum, vel in lauum, & demũ videbis simul cum ijs omnibus penem amittere aliquem motum voluntarium, inferre certò poteris, morbum esse in trunco nervorum communi prodeunte à quarta, & quinta lumborum vertebri, quoniam hi omnes musculi citati recipiunt furculos nerveos, vt fungantur suis officijs, à quarta lumborum vertebra, qua certissima methodo resolutiua cognoscere huius affectus radicem.

Diximus penem amittere motum voluntarium ob læsionẽ factam inter quartam, & quintam lumborum vertebra, idque cognosci ex læsis omnibus illis musculis, qui sunt induti nerveis furculis prodeuntib. ab illo nervorum pari, quod prodeit à quarta lumborum vertebra: sed quoniam ob plurimas alias causas motus voluntarius quatuor musculorum pertinentium ad penem tolli, vel impediri potest: Propterea in hoc loco vñum, quod est obseruatione dignum, non est omitendum, & est, dum duo primi musculi penis; quorum officium inter cætera est aperire meatum, per quod semen debet foris propelli, adeo lacerantur à Lithotomis, tum quando secant, tum quando immittunt forcipem dilatantem, & lacerantem vesicæ collum, & omnes partes vicinas, vt inde musculi hi duo primi penis amittant virtutem vsu aperiendi meatum, per quod sperma emitti debet, quo emissio dum coeunt, semen ob musculorum illorum infirmitatem cum æ primi non amplius possit in penẽ sequi, vt sponte in vesicam defluat, & deinde cum lotio simul elabatur, quod Augustino Amulio amico meo, & nonnullis alijs contigisse vidimus.

Ex quo casu colligimus motum musculorum pudendorum non solum tolli posse ob morbum ex stentem in trunco, verum etiam ob morbum existentem in musculis ipsi.

Secundo colligimus, quomodo lacerentur isti musculi, quorum vsus aperire meatum, & expellere semen per synphtiam vicinitalis.

Tertio colligimus errare Lithotomos dum nimio impetu secant plusquam par sit, & lacerant ceruicem vesicæ, vt sæpè mors propterea sequatur: Satius enim esse aliquantulum magis morari, vt tutius res ageretur; quoniam ex nulla alia causa, his, quibus transponitur per sectio, nem calculus, mors contingere potest, quam ex hac colli vesicæ læsione.

Errant, dum iniungunt tibiam, qua intorsum flecti non potest ob morbum existentem in coxendice, in osse sacro, vel lumbis. Cap. XXXIV.

Persæpè vidimus in hunc errorem prolabi nostros chirurgos, dum aggediuntur curationem tibiæ, quando intorsum tibia inflecti non potest ob morbum agentem radices non in tibia, sed in coxendice, vnde oritur musculus, qui inflectit intorsum tibiæ; tunc enim tibiæ læsam vnguentis: lana succida, fascijs, & oleis varijs circumvoluit, perpetuo hanc hæresim insequentes, quod vbi est symptoma, ibi sit morbus; quod erratum hæcenus plurimis argumentis est reiectum; quoniam ostensum est superius sapissimè valde distare, & loco separari morbum à suis symptomatibus.

Similiter in hoc capite ostenditur, musculum tertium tibiæ mala ledi posse constitutione in infima, & posteriori appendice coxendicis, vnde originem trahit, vel in progressu, antequam in tibiæ inseratur, veluti circa medium femoris, & inde sequi tibiæ ob hunc musculum læsum in origine longè à tibia intorsum inflecti non posse.

Causa enim quod symptoma possit esse in tibia, morbus in coxendice, est, quia hic musculus tertius tibiæ oritur nerveo principio ab infima, & posteriori appendice ossis coxendicis; quare morbus potest esse in nervo illo principio, & symptoma apparere in tibia.

Præterea, cum iste musculus antequam inseratur in tibiæ, in medio femoris fiat carnosus, potest usu venire, ut pars illa car-

pretea est inuenienda methodus anatomica, quæ ex officiis læsis nos perfectè doceat, quando morbus existens in exortu nervorū manus à ceruice in prodeuntis sit in causa, cur secūdi articuli quatuor digitorum non flectuntur. Audias igitur, quomodo sit comparanda hæc cognitio; adfuit surculi isti nerui, antequam ingrediantur primum hunc musculus flectentem hæc secunda ossa quatuor digitorum, prius peragant per secundum musculus flectentem cubitum, & deinde inferuntur in istum primum, de quo loquimur, & post istum tandem peragant per musculos flectentes tertia ossa quatuor digitorum, & tertium articulum pollicis.

His ergo positis, talem possumus demonstrationē formare, non possunt flecti quatuor ossa digitorum, pollice excepto, & simul cubitum non flectitur, neq; tertius articulus quinque digitorum, ergo morbus lædēs hæc officia nullo modo potest esse digitis, neque in musculo illo flectente digitos, sed in altiori exordio, quod est in capite tertij paris nervorum manus, quod par est commune omnibus illis musculis, cū ab ipso facultas motrix, & sensatrix trahāt originē, quod par immediatē oritur ab illa nervorum rete, cuius imago perbellè exprimitur in Cardinalium galeris; sed demum tamquam à trunco, & stipite proprio à uertebis cervicis trahit suum principium.

Ex quo discursu optimè colligere possumus, quando digiti nō possunt flecti, an hæc mala ualetudo digitorū proveniat à morbo existente in digitis, uel in exordio musculi, uel in cervicis uertebis; & inde quoq; animaduertimus, quando in digitis hoc modo læsis sint adiungenda topica digitis, quando exordio musculi flectentis secundos articulos, & quando uertebis cervicis. Gal. 3. de loc. aff. 10. eadem philosophia incedēs percuratus est locum affectum in Pansania Syro Sophista: qui Romam ueniens cadens è uiculo ictus est in dorsi initio & amisit sensum duorum digitorum minimorum u-

nistræ manus. Addit alios medicos adaptasse remedium digitis, & in peius Pansaniam incidisse; dicitq; se initio dorsi percussū appouisse, & breui sanitati restituisse.

Hinc quoq; facile est uidere, quo pacto nostros nonnulli, qui se dogmaticos faciunt, in errorem incidunt, dum in omni officio læso musculorum, si primis indicationib; lesio non tollatur, uolunt cerata, stillicida capiti adiungere, perinde ac solū à capite prodirent omnes causæ lædentes officia musculorum, & nervorū: ut hinc sæpè frustra administratis his suis medicinis caput, & cætera ægrorum uiscera in egritudines longè maiores trahant.

Errant, dum digitis illorum, qui tertium articulū quatuor digitorum, pollice excepto, flectere non possunt localia applicant, quando alijs longè diuersis partibus essent applicanda. Cap. XLV I.

VT magis eluceat hæc generis symptomathia, quæ sit per musculos, & nervos continuatos, & in longitudinem extensos; agendum proposuimus de longis digitorum musculis, ut errata empiricorum de consensu generis (quantum fert tenuitas nostra) ante uertamus, & corrigamus, quia licet de omnib; consensibus, qui accidere possint, non sit possibile, cū sint ferè infiniti, pertractare; attamen nos expergescēt horum exemplorum luce, non tam faciliē in errorem corruemus.

Contingere ergo potest, ut tertius articulus quatuor digitorum, pollice excepto aliquando non flectatur propter consensum morbi existētis in parte anteriori, & interna articuli cubiti, unde hic musculus oritur, qui; descendens, antequā ad brachiale perueniat; diuiditur in quatuor tendines, qui cum sint subiecti tēdibus primi musculi, ante radicē secundī digitorum internodij perforant eos tendines, & deinde inferuntur in tertia ossa digitorū, gratia flectendi, & trahendi digitos, ut optimè constringantur; uidētes ergo empirici tertia internodia horum quatuor digitorum nō flecti, ob imperitiā anatomie tanta non pollent cognitione, ut sciant, tali credāt, digitos immobiles posse esse sanos, & morbum efficien-

clētem hoc symptoma esse in cubito, qua sympathia horum longorum musculorum ignorata, cecorum more symptoma ti occurrūt oleis, & ceteris remedijs, quae aliquid opis praestarent, si cubito ea adiungerent, vbi est radix, & causa symptomatis digitorum.

Sed quando digiti non possent flecti, quia in exordio musculi flectentis tertium articulum sit morbus, ob vulnus, vel ob alias causas, tunc si digitis topica, quamvis peroptima sit, adiungantur, nullam conciperemus spem ex topicis adiunctis, digitis: vel si cubitum ictum ob casum, vel ob alias causas reciperet, quomodo inungendo digitos curati poterit, vel demum si tonsor aperiendo apostema circa cubitum, vel supra brachiale transversim incidere hunc musculum, & inde digiti non possent flecti; quis risum teneret videndo empiricos digitis applicantes localia?

Potest quoque contingere hoc symptoma in tertio osse quatuor digitorum, pollice excepto, quia nervus vestiens hunc musculū sit angustia aliqua oppressus in origine prodit enim ramus vestiens hunc musculum à tertio pari nervorum brachij, & à quinto tamquam à primo stipite, sed magis proximè deducitur à rete imaginem exprimente cordularum Cardinalium galeri, cognoscemus autem affectum existentem in digitis à nervorum exordijs prodire, quando misenti illi, qui priusquam isti, ipsidem nervorum ramis induuntur, erunt laesi, sicuti est musculus flectens cubitum, nec non illi musculi qui irrigantur post istos, qui trahunt tertium internodia quatuor digitorum, quique movent pollicem, ipsumque ab alijs separant, ut omnis ferè motus digitorum ab istis furculis tertij, & quinti nervorum brachij exoriantur; valebit ergo hac consequentia, non flectuntur internodia tertia quatuor digitorum, ergo morbus potest esse in tertio, & in quinto paribus nervorum brachiorum, ergo potest esse morbus in rete illo nervorum, vel in vertebis cervicis; ergo dabitur occasio, ut digiti amittant motum ob morbum existentem in cervice, vel in rete; ergo tunc ad curandos digitos remedia collo, vel sub iugulo, vbi est rete, erunt applicanda; quaecum ita sint, quid diceret empiricus hac

Sanctory Sanctory Pars I.

cognitione priuatus, numquid non admiraretur, quando oculis proprijs aspiceret probum anatomicum post factam hanc consequentiam, quod digiti haberent amissam flexionem ob vitium in capitibus nervorum, in vertebis colli, vel in rete, fomentationibus adiunctis vertebis, digitis motionem dare?

Nos faciemus denique hanc consequentiam, amotis percussionibus, & vulneribus, & similibus manifestis, si musculus iste flectens tertium internodiu quatuor digitorum deficiat, & insimul cubitum flecti non possit, & ceteri motus digitorum quoque deficiant, ergo in capitibus nervorum erit morbus, qui efficit hoc symptoma in digitis.

Methodus verò, qua distinguere possumus, an causa, & radix symptomatum digitorum sit in collo, vel in rete, vel demum in cerebro ipso, est, quia si primaria affectio est in rete, & non in cervice, vel cerebro, symptomata aliubi esse non possunt, nisi inter digitos, & iugulum; si in cervice, inter digitos, & cervicem; si in cerebro, inter digitos, & cervicem illius, & alterius lateris observari possunt symptomata; qua methodo Gal. progrediens peruestigavit causam, cur in homine illo veniente Romam digiti amiserint sensum inuenitque scyrthosum dispositionem circa septimam vertebrae cervicis ob ictum factam, fuisse causam, cur digiti non sentirent, & inuento loco cervici topica adiunxit, & paulo post sensationem digitis reddidit summa cum omnium admiratione.

Errant, dum inungunt quatuor digitos, pollice excepto, qui non possunt extendi ob morbum existentem in humero.

Cap. XXVII.

Non rarè accidere vidimus, ut digiti non possint extendi, quamvis in digitis nullus humor, vel alia causa praeternaturam observetur, quae motionem digitorum tollat, nihilominus non defunt empirici, qui digitos hos laesos per consensum vexant vnguentis, pinguedinibus lana succida, nec non etiam obliuunt ipsos oleo de iunipero, de terebentina, de ammoniaco, oleo phylophorum de la-

G teri-

teribus vocato, & alijs plerisque tractant linimentis, horum omnium localium administrationem ipsimet empirici irriterent, si proprijs oculis in secandis corporibus origines musculorum intuerentur, ut quotidie vident anatomistæ qui in cadaveribus, suis manibus trahentes hunc museulum sub externo humeri tuberculo, movent mortuorum hominum digitos; musculus enim extendens hos digitos oritur ab hoc humeri tuberculo, quippe qui si lædatur in illa superna parte, digitus alioquin sani immobiles ferè red-duntur, quare si hæc scirent, & deinde viderent post percussum humerum digitos amittere motum, ipsi quoque non digitis, sed parti illi superiori localia applicarent.

Ideo non datur alter modus cognoscendi symptomata motricum facultatum, nisi per cognitionem ortus, & progressus musculorum, & nervorum. Hinc si de ortu, & progressu primi musculi externi digitorum; cuius visus est, quatuor digitos extendere, pollice excepto, loquamur; dicimus, hunc musculum in primis nasci ab hoc externo humeri tuberculo, & deinde incedere per cubitum, & radiū, & in quatuor latos tendines cessare, qui inseruntur deinde à primo vsque ad tertium articulum quatuor digitorum sub vnguibus.

Ex hac concepta veritate colligimus cur non extendantur digiti, & est, quia huius symptomatis digitorum causa, & protopathia habere potest radicem tum in externo humeri tubere, quo læso digiti desinunt extendi, tum inter cubitum, & radiū, tum iuxta brachiale: videas ergo, quomodo causa, quæ motum digitorum tollit, varijs in locis, & procul à digitis esse possit, quæ cum ita sint, quomodo vnguentis, linimentis digitis adiunctis, causa læsionis existente in humero, vel inter cubitum, & radiū, vel ante brachiale, volueris digitis opè ferre? pergas toto anni curriculo inunctionibus orientalibus opobalsami, & omnium generum, quod nihil facies, & totum amittes opus.

Præterea contingit aliquando, ut digiti isti quatuor non extendantur, non quia sit causa præter naturam in digitis, vel inter cubitum, & radiū, vel in humeri externo tuberculo; sed quia sit in

parte longè magis remota, sicuti quando est in quarto coniugio nervorum brachij à quo surculi vestientes hunc musculum extendentem quatuor nominatos digitos prodeunt.

Methodus autem cognoscendi, quando digiti non extendantur ob morbum existentem in capite quarti paris nervorum à ceruice procedentium, erit hæc, quia omnes musculi circumuecti ipsidem nervis proceduntibus ab hoc quarto coniugio sentient eundem defectum, & tales erunt musculi cubitum flectentes, & extendentes, qui irrigantur surculis eiusdem quarti paris nervorum manus, antequam induatur iste musculus, de quo loquimur.

Præterea deficiet in suo officio musculus extendens brachiale, & musculi præbetes motionem pollicis, qui ab eodem nervorum stipite motum suscipiunt; valebimus ergo ex omnium istorum musculorum læsione (supposito prius, causas alias evidentes non esse, quæ motum impediunt, veluti ciliæ vulnera: & tumores) colligere, quantum par nervorum manus morbo vexari in ceruice; quare pro digitorum curatione remedia non digitis, sed ceruicis vertebriis tunc essent applicanda.

Præterea contingere potest, ut digitus minimus non possit separari à reliquis, vel ob tumorem existentem in externo humeri tuberculo, factum à fractura, vel ab aliqua destillatione, vel ob morbum existentem in nervorum rete, vel in ceruice, propter quas causas si digitus minimus ab alijs abduci non possit, nunquam unguentis admotis digitos curari poterit.

Præterea causa, cur minimus iste digitus ab alijs non separetur, & palma tota fieri non possit, ubique in spatio illo ab humero ad brachiale potest hære, nullo humore in digito minimo existente; tunc sanè digiti, vel palma tota non esset inungenda, sed locus, ubi confidet humor, siue sit in humeri capite siue inter cubitum & radiū, per quem locum defertur musculus, quos locos læsos promptè admodum quique cognoscere poterit, si anatomica facultate erit excultus, quoniam per officia læsa cognoscat musculum læsum, cognito uerò musculo læso, cognoscat illico omnes eius partes, in quibus

causa principalis posset agere radices, & cognosceret, in quas partes eius symptomata posset diffundi, quæ partes illud occupant spatium, quod est ab externo humeri tuberculo usque ad minimum digitum.

Demumque virtute methodi tradita in hoc libro inueniet, an per se, vel per consensum alterius vicini musculi affectus lædat corporis nostri operationes; Hæc sunt principia, per quæ optimè poterimus cognoscere, ubi sit in musculis morbus.

Demum, si vis scire, quando minimus digitus non possit separari ab alijs per neruum læsum in exordio quarti paris neruorum manus, scias ab hoc quarto pari neruorum, non solum prodire neruos vestientes hunc musculum separantem minimum digitum ab alijs digitis, verum etiam prodire ab eodem pari neruos vestientes musculos flectentes cubitum, & musculum extendentem brachiale; quare si digitus non poterit separari ob vitium in capitibus neruorum, necessarium musculi cubiti, & brachialis non poterunt fungi suo officio, & eo magis hæc consequentia valebit, quia nerui à quarto pari neruorum manus prodeuntes prius irrigant musculos flectentes cubitum, quam musculum istum separantem digitum; quare per hanc singularem methodum, cognita protopathia, poteris, si erit in collo, ibi adiungere auxilia topica, & non digitis.

Errant, dum digito indici, qui non potest extendi, adungunt topica, quando causa læsionis est in cubito, vel in cernice. Cap. XXVIII.

SI videris hominem, qui non possit digito indice indicare, vel indicem, quod idem est, obliquè extendere, illicd ex hoc læso officio dicere poteris, tertium musculum externum, qui prodit à medio cubito, ubi est linea illa aspera, & oblonga, esse læsum, quia huius musculi munus est extendere digitum indicem; quare poterit contingere, ut in medio cubito, vnde oritur musculus, sit morbus, & index alioquin sanitate præditus patiatu per sympathiam cubiti: poterit quoque

esse morbus in vlna, vel in cubito, ubi linea oblonga, & aspera existit, vel in brachialis, per quem locum transit musculus, vel poterit esse impedimentum in musculis vicinis, quatenus musculi cohererent, & vicini sint onusti, atque referti materia humorum sarcina, vel quod tumidi facti sint ob œdema, vel propter alias causas, & horum omnium morborum signa solum apparere in indice; quare loca affecta sunt inuenienda, & ijs adiungenda sunt localia, & nequaquam iudici per consensum læso; quo pacto uerò omnia hæc loca læsa cognosci possint, ex traditis in primo libro, & ex officiis læsis facile cognoscere poterimus.

Si uerò musculus huic destinatus mu-
neri extendendi indicem integra gauderet ualitudine, & motio huius musculi diminuta, uel ablata prodiret à neruorum origine; audias methodum, quæ ad huius cognitionis apicem nos certò transferre potest: à quarto pari neruorum manus propaggines uestientes hunc musculum exoriantur, & ab eodem trunco prodeunt nerui furculi irrigantes musculos flectentes, & extendentes cubitum, & musculos brachiales, & cæteros pertinentes ad digitorum extensionem, quare si index non posset extendi, & simul cubitum neque flecti, neque extendi possit; & similiter brachiale in suo obeundo officio deficiat, ex ijs semper consequentiam inferre poteris; quod in communi trunco neruorum, qui consistit in uertebis ceruicis, unde oritur quarta coniugatio neruorum, sit radix, & causa, propter quam index non possit extendi; quare si uolueris tunc indicem læsum subleuare, non erunt medicamenta indici, sed uertebis ceruicis, uel reti apponenda, quod empirici irriterent.

Quomodo autem cognoscatur an causa læsionis digiti indicis sit in rete, uel in uertebis, animaduertas, hoc cognosci posse ex præcedentibus alijs signis, quemadmodum cognouit Galen. scyrrosam dispositionem post septimam uertebra ex ictu habuisse ortum: cognoscemus similiter ex ijs, quæ tradita sunt in primo libro capite 11. quod est de locis affectis cognoscendis.

Errandum digitum pollicem, cuius tertius articulus non potest extendi, innungunt, quando causa lésionis, est in cubito, vel in ceruice. Cap. XXIX.

Chirurgi in nulla corporis parte maiori diligentia vti deberent, quam in cognoscenda, & curanda affectione digitorum; quoniam sæpe accidit, vt digiti ob musculorum suorum longitudinem, nullo morbo premantur, attamen amissam suam motionem habeant ob morbum in alia remota parte habentem radicem, vnde digiti propter illius partis sympathiam munera sua explere non possint; quare, quoties videris tertium articulum pollicis non posse extendi, neque ab alijs digitis abduci, inferas, ergo quartus musculus externus digitorum est malè affectus, cuius vsus est extendere tertium articulum, & est ille, qui à cubito egreditur penes tertium musculum, qui quæ deservitur supra radij appendicem, & inseritur tertio articulo pollicis; quare contingere potest, vt in cubito sit morbus, & in pollice tantum appareat hæc functio læsa: an ne inflammatio cubiti, vel cubiti percussio, vel vulnera in illa parte possunt auferre pollicis motum? cur ergo vis empirice auxilia adiungere pollicis? quando pollex non est alicuius malæ causæ particeps, & functio sit læsa in ipso per consensum eiusdem musculi in alia parte læsa.

Postremò potest tolli hic motus pollicis ob nervos læsos in capitibus, quæ capiti sunt in rete, & in vertebribus cervicis, vnde omnes nervi digitorum dependet, quoniam virtus movendi pollicem pendet à rete, & à vertebribus; musculi verò existentes supra rete, quæ supra iugulum sunt, à vertebribus tantum suam movendi virtutem trahunt, quare si videris, dum tertius articulus pollicis non possit extendi, illos musculos tantum esse læsos, qui infra rete sunt, morberit in rete; si verò videris, non solum musculos, qui sunt infra rete, sed etiã supra rete non extendi, tunc morbus tollens extensionem tertio articulo pollicis erit in vertebribus colli, vnde oritur quartum par nervorum. His igitur positis, quomodo si morbus erit in partibus superius, &

symptoma in pollice, volueris empirice digitum pollicem inungere, vel fascijs, ligaturis; pinguedinibus obducere ac obvoluere: quo nil inceptius esse potest, & à rectis physiologiæ principijs magis abhorrens; nihilominus his nostris temporibus plurimi sunt empirici, qui in hæc syrtis incurrun: quoniam nullo modo sibi persuadere possunt, quod symptomata perpetuò non sint in eadem parte cum morbo coniuncta.

Musculus in ordine quintus, qui extendit totum pollicem enascitur ab eadem linea cubiti propè quartum musculum, cuius progressus est obliquus pollicis versus, & in quatuor vt plurimum tendines degenerat, vt propterea plures videantur musculi, cuius primus tendo inseritur in tertium pollicis articulum, alter in secundum, tertius verò tendo in primum articulum pollicis, quartus in os brachiale, quo pollex fulcitur. Quare quis esset adeo rudis, qui, læso cubito, vnde enascitur musculus, ob quam læsionem pollex non posset extendi, pollicem inungeret? quis in læsa tendinum origine, vel in læsione facta in obliquo progressu, vel in ossis quo fulcitur pollex, digitum inungeret? superliniret ammoniacum in aceto dissoluto, & similibus: vt nonnulli ex empiricis nostris faciunt, qui, inter cætera auxilia quibus tractant digitos vtuntur chirotecis quibusdam ex pelle, vel lana succida intus obuolutis, & alijs vanissimis topicis vexant miserum patientem, quando originis musculi, & cubito, vnde musculus oritur esset localibus proportionatis succurrendum. Si verò in nervis esset læsio, eadem methodo primarium affectum poterimus venari, vt superius docuimus, quæ est in primis expendere hunc quintum musculum extendentem pollicem, & ceteros omnes musculos, qui ipsi nervi sunt irrigati, quia est impossibile in rete, vel in vertebribus cervicis, vnde prodeunt nervi dantes motum, vt pollex extendatur, esse primariam affectionem, & primariam causam, cur pollex non extendatur, nisi cæteri musculi ipsi nervi sive furculi irrigati deficiant in tuo obeundo officio.

Errant, dum semper brachiale illius, qui non potest ipsum extendere, topicis trahant, quando lœsionis causa est in humero. Cap. XXX.

VIdimus sæpe numero, dum patientes non possunt extendere brachiale, nostrates brachiale, & totam manum simul obuoluere linimentis, vnguentis, lutis, & demum vinaceis, permanentes perpetuò in hac inscitia, quod symptoma loco à morbis separari non possint; Vidimus tamen patientem, qui nullo modo poterat brachiale extendere ob morbum non in brachiale, sed in humeri externo tuberculo, existentem; in brachiali verò ipsius erat affectus per consensum, in fieri, & dependens, qui insequabatur morbum humeri, vt umbra insequitur corpus.

Pergamus igitur nostra methodo, & dicamus brachiale, vel manus ipsa non potest extendi, ergo læsus est sextus, & septimus musculus manus; quoniam ab his duobus musculis extensio brachialis proficiscitur, ergo lœsionis causa posset esse, tum in principio, unde exordium huius musculi trahunt, tum in alijs partibus supra brachiale: quare si in principio & origine esset morbus, vel impedimentum, necessariò appareret læsio in brachiali: perpendere igitur oportet musculi principium, & progressum, vt huius musculi sympathiam cognoscamus.

Scias ergo, quod sextus iste musculus oritur à radice externi tuberculi humeri, & cubito connectitur, & amplectitur, & per cubiti longitudinem perrepat, quando verò ad caput peruenit, degenerat in tendinem validum, qui defertur supra cubiti appendicem in sinum quandam iuxta styloidem (est autem stylois cubiti processus) & ab hac parte suscipit suum ligamentum, deinde in os illud postbrachialis inseritur, quod minimum digitum sustinet: ecce ergo quod potest esse morbus in externo humeri tuberculo, qui impediatur, ne extendatur brachiale,

Amplius potest esse morbus in cubito, & in eius longitudine, & in sinu iuxta styloidem, & eius morbi symptoma in brachiali.

Sanctory Sanctory Pars I.

Sicuti quando cubitus, & humerus vulnerantur, vel ob casum, ictum recipiunt, vel percutiuntur, tunc statim potest contingere, vt brachiale non possit extendi ob morbum in cubito, & humeri externo tuberculo existentem.

Præterea posset dolor concitari in brachiali ob musculos in cubito contractos ob callum, vel scyrrum, & morbum esse in cubito, vbi nullus sit dolor.

Præterea brachiale aliquando non potest extendi ob lœsionem factam in origine septimi musculi, quem vocant bicornem, iste enim nascitur ab inferiori humero supra articulum, deinde supra radium repit, & circa mediū radii cessat in tendinem validum, & biffidum, cui propterea nomen bicornis impositum est, qui postquam supra brachiale iter fecit, inseritur in ossa postbrachialis, quibus ossibus index, & medius fulciuntur, læso ergo isto, vel altero musculo in cubito, vel in humero, ex necessitate non poterit extendi brachiale, quare si affectus crit factus in parte inferiori humeri, vnde bicornis nascitur, poterit, esse symptoma in brachiali, & morbus in alijs partibus quia sæpè accidit, vt actio læsa non sit, vbi sit morbus.

Errant, dum inungunt brachiale illorum, qui non possunt manum supinam reddere, & flectere brachiale, vel ob tremorem non possunt scribere. Cap. XXXI.

Persæpè contingit, vt manus non possit reddi supina, vel flexio brachialis læsa, & impedita sit, vt observatur in ijs, qui in scribendo tremore manus afficiuntur, qui licet in cæteris operationibus omnibus brachiale fortissimum habeant; in actu tamē scribendi adeo redditur infirmum, vt nullo modo suo fungi possint officio; causa verò istius tremoris nulla alia esse potest, nisi imbecillitas musculorum flectentium manum, & brachiale.

Musculi verò flectentes brachiale duo sunt, alter est inter externos ordine octavus, & est ille quem vocant longissimum qui nascitur ab humero, & deinde per agrans oblique radium membranco tendine inseritur in radii appendicem; quare

G 3 dum

dum manus non potest reddi supina, & brachiale non potest flecti, causa esse potest non solum in brachiali, sed etiam in varijs locis, & presertim in humero, unde oritur iste musculus, qui flectit brachiale.

Alter verò musculus flectens brachiale est nonus musculus, qui exoritur a copula, quæ cubitum humero connectit, & qui è superiori parte cubiti obliquus progreditur, & in medium radium infertur, vt moueat manum supinè, & moueat radium exterius, vt flectat brachiale; & in qualibet istius musculi parte potest esse morbus aliquis impediens hanc brachialis flexionem.

Videas ergo quopacto brachiale tremore afficiatur per consensum à morbo existente procul a brachiali, potest enim esse morbus in humero in copula connectente cubitum humero, & in progressu istorum musculorum, & brachiale esse lesum quamuis per se careat omni morbosa constitutione: quo pacto ergo Empirici audient, quando quis non potest flectere brachiale, & in actu scribendi maximo tremore afficiatur, inungere manū brachiale: digitos? quamuis uideant nullo tumore, uel alijs affectibus manifestis partes has esse affectas.

Amplius non solum in humero potest esse causa tollens flexionem brachiali, uerum etiam potest esse in rete neruorum sub clauicula existentium, & demum potest esse in vertebribus ceruicis: ratio est; quoniam musculi isti octauus, & nonus contexti sunt iurculis missis à secundo, & tertio paribus neruorum manus.

Sed, vt certa methodo cognoscas, quando brachiale suum munus flectendi non exercent ob neruos lalos in trunco neruorum tertiz coniugationis, debes respicere an secunda, & tertia internodia omnium digitorum possint flecti, quoniam, si ipsa quoque non poterunt flecti, inferre poteris, esse in tertia coniugatione causam, cur brachiale flecti non possit, & ratio potissima est, quoniam musculi flectentes secundos, & tertios articulos omnium digitorum ipsdem iurculis tertij paris neruorum manus sunt induti, & ab ipsdem virtutem motricent recipiunt, quare amotis alijs morbis sensibus manifestis vt sunt vulnera, uel confractio brachialis

uel humeri, ob casum ab alto, inferas ex ijs hanc consequentiam, secunda, & tertia internodia omnium digitorum, & insinul brachiale non possunt flecti, ergo à communi neruorum origine læsa prodit vitium, quod potest habere sedem in rete sub clauicula, & in vertebribus ceruicis, unde oritur tertia coniugatio neruorum manus.

Quare dabitur occasio in ijs, qui male flectunt brachiale, & in ijs, qui difficulter admodum ob tremorem scribunt, vt topica remedia, quæ possent aliquid opis afferre, non brachiali tantummodo, sed clauiculæ, vel axillis, sub quibus nerui omnes, qui mittuntur ad manus transeunt & demum ceruicis tamquam primo trunco conueniant.

Si denique brachiale non flecti potest ob morbum existentem in capite secundi paris neruorum, cognoscas tali pacto, quia tunc neque cubitus poterit flecti, quia ipsdem iurculis neruorum secundi paris induitur, vt brachiale, neque secundus articulus pollicis, qui similiter recipit motum ab hoc secundo pari, quare si fuerit in hoc secundo trunco morbus tollens flexionem brachiali, neque cubitus neque secundus articulus pollicis poterunt flecti.

Errant, dum topicis tractant tibiam, quæ non potest trahi sursum versus inguē alterius tibiæ ob morbum existentem in illibus. Cap. XXXII.

CAUSA, quæ possunt impedire; ne tibia trahi possit sursum versus inguē alterius tibiæ, modò possunt esse in tibia, modò extra tibiam in loco quoque valde remoto, & precipuè in parte anteriori, & suprema ossis ilium, unde oritur primus tibiæ musculus: quoniam potest contingere, vt in hoc principio, & origine musculi sit aliquis morbus, qui tollat vsum primo huic musculo tibiæ, & eius symptomata precipuè se ostendat in tibiam, quam dicemus tunc esse læsam per consensum ab ilib. veluti si contingeret, vt musculus esset vulneratus in sua origine, & excisus esset fibre, vel post inflammationē talis factus esset callus, uel post casum ab alto talis relicta esset dispositio scyrrhosa, vt propterea musculus amplius nullas habet

ret vires, empirici tamen in hoc modo læso officio inungunt tibiam, & genua, & non ilia; credentes morbum solum esse, in parte illa inferna, quia non vident cōsensum inter genua, & ilia seruari, quoque posse per primum tibiae muscū, illum longissimum, & gracillimum, qui ab ilio oritur, & tibiae inseritur; lædi enim potest (vt diximus) hic musculus in exordio, quod est in appendice anterioris partis illius, & symptoma apparere in tibia, quæ est in loco valde remoto ab anteriori illius parte.

Valebit ergo consequentia, tibia non potest tolli versus inguen alterius, ergo potest esse læsus primus musculus ille longissimus, qui oritur à suprema, & anteriori sede illius, & deinde oblique secundum internam femoris partem ductus anteriori parti tibiae inseritur, cuius musculi officium est (auxilio tamen musculorum femoris & aliorum tibiae) trahere tibiam sursum versus inguen alterius tibiae; diximus aliorum auxilio, hunc muscū edere hunc vsum, quoniam adeo est gracilis, vt ex se tantum pondus commouere non possit attollere.

Hic obiter animaduertatur error Galeno adscriptus dicenti, vsum istius musculi esse tibiam supra tibiam deferre, vt pueri ludentes facere solent, quod non est receptum, quoniam oporteret, vt esset insertus in mediam tibiam, vt tibiam supra tibiam deferret, sicuti re vera hic musculus est insertus in mediam tibiam simiarum, vt potnit observare Galenus, sed non in medias hominum tibia; his igitur positis, nunquid non facile cōtingere potest, vt caula, cur tibia non possit trahi sursum versus inguen alterius tibiae, sit in anteriori illius appendice, eius verò symptoma in tibia quare, si nostrates hi, qui mordicus tenent, vbi sit symptoma, ibi esse morbum, tunc inungerent tibiam, an ne esset ridiculum, videre homines summa industria adiungere vnguenta sanæ, & benè constitutæ tibiae, nō per se læsæ, sed solū per cōsensū illius?

Denique tantus est cōsensūs in hoc nostro corpore, vt morbus possit esse circa tertiam vertebra lumborū, eius verò symptoma appareat solum in tibia, quāuis per se sit optima constitutione dona-

ta, vnde sequatur, quod tibia non possit sursum versus inguen trahi.

Audias rationē ab anatomia depromptam, cur hoc aliquādo cōtingat; A tertio pari neruorū lumborum oritur neruus, qui deinde peruenit ad illam neruorum implicationem, quæ imaginem retis exprimit, quique tandem mittit surculum, in primum hunc tibiae muscū, quo præcipuè musculus habet facultatem motricem; quare potest accidere, vt morbus sit circa tertium par neruorum pedis, quod à tertia lumborum vertebra prodit, & symptoma in tibia; quare, si propter hanc causam tibia non poterit sursum tolli, non erit inungenda, sed inuenienda erit radix, & protopathia symptomaticis existentis in tibia, & si fuerit causa, & origo symptomaticis in lumbis, ibi inunctiones, quæ possent prodesse, essent applicandæ.

Vt igitur methodo aliqua cognoscas, quando per tam longinquum cōsensum id accidere possit in primo hoc tibiae musculo, scias à tertio pari lumborum enasci propaginem prius vestientem primum hunc muscū tibiae, & aliam propaginem deinde dantem motum septimo, & nono musculis tibiae, cuius munus est tibiam extendere secundum rectam lineam, quare valebit consequentia, non potest tibia rectè extendi, quod munus pertinet ad septimum, & nonum muscū, & non potest trahi sursum versus inguen alterius, & nullus ictus, nullus tumor, vel vulnera præcesserint, quæ potuerint manifestè tibiam lædere, ergo tibia læsio habebit suā originem in tertio pari lumborum, vnde oriuntur isti nerui dantes motum musculis illis citatis.

Præterea, cum innumerales possint esse in hoc nostro corpore cōsensūs, & sympathiæ, quas mente vix assequi possumus, ego illas dumtaxat perquirendas mihi proposui, quæ quotidie in humanis corporibus experientia obseruantur, & quæ rationibus desumptis ab arte anatomica cognosci possunt.

Audias igitur antequam capiti finem imponam quendam cōsensūs vicinitatis, qui frequenter obseruari solet in musculo, de quo loquimur; aliquando contingere solet in musculis lumborum ali-

quis infarctus humorum ab alijs partibus missus, vel per congestionem collectus, quippe qui tollat officia primo, septimo, & nono musculorū tibie, quod hoc modo contingere potest; primum par nervo. xii, quod oritur a tertio pari lūborum, & deinde a rete descendit ad femora, & decidēs adheret, & annectitur musculis lūborū, qui si propter scyrrhosā dispositionē, vel infarctum tumidi aliquantulum sint facti, necessariō compriment hūc nervorum truncum, quo compresso virtus motrix, non amplius diffundetur, vel transmittetur ad musculos moventes tibiam, unde sequetur, quod tibia versus inguē alterius attolli non possit, nec in rectum extendi ob illum infarctum puitosum existentem in musculis lumborum.

Amplius in hoc primo, septimo, & nono musculis tibie observatur alter affectus per cōsensū vicinitatis, qui fit à morbo existente in sexto musculo femoris, quoniam quando cōtingit, vt in tēdine forinsecus sexti musculi sit aliquis puitosus infarctus, illico primus musculus tibie (cuius vsus est trahere tibiam versus alterū inguē, aliorum tamen musculorum auxilio) comprimitur, & tollitur eius vsus; cognoscemusque affectum horū musculorum tibie esse per cōsensum sexti musculi vicini, quando videbimus prius officium sexti musculi deficere, quod est trahere femur sursum, & flectendo, femur introsum mouere: quare si post hunc perditum vsum femoris sequatur amissio primi musculi, nec non etiam septimi, & noni tibie, erit inferendum, tibiam esse lesam per cōsensum factum à sexto musculo femoris, cui auxilia essent adiungenda, & non musculis tibie.

Errant, dum topicis tractant tibiam illorum qui non possunt tibiam supra tibiam deferre ob morbum existentem circa os pubis.

Cap. XXXIII.

VAlere optimē potest hęc consequentia tibia supra tibiam non potest deferri, ergo causa huius potest quoque esse in parte anteriori pubis propē cartilaginem iuxta longitudinem ossis pubis, quia ab illa parte secundus musculus ti-

bie exoritur, cuius munus est tibiam supra tibiam deferre, vel superequitare; quare si hoc principium musculi esset morbo aliquo in mala compositione, vel in soluta vnitāte oppressum, non video (cum in origine, & initijs musculorum maxima sit virtus) cur nō possit quoque contingere, vt tibia, quę longē distat à pube, lædi possit non à morbo existente in tibia, sed in principio musculi, quod est in superna, & anteriori parte ossis pubis.

Quare colligere possumus, si in exordio musculi virtus est collisa atque collapsa, ex necessitate tendinem insertum in tibiam trahere non posse tibiam supra tibiam: quomodo ergo tunc empirici ita audacter ope inunctionum, & fomentationum tibie, ægris polliceri poterunt salutem? & quomodo eos non pudeat, quando suis frustrantur pollicitis, iterum versari inter illos, quos toties deceperunt?

Ceterum animaduertant lectores, nō solum posse esse morbum in anteriori parte pubis, & eius symptoma apparere in tibia, alioquin sana, & optima constitutione prædita; verum etiam, quod maiori admiratione est dignum, posse esse morbum inter quartam, & quintam vertebra lumborum, & in tibia apparere hoc symptoma, quod est tibiam supra tibiam non posse deferri; quoniam ab illis vertebri nascitur nervus, qui descendens irrigat secundum musculum tibie; quare si in capite istius nervi erit morbus, eius symptoma haud dubiē apparebit in tibia.

Methodus verò, qua cognoscere poteris, quando illud caput nervorum inter quartam, & quintam vertebra sit læsum, erit hæc, quia, antequam hic nervus perveniat ad hunc secundum musculum tibie, prius peragrat pes scaprim, nōnum, & decimū femoris, & deinde surculos mittit ad penem, merito quorum penis habet motum voluntarium tum in extrahendo semen, tum in alijs exercendis officijs, deinde ad secundum hunc tibie, de quo loquimur; deinde exoritur alter nervus ab eodem trunco petens quintum musculum femoris.

Quare, quando videbis vsum septimi mu-

musculi femoris, qui est trahere femur sursum, magis tamen intorsum, quam sextus, esse læsum; & videbis quoque læsum esse vsum noni musculi, qui est femur in gyrum intorsum mouere, & decimi cuius vsus est extorsum in gyrum vertere, & simul cum ijs quintum musculum femoris esse læsum, cuius vsus est femur extendere in rectum, vel in latum, & demum videbis simul cum ijs omnibus penem amittere aliquem motum voluntarium, inferre certò poteris, morbum esse in trunco nervorum communi prodeunte à quarta, & quinta lumborum vertebra, quoniam hi omnes musculi citati recipiunt furculos nervicos, ut fungantur suis officiis, à quarta lumborum vertebra, quæ certissima methòdo resolutiua cognoscet huius affectus radicem.

Diximus penem amittere motum voluntarium ob læsionem factam inter quartam, & quintam lumborum vertebra, idque cognosci ex læsis omnibus illis musculis, qui sunt induti nervicis furculis prodeuntibus ab illo nervorum pari, quod prædit à quarta lumborum vertebra: sed quoniam ob plurimas alias causas motus voluntarius quatuor musculorum pertinentium ad penem tolli, vel impediri potest: Propterea in hoc loco vnum, quod est observatione dignum, non est omitendum, & est, dum duo primi musculi penis, quorum officium inter cætera est aperire meatum, per quod semen debet foris propelli, adeo lacerantur à Lithotomis, tum quando secant, tum quando immittunt forcipem dilatantem, & lacerantem vesicæ collum, & omnes partes vicinas, ut inde musculi hi duo primi penis amittant virtutem vsum aperiendi meatum, per quod sperma emitti debet, quo emissio dum coeunt, semen ob musculorum illorum infirmitatem cum æ primi non amplius possit in penem sequi, ut sponte in vesicam defluat, & deinde cum lotio simul elabatur, quod Augustino Amulio amico meo, & nonnullis alijs contigisse vidimus.

Ex quo casu colligimus motum musculorum pudendorum non solum tolli posse ob morbum existentem in trunco, verum etiam ob morbum existentem in musculis ipsius.

Secundo colligimus, quomodo lacerentur isti musculi, quorum vsus aperire meatum, & expellere semen per synphtiam vicinitatis.

Tertio colligimus errare Lithotomos dum nimio impetu secant plusquam par sit, & lacerant cervicem vesicæ, ut sæpè mors propterea sequatur: Satiùs enim esse aliquantulum magis morari, ut tutius res ageretur; quoniam ex nulla alia causa, his, quibus transponitur per sectio, nem calculus, mors contingere potest, quam ex hac colli vesicæ læsione.

Errant, dum inungunt tibiam, quæ intorsum flecti non potest ob morbum existentem in coxendice, in osse sacro, vel lumbis. Cap. XXXIV.

Per sæpè vidimus in hunc errorem prolabi nostrates chirurgos, dum aggreduuntur curationem tibie, quando intorsum tibia inflecti non potest ob morbum agentem radices non in tibia, sed in coxendice, unde oritur musculus, qui inflectit intorsum tibiam; tunc enim tibiam læsam vnguunt: lana stercida, fascijs, & oleis varijs circumvoluunt, perpetuo hanc hæresim insipientes, quod ubi est symptoma, ibi sit morbus; quod erratum hæcenus plurimis argumentis est reiectum; quoniam ostensum est superioris sepius valde d'Arc, & loco separari morbum à suis symptomatibus.

Similiter in hoc capite ostenditur, musculum tertium tibie mala ledi posse constitutione in infima, & posteriori appendice coxendicis, unde originem trahit, vel in progressu, antequam in tibiam inferatur, veluti circa medium femoris, & inde sequi tibiam ob hunc musculum læsum in origine longè à tibia intorsum inflecti non posse.

Causa enim quod symptoma possit esse in tibiam morbus in coxendice, est, quia hic musculus tertius tibie oritur nervico principio ab infima, & posteriori appendice ossis coxendicis; quare morbus potest esse in nervico illo principio, & symptoma apparere in tibia.

Præterea, cum iste musculus antequam inferatur in tibiam, in medio femoris fiat carnosus, potest usu venire, ut pars illa car-

carnosa repleatur magna humorum sarcina, & ibi sentiat dolor, sed non talis, vt in tendine, quia caro non est tam exquisiti sensus, sicuti sunt tendines, potest igitur esse, vt illa pars carnosa repleta humoribus trahatur, & contendat nerueum principium ortum ab illa appendice coxendicis, & maior perferatur dolor in coxendice, tum ob nerueam substantiam, tum quia, obscuretur dolor femoris à dolore coxendicis, quia maior est; similiter pars carnosa huius musculi repleta potest excitare dolorem in tibia contendendo tendinem musculi, vbi infertur.

Quare colligimus, posse impediri, ne tibia intorsum inflectatur ob morbum existentem in coxendice, & in femore, his igitur positis, volueris ne empirice, si radix, & morbus tibiæ sit in femore, vel in coxendice adiungere topica tibiæ; nemo sane metus, qui hæc principia Anatomica haberet ista faceret, & talem deferret errorem.

Præterea non solum symptoma potest esse in tibia, & morbus in coxendice, vel in femore, verum etiam potest symptoma apparere in tibia, & morbus huius symptomatis esse in osse sacro, quādoquidem quartus nervus pedis, qui est omnium crassissimus, & fortissimus sit ab ultimo nervo lumborum, & ex tribus sequentibus ab osse sacro prodeuntibus; iste igitur truncus mittit ramum ad primum tibiæ musculū, cuius est, trahere tibiā sursum versus inguē alterius, & alios mittit surculos ad hunc tertium, de quo loquimur, & ad quartum tibiæ, cuius usus est tibiā in rectum flectere; & alium ramū ad quintam tibiæ, cuius munus quoque est in rectam flexionem facere, & alium ramum ad quintum femoris, cuius munus est femur extendere, & in latus, & in gyrū femur mouere, quia iste musculus distribuitur in tres alios musculos,

Quare si volueris cognoscere, an istud munus tertij musculi tibiæ deficiat, quod esset quando non posset tertius musculus intorsum flectere tibiā ob morbum existentem in trunco nervorum prodeuntium à vertebris lumborum, & ossis sacri; tunc videre expedit, an citati musculi, qui induunt ipsam nervi amiserint

suum officium, quia ex amissis illorum musculorum officiis valebit consequentia, quod morbus esset in osse sacro, quāvis symptoma appareret in tibia, & tunc oporteret os sacrum, & non tibiā inungere.

Inferas ergo ex his, tibia non potest inflecti intorsum, qui convenit tertio tibiæ musculo, tibia quoque non potest trahi sursum versus inguē, quod pertinet ad primum tibiæ, tibia non potest flecti in rectum, quod pertinet ad quartum, & ad quintū tibiæ; & femur non potest extendi in latus, nec in gyrum moveri, quod pertinet ad quintū femoris, qui omnes musculi eadem nervorum propagine gaudet; inferas ergo morbum debere esse in radice quartij parvis nervorum vestimentum, pedes, & si opus esset inungere, tunc non tibiā, sed os sacrum, vel circa ultimam lumborum vertebram, vt diximus, esse inungendum.

Errant, dum Topicis tractant tibiā, quæ non potest flecti in rectum ob morbum existentem in coxendice. Cap. XXXV.

Poterit in coxendice, vnde pronascitur musculus flectens tibiā in rectum, colligi mala aliqua humorum soboles, vel accidere poterit vulnus, vel tale quidpiam in posteriori parte coxendicis, & inde in tibiæ apparere hoc symptoma, quod non possit in rectum flecti, ratio ab anatomia depromitur, quia hic musculus oritur à coxendice, & descendens per femoris posteriorem partem inseritur in caput fibule, cuius officium est tibiā in rectum flectere, sed dum peruenit ad mediam partem femoris exterius positam recipit magnam carnis molem ortam à medio femoris.

Quare his positis, si in exordio istius musculi fuerit morbus, & inde cōtingat, tibiā non flecti in rectum, volueris tunc tibiā inungere, vt faciunt nostratum plures, qui solum symptomata respiciunt?

Similiter, si in illa carnis positione in parte media exterius sita fuerit impedimentum, vel mala aliqua cōpositio, vel vlcus, vel vulnus, vt propterea amittatur robur illius partis, vnde prodit virtus flecten-

Atendi, volueris ne tibiam tunc inunge-
re, quæ solum læsa est per consensum.

Idcirco si in tibia ipsa tædo istius quar-
ti musculi supra caput fibule, cui inieritur
esset excisus ob aliquod vulnus; cur sem-
per in casu hoc deplorato, irritis tuis vi-
nacæis vexas tibiam, cum sit priorius im-
possibile, post excidium hunc tendinem,
flectere tibiam in rectum; quinimò exci-
so hoc tendine, non solum tollitur flexio ti-
biæ, sed tollitur, quod homines amplius
nec currere, vel ambulare possunt.

Mirandum est, quomodo Galenus in
hunc errorem incidit, quod cuida cur-
sori fuerit hic quartus tibiæ musculus ex-
cisus, nihilominus dixerit cursorem, ve-
locius cucurrisse, quod non potuit esse,
quoniam si hunc musculum leuamus, nul-
lo modo recta flexio effici poterit: & ra-
tio est, quia cursus fieri non potest sine re-
cta flexione, ut testis est ipsemet Galenus
2. de administratione ana. quinimò læso
hoc musculo, non solum curius omnino
demitur: verum etiam incessus, vel am-
bulatio tollitur; quare si cursus, & am-
bulatio erunt adempta ob morbum existen-
tem supra caput fibule, unde oritur hic
musculus, vel ob morbum existentem in
medio femoris, unde musculus sit valde
carnosus, quis esset tam bardus, & mente
captus, qui tibiam inungendo speraret
salutem? ut faciunt empirici, qui semper
illidunt his vadis occurrentes symptoma-
tibus, quod faciunt, quoniam origines,
progressus, & officia musculorum, &
neruorum omnino ignorant: vel credunt
fortasse musculos oriri ex illis mer parti-
bus, in quas inferuntur.

Postremo cum musculus iste quartus
recipiat virtutem flectendi à nervis pro-
deuntibus à quarto pari nervuorum pedis:
propterea potest accidere, ut circa quin-
tam lumborum vertebam, & circa tria
foramina ossis sacri, à quibus locis hoc
nervorum par trahit suum initium, sit mor-
bus, qui sit causa, cur tibia non possit fle-
cti, quod hac methodo cognoscemus,
quia cum ab isto quarto crassissimo ner-
vorum trunco prodeant rami vestientes
primum, tertium, hunc quartum, & quin-
tum tibiæ musculum, & exinde ad quin-
tum femoris mittat ramulos, virtute quo-
rum officia horum musculorum exer-

ceantur, tunc si erit morbus in exordio
circa summitatem ossis sacri, necessariò
enumerationum istorum musculorum,
officia debent cessare, & ex horum mu-
sculorum lésione, deinde nos amotis ma-
nifestis affectibus, poterimus peruenire
ad cognitionem affecti loci.

*Errant, dum inungunt tibiam, quæ in re-
ctum extendi non potest ob morbum
existentem in ilium appen-
dice, vel in osse sacro.*
Cap. XXXVI.

SI morbus ob distillationem, vel ob alias
causas egeret radices in media appen-
dice ossis ilium in extrinseco latere, unde
oriuntur musculi extendentes tibiæ, tunc
tibia nullo modo posset extendi, & causa
istius lésionis non esset in tibia, sed in ilii
appendice, ecce quomodo cubiti tractu
morbi, vel causæ aliquando à symptomati-
bus distat, quâ mirabilem sympathiâ nec
possunt, nec volunt empirici cognoscere.

Age ostendamus nos ex anatomia hæc
remotam sympathiam, quæ est inter ti-
biam, & ilium: numquid non est munus sexti
musculi tibiæ extendere in rectum tibiæ;
sed sic est, quod iste sextus musculus ex
omniuius consensu oritur à media appen-
dice forinsecus ossis ilium, ergo dabitur
occasio, quod morbus ilium ostendat suum
symptoma in tibia, præterea potest quoq;
esse morbus in progressu istius musculi,
quia in primis descendens iungitur maiori
trochantirio, & ibi cessat in membra-
nosum illum tendinem, quo in toto cor-
pore non est maior, amplectitur enim
omnes ferè musculos, qui circa femur
locati sunt, & deinde rectis fibris descen-
dēs rotulæ genu amplectitur, & in ante-
riore tibiæ, fibuleq; partē tandē inseritur.

Quare his positis, quid prohibet quin
causa, cur non extendatur tibia sit in ilibus,
vel in trochantirio, vel in femore, &
symptoma præcipue appareat in tibia per
optima constitutione prædita; quinimò
cū iste sextus musculus amplectatur mu-
sculos omnes in femore locatos, posset
cōtingere, ut hoc læso, omnes musculi fe-
moris, & tibiæ in obeundis suis muneri-
bus deficerent per consensum vicinitatis
istius musculi; videas ergo quot modis ac-
cidere

cider e possit, vt tibia non extendatur ob morbum, vel causam, aliubi positam.

Denique potest accider e, vt morbus sit circa os factum, & infimam vertebrae lumborum, vnde exoritur primum par neruorum petentium pedes, & symptoma sit in tibia, in quam inseritur sextus iste musculus tibiae: cognoscitur verò tibia non fungi suo officio extendendi ob laesum caput primi paris neruorum, pedis ex laesione illorum musculorum, qui sunt neruis eiusdem primi paris irrigati, veluti est primus musculus tibiae, septimus, & nonus.

Hinc si videbis tibiae non posse sursum trahi versus inguem alterius cruris, quod officium pertinet ad primum musculum tibiae, qui irrigatur eadem propagine neruea prodeunte à primo pari neruorum pedis, & videbis non extendi tibiae per rectam lineam, quod munus attingit ad septimum, & nonum musculum tibiae; tunc magno tibi erit argumento, quod in capite primi paris neruorum pedis, vbi est vltima vertebra lumborum, praecipue sit morbus, quamuis symptoma sit in tibia; vulneris ergo tunc adiungere topica tibiae? nihil sanè esset magis abhorrens à medica physiologia, & nihil fieri posset, quod magis faueret circulatoribus, & quod redderet artem inartificiosam, & infanorum hominum propriam, quam occurrere symptomatibus, vt symptomata sunt.

Quia symptomati occurrere est mederi aliquando morbo, in loco, in quo non est, vt hinc symptomata ex se nihil indicent, sed solum sint in fieri, & aliquando adeo loco separentur à morbis, vt diffundantur symptomata in partes aliquas, quae optima sunt constitutione donatae, quae medicum non alliciunt.

Præterea potest esse morbus circa magnum trochanterium, & symptoma apparere in tibia, quoniam erit septimus musculus à magno trochantirio, & ad patellam vsque rectis fibris carnosus progreditur, deinde cessat in latum, & membranosum tendinem, qui patellam complectitur, & implantatur anteriori parti tibiae, quare si septimus iste musculus (cuius officium est in suo latere tibiae extendere) in suo exordio haberet

morbum, propter quem tibia non posset extendi, tunc, cur vis empirice vnguentis, lutis, & vinaceis uexare tibiae, si morbus est in maiori trochantirio, in tibia verò sit solum symptoma?

Amplius si septimus iste musculus tibiae in femore, vbi fit carnosus, esset repletus humoribus, vel ob vulnus excisè essent fibrae transuersim, vnde tibia propterea amisisset vim extendendi, qua ratione, vel qua philosophia ductus topicis tibiae tractares, cum in tibia sit tantum symptoma, & non morbus?

Demum si morbus esset in tertio lumborum foramine, vnde primum par neruorum pedum exoritur, & tibia non posset extendi, cognoscamus ex laesione illis officijs musculorum, qui irrigantur illis nerueis surculis, quibus irrigatur quoque septimus iste musculus extendens tibiae, qui musculi sunt primus, & nonus tibiae; quare si primus tibiae musculus amitteret suum munus, & similiter nonus, & insimul quoque vñs huius septimi sit amissus; signum erit, morbum esse in capite primi paris neruorum pedum; quare si topicis esset curandus affectus, tunc ad lumbos esset confugiendum, & non ad tibiae.

Insuper tibia aliquando non potest extendi ob laesum musculum octauum eiusdem tibiae, quia in ceruicem femoris (in locum delibet, vbi est maius trochanterium, quod est femoris processus maior, vnde oritur octauus iste musculus extendens tibiae) humores confluerint, qui impediunt extensionem tibiae, vt obseruatur praecipue in illis, qui ischiadem patiuntur, in quibus, quamuis tibia omni malo humore, & mala constitutione sit priuata, recipit tamen symptoma illius morbi, qui suam sedem tantum habet circa radices maioris trochantirij, communicatur tamè tibiae symptoma, quia musculus iste octauus progreditur ad patellam, & in tendinem desinit, qui genit complectitur, quare si in musculi initio erit morbus, & causa huius symptomatis in tibia, cur non vis adiungere localia musculi exordio, vbi est morbus? tanto magis cum musculi virtus praecipue conferuetur in exordijs, quibus laevis, musculi secundum omnes partes in suis obcundis officijs tam facile defici-

deficiant: quare localia erunt apponenda si tibia erit læsa ob læsi musculi exordium inguini, & nequaquam tibie.

Postremò potest esse morbus, vbi est quarta vertebra lumborum, vnde oritur secundum par nervorum pedis, & eius symptoma apparere in tibia, quoniam octauus musculus tibie, cuius munus est tibiam extendere, recipit virtutem motricem à neruis prodeuntibus à quarta vertebra quare si morbus esset circa quartam vertebra lumborum, & impediret transitum facultati motrici, tunc nisi ad lumbos topicis auxilijs confugas nihil facies.

Sed audias, quomodo cognosci possit, quando tibia non potest extendi ob morbum existentem circa quartam vertebra lumborum. Pollex non movebitur, quia eius motus quoque pendet à sacculis istius trunci, & nonius tibie musculus non explebit suorum officiorum partes: ob eandem rationem quintus musculus femoris suum non poterit munus obire, quod est femur extendere, & rectè stare; ex his simul læsi officijs ducemur in hanc cognitionem, quod morbus causans impedimentum in tibia sit in capite secundi paris nervorum pedis, quod oritur a quarta lumborum vertebra, quatinus symptoma sit in tibie: olligas ergo, quomodo his non præcognitis, quilibet empiricus in symptomatibus auferendis nullis in dies possit errare.

Errant, dum iungunt tibiam, quæ non potest extendi ob noni musculi lesionem, quando essent iungenda illa, vel lumborum vertebra. Cap. XXXVII.

Esse potest in parte anteriori illi collectus viscosus humor, vt nonius musculus ibi exorians imbibatur, & in illa origine ob humorum farciuram vires extendendi tibiam amittat, tunc localia procuratio istius affectus essent applicanda anteriori parti illium, & non tibie; quia symptoma solum est in tibia, morbus verò in anteriori parte illium: communicatur verò iste affectus tibie ob hanc rationem, quia iste nonius musculus enascitur ab anteriori parte ossis illium supra articulum coxendicis, & incedit inter septimum, &

octauum musculus, & coit cum septimi, & octauo tendinibus, & vnà patellam amplectantur, & in anteriorem tibiam inseruntur.

Videas ergo, quanta seruari potest distantia inter originem, & terminum musculorum. Præterea qualis debeat esse consensus, & sympathia, vt morbus existat in vno loco, eius verò symptoma in alio longè diuerso ob instrumentorum continuationem appareat, sicuti in hoc casu contingit, vt morbus sit in ilibus, motus verò diminutus in tibia.

Similiter si de dolore musculi loquamur potest esse imbibitus musculus in aliqua parte carnosa, quæ sit facta indolens ob tumorem, qui deinde contendat fibras, & tendinis insertos, propter quam tensionem maximus sentiat dolor in partibus, quibus inseruntur tendines, quoniam illæ partes moventur, & maximos experiuntur labores.

Quare nisi methodo anatomica perquiras, vbi sit morbus in musculis, vel in nervis, nunquàm scire poteris locum applicandi remedia, vt merito in scholis receptum sit, vbi agendum desumi à substantia indicantis: quare si indicans est in femore, & in anteriori parte illium, vnde nascitur hic nonius musculus extendens tibiam, & non inuenianus hunc locum affectu, casu, & fortuito de locis ageretur.

Præterea non solum potest accidere, vt tibia non possit extendi ob morbum existentem in parte anteriore illium; verum etiam ob morbum existentem in tertio lumborum foramine, à quo exoritur prima nervorum pedum coniugatio, quæ mittit ramulum vestientem nonium hunc musculus, quare si in hac prima coniugatione nervorum erit aliqua angustia, propter quam permeare non possint radij spirituum animalium, necessariò sequetur, tibiam non posse extendi.

Quare quomodo vis empirice tunc tibiam tractare vnguentis, balneis, luti, & que vinaceis? apage hunc malum medendi usum, quoniam primò tempus contraris, secundò laxantibus topicis contrangis vires tibie, laxando musculis, & tendines insertos, quare si morbus est in lûibis, & symptoma in tibia, localia erunt vertebis lumborum adiungenda, vel oportebit

bit refoluere, vel deriuare collectos humores vftionibus, vel alio ingenio.

Methodus verò, qua cognoscere poffumus, tibiam non extendi ob morbum circa lumbos existentem, colligi potest ex læfione cæterorum mufculorum, qui irrigantur iisdem propaginibus miffis ab eodem trunco, ficuti est feptimus mufculus tibiæ, qui induitur neruis prodeuntibus à primo nernorum pedum pari; & primus tibiæ, qui propter eodẽm furculos fuum exercet officium, quod est trahere tibiam verius in guem alterius eruris.

Præterea nonus ille mufculus irrigatur quoque propagine prodeunte à fecundo pari, quod oritur à quarta vertebra lumborum; hoc par mittit ramos ad digitum pollicem, ad quintum mufculum femoris, cuius vfus est femur extendere, & est caufa rectæ stationis, mittit quoque ad octauum tibiæ, cuius vfus est extendere; quare ex læfis his omnibus officijs colligere poffumus, morbum esse circa lumbos, quamuis symptoma fit in tibia, & optimè faciet hac diuina arte exculus mederi affectibus, qui procul valde fiunt à finis morbis, ficuti tibia diftat à lumbis, vt propterea ob hanc noftri corporis sympathiam empirici valde admirentur videntes aliquando probum anatomicum curare tibiam læfam remedijs pofitis fupra nates.

Dum in externo femoris capite est tumor, vel scyrrhus aliquis imperfectus, vel aliquis malus habitus, tunc fequitur, quod tibia obliquè non poffit moueri verius exteriora, errant in hoc empirici inungentes tibiam, quia morbus caufans hoc symptoma est in parte externa capitis femoris.

Præterea potest esse caufa istius symptomatis tibiæ in exortu quarti paris neruorum pedum, quod est omniũ crassiffimum, exoriturque ab vltimo lumborum foramine, & à tribus fequentibus in offe sacro; quoniam neruus veltiens decimũ hunc mufculum tibiæ, cuius vfus est obliquè tibiam verius exteriora mouere, oritur ab hoc quarto pari neruorum, quare potest contingere, vt morbus fit in lumbis, & in offe sacro, & inde iste mufculus tibiæ exercere non poffit fuum officium.

Cognoscamus hoc symptoma tibiæ

prodire à morbo lumborum, quando omnes illi mufculi, qui ab eodem trunco neruorum recipiunt virtutem animalem erunt læfi, vt funt primus mufculus, certius, quartus, quintus tibiæ, quintus femoris, & tres primi mufculi mouentes pedem, fimiliter quartus, quintus pedem mouentes, & duo illi mufculi qui flectunt digitos, qui oriuntur à tibia, quorum officio omnia fi videris esse læfa, inferre certò poteris morbum esse in capite quarti paris neruorum pedis, id est circa poftremam vertebam lumborum, & circa tria foramina offis sacri; videas ergo quo pacto empirici fepe lædere poffunt topicis fuis auxilijs.

Errant, dum inungunt femur, quod in rectam lineam extendi non poffit ob morbum existentem in coccyge.

Cap. XXXVIII.

SI contingat, vt in offe sacro, vel in coccyge fit aliquis pituitofus infarctus, vel in appendice offis ilium, & propterea femur nõ poffit extendi, tunc nõ defunt empirici, qui inungunt statim totum femur nefcientes animo concipere in alia parte offe morbum, quam in femore.

Caufa tanti erroris est, quoniam nefciunt, vnde oritur primus femoris mufculus ille crassus, & carnofus valde, qui clunes conftituit, exoritur enim ille mufculus primus femoris à dimidia appendice offis ilium, ab offe sacro, & à coccyge, & ampla infertione in maius trochantarium inferitur, eius vfus est, fi fecundum omnes fibras operetur, in rectam lineam femur extendere, fed fi cum fuperioribus, vel cum decliuioribus tantum fibris operetur, modò in vnum, modò in aliud latus femur ducere poterit, inde ex læfis officijs, quæ pars mufculi læfa fit colligere poffimus.

Quapropter non par est, dum non extenditur femur, femper confugere ad femur, quia nulla est confequentia, tibi est actio læfa ergo & morbus, cū pleriq; plures affectus fieri poffint in vna parte fana & ob sympathiã longorũ mufculorũ, & neruorum, caufa & radix affectionis in loco valde diftanti habeat radices, ficuti de femore loquentes dicimus cõtingere

re posse, vt femur non extendatur ob morbum existentem in osse sacro.

Præterea, potest esse morbus in primo pari nervorū ossis sacri, qui sit caula, cur femur extendi non possit, ratio est, quia ab hoc nervorum trunco enascuntur propagines petentes primum hunc femoris musciculum, quibus læsis in suo exordio, statim musculus in suo officio obeundo deficiat oportet.

Methodus verò, quæ nos docere possit, quando ob hanc causam sit læsum femur; est hæc; ab hoc primo nervorum pari oritur hæc propagatio vestiens primum hunc musciculum, & septimum femoris cuius officium est trahere femur sursum fortiter flectendo magis inrorsum, quam faciat sextus musculus, & deinde alias mittit propagines ad musculos ventris; quare quando uniformiter septimus musculus femoris, & ventris musculi non poterunt explere sua officia vna cum primo hoc musculo, de quo loquimur, interendum erit à primo hoc trunco nervorum, ossis sacri læso prodire affectionem, & in osse sacro esse morbum, quamvis symptoma appareat tantum in femore.

Si aliquis non posset femur extendere, & per consequens rectam stationem non posset exercere, tunc adiungendo semper topica femori, quasi causa istius læsi officij aliubi non possit insidere, quam in femore, inter empiricorū errores collocandum hoc esset; quoniam musculus extendens femur non oritur à femore, sed ab osse coxendicis, & à pubis humiliori sede, & insertus est posteriori femoris sedi circa capita ipsius humiliora iuxta genu.

Quare in hoc musculo omnium muscutorum maximo potest esse morbus in osse coxendicis, vnde exoritur, & symptoma in femore. Similiter potest esse morbus in parte humiliori ossis pubis, & in femore apparere symptoma hoc, quod videlicet non possit femur extendi, & inde statio recta sit impedita; tunc quando hoc accideret numquid non errarent empirici inungentes femur, & genu? in quibus licet symptomata videantur; attamen optime sunt constituta genu, & femur.

Amplius potest esse, ut non extendatur femur, & propterea statio recta sit amissa,

& morbus sit in secundo pari nervorum pedum, quod nascitur inter tertiam, & quartam vertebrae lumborum: quando verò hoc accideret, methodo esset à nobis cognoscendus morbus existens in principio secundi paris nervorum, præsciendo prius ab hoc secundo pari oriri ramos petentes digitum pollicem, octavum, & nonum musculos tibiæ, quare, quando femur non posset extendi, & simul octavus, & nonus musculus tibiæ essent læsi, quorum officia sunt extendere tibiæ, dicas supra femur esse morbum reconditum, sicuti in lumbis, vnde oritur secundum par, à quo oriuntur isti nervi, illumque esse morbum in angustia, & mox philosophari poteris, quanam species angustia esse possit, an compressio, vel subsidencia, vel coalescentia, de quibus speciebus in primo libro, deinde illis methodis traditis invenies affectum præter naturam.

Ad hæc potest quoque accidere, vt femur non possit extendi, & homines non possint rectè stare ob lesionem factam in principio tertij paris nervorum pedis, quod oritur inter quartam, & quintam vertebrae, quod par mittit ramos ad hunc quintum, ad septimum, nonum, & decimum musculos femoris, & ad secundum tibiæ, & ad musculos penis, & vesicæ; quare si omnes isti musculi citati erunt læsi, morbus erit ex necessitate in tertio pari idest inter quartam, & quintam vertebrae; est enim impossibile, vt quintus musculus femoris sit læsus ob morbum existentem inter quartam, & quintam vertebrae, quin eadem lesionem patiantur secundus, nonus, decimus, secundus tibiæ musculi penis, & vesicæ.

Demum potest esse inter ultimam vertebrae, & os sacrum morbus, & inde sequatur, quod femur alioquin sanum non possit extendi ob hanc sympathiam, quia à quarto pari nervorū pedum enascitur ramulus vestiens hunc quintum musciculum, valet ergo consequentia, læsus est truncus, ergo necessitè læditur ramus; cognoscemus deinde hunc ramum non fungi suo officio ob læsum truncum, quando primus, tertius, quartus, & quintus tibiæ simili modo læsi sunt; quia omnes isti musculi sunt induti furculis prodeuntibus

bus ab hoc quarto pari.

Inde colliges quo pacto ex læsis officiis cognoscere possimus, quando femur lædatur ob morbum existentem inter tertiam, & quartam, quando inter quartam, & quintam, & quando inter ultimam & os sacrum: cognitio enim anatomie tantum potest, ut digito bonus anatomicus sciat ostendere protopathiam.

Postremo an ne posset aliqua humorum colluvies detineri inter foramen ossis coxendicis, pubis, & illum, quæ comprimat nervum transcurrentem per foramen, & inde symptoma appareat in femore? an ne posset in musculis nono, & decimo, qui in gyrum inouent femur, esse tumor aliquis, qui si comprimeret hunc nervum, motum femoris tolleret? quare concludimus illum empiricum per sæpe fallere, & decipere, qui occurrit semper symptomati localibus.

*Errant dum inungunt femur, quod trahit
forsum, & moueri intorsum non potest
ob morbum existentem in undecima,
vel duodecima vertebra thoracis.
Cap. XXXIX.*

Sæpissime vidimus in ægrotantibus, semora non posse trahi, nec flecti intorsum; quod munus pertinet ad sextum musculum femoris, qui oritur ab undecima, & duodecima vertebris thoracis, & à prima, & secunda lumborum, & progrediens per internam illam partem inieritur in minus trochanterium; quare si esset in capite musculi morbus, & radix, cur femur non posset sursum trahi, & flecti intorsum; arbitror ego, si femur tractares topicis annis sexcentis, nihil ageres.

In læso igitur hoc femoris officio erit perpendendum, an in undecima, & duodecima vertebris thoracis, uel in prima, uel secunda lumborum sit tumor, uel dispositio scyrrhosa, uel humorum infarctus in parte interna sub vertebris, unde sumit initium quia de extima supra vertebras facile esset cognoscere, cum manibus ipsis tumores quamuis minimi sint, cognoscantur.

Est ergo operepretium perpendere, an sub undecima, & duodecima vertebris thoracis, uel sub prima, & secunda lum-

borum, unde musculus iste trahit originem possit esse, uel tumor, uel scyrrhosa dispositio, uel infarctus pituitosus, quod peroptime cognoscet ex ijs; quæ tradita sunt in primo libro capite de locis affectis, quoniam cognito, quod sit in principio musculi tumor, uel scyrrhosa dispositio cognoscemus illicet ex hoc morbo existente in principio huius sexti musculi in primis deficere usum huius sexti musculi femoris, deinde cum iuxta hunc musculum descendat primum par nervorum pedum, sequetur necessarium, ut iste musculus sextus tumidus factus in exordio, uel paulò infra comprimat primum par nervorum, & ob angustiam ab ipso facultas animalis non mittatur, ad primum septimum, & nonum musculorum utriusque tibie.

Sicuti contingit cuidam præclarissimo uiro, qui amisit motum femoris, & tibie ob hanc scyrrhosam dispositionem in lumborum vertebris circa exordium sexti musculi existentem, quam conieci non solum ex pondere, quod in illa parte sentiebat, uerum etiam, quia retulit ictum ex casu in dorso recepisse.

Hic tamen patiens in primis à nonnullis medicis dogmaticis fuit laceratus, qui credebant caput fuisse originem amissarum functionem musculorum femoris, & tibie; deinde ab empiricis, qui tibias inunctionibus, & alijs topicis fortissimis tractarunt, unde læsiones uariæ secutæ sunt quoniam vires tibiæ alioquin optimæ constitutionis potentissimis oleis & laxantibus alijs topicis adeo fuerunt confractæ, ut ex illis amissis functionibus alie læsiones in creuerint.

Quare ne decipiamur in cognitione partis principaliter affectæ, debemus prius ortum, progressum, & figuras omnium partium corporis ante oculos obijcere, & deinde ex sufficienti parte enumeratione, uitæ tamen methodorum traditarum in primo libro inuenire affectus, deinde separate affectum per consensum ab affectu per essentiam, & in affectibus per essentiam distinguere idiopathiam à protopathia, alioquin non uideo quo pacto reconditas ægriudines unquam possimus perfecte cognoscere.

Quinimò sine hac arte anatomica

num-

nunquam possemus credere morbum esse circa lumbos, & os sacrum, & symptoma illius esse in tibia, quod tamen facile esse potest, quia dum sextus musculus femoris comprimet primum par nervorum pedis, omnes musculi, qui sunt irrigari illis furculis, qui prodeunt ab hoc primo pari nervorum pedis, sua officia explere non poterunt, & hæc anatomicus sine ulla admiratione admittet.

Insuper potest contingere, ut femur non possit inflecti, & introrsum trahi propter angustiam existentem in exordio primi paris nervorum lumborum, quia ab hoc pari exoritur ramus, qui fertur per interiora, & irrigat sextum musculum femoris, quo læso, femur non potest flecti, & sursum attrahi introrsum, quare si huius læsionis femoris radix est circa primam vertebra lumborum, quo pacto per topica adiuncta femori poterimus huius symptomatis euellere radicem.

Methodus, quæ nos certò docebit, quando in hoc particulari furculo interno est morbus, qui efficit symptoma in femore, desumi debet ab anatomia, & est, quia ab eodem nervo mittuntur ramuli ad ventris musculos, & ad quartum brachij, & alij mittuntur ad nonum musculum dorsi.

Ideo, si circa primam vertebra lumborum in capite nervi interni primi paris erit morbus & symptoma in femore ex necessitate officia horum musculorum debent esse læsa, & ex læsis officiis musculorum ventris, quarti brachij, & noni dorsi, de quibus officiis superius actum est, ducemur in cognitionem morbi ramuli interni prodeuntis à primo pari nervorum pedis, quod exoritur à prima vertebra lumborum.

Videas ergo, quot sunt in hoc nostro corpore sympathiæ, & consensūs, cum læso ramulo interno primis paris nervorum pedis, symptomata appareant in brachio ob quartum musculum brachij, in femore ob sextum femoris, & in nono dorsi muscululo, qui pertinet ad quintum par, quorum musculorum ministerio lumbi flectuntur versus anteriora.

Præterea, si esset morbus in exordio primi paris, tunc non solum ramulus iste interior, de quo iam diximus, verum

Sanctorij Sanctorij Pars 1.

etiam exterior eandem passionem consentiret, quo læso symptomata observari possunt in partibus remotissimis; quoniam exterior ramus huius primi paris mittit furculos ad quartum musculum thoracis ad vndecimum, & decimum tertium dorsi; interior, ut diximus ad sextum femoris, & ad quartum thoracis, quare ratione quarti musculi thoracis, cuius usus est constringere posteriora thoracis, & expirationi aliquid opis afferre, potest esse morbus in prima vertebra lumborum, unde oritur primum par nervorum pedis, & eius symptomata apparere in pectore; ratione verò musculorum dorsi dorsi non male agere suas partes, ratione verò quarti musculi brachij, qui oritur ab osse sacro, & lumbis brachium in suis muneribus deficere, ratione denum sexti musculi femoris femur esse læsum; quare ob morbum lumborum brachia, pedes, & dorsi pati possunt.

Tunc vellein videre empiricum adiungentē topica femori optima constitutione donato, adiungentem brachio, dorso, ubi nulla per se est mala valetudo, nisi per sympathiam; videas ergo quam mirabilis seruetur sympathia in hoc corpore cum in unico puncto esse possit morbus, veluti observatur esse circa primam vertebra, & symptomata huius morbi in brachio, in femore, & in pectore apparere; quare nisi anatomiam omnium partium corporis in omni læsa actione perpendamus, est prorsus impossibile nos posse rectè mederi.

Insuper potest esse morbus in renibus & symptoma apparere in femore: sicuti ex Hipp. habemus, calculum in renibus inter cætera signa cognosci ex femoris torpore è directo respondente. Causam istius stuporis in coxis putant Langius & Iacotius esse, quia in hoc affectu nephritico replentur venæ & arteriæ cruris unde ob copiam cōprimitur nervus: unde stupor.

Sed falluntur, quia si ob salem compressionem fieret isti stupor, eadem stupiditas esset in toto pede & non solum in coxa: causa igitur est musculus sextus femoris qui dicitur psoas, qui a parte subiecta renibus oritur, ibique comprimitur, unde stupor solum in coxa, quia ad partes inferiores non excurrit.

H Am-

Amplius hic sextus musculus femoris potest lædi per consensum vicinitatis in suo exordio, veluti ob tumorem lumborum, vel ob ictum circa vndecimam, & duodecimam vertebra thoracis, vnde oritur; potest enim contingere, vt sextus iste musculus quamvis in parte sit interna, comprimatur ob tumorem aliorum musculorum, & symptomata in femore appareat; cognoscemus autem quem musculus tumor, vel ictus principaliter lædat ex officio magis, & primo loco læso.

Per hypothesein, post casum est vehiculo ictus factus est in lumbis, tunc dolent lumbi, dorsum, femur, & brachia: si vis scire quis musculus principaliter læsus sit consideras, quæ officia magis læsa sint; si erit officium extendendi dorsum totum in rectum magis læsum, inferas ex anatomia (sine qua, vt sæpè diximus, est impossibile mederi) sextum par musculorum, dorsum esse principaliter læsum, cuius munus est extendere totum dorsum in rectum, ergo si hic est principaliter læsus, poterunt esse læsiones in exordio, & in progressu, exordium eius est in infima ossis sacri parte, & in interna parte ilium, progressus est in toto dorso, cum ab infimis his partibus vsque ad primam thoracis vertebra se extendat.

Si vero inter officia læsa ob ictum, officium constringendi posteriora thoracis esset magis læsum, quod cognoscereur ex læsa respiratione; quoniam officium istius musculi est respirationi conferre vt superius declarauimus, confugeremus ad initia, & progressus istius musculi, & manibus proprijs inueniremus locum principaliter læsum.

Similiter si post ictum in lumbis inter cætera officia læsa apparet hoc, quod brachium trahi deorsum non posset, illico possemus certò inferre, quartum musculus brachij esse læsum, quia oritur ab osse sacro, & à lumbis, & ex hac cognitione principalem affectum cognoscemus, & remedia localia rectissime administramus.

Ad hæc potest quoque hoc accidere per consensum quarti musculi brachij, quatenus sub axillis, vbi inseritur, sit tumor contrahens, & extendens quartum musculum brachij, quippe qui deinde ob contractio-

nem, premeret super nervum missum sexto musculo femoris, & inde femur ob tumorem existentem sub axillis non posset flecti, & introrsum sursum trahi; ecce, quam mirabilis sympathia obseruetur in hoc nostro corpore, vt morbus sit sub axillis, & femur per illam sympathiam quoque ægrotet: non desunt quoque aliæ sympathiæ, quæ quotidie obseruantur in ægrotantibus. has autem volui proponere contra empiricos, ne in posterum aliqui ita sint faciles ad credendum, quod symptomata solum essent curanda.

Dum pedem, & calcem inungunt, quando internum caput femoris esset inungendum. Cap. XL.

VSu venire solet, vt patiens aliquando non possit tollere calcem digitis terræ premendo ob læsos musculos in exordio, quod est in interno femoris capite; nihilominus empirici nesciunt alium locum in hoc casu inungere, & topicis tractare, quam calcem, & pedem, nescientes ad quos musculo pertineat hoc officium.

Scias ergo hoc officium tollendi calcem expleri præcipue à tribus musculis, à primo nimirum, secundo, & quarto pedis quod experimentum anatomia manifestissimum est: scias præterea primum, & secundum musculos pedis, qui videntur vnus musculus, habere principium ab interno femoris capite retrò iuxta genu, deinde progrediens deorsum constituere suræ partem, & deinde cum tendine omnium robustissimo quarti musculi vniri, & fieri vniuersum tendinem, qui in posteriorem calcem inseritur, quare, si morbus erit in capite illo interno femoris in origine musculi, vel in itinere in sura videlicet, vel paulò infra, volueris ne inungere calcem, vt solent nebuloſi isti chirurgi.

Præterea ait ne sæpè vidimus sub genu homines vulnerati, & abscindi origine horum duorum musculorum, deinde vsus, & officium trahendi calcem sursum, & extendendi pedem digitis in terram figendo amitti? quomodo inunctionibus adiunctis calci aliquid boni facies? si aliquid esset molliendum oportet sanè confugere ad locum affectum, & ne-

& nequaquam ad symptoma.

Similiter si de quarto musculo loquamur, qui maior est tibia, quique oritur sub appendice fibule à posteriori parte, & factus carnosus tibiæ, & fibulæ adhæret, deinde cum tendinibus primi, & secundi descendens desinit in ualidissimum illum tendinē, qui inseritur in calcaneum, quo tendine uidemus lanios suspēdere in melleo integra animalia, tunc, si unde exoritur sub appendice fibulæ, uulneretur, uel transuersum excidantur fibræ, sursum non poterit ille calcem trahere, similiter si tendo, uel origo musculi quarti sit scyrtosa dispositione, uel infarctu pinuoso impedita, non poterit calx sursum trahi, quomodo ergo in simili casu localia applicabis calci, si morbus est aliubi?

Insuper, cum isti tres musculi sint contexti nervis enascentibus à quarto pari neruorum pedum, quod potest contingere, ut calcaneus tolli non possit, & morbus nō in calcaneo sit, sed circa ultimam lumborum uertebra, unde nascitur quartum par neruorum pedum, quorum surculi sunt illi, qui dant motum calcaneis: quid magis quam hoc exemplum possit confundere empiricos illos, qui anatomiam humani corporis despiciere solent, quam uidere in calce apparere malam ualitudinem, & illam alio modo, non posse curari, quam topicis adiungendis ultimæ lumborum uertebrae, & ossi sacro?

Methodus uero cognoscendi, quando calx læditur ob morbum existentem in osse sacro, & lumbis, est, quoniam deficiet quoque in suis muneribus obeundis omnes illi musculi, qui facultatem motricem recipiunt ab hoc quarto pari neruorum pedum, ut sunt musculus primus, tertius, quartus, quintus tibiæ, quintus femoris, quintus pedis, & illi musculi, qui flectunt digitos, ut sit necessaria consequentia, hæc deficit calx in hoc munere se tollendi, & cæteri simul enarrati musculi, ergo morbus efficiens hoc symptoma erit in quarto pari neruorum, uidelicet in origine prodeunte à lumbis, & ab osse sacro.

Errant, dum semper calcaneum inungunt, quando versus anteriora in obliquum, non potest moueri, cum modo in femore, modo in osse sacro possit esse morbus.
Cap. XLI.

ERRANT empirici, dum quis nō potest mouere calcaneum in obliquū versus anteriora inungendo calcaneum, quia hoc officium mouendi calcaneum obliquē versus anteriora pertinet ad tertium musculum pedis, qui oritur ab externo capite femoris, quare potest cōtingere, ut in femore sit impedimentum, & motio ablata in calce.

Præterea musculus iste recipit facultatem animalem à quarto pari neruorum pedum, quare potest accidere, ut causa symptomaticis calcis sit in exordio quarti paris neruorum, quod est in extrema lumborum uertebra, & in osse sacro: oritur enim hoc quartum par ab extrema lumborum, & à tribus sequentibus ossis sacri, ut propterea sit crassissimus, & robustissimus omnium iste truncus.

Cognoscemus deinde, ut in superiori capite diximus, quando ob hanc causam existentem in origine quarti paris neruorum calx non mouetur, quia eodem modo, læso principio, cæteri musculi irrigati ijdem surculis amittent sua officia, ut primus tibiæ, cuius usus est trahere tibiā versus inguē alterius, ut tertius tibiæ, cuius usus est tibiā flectere introrsum, ut quartus, & quintus, quorum usus est flectere tibiā in rectum, & cū his læsis officijs digiti quoque non poterunt flecti; tunc ex omnibus his officiis læsis, si uiderimus calcem non moueri, scilicet inferre poterimus, morbum esse posse in lumbis, & osse sacro, unde oritur quartum par, & topica his superioribus partibus applicabimus.

Similiter errant dum inungūt calcem quando aliquis pedem versus interiora trahere non potest, quoniam munus trahendi pedem versus interiora, & sursum tollere calcē pertinet præceteris ad quintum musculum pedis, cuius musculi initium, & origo trahitur a tibia & fibula, deinde descendit carnosus vsq; ad extremam tibiā, & prope internum malleo-

lum definit in robustum tendinem, & excurrit sub interno malleolo, & sub osse naviculari, & demum sub planta pedis in tarsi os implantatur; Quid ergo vis tarsum inungere si circa tibiā, & fibulam est huius symptomatis radix? quare cognito huius musculi exordio, & progressu, est examen faciendum, an in origine, vel progressu, vel in fine sit morbus, quæ ex præcedentibus, & consequentibus signis cognoscuntur, & aliquando manibus proprijs inveniuntur causæ horum symptomatum.

Ad hæc potest contingere, ut dictum officii amittatur ob nervorum læsiones in origine, quas læsiones ex officiis læsis ceterorum musculorum, qui eandem facultatem ab eodem stipite recipiunt facile cognoscere poterimus: quibus cognitis nõ semper topica erunt applicanda tarso, ut faciunt empirici, sed ossi sacro, & lumbis.

Errant, dum digitos pedis topicis tractant, dum non possint extolli versus genua, calcem premendo ob morbum existentem in tibia.

Cap. XXXXII.

Quatuor observantur musculi, qui extendunt digitos pedis versus genua, calcem in terram premendo, quorum quatuor musculorum primus est musculus sextus pedis, qui oritur ab anteriori parte tibiæ, qua illi fibula superius coarticularatur, & incedit per superiorem tarsū, & inseritur ossi illi, quo pollex fulcitur, & est ille musculus adeo cuidēs sub pelle versus pollicē, cuius usus est flectere illam partem extendendo versus genua, ut diximus: quare potest esse morbus in anteriori parte tibiæ, cuius symptoma appareat tantum in pollice.

Secundus musculus digitorum, qui septimus pedis est, a fibula exoritur, & latum tibiæ externum occupat, & inseritur ossi sustulcienti pollicem.

Tertius, qui octavus pedis dicitur, oritur a media fibula, & implantatur radici ossis pedis paruum digitum sustentis.

Quartus, qui nonus pedis dicitur, est pars musculi moventis quatuor digitos, & inseritur in medium serè longitudinis ossis pedis ante paruum digitum positi, &

isti omnes simul operantes extendunt, & flectūt versus genua extremam partem, ubi digiti fundantur, & horum musculorum beneficio fiunt laterales motus, prout singuli magis in vna, quam in altera parte locati sint, ut omnes simul operantes rectam flexionem, & extensionem digitorum faciant.

Si scorsum vnicus musculus operetur, vnam motionem facit, verbi causa, si sextus musculus pedis solus operetur, iste trahet pollicem: si septimus, vel octavus minimum digitum, si nonus rectam motionem quatuor digitorum; quare ex officijs his læsis cognoscemus musculum læsum.

Cognito musculo læso, cognoscemus, an morbus tollens flexionem hanc digitis sit in tibia, unde oritur, vel sit in progressu musculi, vel in digitis ipsis, in quos inseritur, quia facile potest contingere, ut in anteriori parte tibiæ ob vulnus perpetram sanatum, vel quia excise essent fibræ transversissimæ, vel propter alias causas, sit morbus, qui tollat flexionem, & extensionem illam versus genua pollicis.

Ecce igitur, quod morbus esse potest in parte valde remota, ut in anteriori parte tibiæ, & eius symptoma in pollice alioquin sano; quare empirici hanc nostri corporis fabricam, & harmoniam nescientes in sexcenta errata cadere possunt.

Præterea potest accidere, ut in fibula, unde exoritur septimus musculus sit morbus, & eius symptoma appareat in pollice, tunc, si empiricus suis localibus occurreret pollicis, erraret valde; quia esset occurrendum fibulæ, unde oritur musculus qui valde distat a pollice.

Similiter de octavo musculo est dicendum, qui exoritur a media fibula, in qua, vel ictus, vel seyrrhoia dispositio, vel similes affectus possent impedire, ut iste musculus octavus non posset extendere minimum digitum; quare, nisi origines musculorum, & progressum addiscamus, & memoria teneamus, non video, quomodo diuinare aliquando poterimus locum affectum.

Postremo musculus isti, sextus, septimus, octavus, & nonus pedis, qui sunt illi quatuor, qui extendunt extremos digitos pe-

dis possunt amittere sua officia ob morbum existentem in lumbis, & osse sacro : adeo vt symptoma istius morbi re vera distare possit duorum cubitorum tractu, & ultra à morbo; scias ergo hos quatuor musculos esse indutos (suralis nerveis missis à ramo exteriori procedente à quarto pari neruorum pedis, quod oritur ab ultima vertebra lumborum, & à tribus sequentibus ossis sacri, & est illud neruorum par crassissimum, & omnium validissimum missum utrobique ad pedes; quare, si in lumbis erit morbus, & symptoma videatur in digitis, vis tu localia apponere digitis? quod si facies, quando sanabis patientem? expedit igitur morbum auferre, qui est causa: quoniam effectus solum tollitur ablata causa, & quando causa est in lumbis, & in osse sacro, vnde enascitur iste truncus, ibi sunt topica adiungenda, & nequaquam ubi est symptoma.

Methodus, quæ nos docere poterit, quando digiti pedis non poterunt extendi ob morbum existentem in lumbis, & osse sacro, vnde oritur quantum par neruorum pedis, est, quoniam omnes musculi, qui sunt exornati illis surculis procedentibus à quarto pari neruorum pedum, erunt lesi; musculi verò, qui sunt induti ijs surculis nerveis sunt primus, tertius, quartus, quintus tibiæ, & quintus femoris & tres primi, qui mouent pedem, de quorum officijs superius egimus.

Quare ex læsis illis omnibus officijs colligere poterimus necessarid morbum esse in trunco, in quarto videlicet pari neruorum pedum; & symptomata in digitis pedum, quæ non raro accidunt, quinimò pluries vidimus truncos neruorum pedum in origine lesi, & symptomata solum apparere in pede, & digitis: causæ quæ possunt capita neruorum occupare sunt scyrthosæ dispositiones, infarctus pituitosus, & alia id genus; videas ergo quænam distantia aliquando obseruentur inter morbum, & eius symptomata, vt empirici adduci non possint, vt credant, symptomata esse in vno loco, & morbum in alio loco valde remoro.

Dum topicis tractant digitos pedis, quando tertium internodium quatuor digitorum, & secundum pollicis flexi non possunt ob morbum existentem sub genu. Cap. XLIII.

Potest accidere, vt sub genu, vnde oriuntur secundus, & tertius musculus digitorum pedis sit morbus, eius verò symptoma appareat in digitis pedum: quoniam, si de secundo musculo loquamur, tum ex omnium consensu, tum experientia ipsa patet, oriri à parte posteriori tibiæ iuxta genu, deinde missum in plantam per partem posteriorem in quatuor cessare tendines, qui demum inseruntur tertijs internodijs quatuor digitorum perforantes primi musculi tendines, perinde ac fit in musculis digitorum manus.

Quare facile potest contingere, vt morbus aliquis sit iuxta genu, vel in itinere, antequam inferatur in digitos, & symptoma hoc, quod videlicet tertia internodia non possint flexi, appareat in digitis.

Similiter, si de tertio musculo digitorum loquamur, eadem euenire possunt; quia hic musculus tertius oritur à nexu fibulæ cum tibia iuxta genu, & quando est in planta, degenerat in tendinem, qui exigua quadam portione implantatur tertio internodio indicis, & medij, demum reliquis totus tendo in secundum os pollicis inferitur, & auctor euadit illius flexionis.

Ideo valebit consequentia, quando tertia internodia quatuor digitorum, & simul secundum pollicis internodium non poterunt flexi, morbum esse in secundo, & tertio musculo digitorum pedis, ergo hic morbus possit esse in planta, & in origine sub genu, veluti si exiit essent fibræ ob vulnus, vel coactus esset aliquis humor, vt in illis, qui gonagrem pati solent, qui humor tolleretur virtuteat huic secundo, & tertio musculi digitorum, in quo casu topica non digitis læsis per consensum, sed sub genu essent applicanda.

Si verò secunda internodia non possint flexi, id pertineret ad primum mu-

sculum, de quo nil dicimus, quia est brevis, & in eandem partem inseritur, à qua oritur; nostrum enim in præsentia est tractare de sympathia, quæ obseruari potest in longis musculis, quia in istis empirici decipiuntur, in quibus sæpe morbus à suo symptomate, cubiti tractu, & ultra distare potest.

Amplius potest accidere, ut morbus insideat in quarto pari neruorum pedis circa os sacrum, unde oritur & symptoma appareat in dictis internodijs, quod videlicet digiti non possint flecti, quia isti musculi sunt neruis prodeuntibus à quarto pari irrigati. Cognoscemus deinde digitos non posse flecti ob morbum in origine quarti paris existentem, quando cæteri musculi, qui sunt induti ipsidem ramis à quarto pari prodeuntibus, erunt laxes, de quibus non vno in loco in superioribus capitibus verba fecimus, ut non sit, quod tam sæpe eandem repetamus.

Præterea in parte anteriori tibiæ sub genu, ubi fibula coartculatur tibiæ sub flexu musculi pedis potest esse morbus, qui tollat extensionem quatuor digitorum, pollice excepto, quoniam à parte illa anteriori tibiæ sub genu exoritur decimusquartus musculus, cuius officium est digitos illos quatuor extendere; tunc empiricus, si digiti propter morbum existentem exordio istius musculi non possint extendi, digitos solis tractaret localibus.

Præterea non solum digiti non possunt extendi ob morbum existentem in tibia, verum etiam potest contingere, ut in osse sacro sit morbus, & digiti alioquin sani non possint extendi, & ratio est, quia iste decimusquartus musculus extendens digitos est circumuolutus neruis propagibus prodeuntibus à quarto pari neruorum, quod oritur ab osse sacro, ut valere possit hæc consequentia, est morbus in quarto pari circa os sacrum, ergo digiti non possunt extendi, & vice versa digiti non possunt extendi, ergo morbus qui est causa, potest esse in osse sacro. Modus vero cognoscendi, quando digiti non poterunt extendi ob morbum huius quarti paris neruorum, scilicet quod non poterunt quoque surgi suis officijs cæteri musculi, qui sunt irrigati ipsidem neruis prodeuntibus ab hoc quarto trunco, quemadmodum

sunt musculi sextus, septimus, & octauus pedis, qui recipiunt neruos, antequam decimusquartus musculus irrigetur, quare ex læsis ipsi officijs in cognitionem protopathiæ peruenies.

Demum potest contingere, ut pollex non possit extendi ob læsum decimusquintum musculus, cuius munus est pollicem extendere; oritur enim hic musculus ab anteriori parte tibiæ, unde oritur membrana iungens tibiæ cum fibula, & deinde inseritur pollicis vniverso, gratia extendendi ipsum secundum rectam lineam, quare, si morbus fuerit in exordio istius musculi, nihil opis præstare poteris inungendo digitum pollicem, in quo nulla est mala constitutio vel morbus, quauis symptoma in ipso appareat; postremo potest esse morbus, & causa in quarto trunco neruorum pedis, eius verò symptoma quoque appareat in digito, & sit quod non potest extendi, quod cognosci poterit ex læsis officijs aliorum musculorum, qui irrigantur ipsidem furculis prodeuntibus à quarto neruorum pari, de quibus egimus superius.

Colligas ex traditis in hoc libro, quando omnium affectuum ideæ partibus corporis nostri per essentiam, & quando per consensum competant, quia in limine libri diuisimus idiopathias seu proprios affectus in affectus per essentiam tantum, & in affectus per essentiam, & per consensum simul: deinde in capite tertio methodi proposuimus, cuius virtute duci possumus ad cognitionem affectuum propriorum principalium, & per consensum.

Sed quoniam in viuientibus corporibus triplex à Gal. obseruatur sympathia vicinitatis nimirum, operis familiaritatis, & generis, erat operæpretium, ut in hoc libro non vniuersaliter, & in abstracto, sed distinctè, & secundum stylum anatomiciæ (quæ sola tantum fructum parere poterat) sympathias perpendere, ideo prius de sympathijs vicinitatis, & operis familiaritatis egimus, & errata nonnulla empiricorum in tractandis his duabus sympathijs reiecinimus: Denique cum artificiosissime obseruentur sympathiæ in neruis, & musculis lōgis, ut sæpe in exordio neruorum, vel musculorum sit morbus, eius verò symptoma appareat tantum in fine, & in

& in locis valdè remotis, & præcipuè in partibus in quas inferuntur, ideo egimus de omni sympathia generis præter naturam, quæ contingere potest in musculis, & nervis longis; dimitimus .n. musculos breves, quoniam in ijs, ubi est morbus, ibi est symptoma, ideo in brevibus empiricus errare non potest; propterea incipimus à musculis longis labiorum, maxillæ, ceruicis, dorſi, & aliarum corporis partium & tandem peruenimus vsque ad musculos digitorum manuum, & pedum, in quibus omnibus ostendimus quādo, & quomodo possit esse morbus in vno loco, & in alio remotissimo eius symptoma.

Nos tales methodos pro cognoscendis morbis muscutorum, & nervorum longorum tradidimus, vt aduci non possimus, quin medici his exalti methodis tale consequantur beneficium, vt perfectè cognoscat sympathias, & amplius in hac re nullo modo in errores labatur; quemadmodum errare solent, qui insequuntur communes illas sententias, quæ sunt, ubi dolor, ibi morbus, & ubi est actio læsa, ibi sit mala constitutio, vel quod idem est, ubi est symptoma, ibi sit morbus; cum aliquando contingere possit non esse morbum, ubi est dolor; vel non esse malam constitutionem, ubi est actio læsa, vel quod in idem fermè recidit, non esse morbum, ubi est symptoma.

Egimus in hoc libro de consensu per sympathiam partium, quæ sympathia, vel est generis, vel vicinitatis, vel operis familiaritatis.

Reliqui verò consensus, qui non reducuntur ad tres propositos superius explicatos quinque à Galeno varijs in locis observantur.

Primus est à vaporibus, qui in varijs morbis observantur vt in vertigine, in suffusionibus, in melancholia hypochondriaca in capitis doloribus, & in quamplurimis alijs, quorum vaporum seu halituum minera si auferatur, statim cessat affectus, qui re vera sunt per sympathiam: quia amota causa fouente, quæ in humoribus consistit, illicd euanescent halitus.

Secundus consensus fit ab aura venetica à digitis pedum, vel ab alijs partibus eleuata, vel à vermibus hæc aura frequenter epilepsiam omnino per consensum producit.

Tertius consensus, qui certè mirabilis est, fit à simplici qualitate sine corpore communicata, non per auras, vel vapores, sed per continuatas partes: de qua Galenus mentionem facit 3. de loc. aff. 7. ubi habet hanc sententiam, „nervosis partibus inflammatis interdum fit delirium, quia calor sine corpore per continuatas partes ascendit ad caput: interdum tædium, quia ascendunt spiritus fumosi, uapores, uel fuliginosi: ergo calor sine halitu per continuatas partes officere potest per sympathiam.

Hunc consensum per continuatas partes Galenus observauit primo de loc. aff. 6. in Iouene Grammatico, qui incidebat in Epilepsiam, dum irasceretur, uel dum inedia sustineret.

Observatur quoque hic consensus per continuatas partes absque eo quod humores, uel vapores effundantur in vulneribus capitis, in quibus excitatur motus biliosus, pars continua a cerebro ad os uentriculi sunt nervi sextæ coniugationis.

Quartus consensus fit per humorum transumptionem factam in uiuo corpore per meatus insensibiles. Hinc Gal. 3. de fac. naturalibus cap. 13. ait in uiuentibus esse transpiratum unum, confluxum unum, & omnia inter se manio affici.

De consensu per transumptionem mentionem facit Gal. 5. meth. 8. 7. aph. comm. 35. & 54. & 6. de loc. aff. 4.

Quintus est consensus factus ab humorum affluxu, qui est frequentissimus & fit aut à frigido condensante, aut à calido liquefaciente, aut à copia grauantē, aut à qualitate irritante, aut à debilitate retentricis partis mandantis, aut à debilitate expultricis partis recipientis. Sed de his consensibus satis superque, Egimus lib. de remediis inuentione cap. 3.



SANCTORII SANCTORII

Olim

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIUM

In affectuum Sympathia, & Idiopathia perquirenda.

LIBER TERTIVS.

Quod specifica affectuum differentia exoriantur a decem differentiis partium nostri corporis. Cap. I.

IN Primo libro tales methodos declarauimus pro inueniendis affectuum omnium Ideis genericis, vt ne rudiores quidem, modo illas calleant, in laqueos, ac syrtes cadere possint.

In secundo, quando affectiones per se, & quando per sympathiam lacerent corporis nostri partes, & quomodo sit perquirenda protopathia, varijs, & accommodatissimis exemplis docuimus.

Nunc conferendus est animus ad cognoscendas specificas, & vltimas affectuum præter naturam differentias; quoniam ad specificas, & non genericas differentias in tradendis indicationibus oculorum acies est dirigenda.

Supponatur ergo, atq; recipiatur ali-

bi quoque iactum fundamentum, quod nullo alio modo cognosci possint vltimæ affectuum differentia, nisi genericas affectuum formas illas cognitas in primo libro adiungendo, & applicando huic, vel illi corporis nostri particulæ, sicuti quando volumus doloris specificam differentiam assequi, eam colligimus ex partium corporis quibusdam differentijs & conditionibus, quæ coarctare possunt dolorem ad aliquod esse specificum: per hypothesein, dolor vt dolor est affectus communis, & genericus, si tamen in membrana considerabitur, fiet pungitiuus, si in carne, laceratiuus: si in arterijs, pulsatiuus: si in nervis, convulsiuus: si in periostijs, frangitiuus: si in viscere, exigui sensus particeps, grauatiuus: Ecce, quod varietas partium specificum reddit affectum.

Ad eundem modum vlcus in varijs locis, seu partibus corporis consideratum

ua-

varias específicas differentias affectuum constituere potest; quoniam vlcus sub genu esse potest cauterium salubre; in pulmone verò illudmet vlcus est phthisis; & sic de alijs specificis affectibus, vt paulo inferius alijs plerisque exemplis ostendemus.

Propterea volentes nos cognoscere específicas affectuum formas, alium modum præstantiorem non potuimus inuenire, quam diligenti examine constitutiones variarum partium nostri corporis secundum quaslibet earum differentias contemplari; quia specifica cognitio tota à varia & diuersa partium conditione, tamquam à proprio subiecto suum trahit initium.

Quæ doctrina diuinis Arist. & Galeni monumentis mirum in modum consentire videtur; numquam enim Aristoteles voluit affectum, vel accidens proprium posse alio modo cognosci, & definiri, quàm per subiectum proprium, vt propterea voluerit propriissimas affectiones per sua subiecta cognosci, & definiri: tanta est relatio, & nexus inter affectum, & locum affectum, vt hinc Diuinus Phylsophus affectus omnes proprios collocauerit in secundo modo dicendi per se, vbi prædicatum debet definiri per subiectum, & subiectum debet esse essentia, quæ constituat totum esse, & quod quid est prædicati, & tandem tradiderit vniuersalem illam propositionem infallibilem, quod accidentis esse, sit inherere subiecto.

Similiter nos volentes ideas específicas affectuum præter naturam inuenire, oportebat, vt eas declararem, & definiremus per partes aptas, vt afficerentur, quæ sunt propria subiecta affectuum, & quæ solæ secundum varias considerationes, & aptitudines possunt definire proprios affectus.

Hinc Galenus iidem principijs commotus videns, neminè assequi posse affectum specificum sine cognitione partium internarum corporis, quæ sunt subiecta affectuum; ideo tum in libro de usu partium, tum alijs in locis summam adhibuit diligerentiam in summatione omnium partium corporis; quoniam earum varietates varios affectus præter naturam generant.

Hinc, prout variantur partes in simili substantia, generantur dyscrasie, quatenus verò variantur in secundis qualitatibus (quæ secundæ qualitates apud Galen. primo de fac. naturalibus sexto quindecim enumerantur, suntque raritas, densitas, grauitas, leuitas, crassities, tenuitas, molliities, durities, friabilitas, lentor, asperitas, leuitas, colores, odores, & sapes) malæ compositiones exoriuntur, quatenus verò partes corporis nostri variantur in magnitudine, quantitate, numero, situ, & figura, oriuntur quoque affectus pertinentes ad conformationem, adeo vt quælibet partium varietas varium aliquem affectum faciat, & quilibet affectus factus supponat in partibus mutationem.

Hinc Galenus in ar. med. cap. octauo volens affectum saluberrimum declarare, signa desumpsit non ab affectu in communi, sed ab optima constitutione partium tam similariam, quàm dissimilariam, quoniam bonus, vel malus affectus à varietate partium oritur, hinc si variantur similes, & proportionem quatuor qualitatum amittant, sunt intemperaturæ; si dissimiles, plurimi alij affectus fieri possunt; quare colligimus ex Galeni sententia, solum ex partium nostri corporis constitutione affectus fieri naturales, quam præter naturam fieri posse.

Hinc Curtius diligentissimus interpret Gal. omnia signa affectuum volens colligere à partibus ipsis tanquam à proprijs subiectis, ad quatuor satis accommodatos fontes, vnde haurienda essent signa distincta, & specifica affectuum, reduxit, vt primus fons contineat illa omnia signa, quæ desumi possunt à propria substantia similari, intelligendo per propriam substantiam commensurationem, vel concentum, & symmetriam quatuor qualitatum.

Secundus fons contineat quæ necessariò coniequantur, vt sunt secundæ qualitates, quæ proportionem primarum sequuntur, & sunt illæ quindecim à Galeno relatæ, vt diximus.

Tertius fons illa contineat signa, quæ ab ijs, quæ accidunt desumi possunt, vt à quantitate, magnitudine, numero, situ, & figura.

Quartus ea, quæ desumuntur ab operatione.

rationibus vitalibus, naturalibus, & animalibus; ad quos fontes vniuersa affectuum signa, quæ re vera desumuntur (vt diximus) à partibus similariibus, & dissimilariibus pro declaratione affectuum, præter naturam reducuntur; quia alio modo non poterant affectus declarari, nisi per illa principia, quæ affectus constituunt, & hæc sunt partes corporis, quæ, prout varijs modis constitutæ sunt, varios affectus gignunt.

Cæterum, si velimus expeditius, & distinctius affectus específicos cognoscere per signa variarum constitutionum partium corporis, hæc Galeni, & Curtij methodo alioquin vera, & artificiosa aliquantulum laborabimus, quia methodus hæc per quatuor fontes incedens potius post cognitos específicos affectus incipit videri artificiosa, quam ante cognitionem, idcirco optimum foret, si methodum non tamen ab hac distinctam, perquirerem, quæ traderet nobis faciliorem modum cognoscendi específicas differentias affectuum, & quæ doceret omnes conditiones, & constitutiones partium corporis, quæ solum nos possint promptè docere affectus, & affectuum remedia, quod bellissimè fiet, si totam hanc philosophiam ab anatomia hauriamus, unde poterimus colligere omnes differentias específicas partium nostri corporis, quæ constituunt varios affectus, & ipsos específicos reddunt.

Specificæ differentiæ ad decem capita reducuntur adeo distinctè, & perspicuè, vt ab omnibus possint cognosci, & ad ipsas omnes conceptus, qui de partibus fiunt, commodè reduci possint, quæ sunt Meatus, Figura, Situs, Compositio, Exordium, Substantia, Temperatura, Numerus, Progressus, & Officium partium: à qualibet enim harum decem differentiarum secundum magis, & minus variatarum specifici emergunt affectus.

Quare, si de dolore loquamur, erit necessarium pungitium dolorem esse in membrana propter aliquam ex his decè differentijs, quinimò argumentari poterimus ex sufficienti partium enumeratione dicendo, si dolor est in membrana, ergo erit pungitiuus, vel ob situm membranae, vel figuram, vel meatum, vel ob eius

compositionem, vel ob membranæ temperaturam, vel ob substantiam, vel ob magnitudinem, vel ob progressum vasorum, vel officium membranæ læsum.

Dicas deinde non ob situm, cum ubique membrana puncturis laeceretur, & cum in eodem situ aliæ quoque partes corporis præter membranas collocatæ sint, quæ pungitium dolorem pati non possunt.

Neque ob meatum, cum æquè contexta sit, & nullos habeat meatus præter insensibiles, & membrana habeat, dum pungitium dolorem experitur, similes meatus perinde ac quando est in sanitate constituta.

Non ob figuram, vel ob compositionem in membrana dolor est pungitiuus, quia compositio, & figura pertinent ad dissimilares partes, dolor verò est solutio continui, quæ prædicatur de simili, & dissimilari.

Præterea neque per exordium, quoniam membranæ persentire possunt puncturas tam in exordio, quam in medio, & in fine.

Neque propter numerum, nihil enim additur membranæ, cuius causa illæ puncturæ persentiantur.

Similiter neque progressum vasorum, cum in qualibet membranæ parte fieri possint puncturæ, & non qua solum progrediuntur vasa.

Idem neque per officium aliquod membranæ læsum, puncturæ fiunt: quoniam licet puncturæ in membranis fiant, non tamen membranæ suum officium amittunt.

Postremò neque ob temperaturam membranæ mutatam dicere possumus puncturas sentiri in membranis, cum temperatura non cito fiat, & cito desinat, in membranis verò cito fieri, & cito desinare possint puncturæ.

Colligas ergo ex sufficienti partium enumeratione differentiam specificam quæ dolor in membranis fiat pungitiuus, esse ob membranæ substantiam; consequentia est necessaria, quoniam partes nostri corporis non habent alias differentias præter illas decè, quæ possint definire passionnes proprias; quare cum substantia prædicetur de molli, denso, raro, & æthereis,

ris, quæ necessariò cōsequuntur: inuenimus puncturas fieri, dum soluitur continuū membranæ ob densitatem, quoniā, dum humor penetrat densam partem sēu donatam, ut est membrana; illo modo soluit continuū perinde ac acuum cuspidēs ea peruaderent: propterea fieri nō possunt dolores pungitiui nisi à subtilissimis humoribus, & nequaquam à crassīs, quia crassi non possunt penetrare densitatem membranæ, ut hinc Diuinus Hippocrates 6. sect. aph. 33. dicat, qui acidum eructant non fieri pleuriticos, & ratio est Galeni in commento, quia tales habent crassos humores, & crassus humor densitatem membranæ peruadere haud potis est, ex qua ratione colligimus quoq; melancholicos non posse fieri pleuriticos, cum habeant crassos humores.

Videas ergo, quam facili per differentias partium corporis naturas affectuum consequi possimus, quas methodo Curtij non tam promptè inueniremus, si quis enim percuncteretur à Curtio, vnde fiant pungitiui dolores in membrana, responderet pungitiui doloris differentiam constitui ab illis, quæ necessariò consequuntur primas qualitates, & forsitan ipse diceret hanc esse densitatem, & nihil ultra.

Hæc Curtij Methodus sanè optimis nixa principijs debito difficilior est, sed hæc, quam tradidimus, ad decem illas differentias notissimas omnia reuocat facili negotio, & resoluit tanquam ad primas, & notiora principia omnem specificam affectuum inquisitionem.

Cæterum pergamus varijs exemplis, donec hæc anatomica methodus clarior, ac patentior euadat; si in musculorum carne est dolor, statim fit laceratiuus; sed quam ob causam fiat laceratiuus, nisi ad illas differentias partium confugas, non intelliges vnquam propter quid in carne fiat laceratiuus dolor.

Dicas ergo nō fieri laceratiuum ob substantiam carnis, non ob figuram; & inuenies, omnibus alijs differentijs sepositis, euenire ob situm, quoniam subtilissimi nervorū sirculi situ, & loco adeò in carne dissociantur, ut in subtilissimos filios diffeminantur, antequā in tendinem desinant, quorum ob tantam tenuitatem à

causa soluente continuū aliqui subtilissimi lacerantur, vnde perlentius laceratiuus dolor, quippe qui in membrana nō animaduertitur, quia filamenta membranæ melius, & fortius contexta ab humoribus non possunt lacerari, & frangi, sed cum tantummodo humores penetrent, faciunt puncturas.

Si in arterijs causa soluens continuū erit, fiet dolor pulsatiuus, non ob substantiam, vel situm, vel figuram (sed ne perpetuò enumeremus omnes) dicas ab officio, quod est pulsare, quod impeditur, & cum tristis sensu animaduertitur pulsatiuus dolor.

Si in viscere aliquo sensu obtusi particeps, ut in liene, hepate, cerebro, vel pulmone erit dolor, fiet grauius, eritque ob numerū, carent enim viscera hoc nervorum numero in imis partibus, ideo doloris animaduersionem vix habent; vel dicimus ob compositionem, cum viscerum compositionem non ingrediantur instrumenta sentiendi, nisi exilia admodum, vel dicemus ob exordium grauius, dum dolore oriri, cum viscera efficiantur fascina ligamentorum, & membranarum, quibus alligantur, & eorum sunt extrema, & veluti exordia.

Ad eūdem modum, si dolor persentiantur frangitiuus, colligemus causam solutem continuū esse in parte corporis omnium durissima, quia fractio solum rebus duris conuenire debet, ut sunt ossa, quæ licet sensu careant, habent tamen periositum, hoc est membranam ossa circumuestientē, quæ cū sit sensu donata, animaduertit ossium continui solutionem, quæ alia non est, nisi fractio; tunc non ob situm, vel figuram, vel meatum, vel alias differentias in ossibus erit frangitiuus dolor, sed ob duritiem, quæ ad substantiam pertinet.

Demum si consideretur dolor in nervis, statim fit convulsivus, quare oportebat, ut ob aliquam ex traditis differentijs id contingeret, erit ergo, ut breuibus, & strictim agamus, ob exordium.

Convulsio fieri nō potest, nisi in nervi exordio fiat aliqua contractio, vnde dolor convulsivus trahit originē: Ecce quomodo hac methodo expēdentes decem illas partium differentias nos peruenire pos-

possimus ad specificam, & ultimam affectum cognitionem; Vnde & quid agendum, & recta remedium administratio tota est colligenda.

Postremo, si de ulcere loquamur, cur vlcus sub genâ procreet affectû salubre, vt est cauterium, dicimus id fieri ob situm, adeo enim distat pars illa à parte aliqua principe, vt nullo modo reucleretur visceribus, ne expleat officiorum suorum munera, quinimò illis sumas suppetias affert reuellendo, vel deriuando aliquam mali humoris colluuiem: in pulmone verò cur illudmer vlcus pariat affectum illum depositum & conclamatum, dicimus quoque id fieri ob situm cordi propinquum, ob substantiam pulmonis raram, & ob officium, cum in respirando diuellantur vlcera labia, & nūquam coalescant, imo ob raritatem in putridum, & cachoericum necessarib' degenerant morbum, inde & ob situm cordi vicinū hectica in corde consurgat, quomodo ergo possimus aliam semitam præter istam venari pro cognoscendis specificis affectuum differentijs, nisi isthæc erit, quæ vltimas differentias partium declarat? quæ partium differentiarum sunt illæ, quæ omnem genericum affectum limitant, atque coarctant, in quarum cognitionem omnem curam, omnemque diligentiam esse flectendam puto in fecandis corporibus, alioquin actum esset de cognitione specifica affectuum, de indicationibus, & de recta auxiliorum administratione.

Probatur inductione, morbos constitui in esse specifico à differencijs partium nostris corporis specificis. Cap. 11.

Prestat alijs exemplis illustrare methodum cognoscendi specificas morborum ideas, & per omnia morborum genera ostendere specificos affectus constitui, & pendere ab illis traditis partium differentijs: quare si de affectibus, qui fiunt a bile loquamur, an ne erysipelas in pleura pleuritidem facit, & in cerebri membranis eadem bilis phrenesim excitat, in pede vero eadem bilis facit erysipelas nullas considerationis? Dicant mihi cur, & afferant alias rationes præter

illas, quæ colligi possint ex decē propositionibus partium differentijs? an ne Erysipelas in pleura tantam minatur pernitiem, & virtutis casum ob situm cordi vicinum, in pede tamen ob situm à corde, & cæteris visceribus remotum nullius sit considerationis? in tunicis verò cerebri erysipelas sit lethale tum ob situm parti principi vicinum, vnde functiones principes, vt imaginatrix, & discursus deprauantur, tum ob numerum venarum, & artiarum cerebri, & niembranarum?

Præterea si affectus, qui sunt ab atra bile, consideremus, an ne dicit Gal. 3. de symp. causis cap. 2. si atra bilis in vniuerso redundat, fieri elephantiasim, si in parte aliqua firmetur, cancerum, sicuti si bilis in toto redundet, icterum; si in parte, erysipelas; vnde hæc quæso affectuum discrimina exoriantur, nili ab illis decem enarratis differentijs in superiori capite.

Amplius, si de catarrho loquamur, an ne videmus eandem materiam ob partium corporis varietatem, sicuti ob varium situm, & ob varios meatus varios gignere affectus, nā si catarrhus in capite sit metur epilepsiam facere potest, si ille in pectore pellitur, & in pectus decumbat ruffim tantummodo excitet, similiter si idem catarrhus, qui in cerebro epilepsiam, & in pectore ruffim facit, in articulos procumbat, podagram faciet, unde ergo prodire potest tanta morborum varietas ab unica, & sola causa, nili partium corporis differentiarum, & varietates sint illæ, quæ constituent affectus communes in esse specifico.

Sicuti de catarrho videmus, qui in cerebro existit quatenus internos meatus ocludit tollere potest præstissima munia rectricis, sentitricis, & motricis facultatis cerebri, unde epilepsia.

Quatenus uerò catarrhus est in pectore, impedit, sed non tollit inspirationem, idè expellitur per ruffim.

Quatenus uerò est in articulis, facit podagram ob progreßum uasorum, accedentim, ut torreni, & partes sentientes progrediantur supra articulos, ubi catarrho particula sentientes uel distendat faciant truces illos dolores.

Similiter, si catarrhus colligatur inter carnem, & cutim fiet œdema ob situm à

visceribus remotum.

Deniq; si ille met catarrhus erit in cerebri substantia, & non in meatibus, faciet non epilepsiam, sed veretum, seu lethargum affectum, ecce quod sitis, meatus, substantia, temperatura, progressus, & ceteræ conditiones partium corporis enarratæ sunt illæ, quæ specificos faciunt affectus.

Sed pergamus ad alia exempla affectuum, ut concludere possimus omnes affectus specificos fieri in conditione partium; an ne intemperies frigida in cerebro obliuionem facit, eademque in hepate hydropisiam? unde hoc prodit, nisi quia intemperies frigida in cerebro tollit motum, & cum memorari sit motus quidam, ut dicit Gal. propterea ob frigidam intemperiem tollitur memoria; ecce quod hoc officium cerebri tollatur, quia intemperies frigida facit obliuionem.

Deinde eadem frigida intemperies in hepate hydropisiam facit, tum quia impedit sanguificicem, tum quia occludit meatus.

Similiter succus mordax, quando est in cerebro, ex Gal. 6. aph. 53. facit maniam, ille met in cute scabiem, quoniam pruritus exoriens à succo mordaci existente in cerebro facultatem discursuam, & imaginatricem peruerit, & præcipue imaginatricem, in qua phantasmata confunduntur ob mordacem succum perturbantem phantasmatum situm, ut hinc succus mordax non permittat, nisi deprauatè cerebrum suum absoluerè pensum, succus tamen mordax existens in cute, cum nulum ibi alteretur officium pruritus solum facit, qui est affectus nullius considerationis.

Ad eundem modum humor melancholicus feriens cerebri substantiam summum mororem, & summam maestitiam sine causa inducit, quoniam vapor melancholicus tenebricosum spectrum facit, quod reluctatur non solum cerebri substantiæ, quæ sua natura alba est, verum etiam spiritibus animalibus, qui splendidi, & lucidi existunt; si verò melancholia feriat officium ventriculi, non phantasma tenebricosum, sed summam famem, & intensam picam seu malachiam excitabit; porro si ille met succus melancholicus frigi-

duis, & siccus, qui tantam excitare potest famem, existeret in capite, & à capite in spinam, & in omnes neruos motui destinatos propelleretur, non famem, sed catthocum faceret, quod fiet ob neruorum substantiam: quoniam nerui sua natura molles sunt, ut recipiant splendorem radiorum spirituum animalium; quare si vapore isto frigido, & sicco repleantur, adeo tenduntur & indurescunt, ut propterea reddatur totum corpus immobile, & quam simillimum lapideæ stature.

Ex altera parte si de affectibus pertinentibus ad ceteras partes loquamur, eadem considerationem habere possumus, veluti (ne recedamus ab exemplis) erit exilis flatus melancholicus in ventre, qui nullius erit impediementi, quippe qui in corde palpitationem efficit: quoniam in corde flatus ille deprauabit, & corrumpet officium systolis, & diastolis, unde cor trahendo spiritum vita fruitur: in ventre verò tum ob loci amplitudinem, tum ob facilem exitum officium deprauare non potest, ecce ergo, quod varia officia partium corporis ab vnico efficiente læsa varios affectus specie differentes constituunt.

Propterea in concauo ventriculi potest esse portacea bilis, quæ faciat diarrheam, sed curabilem, quæ bilis, si in os ventriculi obrepit, cardialgiam adeo trucem, ut mortem repentinam, sicuti testatur Alex. Tral. inducere possit, quod sanè fiet ob situm proximum cordi, videas quopactò humor malignus ob tam breuem distantiam facere potest contrarios affectus, quia in fundo ventriculi curabilem affectum, in ore verò incurabilem, quinimò repentinè exitum adicere potest.

Similiter fiet ob lubricum mucum leuitas intestinorum, unde retinendi potentia, & per consequens concoquendi officium demitur non sine manifesto mortis periculo, quod lubricum, si est in ossibus, non minatur summi momenti malum, cum facili negotio tolli possit, quia nullum principale officium ab ipso aufertur, ecce quod idem affectus communis, ut est læuitas ob varios situs partium, & ob varia officia læsa varios affectus specificos constituere potest.

Possim sanè vagari per omnes specifi-

cas differentias affectuum, & plerisque alijs exemplis ostendere affectus específicos fieri à conditione subiectæ partis affectæ, sed cum videam enarrata affectuū exempla sufficientissimè hanc veritatem declarare, incipimus supponere hoc fundamentum, quod vitiinæ differentie affectuum trahant ortum à conditionibus partium nostri corporis.

Quocirca si medicus fuerit perperā ex cultus, & limatus anatomia, cuius innus est paruum omnium situm, figurā, meatus, & ceteras nō semel enarratas conditiones diligentissimè observare; quomodo vitare poterit errores tam in cognoscendis, quā in curandis affectibus? Quomodo ergo, vt exemplis illustremus hanc materiam, poterit cognoscere, an orificium vetriculi sit lesum, si nesciet, vbi sit? sicuti videntur nescire illi, qui dicunt orificium vetriculi esse sub mucronata cartilagine, cum re vera longè distet? Quopado non errabunt illi, qui dicunt pylorū à fundo ventriculi exordiri, cum palmitractū eius exortus ab imo distet?

Similiter, si de meatibus loquamur, multi cū Gal. dicunt, os cuneale esse perforatū, vt cribri specimen exprimat, & renes colatorium habere, de quo tam multa multi scripsere, vt non sit mirū, si ignorato vero situ, & veris meatibus partium corporis, medici in affectibus perquirendis, & curandis tam sæpè vacillent.

Quinimò plurimos videmus, qui se dogmaticos credunt, qui spreta illa anatomica cognitione solum per vniuersales qualdam causas remotas procedunt, vnde hauriunt indicationes vniuersales, & ab ijs remediorum materias colligunt, quæ non sequuntur, quia inferre ex vniuersali medio attributum minus vniuersale est paralogismus in secunda figura ex duabus affirmatiuis.

Exemplum, dum medici vulgares curare volunt traulos, (hi sunt illi, qui litteram malè pronunciant), dicunt homines fieri traulos ob intemperiem humidam capitis, ex qua pōssione colligunt, esse exsiccandum caput, & deinde concludunt attributum minus vniuersale, scilicet, salutem videlicet, cauterium, & alia id genus, quæ exsiccandi virtutem habent, esse proponenda, quæ non sequuntur ex medio

casu non quæsito.

Ecce, quod isti, qui per normas, vel notiones vniuersales incedunt in perquirendis auxiliorum materijs, necessaria in paralogismos impingant; Quocirca deberent in hoc casu illas conditiones nempè situm, meatum, & figuram palatus, & ossium maxillæ considerare, quoniam per has conditiones talis affectus specificus, & particularis fieri debet.

Credimus enim nos, traulos fieri ob duos meatus quarti ossis maxillæ superioris nimium apertos, quæ cum ita sint, si exsiccarent empirici caput decem annorum tractū, vel ipsam Oraculum mitteret balbos, vel traulos in Libiam regionem calidissimam, quæ exsiccaret caput, nunquam trauli illo defectu liberarentur, nisi inungerentur meatus illi duo, qui immediatè constituunt traulum, de qua re iterum paulò infra agemus, vt res melius intelligatur.

Præterea si in superna medulla spinali essent collecti humores, illi sanè dolores aliquos mites facerent, deinde tamen si ipsi met humores descenderet ad ossis sacri medullam, ibi truces excitarent dolores; uellem, ut quis nisi sine illius differentijs à nobis traditis rationem redderet, cur mites dolores fiant in parte superiori medullæ, truces uerò in parte inferiori, quæ causa tamen alia non est, nisi quia medulla thoracis est mollior, & ideo molles, & mites dolores, medulla uerò inferior est durior, ideo sæuissimi fiant dolores, quoniam in parte dura maiori cum uiolentia fit continui solitudo, ecce ergo quod hæc substantia medullæ præcognita, causam huius rei aperit.

Amplius, si de substantia ossis maxillæ inferioris loquamur, quæ est rara, & frungiosa, si ob lucem gallicam exesa è naribus portio aliqua emungatur, empiricus non ita admirabitur rei nouitatem, si raritatem illius ossis substantiæ corruptioni ualde obnoxiam prius cognouisset.

Deniq; si de progressu uasorum loquamur, an ne errant, qui dicunt saluatellam immediatè deplere splenem? quis amabò poterit melius tantam innanitatē cognoscere, quam anatomicus ille, qui sciet omnium uenarum progressus, & originēs.

An ne quoque errant, dum dicunt Ion. gæ melius per basilicā iecur depleri, quā per cephalicam cum ab unica cōcavitate existente in iugulari ambæ propagines prodeant: sed quod deterrimum est iuvent ministris in utriusq; iecoris, ut basilicā aperiant, quamvis deliteat, & quamvis cephalica sit evidens & conspicua, ab illis spectatur, ut in simili occasione uiderint tōsorem ter secasse innaniter basilicam parum conspicuam.

Postremo; si de compositione partium loquamur in exemplum proponere possumus erratum illud, dum empiricus credit mactonantem cartilaginem facili cadere posse; hæc nullo modo diceret, si uidisset, quomodo sit composita, & unita ossi pectoris; uidisset enim illam unionem esse, non per diarthrosim, sed per symphysim, quæ unio, uel compositio non supponit motum, ut propterea non possit ita facile luxari.

Patet ergo in omni cōsideratione specifica, siue sit morbus, siue sit causa, uel symptoma, nos nō posse differentias specificas consequi, nisi prius cognoscatur differentia istæ decem partium nostri corporis.

Nec mihi aliquis obiiciat, quod alibi Galeni auctoritate probatum sit, locum affectum respectu affectus esse accidens separabile, ut est inflammatio respectu pleuræ; in hoc capite tamen nos asseruisse esse inseparabilem, & conuertibile cum affectu, & affectum de loco affectu prædicari in secundo modo dicendi per se, perinde ac si diceremus inflammationem esse non posse, quin pleura quoque læsa sit.

Quia respondemus locum affectum uel considerari communiter, uel secundū differentias specificas iam citatas: Si communiter, est quid separabile, quia quilibet specificus affectus respectu loci affecti absolute sine limitatione consideratus accidit loco affecto, ut accidit risibile animali, animal enim stat sine homine, & sine risibilitate; Similiter stat pleura sine inflammatione, cum uarijs affectibus affici possit.

Hinc est, quod à loco affecto communiter sumpto procedere ad affectum aliquem specificum est argumentum à po-

sitione consequentis in quo colligitur conclusio affirmatiua in secunda figura, quæ non sequitur, ut alias diximus.

Si uerò consideratur locus affectus secundum specificas differentias in quolibet affectu, sic redditur conuertibilis, & sit propriū subiectum, quod definit prædicatum, ut faciunt omnia subiecta, quæ ingrediuntur secundum modum dicendi per se: sic pleura affecta secūdam tales meatus, talem figuram, talem situm, & reliquas differentias est inflammatio pleuræ, & uiceuersa, scilicet si est pleuritis, pleura erit affecta secundum tales meatus, talem figuram, & talem situm, reliquæ enim uarietates non pleuritidem, sed alios affectus facere possunt: de qua re uberius in lib. de indicatione agemus.

Offenditur ubi agendum colligi modo ex partium Situ, & Meatu, modo ex progressu, & exordio.
Cap. III.

Non solum decem illæ specificæ partium differentiæ enarratæ eleuare nos possunt ad cognitionē specificarum affectuum idearum, uerum etiam ad notitiam eorum omnium, quæ consequuntur essentiali affectus, quod ualde coheret Arist. sententiæ dicentis in posterioribus analyticis, quod illud, quod dat quid, dat quoq; propter quid eorum, quæ consequuntur. Quare si per partium nostri corporis situs, meatus, figuras, compositiones, temperaturas, substantias, numeros, officia, & progressus, internā, & singularem affectuum naturam cognoscere ualebimus, inde cognoscemus quoq; remedia, & remediorum administrationē; remedia, quia talem relationem habent cum morbis curandis, ut ex cognita affectuum essentia remedia illicō inferantur: remediorum administrationem; quia nō possunt dici remedia, nisi rectē administrarentur, quæ recta administratio consistit in recta cognitione quatuor conditionum, quarum prima est ubi sit medicina applicanda, secunda quomodo sit danda, tertia quanta, & quarta quando sit adhibenda.

Quare, si de ubi loquamur facili ostendere possumus modo colligi ex situ partium

tum corporis; modò ex meatuum cognitione, modò ex partium progressu, & ali. quando ab exordio musculorum, uenarum, & cæterarum omnium partium.

Dicimus situm nos docere locum, ubi agendum sit, quod exemplorum luce cognoscitur per hypothesim, si quis vellet topicum aliquod hepatis applicare, & crederet hepatis situm esse in parte sinistra, & illi parti affigeret locale medicamentum quas suppetias afferret? quare expedit situm loci affecti callere aliquin casu, & fortitò medicinam faceret.

Audias ex situ partium ignorato in quos errores incidunt celebres quoque medici. Sunt qui credunt orificium ventriculi supernum locatum esse sub mucronata cartilagine, quique in omni angore, & vomitionibus biliosis cerata roborantia, & calida adiungunt iuxta illam mucronatam cartilaginem, credentes ibi esse orificium ventriculi, attamen ibi est iccur, ut nos docet astopsia.

Præterea est sapientissimus Galenus (cui non licuit humana corpora secare) qui de renum situ loquens dicit, renem dextrum esse altior em sinistro, ut in brutis observatur, quod contrarium in hominibus conspicitur, quoniam habent sinistram altior em dextro, tunc hoc situ ignorato, si alicui ren dexter, vel sinister doleret, vel alio malo affectu esset tentatus, quomodo poterit appositè topica adiungere, nisi casu, & fortitò?

Demum, ut non prætermittamus situm ventriculi, est Galenus, qui credit ventriculuni magis vergere ad partem dexteram, quam ad sinistram; Ex altera parte est sensus ipse, & anatomicorum testimonia, quibus sane fides non est deroganda, qui dicunt ventriculum magis vergere ad sinistram partem, quam ad dextram; comprimitur enim in lævam partem à iecoris magnitudine.

Dicas mihi si nescies situm ventriculi, quando vetriculus esset in uni mentis extrinsecis tutandus, quomodo posses scire locum ubi essent localia applicanda? Ecce igitur, quod ubi agendum ex situ partium aliquando colligi debeat.

Præterea non solum potest colligi ubi agendum ex situ partium, verum etiam

ex progressu, exordio, & ex meatibus ipsis.

Nec mihi obijciant, dicentes, quod vnum Galeni auctoritate indicet solum vnum, ut nos quoque admittimus, & altioribus principiis probabimus in lib. de indicatione, & propterea ubi agendum indicari solum ab inhaerentia indicantis, quæ vnica est, ergo non à situ, & ab alijs conditionibus.

Respondemus nos querere ex situ, & ex alijs conditionibus partium hanc inhaerentiam indicantis, ubi sit, eamque dicimus nò posse haberi per vnicū signum tantum, per situm videlicet, vel per meatum, & ratio est, quia inhaerentia est multiplex, & est quid æquiuocum, cum modò per situm cognoscatur, modò per exordium, modò per progressum, & modò per meatus; sicut enim locus non prædicatur de loco, similiter inhaerentia, non prædicabitur de inhaerentia, quare per varia signa, & per varias conditiones enarratas varias inhaerentias cognoscere poterimus, neque tollitur, quin vnum, ut vnum nò indicet vnum, vel vnum indicetur ab vno.

Sed redeamus, vnde digressi sumus dicentes non solum ex situ colligi ubi agendum, verum etiam ex progressu, veluti, si de vena basilica loquamur nos scimus neruum magnum, & arteriam maiorem sub basilica progredi, sub cephalica verò neque neruos, neq; arterias excurrere; quare quando vtraque vena esset occulta, tunc satius esset cephalicam secare, quam basilicam; Ecce ergo, quod progressus vasorum docet ubi sit agendum.

Præterea ab exordio quoque colligimus ubi agendum sit, veluti cognoscentes nos ab vnica concauitate prodire basilicam, & cephalicam cognoscemus quoque vnicum esse exordium in iugulo, propterea eadem esse vtilitatem in omni casu tam in sectione cephalicæ, quam basilicæ.

Amplius ex meatibus partium corporis colligere possumus ubi agendum sit; veluti cōtingit illis, qui litteram, non possunt exprimere, qui trauli vocantur; hoc enim lingue impedimentum oritur, ut puto, à duobus foraminibus nimium aper-

aperitis, quæ sunt sub palato inter quartum os maxillæ, quare, si vrantur, vel tunica circumstans abscindatur, & obcalescat, ut meatus callo claudi possint, videntur deinde trahi, illa lingue hæsitantia liberari, ecce, quod ex meatibus non solum colligimus affectum, sed quid agendum, & ubi vel cui parti sit adiungendum remedium; possem alia innumerabilia proponere exempla, quæ ostenderent, ubi agendum ex meatibus quoque; colligi posse, sed cum res sit clara, & prænitens, non deest longiori discursu hanc tractare materiam: ex his tamen colligere poterimus, quantum errant illi, qui spiritus his specificis differentiis hæruunt indicationes à communibus, veluti sunt illi, qui credunt lingue hæsitantiam prodire ab intemperie humida, de quibus paulo infra.

Ostenditur quomodo agendum colligi modo ex partium figura, substantia, & compositione, modo ex numero, & officio partium. Cap. IV.

Quomodo agendum indicatur tantummodo à passione indicantis, quia vnum, ut nunc indicat vnum solum, & non plura, ut cum Gale. probabimus in libro de indicatione. Quando verò nos dicimus; quomodo agendum colligitur modo ex partium nostri corporis figura, modo ex substantia, modo ex partium compositione, modo ex numero, & denum ex officio, nos non tollimus, quin à passione indicantis quomodo indicetur.

Quomodo autem indicans possit pati, ut melius vincatur, & superetur, dicimus id colligi modo ex cognitione figuræ partium corporis, modo ex cognitione substantiæ partium, modo ex compositione, & reliquis ceteris.

Sed quoniam exempla sunt illa, quæ promptè docent, reliqua afferamus. Numquid non ex ventriculi figura, quæ assinitur bonæ & cucurbitæ, colligimus quomodo cetera sint affigenda ventriculo prode hunc indicantis?

Ex hepatis figura imitante semilunium colligimus, quomodo extrinseca auxilia debeant hepatis applicari.

Ex figura rectorum musculorum, dum illi tenui sunt, addicimus, quomodo topica sint affigenda? ut in hac re plures ex-

rent videntes duritiem hanc oblongam in parte dextra credentes spectare ad hepatis, cum ad rectos musculos abdominis pertineat, in quæ errata non incurrerent si hepatis, & horum musculorum figuram cognoscerent, quod erratum relictum est in octavo capite secundi libri.

Ex figura splenis quoque colligimus, quomodo sint affigenda topica spleneticæ, splenis enim exigua pars occupat partem supernam, quæ topicis tantum potest tractari, interna vero nequaquam ob localia pati potest, supernæ igitur partis splenis figura assimilatur plantæ pedis, sed gibba est aliquantulum, in parte verò interna est concava; quæ cum ita sint, quomodo poteris splenem localibus iuvare, nisi perfecte prius scias figuram splenis, ex qua præcipue modus operandi vel adiungendi emplastra, & cerata colligitur.

Similiter ex figura colli intestinali addiscimus, quomodo sint applicanda emplastra, vni uetæ, & alia id genus, in ieras ergo ex figura omnium viscerum cognosci potest, quomodo sint administranda remedia.

Præterea non modò ex figura operandi modus colligitur, verum etiam ex substantia partium, quoniam alio modo est agendum in parte dura, ut in ossibus, & dentibus, & alio modo in carne, alio modo in mammillis, & ceteris partibus glandulosis; alio modo in renibus, alio in medulla inferiori, quæ emulari videtur nervi duritiem, quam in superiori, quæ est mollior.

Similiter in luxatione ossium chirurgus optimus quomodo agendum colligit ex compositione, nam alio modo in diarthrosi luxatæ partes in pristinum statum reducuntur, & alio in symphisi, ubi nullus est manifestus motus, ut sunt suturæ ossium capitis, quæ per symphium componuntur, & simul videntur, ex varietate igitur connexus, vel compositionis vario modo est a generalit.

Amplius, si consideratione compositionis transferimus ad partes componentes, tunc eodem modo ex compositione in hoc sensu viurpata colligimus quomodo agendum sit, exempli gratia, sit vulnus sub clavicula, vel in processu interno scapulae, ubi reperitur rete illud nervorum, quod excurrit ad brachia, cui dubium, quod alio modo

modo ob hoc rete, quod componit illam partem, erit agendum in dilatando, & in faciendo illas partes, quam si in alio loco esset operandum?

Quinimò non solum in dilatando, & secundo, verum etiam in localibus adiungendis esset temperatura neruorum expendenda; localia enim nimium frigida, & nimium calida neruorum temperaturam destrunt; ecce ergo, quod non solum compositio, sed etiam temperatura partium nos docere potest, quomodo agendum sit.

Præterea, si numerum, & progressum partium componentium aliquod viscus spectemus, addiscimus quoque quomodo sit administrandum auxilium, veluti cognoscentes nos splenem maximo venarum numero prodeuntium à portâ consistare, ex hæmorrhoidibus, quæ ab eodem trunco deducuntur, euacuamus, ut splenem subuenimus; idem dicendum de quolibet corporis parte; ecce quod quomodo à numero, à progressu, & compositione colligitur.

Postremo ex officio patris quomodo agendum haurire possumus; nam præcognito officio ventriculi esse chylicationem, quæ in illa caloris partium circumiacentium symmetria consistit, nos ex officio læsæ partem circumiacentem, si est debito calidior, per interna remedia refrigeramus, si à naturali temperamento parum recedat, cibis refrigerantibus, vel topicis eandem virtutem habentibus conamur ad illam symmetriam transferre calorem.

Similiter visâ sanguificatione læsa, nisi præciamus ad quod viscus hoc officium pertineat de remedio actum est: Arist. 2. & 3. de partib. anst. dicit ad cor hoc officium pertinere. Auerroes dicit sanguinem in hepate præparari, & in corde perfici. Vesalius lib. 3. cap. 2. & 6. dicit vim sanguificandi venis competere, & non parenchymati. Argent. dicit competere solum parenchymati hepatis. Ego arbitror cum Gal. primo competere hepatis parenchymati; deinde in venis perfici: quare læsa sanguificatione erit hepatis, & non cordi succurrendum.

De quanto agendum sit, nostrates cum Galeno optime dicunt, quantum desumi

ab actione indicantis, nos verò hic laboramus, ut inueniamus illa signa, quæ nos docere possunt, an actio indicantis sit maxima, vel parua; quoniam scire quantum desumi ab actione indicantis, est communissimum, & genericum scire à quibus illa inferri potest consequentia; Quare dicimus nos quantum agendum, vel actionem indicantis desumi præ ceteris à temperatura, per hypothesein, erit indicans calidum in capite, erit quoque simile indicans calidum in iecore, tunc temperatura capitis docebit nos, quod illud frigidum, quod hepatis calido conueniret, capitis robur destrueret; quia capitis temperatura est frigida; hepatis verò calida; quare si actio indicantis debet vinci à potentiore, nos pro hepatis calore, refrigerantia eligemus intensioris virtutis, quam pro calore capitis, non quod eadem refrigerantia non possint superare quoque incendium capitis, sed quia destruerent temperaturam capitis; cerebrum enim ob suam temperaturam, & ob suam molliem, ita facile alteratur, ut merito sagax natura ossibus cerebrum munierit, ne ære extrinseco alteraretur.

Quare dicimus temperaturam, & deinde molliem, duritiem, & qualitates ad substantiam pertinentes nos docere quantum agendum. Hinc manifeste ob molliem, vesica ob suam frigidam temperaturam, oculi, aures, ventriculus tum ob temperaturam, tum ob situm quantum agendum admonere.

Quando sunt tunc à presentia indicantis: Hæc presentia verò colligitur à variis symptomatibus, & aliquando à situ; sicut videns Galenus pylorum in fundo ventriculi esse iocatum, dicebat, liquida esse danda in principio conuiuii, ut prompte exeant, & ne impendantur ab eis, quæ sunt difficilioris concoctionis.

Primum exemplum errorum non illorum Medicorum, qui ob situm igno autem dicunt Gal. pylorum exordiri a cæcis intestinis fundo. Cap. V.

QUoniam ostendimus deesse esse conditiones, vel differentias partium non corporis, quæ dant esse specificum agentibus tam naturalibus, quam præter-

naturam, & quæ docent remedia, & remedium administrationem: nunc præstat de illis Medicorum erratis diligentius agere, quæ committuntur ob incertam prædictarum differentiarum, vel conditionum partium corporis, quæ sunt Situs, meatus, temperatura, & cæteræ superius enarrate conditiones: quoniam illis erratis relictis, reliqua universa eadem methodo facile corrigi poterant.

Exordiamur itaque à nonnullis erratis ad Situs pertinentibus: Errare igitur videntur nonnulli dicentes orificium ventriculi per quod in pylorum mittitur chylus esse in fundo, vel in decliviori regione situm, & collocatum, causaque huius tam communis erroris fuit sapientissimus Galenus, quoniam eius auctoritas talis est, ut non solum in totius Europæ tractibus, verum in id quod Mercuriano, & Septentrione finitur diffusa culta, observantiaque nescitò existimetur.

Galenus igitur, cum ei non licuerit secare humana corpora videns in brutis quibusdam animantibus pylorum esse in fundo ventriculi, credidit in libro de tuenda aenitate, & in 4. de ul. par. cap. 7. pylorum in hominibus quoque, à fundo ventriculi exordiri. Quæ opinio est falsa, & fuit multorum errorum origo: Falsa est, quia reluctatur experientia, quoniam in humanis cadaueribus astrosia ipsa ostendit, pylorum ab imo ventriculo non prodire, deinde reluctatur Vesalio, Columbus, & cæteris omnibus præclarissimis anatomicis, qui quotidie luminaria corpora secant, quare esset ueracioris, & nebulonis illa hominis natura, qui sententiam apertè falsam, & quæ ad insanam experientiam non rejiceret. Quinimò est ipsiusmet Gal. præceptum 6. de morbu. lib. 2. ubi habet, quod omnia sint examinanda ratione, & experientia, & libertinos vocat illos medicos, qui sunt addicti auctoribus: & secundo methodi vocat tyrannicam morum doctrinam, qui semper sunt addicti præceptoribus, & in libro de libris proprijs reprehendit medicos, qui se vocant Praxagoreos, vel Hippocraticos, & lib. de plenit. in principio d. c. nos alloqui ingenuos, & veritatis amicos, & non illos, qui seruii culpa dogmati se addixere

Similiter lib. 2. de semine, ca. 2. dicit se nemini credere, nisi expeririatur habet hæc verba, per totam vitam sui coniunctus hoc vicio, quod nemini fidem habuerim priusquam ipse essem expertus ea quæ saltem possibile erat per experientiam scire: quapropter libero ingenio prædictis non pepercit Hippocr. Platoni, Crisippo, & Aristoteli, sapientem enim horum divinarum hominum sententias rejicit atque excludit, idemum 1. sectaph. comm. 1. dixit in arte medica esse duo crura, quibus est incedendum, ratio nimirum, & experientia: de auctoritate ne verbum quidem, quare & nos Gal. temulantes despiciemus auctoritates philosophorum, si sensibus reluctabuntur, quoniam sicuti, ut dicit Arist. 8. phys. 22. signum imbecillitatis intellectus est dimittere sensum, & quæere rationem, sic dicimus longè maioris imbecillitatis intellectus signum esse, dimittere sensum propter auctoritatem, à sensibus enim cognitio nostra dependet, ut iure Plato dixerit, sensus esse synceros mentis inter nuncios, eosque appellaverit quasi satellites, & duces ad veritatem comparandam.

Exequamur ergo propositum, Galen. quarto de tuenda sanitate capite ultimo, & sexto eiusdem libri, 4. de vlu par. 7. sustinuit pylorum esse in imo ventriculi, habetque hæc verba 4. de tuenda: ubi ventriculus alii præterea non desiderat, imam sui partem τὰ ὅλα Græci vocant, id est portam recludere, ac quod ciborum superfluit exprimere, seu alienum onus trudere; dicit igitur Galen. quod pylorus sit in fundo & imo ventriculi, idem dixit 4. de vlu par. 7. quod tamen reluctatur experientia, quoniam est in dextra parte ventriculi, quæ pars à fundo, & imo distat semè palmi tractu, ut est videre in humanis cadaueribus, hinc est, quod, licet ventriculus asculentis, & poculentis sit onustus, pyloro existente aperto nihil ab ipso egrediaris: quod non contingeret, si pylorus à fundo ventriculi haberet exordium.

Quod igitur ita se res habeat, ventriculi figuram observatam à Vesalio, & à cæteris anatomicis nostri temporis proponamus, an ne sensu patet ubi est, ubi esse pylori exordium: an ne locus, ubi est



D, distat ab A, quod est ima vetriculi pars videns igitur Gal. in simijs, & canib. esse pylori initium in fundo, credidit in eodem situ, esse quoque in hominibus.

Ceterum, quod pessimum est hoc, siu pylori male percepto tractatur questuuncula ab ijs, qui pertinaciter sunt addicti Galeno, inanes, & futiles, veluti dum dicunt, à sumpto cibo esse operæ pretium, omnino abstinere ab exercitio, ne ob motum cibus inconcoctus in pyloron à fundo exorientem procumbat; cuius quæstus causa non habet locum in hominib. quia orificium pylori habent in parte superna & nequaquam in fundo vetriculi.

Similiter, dum dicunt, quæ citæ sunt coctionis esse prius ingerenda, & postremo esse comedenda quæ difficilioris sunt coctionis, rationemque desumunt à situ pylori, credentes orificiū inferni vetriculi esse in fundo; ex qua fallâ positione inferunt liquida, & ea quæ acilioris sūt coctionis esse prius ingerenda, vt promptè, quando sunt cocta, descendā; ea vtrò quæ sunt difficilioris coctionis postremo ingerantur; quia diutius morantur in vetriculo, quæ omnia, cum ex falso principio prodeant, non admittuntur: patet enim situm orifi-

cij pylori esse in parte superiori, & palmi propemodum tramite distare ab imo.

Gal. quoque 13. meth. cap. 17. docet quod quando os vetriculi vrgetur phlegmone, cataplasma applicari debeat ipinx dorsi: ibi enim cum locus sit viciuor, os vetriculi citius inflammatione liberari potest.

Quinimo sagax, & prudens natura merito in superiori parte locauit orificium, quod in pyloro mittit, ne liquida, & quæ poculorum affluentia, atque frequentia ingeruntur, illud sic incocta descendant in pyloron: erat enim operæ pretium, antequam cibus descenderet in duodenum intestinum, vt primam coctionem susceperet, quæ aliquo temporis spatio fit, deinde in vetriculo suscepta aliqua coctionis elaboratione fieret chylus, & descenderet; sed nequaquam sponte, vt credunt empirici, sed à fibris rectis attractus, & à transuersis expulsi: munus enim præcipuum naturalium facultatum est opificio rectarum fibrarum attrahere illud, quod coctum est, quia est dulce, & suaue, & ideo nequaquam grane, & onerosum, quinimò tam expedire à supernis, quàm ab infernis partib. humores viles attrahuntur vt in libro de reuulsiōe ostendimus.

Quæ

Quæ cum ita sint, omnes cessant quæ-
stionculæ; cessat illa, dum dicunt, quæ fa-
cillioris sunt coctionis, prius esse ingeren-
da, tum quia pyloros non exorditur ab
imotum quia cibus ingellus regulatur à
facultatibus naturalibus, & nequaquam
spontè labitur; cessat quoque alia, dum di-
cunt, ob hanc rationem post cibum non
esse faciendum exercitium quia per orifi-
cium pylori incoctus cibus in intestina
procumberet, quod non sequitur; quo-
niam orificium, ut diximus, est in parte
superiâ, & non in fundo.

*Secundum exemplum errorum ob situm
par corporis ignotum est dum dicunt, os
ventriculi esse sub mucronata cartila-
gine. Cap. 1. 1.*

M Edicorum vulgus (nescio quo fa-
to) tam sæpè in reb. adeo apertis
excutiat, & tãto tempore in hac versetur
hæresi, quod videlicet sub mucronata
cartilagine os ventriculi situm, & locatũ
sit, quilibet enim, qui semel tantum per-
fectè videret humani corporis anatomen
vel saltem fidem adhiberet Vesalio, Co-
lumbo, & alijs anatomicis, quibus in hac
re præcipuè fides non est deroganda cer-
tissime non diceret, os ventriculi esse sub
mucronata cartilagine; horum enim ana-
tomicorum vnica est vox, quod ventricu-
li os ab illa parte distet, & situm, & loca-
tum sit in sinistra parte, & vergat versus
dorsum; aiuntque sub mucronata cartila-
gine esse aliquam iecoris portionem, quæ
occupat regionem illam anteriorem, in-
cipiens tamen à dextro latere, peruenien-
sque ad mucronatam cartilaginem, & ali-
quantulum vitra, vt amplectatur illam
ventriculi partem gratia ipsũ fouendi,
& calefaciendi.

Quare qui ci edant mucronatam hanc
cartilaginẽ esse oris ventriculi munimen-
tum incidunt in plurimos errores, & illos
inexcusabiles; quoniam existimantes os
ventriculi ibi iacere, ex hoc errore in a-
lium longè maiorem serpunt, veluti dum
carãtes animi deliquium factum ob bilẽ
ferientem os ventriculi, cõfingit ad mu-
cronatam cartilaginẽ credentes ibi esse
os ventriculi, & illi parti admovent calida,
vt sunt olea de nucẽ muscata, de spica, ce-
rata stomachalia calida, & fomētationes;

Sanctory Sanctory Pars 1.

errant sanè, & ledunt maximè quia ibi nõ
est os ventriculi sed iecoris portio, quæ à ca-
lidis his topicis insigne maleficiũ recipit.

Quinimò audias casum, quẽ semel vidis-
erat vir quidam emaciatus in uentriculo
biliosus succis referto, propter quos in an-
xietates, & deliquia animi sæpè incidebat
erat quoq; empiricus ille notissimus Oe-
nobarb. & obrektor, quem tu nosti, qui
misero huic patienti succurrere conaba-
tur, admouebatque perpetuò, ubi est mu-
cronata cartilago, calida, quorum malefi-
cio, cum ad illum locum perueniat iecur,
in calidissimos affectus, & incurabiles il-
lum patientem reduxit, ecce igitur quam
sæpè maximi errores fiant ob situs vice-
rum incertiam; quis posset committere,
quin valdè miraretur tam crassam mul-
torum medicorum ignorantiam, cum ta-
les sint, vt nunquã viderint, vel obserua-
uerint non dicam anatomen, vel anatomi-
ar scriptores diligentissimos, sed neque
schemata, & exemplar aliquod humani
ventriculi, vbi videre potuissent orificium
ventriculi in læua parte situm esse, & ne-
quaquam sub mucronata cartilagine, sub
qua portio hepatis manifestissimè iacet.

Intuper errare possunt ob situs mucro-
natę cartilaginis, & adherentium viscẽrũ
insestiam, quando vulnerata cartilagine
nõ animaduertent vulnus illud esse le-
thale, tum quia manit sepius transuer-
sum, & cor, tum quia tendo septi trans-
uersi mucronatę cartilaginis subnectitur.

Præterea aberrare plurimi videntur,
qui perperam obleruant situm colli vesicę,
quoniam (dum à Lithotomo vesicę
calculo correpti inter anum, & testes se-
cantur, gratia extrahendi lapidẽ) credunt
in illa sectione secari quoq; posse collum
vesicę, quem errorem sequi videtur Co-
lũbus anatomicus alioquin peritissimus,
lib. 5. cap. 26. ubi agit de musc. colli vesicę,
dicitq; aliquando à Lithotomo, qui situm
vesicę ignorat, musculum cervicis trans-
uersum incidi, & inde nouum morbum
induci, quoniam dicit ille, secũto hoc mu-
sculo, inde urinam non posse contineri,
quæ sententia quamuis fuerit viri præ-
stantissimi, vera esse non potest, quinimò
si aliquis semel videret Lithotomum se-
cantem, & incidẽtẽ, ut calculum extra-
heret, & semel uidisset vesicę situm, illi cõ-

certo sciret à Lithotomo non posse incidī, & secari ceruicem, vt admiratione dignū sit, quod Columbus, qui toties secavit hominū corpora, in hac re aberrauerit, cum tam clarē pateat collum vesicæ palmi fermē interstitio abesse ab illa parte, quæ inter anum & testes secatur, ita vt Lithotomi vulnus nō perueniat ad collū vesicæ, sed solum vique ad fistulam, qua defertur Lotium, neque ultra penetrare potest, quia impeditur à quadam magna syringa imposita à Lithotomo, quæ est tāquam vulneris terminus, & quæ inmittitur, vt pars illa externa solum secetur, in qua nullum subest mortis periculum.

Præterea patet experientia, vulnus Lithotomi periculo vacare, quoniam aliqui inveniuntur patientes, qui illo sæuissimo affectu vexantur, vt ob carunculas vrina adeo supprimatur, vt nullo modo confuectum iter facere potens exedat fistulam inter anum & testes, & sibi viam apertens in loco vbi Lithotomus secare solet inde multorum annorum spatium sine aliquo vitæ discrimine lotium per illam semitam perpetuò stillet.

Patet quoque Hippocr. auctoritate qui 6. sect. aph. 18. dicit pertusa, perfectæ vesicæ, cerebro, corde, septo trausuerso, &c. esse lethale, quare inferendū est, si Lithotomi secaret collum, omnes interimerēt.

Nec valet dum occurrunt, collum vesicæ esse carnosum, & propterea vulnus non esse tanti faciendum, Hippocr. verò intelligere de vesica, nequaquā de ceruice; quia responsio est à veritate aliena, quoniam in ceruice vesicæ est maior nervorum, arteriarum, & venarum implexus, quam in qualibet vesicæ parte, & per cōsequens maius periculum, nervorum enim propagines sextæ coniugationis cerebri irrigant vesicam, & in collum tamquam in centrum vniuntur omnes, vnde exquiri sitor sensus, similiter venæ, & arteriæ vesicæ in collum omnes conueniunt, vt necis periculū si respiciamus vasa, maius sit ob lesum collum vesicæ, quam ob vesicā.

Errant quoque dicentes, collum vesicæ esse valdē carnosum quod relinquitur sensib. quoniam, si inspexerint summa cum diligentia collum vesicæ, non vident esse carnosum; quinimò, vt meum sensum liberè dicam, fateor me inspexisse non se-

mel collum vesicæ, & nunquam vidisse in cadauerū vesicis aliquas euidentes fibras carnosas, adeo musculus ille est exilis, & ferè inuisibilis; vt credam cum Auerroes musculum non esse organum ad quatuor voluntarij motus: videmus enim insecta edere motus voluntarios sine musculis: videmus linguam exeri sine musculis: videmus totam spinā dorsī flecti & curuari, & non dari talem musculum nec omnes vnitos qui hoc efficiant. Hinc video potius nervū esse partem principem musculorum, quam caro: quia nō datur motus voluntarius sine nervis, sicuti dari videtur sine carne in insectis, in collo vesicæ, & in lingua videtur dari aliquis motus spontaneus, sine carne musculosa. Neque laudo opinionem Veighæ in ar. parua dicentis tendinē esse partem magis principālē organi motus voluntarij: quia dantur musculi sine tendine sicuti sunt musculi Laryngis ani, &c. Quod verò neruus sit præcipuum organum libertatis videtur esse Gal. sent. lib. de plenit. 5. quamvis alijs in locis vario modo locutus sit.

Causa verò, cui pereant aliqui, qui à Lithotomis secantur, est, quia post sectionē immittunt forcipem, & violententer collum dilatant, & dilant, vnde collum vesicæ sic laceratum ob eius virtutem collisam in gangrenam facilius cedit, vnde mors.

Quomodo autem vitari possint hæc mala, quæ à Lithotomis perpetrantur, agemus tum in lib. de mala administratione remediorum, tum in lib. de ferro, & igne; nostrum enim in præsentia est animaduertere errata, quæ committuntur ab empiricis ob inscitiam scus partium nostri corporis, & quia situs colli vesicæ à multis ignoratur, propterea in exemplum methodi nostræ proposuimus.

Primum exemplum errorum ob Meatus ignoratos, dum dicunt, causas adequatas Lithinosis esse materiam crassam & calorem yenum. Cap. VII.

CORRIGUNT in hanc communem sententiam medici nostri temporis, dū perquirunt causas passionis nephriticæ, dicentes, causas duas tantum esse sufficissimas, materiam scilicet, & efficientem causam verò principalem, quæ consistit in meatibus ad renes, & hepar pertinentibus

tibus omittunt, deberent enim per omnes propositas differentias partium percurrere, quia quæ ad esse specificum affectuum spectant, semper inuenirent.

Primo enim dicunt materiam calculi esse lentos, & crassos humores congestos, vel ob usum ciborum crassorum, ut est lac, caseus, & alia id genus, quæ cum facile coctionis rationem effugiant in crassa, & viscosa excrementa cedunt.

Secundò dicunt necessariò quoque conspirare efficientem causam Lithiasis, quæ dicunt esse calorem immoderatum renû, qui attrahit in renes crassa excrementa, quæ, si aliquis temporis tractu ibi morantur, in tophos, vel lapides, vel arenulas degenerant, quæ sententia, cum uersetur in uniuersalissimis, & nequaquam in specificis, aduersabitur nostræ philosophiæ, & ni fallor, ueritati ipsi: semper enim constanter dicimus ex notionibus tantum uniuersalibus neque specificam cognitionem, neque remedium nos posse colligere, quia incidimus in paralogismum affirmatiuum secundæ figuræ, de quo paralogismo alibi à nobis actum est.

Cæterum exequamur propositum, & ostendamus aliquid aliud requiri in nephritica passione præter crassa excrementa, & calorem renum, & ostendamus caloris excessum, & crassitiæ humorû præter naturam nõ semper conspirare, an ne innumerabiles reperiuntur homines, qui humorum crassitie sunt refertissimi, qui semper lacte, & caseo uicitant, & innumerabiles tales, quibus exardent renes, qui nullo uitæ suæ tempore lithiasim passionem sint experti? quare quomodo poterunt defendere causas specificas lithiasis esse crassitiem humorum, & calorem insignem renum? de ratione enim causarum, quæ per se sunt, est, ut positis causis, ponatur effectus: uel saltem uersa uice, positio scilicet effectui ponantur causæ.

Inquiramus igitur nos causam seu conditionem specificam lithiasis, eamque à decem illis citatis differentiis eliciamus, & ne semper eas uniuersas reperamus, confugiamus ad Gale. qui adæquatam, & ueram causam seu occasionem nephriticæ passionis docet, quæ continebitur quoque in illis decem propositis, dicit igitur Gal.

14. met. c. 16. incidunt ex uictu crasso

, diu exhibitò in generationem calculi, & non omnibus cõtingit, quia quibusdã ita densi sunt renes, uel sunt angustissimi ora uenarum in iecore, ut sine errore in uictu hoc morbo corripiantur: ecce igitur, quod uera causa, quæ specificum reddit affectum hunc renalem, sint lati meatus, ut ualeat consequentia, meatus sunt angusti, ergo (quamuis, & calor ingens, & maximus infarctus humorum sit in corpore) non fiet lithiasis.

Præterea, ut melius cognoscamus calorem, & crassitiem nullo modo esse ueras, & immediatas causas: ad experientiam, aciem oculorum conferamus, numquid non inueniuntur plures, qui uruntur summa inedia, in quibus nullus infarctus colligi potest, attamen calculum, & arenulas gignunt? quomodo ergo erit necessaria in lithiasi passio multa crassities.

Similiter an ne plures patiuntur hunc affectum, qui sunt omninò calore ferè spoliati, ueluti sunt illi, qui ad extremam senectam peruenere, qui calculos, & arenulas tam sæpe patiuntur?

Postremò an ne fieri potest calculus in infantibus in utero matris existentibus, in quibus causa adæquata non potest dici pituitosus infarctus, cum sætus, uel embrio sanguine purissimo, & nequaquam uiscoso nutriatur? quare crassities, & calor non erunt causæ adæquatæ, quinimò sæpe remotæ, & extraneæ: in omni enim homine tenuissimis humoribus prædito potest esse tanta crassities, quæ lithiasim facere possit, quare crassities, uel calor neque per se, & adæquatæ erunt causæ, neque ex illis, quæ saltem sunt de omni.

Relinquitur itaque causam ueram, & adæquatam esse meatus in renum regione plus debito apertos, quoniam his positis, ponitur lithiasis, & posita lithiasi, ponuntur meatus multum aperti; quod clarius quoque colligitur ex Galeno 6. de morb. uulg. l. comm. 5. ubi hoc uerborum ornatu discuit, quicquid in uenis ferosum, tenueque cum sanguine mixtum est, id à rene in se ipsum trahitur, cumque meatus, per quos id in uentriculos renum illabatur, latius aperiantur, etiam aliquid ex crassioribus simul insluit: quare Galenus uult apertos, & latos meatus esse causam lithiasis, & necessariò concurrere

in generationem passionis lithiasis.

Ecce quod calor, & pituitosis in fardus pro generatione calculi non necessariò còcurrunt, quia, vt diximus, inueniuntur senes calore nò solù renù, sed totius corporis priuari, qui calculos patiùtur, deinde inueniuntur, qui renibus sunt calidissimis, & excrementis crassissimis sunt refferti, qui nunquam patiuntur, vel passi sunt lithiasim affectiònem, quare, si necessariò non concurrùt calores, & lentiores, neque necessariò indicationes à crassitie humorum, & à calore intèro hauriemus.

Hinc errât illi medici vulgares, qui refrigerant miseros senes lithiasim passionem habentes, qui sunt calore exuti, refrigerat enim aquis thermarum, sero lactis credentes excessum caloris necessariò concurrere ad gignendum calculum.

Neque obijciunt dicentes, quod necessariò calor conspirare debeat, vt tenues partes soluantur, & crassie relinquuntur, quoniam occurrimus in omni viuente corpore, quamuis sit secundum totù frigidissimum, tantum esse posse renum calorem qui possit temporis spatio lentorem illapsum cogere, & condensare.

Similiter, neque obijciunt, non fieri lapillos sine crassitie humorum, quoniam nos concedimus, in omni viuente esse posse tantam crassitiem humorum, quæ si in renibus moraretur lapillum efficeret, negamus tamen illum calorem, vel crassitiem illam, quæ sunt præter naturam, & quæ alliciunt medicum, & quæ debent tolli conspirare semper in arenulas, vel lapillos gignendos, cum in omni homine non pituitoso, tanta sit pituita, quæ vnum lapillum efficere possit.

Propterea reprehendimus illos, qui in omni lithiasi vtuntur refrigerantibus, vt feminibus mellonum, sero lactis, & similibus, vel illos, qui semper attenuantibus, & incidentibus vtuntur, quasi quod arenulæ fieri non possint sine stomachi, & totius corporis repletione crassiorum excrementorum, & quasi, non inueniantur biliosissimi homines, qui sanguinem, & cæteros humores tenues habeant, qui lithiasim patiuntur affectum.

Patet igitur auctoritate Gale. & experientia, crassiorum humorum dominium, & caloris excessum non esse semper causas

per se calculorum, vel arenularù, sed esse latos, & reclusos meatus hepatis, venarù emulgentium, & renum, qui necessariò in lithiasi affectu concurrere debent.

Præterea Gal. lib. de dignotione & medicatione affectionis renum, c. 2. attribuit causam lithiasis meatibus latoribus renù, & nò calori attrahèti, & crassitie immoderate: quia etiã à calore naturali moderatissimo fiet lithiasis, si propter laxitatem vasorum confluit parù viscosæ materiæ: ibique moretur: imò in collo intestino testatur Gal. 6. de loc. aff. 1. callosos lapides concreseceri posse, vbi calor est supra modum imbecillis: parimodo pituita vitrea in iuncturis sua natura frigidis in gypseum lapidem conuertitur.

Hinc errant Græci vt Paulus, Aetius, & Alex. qui vbi de hac re loquentes dicunt, caloris excessum esse causam efficièntem lithiasis. Quæ opinio, vt ostendimus, reluctatur experientie, & Galeno, qui 6. de morb. vulg. 3. côm. 15. habet hæc verba; ca-
„lor autè vel mediocris ad hæc cogendâ
„materiâ satis est, si quidem in calidis aquis spontè scatuerientibus, & si tepidiores sint moderatè, concresecere topi conspiciuntur: Quid clarius vnquam explicuit Galenus, dicens quod possit esse causa efficiens calculi calor moderatissimus, & quod ob moram diutinam resoluarur à quoque leuissimo, & tepidissimo calore.

Hinc in vesica, quæ longè est frigidior renibus tum ob substantiam nerueam, tum ob cavitatem, in quam ær perpetuò permeat post excretionem lori, ne detur vacuum, in vesica lapides concresecunt, vbi est valdè diminutus calor; quo modo caloris excessus erit efficiens causa lapillù, & arenularù? qua ratione igitur in senes aunis obstituto lithiasi affectione catenato laudant refrigerantia? vt nuper fecit empiricus, qui traxit hominem in vltimo senio còstitutum hac passione vexatum, refrigerantibus qua ratione, si topis & lapilli à moderatissimo calore fieri possint, volunt sèper in lithiasi tenes refrigerare?

Secundum exemplum errorù ob Meatus ignoratos est, dum Galenus dicere videtur in renibus esse cribrum. Cap. VIII.

P Ræterea, vt decè conditiones partium nostri corporis diligentius expendamus, ex quibus esse specificum affectuum colli-

colligitur, valdè prodeſſe poterit, ſi eas applicabimus plurimis corporis partibus; ſi loquamur igitur de meatibus, ſe offert, vt proponamus illud erratū nonnullorū antiquorum, & ipſius Galeni, qui credebant in renibus eſſe quodaſdam meatus; qui æmularentur cribrum ſeu colatorium, per quos dicebant lotium ſyncerum percolari, vt portio ſanguinea ſuperne deſcenda renes aleret, addebantque cribro hoc dilata to atque recluſo ab aliqua cauſa præter naturam aperiente, ſanguinem deinde egredi cum lotio.

Quis amabo certò ſcire poterit, an in renibus ſit hoc cribrum ſeu colatorium, niſi ipſoſ renes inſpiciat, aperiatque, & contèpletur renum figuram, ſitum, meatus, & reliquas enarratas conditiones? quoniam ex harum conditionum, vel diſferentiarum partiū corporis inſcitia neceſſariò prauæ affectuum debent fieri intelligentiæ, & omninò à veritate alienæ; & ex mala intelligentia partium corporis indicationes deinde hauriuntur ſepiſſimè tranſcendentes, & falſæ, vnde varijs modis miſeri lædantur ægrotantes.

Audias igitur cum anatomicis noſtris quo pacto ſint cōſtituti renes, ſi vis cognoscere, an in ipſis ſit cribrū, nec ne: in primis tã à vena maiori, quàm ab arteria oriuntur emulgentes, per quas à renibus ſit perperua attractio ichoris ſanguinis; emulgentes deinde ingrediuntur corpus renum, & coeunt ſimul in vnum truncū, qui deinde in ramos diuiditur, qui per vniuerſam renum ſubſtantiam diſſeminantur, vt renes ſanguinea portione nutrirī poſſint, ſed, cū ſeroſa portio, vt inutilis debeat propelli à renibus, & nulla ad ſint foramina ſenſibilia (vt docet aſtopſia) quæ imaginem habeat cribri, vel colatorii, eadem ſeroſa humiditas penetrat quodaſdam renum eminētiās, quæ ſunt ramulis diſperſæ, & per has in vterque ſulcat, vel percollatur, & deinde ad veſicam per meatus vteretres, qui ſunt ſenſibiles procumbit; quare experientia patet, (niſi mē fallant oculi) non dari hanc membranulam, quæ ſit appoſita ſinibus ſirculorum emulgentium, & quæ cribri imaginem exprimat gratia retinendi ſanguinem; vt obſervatur in meſeraicis venis gratia quoq; retinendi ſanguinem, quo-

niam ſagax natura ex ipſamet ſubſtantia renum procreauit quodaſdam eminētiās quæ ingrediuntur in ramulos illos diſperſos, quæ eminētiæ obſtant, ne ſanguis dilabatur.

Hinc factum eſt, quod dum lapillus renum detrudatur ad veſicam, eminētiæ hæc diuellantur ac aliquæ lacerentur, vt exinde ſuat ſanguis cū vrina, donec natura errore illum corrigat, adeo vt cribrum, vel colatorium ſit abiiciendum; cum re vera nulla membrana perforata, vel nihil, quod cribri ſpecimen declararet, inucniatur; neq; ab anatomicis diſigentiffimis obſeruetur; quapropter, ſi obſerget deſcui ſanguinem cum lotio, non erit credendum cribrum eſſe dilatatum, & propterea indicationes aſtringēdi, vel increaſtandi eſſe hauriendas, vt faciunt, qui cribrum ſeu colatorium admittunt.

Præterea veteres Medici, inter quos eſt ſapientiſſimus Gal. excogitarunt eſſe aliud cribrū in oſſe cuneali, vbi eſt ſinus ille æqui ſelle ſimiliſſimus, dixeruntque; quemadmodum in renibus percolatur lotiū, & à ſanguinea parte per cribrum ſcernitur; ſimili modo in oſſe cuneali, vbi inſidet glandula colligens excrementoſam pituitam cecrebi, debet eſſe cribrum.

Putabant enim os cuneale in ſuperficie habere oſſeam ſquamam multis foraminibus peruiam, quæ cribri ſpecimen exprimeret, quo mucoſa pituita ſtillaret, & deinde per nares, & palatum deſlueret.

Hæc ſententia nō debet reiſci rationibus, ſed experimentis, quare cum nemo anatomicorum ſit, qui viderit vnquam in ſuperficie oſſis cunealis foramina, & aliquid ſimile cribro, erit explodenda tamquam ſenſibus, & veritati contraria; in ijs enim, quæ pertinent ad ſenſum, nulla debet eſſe diſputandi occaſio.

Reiſcienda ſunt errata, quæ ex falſis principijs colliguntur dum dicunt videret, cerebri excrementa omnia ab illa paruula glandula recipi, deinde per cribrum deſcendere, & ad nares, & ad palatum procumbere, propterea errhinis, & maſticatorijs vtuntur, quaſi alia non dentur foramina in capite, niſi illa, quæ mittunt ad nares, & ad palatum.

Errant primo dicentes pauillam illā glandulam tantum pituitæ excrementoſæ

ſæ aceruū recipere, perinde ac cerebrum alios non haberet meatus, quam offis cunealis.

Secundo errant, dum in omni deſtillatione vtuntur Erthinis, & maſticatorijs, quia alia plura ſunt foramina capitis, per quæ pituita ſecernitur.

Audias igitur foraminum omniū capitis breuiſſimam hiſtoriam, nam alia præterea vix inueniri poſſunt: os cuneale habet decem, & ſeptem foramina propria, in temporibus octo ſunt, in occipiti ſeptem; deinde quatuor foramina maiora ſunt illa, quæ ſunt cōmūna ſyn-
cipiti, cuneali, & temporibus, duo ſunt in fronte, in maxilla verò ſuperiori ſex obſeruantur foramina propria, communia verò maxillæ ſeptem; deinde inferior maxillæ habet duo; præterea quatuor ſunt foramina communia oculis, maxillæ ſuperiori, & offi frontis, alia aliquando in aliquibus caluarijs obſeruantur, quia re vera nunquam ſeruatur in omni cadavere idem foraminum numerus ad vnguē, de qua re noſtrum non eſt hic agere, ſatis enim mihi eſt ante oculos ponere plurimos meatus ſenſibiles eſſe in caluarijs, de quibus Columbus, & Veſalius diligentiffimè tractant: per hos igitur meatus aditum expeditiſſimum habent recrementa, vt ſit ridiculum credere paruulam illam glandula cunealis omnia cerebri excrementa recipere, & credere, quod omnia foramina ad nares, & ad palatum excrementa mittat: Ex quorum omnium meatuum cognitione in reuellendis, & deriuandis excrementis ſummam intelligētiam colligemus, quoniam niſi meatus per quos meare poſſint humores cognoſcamus, neque reuellere, neque deriuare ſciemus.

Quartum exemplum errorum ob meatus ignoratos, dum dicunt Traulos, & Balbos ab intemperie humida capitis fieri. Cap. IX.

PRæterea, vt plurimis & conſpicuis exemplis oſtendamus affectum genericum ob meatuum varietatem fieri ſpecificum, proponamus illos affectus, qui perttē docere poſſint veram eſſe hanc noſtram methodum, vt ſunt traulis, balbi

vel ſemilingues, qui habent tale ſpecificum eſſe ob quosdam meatus exiſtentes in maxillis.

Trauli igitur illi vocantur, qui in locutione literam non poſſunt exprimere; vt autem huius affectus immediatam & veram cauſam conſequamur, propoſita methodo eſt incedendum, proponendo decem illas enarratas conditiones partiū corporis, & ex ſufficienti enumeratione illarum colligere, quæ conditio ex illis faciat affectum ſpecificum.

Sic dicemus non fieri traulos ob figuram lætam inſtrumentorum pertinentiū ad locutionem, quia nos videmus figuram partium ad locutionem conſpirantem eandem eſſe in ijs, ſicuti in cæteris hominibus.

Pergas deinde dicendo, non ob ſubſtantiā, ſitum, progreſſum vaſorum, vel exordium læſum; quoniam eadem ſeruatur ſubſtantia inſtrumentorum pertinentiū ad locutionem in ijs, vt in alijs hæc affectione priuatis, idem partium progreſſus, & ſitus, & illudmet inſtrumentorum exordium.

Similiter dicere valemus, traulos non fieri ob temperaturam linguæ, & cæterarum partium conſpirantiū ad locutionem, quia illi, qui malè exprimuntur, inueniuntur modò frigidi, modò calidi, modò humidi, modò licci tam ſecundum totum, quam ſecundum omnes partes, vt trauli modò abundant ſputis, modò priuentur, modò calidi, modò frigidi ſunt: quare temperatura traulos nullo modo conſtituet.

Inferas ergo poſt ſufficientem enumerationem conditionum, traulos tales eſſe ob aliquam varietatem meatuum exiſtentiū in inſtrumentis pertinentibus ad locutionem; quoniam non dantur aliæ differentiæ partium illarum, quæ poſſint affectum aliquem facere, niſi illæ decem, quarum, ſi nouem optima ratione aliqua excludantur, decima eſt illa, quæ dat eſſe ſpecificum affectibus tam naturalibus, quam morboſis.

Si aliquis igitur erit traulus, erit ob maiores, vel ob plures, & ſitu differētes meatus exiſtentes in inſtrumentis pertinentibus ad locutionem; inſtrumenta verò ad locutionem pertinentia ſunt pulmo, trachea,

chea, laryx, lingua, palatus, dentes, & labia, dicas deinde, nullam illarum decem conditionum in omnibus ijs instrumentis, observari in traulis, quæ ad unguem non observetur in ijs, qui quam optimè loquuntur, præter illam differentiam, quæ consistit in meatibus, ergo metus facient traulos, eritque affectus in conformatione, & nequaquã in interperie: sunt enim in media palati regione. Id est in quarto esse superioris maxillæ, in illis omnibus quos hucusq; viderim, qui hanc literã, r, exprimere non possunt duo foramina, quæ nullomodo adeo aperta, & obvia inveniuntur in ijs, qui illo affectu carent, ergo causa immediata, qua posita ponit, erunt duo illi meatus plus iusto aperti, & affectus erit in conformatione.

Eadem methodo balborum, & semilinguium immediatam causam perquirimus percurrentes decem illas differentias instrumentorum pertinentium ad locutionem, dicendo, id non fieri ob figuram, quoniam eandem obsident figuram balbi, & non balbi: neque ob substantiam illarum partium, vel progressum venarum, vel nervorum, vel ob exordium aliquod læsum, quoniam partes ad locutionem conspirantes neq; in substantia, vel progressu, vel exordio, vel situ variantur: sequitur ergo esse ob meatus.

Sicuri enim diximus in media regione palati observari duo meatus qui faciunt traulos: similiter observamus iuxta dentes foramina (omnibus ijs tamen ab ortu nature cogenita) maiora, per quæ pituita stillans, vel irrigans linguam in parte illa anteriori blefam locutionem facit, unde balbi, & semilingues sunt.

Nec propterea dicendum est balbos fieri à capite pituitoso, vel à cerebri humida intemperie, quoniam in qualibet valde sicca cerebri intemperie tanta colligi potest pituita, quæ præcumbens per illam partem irrigare linguam, & balbos facere possit, quæ pituita, si in maxima quantitate per alia foramina maxillæ descenderet, & buccam impleret, non balbos propterea faceret.

Communis ergo sententia, quod trauli, & balbi, & semilingues fiant ob nimiam cerebri humiditatem adversatur experientia: etenim quomodo nimia capitis hu-

ditas erit causa traulorum, vel balborum, si non est semper & de omni? Quis non videt blefos aliquos aliquando summa capitis siccitate esse præditos, & viceversa plures inveniri insigni humorum diluvie correptos, quos pituitosa excrementa ab ortu nature ad vltimum usque sint commixta diem, qui locutionem ita facilem atque expeditam habent, ut nihil in locutione exprimat, quod vacillet. Quando tandem hoc somno excitabimus in rejiciendis his causis, quæ non sunt adæquatæ, & convertibiles?

Reijiciendi igitur sunt, qui auferunt causas, quæ non sunt de omni, quippe quæ neque infirmum necessitatis gradum capiunt, quo nihil ineptius, aut stolidius in philosophia profecti potest; causas enim, quæ perpetuò veræ sunt, & mulierculæ, & rustici conantur venari, & quæ solùm in aliquibus, vel aliquo tantum tempore veræ existunt, à pueris quoque rejiciuntur. Quia veræ causæ debent esse de omni per se, & convertibiles, omnes enim, qui sunt blefi irretiti locutione, ut experientia docet, habent meatus maiores circa dentes, & versa vice: simili modo, omnes trauli habent meatus in palato circa quartum os maxillæ, & viceversa. Quare cum intemperies cerebri humida non concurrat in his affectibus, nescio quo spiritu divinis Hippocrati ediderit aphorismum 32. 2. sectionis, Balbos fluxu tentari ob intemperiem frigidam, & humidam capitis, cum æquè frequenter eveniant fluxiones in balbis, ut in non balbis: nisi dicamus in aphorismo Hippocratis explicari causam aliquam remotam, quæ aliquando iuncta cum proxima affectum facere possit, propterea aphorismum aliquando solum, & non semper verificari.

Similiter, nescio quo consilio ductum Oraculum apud Herodotum citatum de derit balbutientem respōsum, ut in Lybiam regionem calidam se transferret, nisi hac communis doctrina percipitur, quod scilicet balbuties oritur à causa humida, & frigida: & propterea cum in Lybia regione sit æstuosus calor, crediderunt illi sacerdotēs calidam balbutientem adeo posse cale fieri in loco illo calido, ut tota humiditas consumi possit, quod est impossibile; quia prius uita, quam tota humiditas stillans,

lans, & irrigans linguam adimeretur; atque sacerdotes parū in anatomia occupati, & maioribus rebus dediti secuti sunt communem, sed falsam sententiam, quæ erat quod balbuties à frigiditate, & humiditate cerebri semper prodiret.

Colligas ergo esse prorsus impossibile, ut específicos affectus cognoscamus, nisi partium affectuum pericula sciamus, & cognoscamus illas decem conditiones, quæ sunt situs, meatus, figura, compositio, temperatura, substantia, numerus, progressus, officium, & exordium partium affectuum; quia in examine harum conditionum semper facile inueniemus naturam specificam affectuum omnium.

Postremò tot sunt affectus, qui ob meatus nimium apertos, vel nimium oclusos sunt, ut non sit mirandum, si Methodici tam facile in illum errorem inciderint, quod omnium affectuum origines essent meatus nimium aperti, vel nimium clausi, vel mixtum, ex his, quoniam rarò obseruantur morbi, qui meatus laesos non habeant.

Audias quem morbum obseruat Auen. fen. 1. doct. 4. cap. 1. qui fit ob quandam meatum oclusum, dicitque quod colica aliquando cōtingere solet ob meatum felleum oclusum, veluti aliquando angustia fit in furculo illo, qui à porro sel. leo descendit ad intestina, tunc enim angustia transitum bilis ad intestina impedit, unde nō irritatur expultrix intestino. rum, & per cōsequens retineantur feces, & ob moram durecant. Et quia cōlum intestinum omnium maximum, & imbecillum colligit magnam secum copiam, & postquam est obsarctum atque onustum, intensus dolor gignitur, qui non tollitur medicamentis soluentibus (ut putant empirici) quia attrahunt nouam materiam, unde maior fit humorū obsarctus, & per cōsequens maior dolor excitatur.

Præterea ille dolor nō tollitur Hiera, vel ceteris exsiccantibus, quia à hiera magis exsiccantur, & magis durescunt feces; neque tollitur clysteribus, quia clausum est cōlum intestinum; sed solum tunc est fidendum oleo amygdalino dulci ad semilibram per os assumpto.

Videas ergo quo pacto meatus oclusi, vel aperti dent esse específicos affectibus:

quomodo autē cognoscatur, quādo, hæc proposita egritudo fiat ob angustiam, & an angustia fiat à materia obstruente, vel ab affectu alio comprimente, vel à coalescentia. In primo lib. methodo tradidimus quæ omnes affectuum ideas genericas promptè docere possunt. Hic verò illas conditiones, vel differentias partium corporis, quæ nos possunt docere específicas, & vltimas affectuum differentias, quæ sunt situs, meatus, compositio, & cetera, proponuntur, quæ maximè conferre poterunt proposito nostro.

Quomodo errent, in temperatura perquirenda: & sumitur in exemplum cor, & pars omnium præstantissima. Cap. X.

Infiniti propemodum affectus specifici tam naturales, quàm non naturales à temperatura prodeunt; sed quoniam prius, & modernis temporibus, medici semper faciles fuerunt ad credendū, affectus prodire à temperatura, ut abundè ostendimus in 1. lib. capite 22. propterea nō deest, ut nos alia agamus, & iam conspicua, & comperta exemplis illustremus.

Veruntamen mihi videtur in cognitione temperatura partium illud plurimè negotiū facessere, quo rudiores in plurimos elabuntur errores, dum non distinguunt temperaturam totius à temperatura partium: incidunt enim in paralogaismum, quia à partibus ad totum procedunt, veluti de corde loquendo ostendi potest, partes enim solidæ cordis omnes sunt frigidae, attamen totum cor est calidum, ut sit paralogaismus, dum dicunt, omnes partes cordis sunt frigidae; ergo cor est frigidum, non valet, nec valet, totum cor sua natura est calidissimum, ergo & partes omnes, quoniam re vera tantum abest, ut partes cordis sint calidissimæ, ut potius sint frigidae.

Atqui; ne hoc videatur paradoxum, excutiamus hanc materiam, & in primis, quibus nitantur auctoritatibus, in mediū afferamus; Est igitur Galeni locus pro illorum sententia 5. de loc. affe. 1. ubi hæc verborum serie de corde dicit, declarauimus in alijs libris, cor esse veluti fontem innati caloris, & in lib. de satus formatione habet, cor esse animalibus inditum, ut esset focus ignis; lib. de visu p. 6. cor calori

loris nativus, quo animal regitur, esse quasi fontem quandam, & domicilium. 2. de temp. & libr. de semine dicit, si digitum immittas in cor recentem maceratum experieris calorem videntem ex ijs nonnulli colligunt, cor secundum omnes partes esse calidissimum, ad unum quoque Galeni placitum 8. de vi par. cor nimium esse refectum arterijs, & venis, quibus nulla est calidior in corpore animalis particula, quare si nulla particula est calidior corde, res est certissima, quod secundum omnes partes cor sit caloris ferax. Præterea referunt Arist. loca lib. de sens. & sensib. c. 2. ubi scribit, cor esse oppositum cerebro, quare si cerebrum est frigidum secundum omnes partes, erit quoque cor calidum secundum omnes partes.

Hanc sententiam in hoc loco rejicere consuevit, tum, quia de hac fabella sciret disceptari cum empirico, tum, ut hac occasione declarare possim, cuiuslibet visceris diuersam esse intemperiem totius, & partium, & nullam esse consequentiam à partibus ad totum, neque à toto ad partes, quia Arist. 7. metaph. tex. 60. dicit, quod illa habet non est ipsa elementa, nec idem quod b & c, sed aliquid aliud, & 8. metaph. tex. 15. habet hæc verba, totum non est quasi coacturatio partium, sed ipsum totum est aliquid aliud præter partes, & 12. metaph. tex. 22. dicit, formas simplicium esse alias à formis compositorum, hæc sunt principia, quæ nos docent, cur à partibus ad totum non valeat consequentia.

Causa autem cur temperatura cordis propoluitur est, quia cor est omnium viscerum potius pluriimum, unde singulari hac præceptione rudiores, qui de re medica consulant, non ita poterunt de quolibet viscere intemperiem partium, & totius expendere, ut alium, & aliquando contrariam, ut de corde dictum est.

De cordis igitur temperatura dicimus, quod constat ex panniculis, seu membranis, cartilaginibusve, & nervis à 6. partibus prodeuntibus, quæ vniuersæ partes sua natura sunt frigidae, quod fundamentum confirmatur Galeni testimonio, & Aul. in sua anatomia: Galeni, quia 3. de alimentis cap. de visceribus, pedestrium habet cordis substantiam esse carnem fibrosam ac duram, idcirco cor coctum esse diffici-

le, & tardè permeare, quare si habet carnem fibrosam, & fibræ naturaliter frigidam substantiam obtineant, ut omnes consentiant, cordis partes similes erunt frigidae.

Similiter Arist. 2. de hist. anim. c. 16. & c. 32. habet cor innigi arteriæ vinculis fibrosis, & quibus coponitur, atqui hæc partes frigide sunt, ergo constat cor ex partibus continentibus sua natura frigidis, quare nulla erit consequentia, cor est fons caloris, ergo partes solide sunt calide, quia cor est dissimulare, cuius munus per motum systolis, & diastolis est gignere spiritum vitalem, neque potuisset gigni calor ob motum, nisi partes continentes fuissent duræ, & fibrosæ, & per consequens frigidae, quoniam calor, qui à motu pendet, sit ob collisionem corporum durorum.

Hinc optimè dicit Galenus, in dextro ventriculo cordis per motum præparari sanguinem, & per septum medium exsudare continuè in sinistram ventriculorum, & statim fieri spiritum vitalem. Valeant ergo cum suis commentis Columbus, Io. Botallus, & Vlnus. Colubus dicit pro spiritu vitali præparari in pulmone: deinde per arteriam venosam transportari in sinistram ventriculorum.

Io. Botallus dicit esse ductum quandam à dextra auricula cordis ad sinistram per quem ductum transit sanguis præparatus & statim fit spiritus.

Vlnus verò libale liene dicit in arterijs lienis præparari sanguinem, & per dictas arterias transportari ad cor, & converti in spiritum. Sed hæc opiniones non semel reieciimus in arte parua, & in prima scilicet.

Sed utcumque, sit dicimus cor esse caloris focum considerando totum organum & non partes.

Quare erat necessarium, ut in corde duo obseruarentur temperamenta, aliud videlicet totius, & aliud partium, nullum enim est inconueniens, ut cor secundum totum sit fons caloris, & sit calidissimum secundum partes continentes sit frigidum, secundum verò contenta, & impetum scientis, quod est secundum sanguinem arterialem, & spiritum vitalem, sit calidissimum.

Quæ posita hac distinctione temperaturarum, omnia argumenta cadunt, & eva-

evanescent, qu' nimò clatè videmus, illa omnia argumèta esse partibus ad tortum, quæ argumèta sunt à divisiis ad conjuncta, ubi idem sensus non sentitur in antecedentibus, & consequentibus. Hæc sunt argumenta, & similia, reliquaque ab Arist. in lib. prim. meth. & alibi, de quo paralogismo in lib. de analogismo & de falsâ experientia quoque agemus: Constat minus ergo, solidas partes coris esse frigiditas.

Ratio autem, cor à natura contextum sit cor ex frigidis & duris partibus, desumitur ab Alberto Magno lib. de sens. & sensa tract. 1. c. 16. quæ est, ut magis resistat alterationibus, & perpetuis motionibus; Natura enim rerum opifex sagacissima propter finem agens, semper id quod melius est efformat; composuit carnem illam habentem multam quandam naturam, inter carnem, & nervosam substantiam, ut dixit Alex. Aph. 1. de anima, ut ratione carnis nervis mollioribus prædite sensum, ratione vero nervi durioris systolem, & diallolum cor haberet.

Ratione patet, quod innestentis cor sua natura risidit, & coarctatur; causa, cur cor à copiosa pinguedine ambiatur est, quia pinguedo contrahit à frigido; artamen mirabatur Aquapenens in publicis sermonibus dicendo, quod si sciret, cur cor calidissimum à tanta circumderetur pinguedine, se alterum Aculapium existimaret, quod mihi movit risum, quia pinguedo à frigiditate paniculi fit gratia conservationis caloris cordis.

Exemplis declaratur, Medicos ob substantiam partium corporis ignorata in plurimos posse incurrere errores. Cap. XI.

Conspertum hæcenus est, corporis nostri partes, nunc ob situm mutatum à statu naturali recedere, nunc ob meatus impeditos, nunc ob temperaturam alteratam, & aliquando ob variam substantiam partium: à variari, & varijs affectibus præter naturam contingi.

Substantiam partium vocant medici secundam qualitatem, ut deinde & crassitatem, & reliqua, quæ sunt, quæ insequuntur temperaturam partium ab ore natura.

Proponamus ergo exempla, in quibus

aliquem speciem non affectum cognoscere possimus, qui inveniatur à partium substantia læsa factus sit, age exordiamur ab aliquo ossium affectu, scilicet ob ossium substantiam læsam. Observantur duo genera, interdu nascitur spongiosum, & interdu, ubi in eis res videtur, quæ ob hanc substantiam mollem, vel spongiosam, & corruptioni obnoxiam à quocunque tabo tam facile eroduntur, ut luc insecti, dum emigunt, cum mace ex natibus aliquando deprehant horum ossium frustulum; quod si accideret, & empirici videant, adeo admirantur, ut credant morbum galli-cum iam corripuisse cetera omnia capitis ossa, quia putant omnia ossa esse ejusdem substantiæ.

Videtur empiricum non edoctum horum spongiosorum ossium substantiam, credentem ob exitum frustuli ossis corrupti cetera omnia ossa capiti inaruisse.

Est igitur necessarium in cognitione, & curatione illa principia morborum scire, à quibus esse speciem morborum pendet, & hæc sunt decem illæ conditiones propositæ, quæ in omni corporis particula affecta debent considerari, ut ad speciei cognitionis apicem perveniamus: empiricus enim, ubi præcognovisset substantiam illam spongiosam corruptioni obnoxiam, & situm illorum ossium, non fuisset admiratus illorum ossium corruptionem, & non ita turpiter in talem incidisset errorem.

Præterea, ut superius diximus, ob diversam substantiam spinalis medullæ inter eam quoque varias atque diversas dolorum species fieri, quoniam, si ex capite pulvis cataractæ per spinalem medullam descendat usque ad externum thoracis, dolorem gravitatem faciet, si vero ultra procumbat per medullam videlicet, & ad humeros, & os sacrum pervenit, dolor non intensissimum excitabit, & ecce quod dolor, qui erat paulo ante gravitatis in eadem medulla, sed in parte, ubi est mollior, in alia medulla, ubi est durior, transit in contrarium dolorem.

Quod experientia observatur, quæ curam habet, quomodo sine cognitione substantiæ partium distinde affectus cognoscere possent; vellem sane, ut de medicum non excultum hac nostra metho-

do,

men obliquum occipitis, non propterea à cerebello exoritur, sed à spinali medula, quæ ex opinione omnium anatomicorum, & ex sensu ipso prodit à cerebro.

Quinimò spina videtur conspicientibus ipsam esse cerebri progressum, quæ similiter obducta est pia, & dura matre.

Postremo ex hac substantia cerebelli malè percepta, errata, quæ sequuntur nò solum stant in opinionibus, verum etiam in operationem transcunt, quoniam, qui dicunt cerebellum esse durius cerebro, & propterea nervos destinatos motui à cerebello pendere, & non à cerebro, si viderent mûculos, qui sunt induti secundo, & tertio nervorum paribus, quæ ex omnium consensu prodeunt à cerebro, non explere suorum officiorum munera, essent coacti in curatione configere ad cerebellum, ad occipitium videlicet, ut eliderent symptomatum radicem, & non ad cerebrum, à quo (ut aiunt) nervi motui dediti nullo modo prodeunt.

Videant ergo omnes, quot errata contingant ob unicam petitionem principij, quæ erat, quod cerebellum esset durius, quod suppositum, ut probauimus, est falsissimû, quare colligimus tanti debere esse præcognitione substantiæ partiû affectuum, quanti ferè est sanitatis, & bonæ valetudinis adeptio, quoniam ignota partiû affectuum substantia, ignorantur indicationes vitales, curatiue, & præseruativæ, vitales, quia alio modo est corroboranda pars mollis, & alio modo pars dura: curatiue, quia modus specificus curandorum morborum pendet à parte viuentè, tanquam à proprio subiecto, quod ingreditur definitionem passionis: præseruatiue, quatenus substantiæ partium variè, ut mollior, durior, crassior, rarior, granitior, leuitas, lentor, friabilitas, & reliquæ secundum magis, & minus leuè varia efficiunt symptomata: quare ignorata substantia partium ignorantur indicationes, ignoratis indicationibus non methodo, sed casu, vel æconum more in affectuum curatione procedimus.

Deum proponimus illud erratum Galeno a scriptam, dum loquitur de obliquis appendicibus ossium 9. de viii par. dicentibus appendices esse duriores ossibus, quod videtur omnino falsum, quia ap-

pendices ossium sunt spongiosæ, & molles, & facilius franguntur dentibus, quam ossa, quinimò sunt succo repletæ, & propterea ob earum molliem ad esum, maximè accommodatæ, ut omnes admittant esse molliores ossibus.

Adsum plurimi, qui defendunt Galen. interpretantes per ossa partem illam, quæ appendices committuntur ossibus quæ expositio meritò non recipitur, quoniam certè est nimis voluntaria, dum dicunt Gal. per ossa intelligere partem, quæ committuntur appendices, debebant potius postquam voluntariè voluerunt interpretari dicere, quod per ossa intellexerit appendices, & per appendices ossa, eadem enim esset interpretandi licentia.

Arbitror ego potius mendum fuisse in eodice, quia non sit rationi consentaneum credere, quod Galenus nunquam commisset appendices vituli, pullorum, & aliorum animalium, in quibus omnibus appendices sunt molliores ossibus, quod nò solum pueri, & rustici sciunt, verum etià canes, & lupi, ut omnino reijcendi sint illi, qui crediderunt Galenum nesciuisse appendices esse molliores ossibus.

Semper Galenus decem propositarum conditionem partium fuit studiosissimus; optimè enim nouit non solum affectum specificum pedere, modo à situ partium, modo à meatibus, modo à figura, modo à substantia, & à ceteris enarratis: verum etià affectuum cognitione, & curatione valenti loquens nos de appendicibus, si in aliquâ dytiraam humidam prolaberentur, illicò cognita mollior appendicem, supponemus appendices molliores magis pati, quam pariantur ossa, quia ossa magis resistere possunt.

Similiter, si quis incipiat premi illæ lue in ossibus iuxta appendices, cum sint molliores, & minus resistent, & oculus patiantur, indicabimus appendices prius esse lasas, quam ossa, deinde cum topicis, si opus esset affectum delere, appendices prius, quam ossa, essent delegendæ.

Denum Galen. & plurimi anatomici videntur errare, dum dicunt, ligamentum exeri non per propriam substantiam, sed per proprios mûculos, quod vix potest defendi; quomodo mûculi reuè à dura trahunt, trahunt ad suum principium: ex-

tra os non sunt muscoli, qui trahant linguam extra.

Quare hoc fundamentum, quod omnis motus voluntarius fiat à musculis nō videtur verum: sic ceruix vesicæ mihi videtur carere fibris carneis: attamen singitur spontaneo officio retinēdi urinam.

Nos propterea libenter accipimus opinionem Auerrois, quæ fuit Veterum dicentium linguam habere omnes motus à propria substantia sicuti aquilæ, læcæ, lubrici, & omnia insecta quæ sine musculis spontē mouentur. Similiter pedes centipedum, muscarum, & culicum, quippe sine musculis spontē mouentur.

Ecce igitur, quo pacto nos maximam utilitatem consequimur ob cognitā substantiā partium; ideo de aliquarum partium substantiam tantum egimus, & in exemplorum formam tradidimus, ut methodum vniuersalissimam consequi possimus; lectores tamen adire poterunt sectiones anatomicas, & deinde Vesaliū, Columbum, Valuerdem, & alios præclarissimos anatomicos, & ab ipsis colligere, quod certum, & exploratū est, quod verò inter illos dubio vertitur, & est perplexū, *autopsia* sit illa, quæ decernat, & terminet litem; in hunc modum quomodo omnes corporis partes sint curandæ ocyus, & perfectius addicemus.

Exempla errorum ob progressum vasorum ignoratum, dum nescire videntur sub qua vena cubiti, nervus, & arteria maiores progrediantur.

Cap. XII.

Progressus vasorum non solum docere nos poterunt affectuum sympathiam, ut in 2. lib. de nervis, & musculis longis ostēsum est; verum etiam varij, atque diuersi progressus venarum, neruorum, & cæterum partium varijs affectibus, esse proprium, & specificū dare poterint. In 2. lib. plurimas methodos proposuimus, quæ declarant nobis mirabiles sympathias humani corporis, quæ sunt à lōgo vasorum progressu: hic vero aliqua pauca errorum exempla de uenarū progressu afferunt, tum, quia de uenarum progressu in 2. lib. nihil diximus, tum ut exemplis lucidissimis incipiamus uidere,

Sanctorij; Sanctorij Pars I.

quomodo progressus vasorum sæpius mē nos doceant affectus específicos, & eorum curationem; pauca tamen exempla proponimus, ne videamur in anatomicas melles ponere falcēs.

Præstat autem in primis proponere illud erratum empiricorum nostri temporis, quod committitur, dum videntur nescire, sub qua vena cubiti progrediantur maior nervus, & maior illa arteria, quæ pulsui digitis medicorum accommodatum facit: quoniam ex horum vasorum progressu non solum affectus específicos præternaturā, qui in cubiti phlebotomia contingere possunt præcognoscemus, sed etiam in quo vase, uel in qua cubiti uena maius imminet periculum; an uidelicet secando basilicam, uel cephalicam, uel medianam, percipiemus.

Sed quia hæc, quæ de progressu uenarum aguntur, ad sensum pertinent, & rationibus non possunt absolui, & tractari, ideo ad duos iudices erit confugiendum, uel ad anatomicos scilicet præstatissimos, uel (si inter illos esset dissidium) ad *autopsias*; quæ non potest decipere, quando diligentissimè secantur corpora.

Quo ad anatomicos, ex illis colligimus, neruum magnum, vel arteriam magnā brachiorum non progredi sub cephalica, & medianā, sed tantummodo sub basilica: audias Columbum, qui hac uerborum serie eandem explicat sententiam capite proprio de nervis brachiorū; prope humerariam, & medianam neruum adesse nullum, prope basilicā verò neruum esse: nullus nervus maior in brachium excurret, quam ille, qui subreptus est basilicæ uenæ: sub, uel prope cephalicam nulla extat nervi propago: Præterea quantum ad arterias attinet ex omnium cōsensu, arteria illa magna, quæ facit pulsui medicis digitis accommodatum excurret sub basilica, & nequaquam sub cephalica, uel medianā.

Quæ cum ita reuera sint, patet quot immincant pericula in secanda basilica, quæ non sit prominens, & conspicua, quare errant non nulli, qui basilicam secant latentem, & profundā, credentes basilicā immediatē iecur deplere, & non cephalicam; modo enim ob secatā basilicā excitatur dolor, modò pars illa uenæ uul-

K neratæ

natura inflammatur, & quia subest nervus, contractiones, & spasmus fieri possunt; quia verò subest arteria, potest incidere, & aneurisma fieri, quæ symptomata, si secabitur cephalica, vel mediana contingere non possunt; quoniam sub his neque nervus, neque arteria excutitur, & quævis non pungatur nervus, vel arteria, dum lationes sunt post cubitum, quod sæpenumero contingere vidimus, dolores maiores concitabuntur circa basilicam, quam circa cephalicam, si quidem confluxus humor extra venam comprimit nervum, & arteriam maiorem, unde dolores pulsantur, & aliquando convulsivi sentiuntur.

Accedit, quod sub basilica delitescat tendo illius nerviculi, quem vulgares vocant brachij pisciculum, qui tendo cum sit valde nervosus dolores convulsivos excitare potest. Idcirco si dum secatur basilica extenso brachio manus supina, & prona reddatur tendo intra retrahitur, & basilica tutius perfoditur.

Galenus lib. de cur. ratione per f. m. cap. 23. proponit duos casus pertinentes ad sectionem arteriæ abique eo quod sequatur aneurisma: refert tamen prius quomodo ex incisione arteriæ sequatur aneurisma, & mors his ferè verbis, novi quoddam interisse incisa arteria subiecta venæ cubiti: causa mortis fuit vehemens dolor factus à ligatura, gratia prohibendi evacuationem sanguinis arteriosi. Dolor enim maximus facilè gægrenam excitat.

Ibidem Galenus proponit modum per somnium admonitum, quem observavit in secunda arteria in duobus casibus, quo observato nullum secutum sit aneurisma.

In primo casu quidam patiebatur diutinum lateris dextri cruciatum: in ipso secavit arteriam inter indicem, & pollicem summæ manus: permisit ferè libram sanguinis arteriosi exire, illico abstulit dolorem sine ullo anismusatis periculo.

In altero casu ex vulnere arteriæ circa maleolos sanguinis fluxus non quiescebat, tunc Galenus transversim dissecavit arteriam, ac statim applicavit medicamentum ex aloë, mana, albumine ovarum cum mollissimis pilis leporinis, quo cicatrix facta, & sanatus est.

Quæ symptomata animadvertit Strato

Erasistratus, & Apemantes in secundo cubito animadvertierunt, quos tamè Galenus lib. de sect. ven. adversus Erasistratos capite 2. non propterea irrisit, quia crederet Galen. hæc pericula non imminere, si d. irrisit Erasistratos, quia erant *diagnosibiles*, id est timentes sanguinis evacuationem, & sanguinis evacuationem semper despiciebant, despiciebantq; phlebotomiam non solum latentis, & profunde basilicæ, vt nos despicimus veruor omnium venarum apertionem, quod sane nimis ab arte abhorret.

Afferamus ergo has conclusiones in omni hepatis affectu. Prima est: si cephalica patentissima est, & oculis ministris sit certissimæ operationis, eam esse eligendam, vel saltem quam medianam vocant, quia sub cephalica neque nervus, neque arteria excutitur, vt sub basilica; sub mediana verò arteria excutitur, nervus nequaquam.

Secunda conclusio: quamvis basilica, aliquantulum evidens sit, ob nervum tamen, & arteriam, nisi sit evidens, eam non esse secundam.

Tertia conclusio, æquè cephalicam, basilicam respicere hepar, ut ostendimus, antequam summam huius tertio lib. imponamus coronidem; quare in omni casu ratione hepatis, & cuiusq; visceris à cephalica sanguinem haurientes eam colligemus utilitatem, perinde ac à basilica, præterquam ubi aliquis vellet reuellere, vel derivare à loco circa mammillas; quoniam post ortas cephalicas, & basilicas ab exteriori iugulari, à basilica propago exoritur, quæ exporrigitur ad mammillas usque, & hæc sunt illæ venæ, quæ in mulierum mammillis nigrae, & tumidae aliquando apparent.

Præterea, ut exemplis ostendamus, quati sit hæc partiū progressus contéplatio, & quot errata contingant ob huius progressus inscitiam, aliquot chirurgorū sed errata afferamus, dum in apostematibus aperiendis ignorant fibrarū progressum, sed quia musculorum fibræ, vel progrediuntur in tactum, vel transversim, plus, vel minus, de musculis transversis, qui immediate sub cute progrediuntur, qui pauci sunt, agendum; quoniam cognitis transiectis, subintelligimus ceteros non

non conumeratos recta progredi, & sectiones in ijs in longum esse faciendas.

Scias prius musculos duos frontis habere fibras rectas, vt notat Vesalius, quauis neget Columbus, hos musculos habere fibras rectas lib. 5. capite de musculis frontis: errare enim videtur Columbus, quoniam experientia visum fuit, quando ob frontis inflammationem, vel ob alias causas, qui transversum secauerunt fibras, statim motum attollendi supercilia fuisse ablatum, quod non sequeretur, nisi fibræ essent rectæ, transversalis enim incisio ledere non potest fibras transversas: quare errant illi, qui transversum incidunt musculos frontis.

Errant quoque chirurgi ob incertam progressus fibrarum primi musculi brachij, dum secant in longum in osse pectoris, quia fibræ transversum progrediuntur, musculus enim primus brachij exoritur ab osse pectoris, & tendit ad humerum, in hoc musculo si inflammationes, & abscessus fiant, & profundè aperiendi detur occasio, si minister in longum secaret fibras, officium huius musculi, quod est adducere brachium ad pectus, deficeret, vel saltem, cum in latissimo hoc musculo omnes non possint abscindi fibræ, diminutè ageret suam munus.

Simili modo si quis in rectum incidere musculum quartum circa os sacrum, vnde exoritur, tolleret, vel diminueret eius officium, quod est trahere deorsum brachium.

Quare si quis errare non vult in apostematibus atque aperiendis obseruet incisionem, vel sectionem semper esse faciendam versus principium fibrarum, quia hoc modo secando nunquam officiet, quod non potest sciri sine diligenti anatomice cognitione, quia licet pauci sint musculi, qui transversum progrediuntur, vt musculi frontis, & primus, & quartus brachij isti sunt obseruandi, ceteri vero serè omnes in rectum progrediuntur.

Suntque nonnulli exiles musculi, & qui aliquo modo obliquum progressum habent, qui nisi incidantur ad vnguem versus suum principium amittunt suum vsu, veluti est primus musculus tibie, qui oritur à suprema illius parte, & inseritur in anteriorem partem tibie: tunc si ali-

quis illum altè secaret in longum; sed versus aliud crus, secaret fibras, & virtutem musculi destrueret.

Denique se offert aliud exemplum errorum empiricorum, dum nesciunt quæquinq; paria nervorum, vena basilica, & arteria axillaris simul progrediuntur: à quatuor quinque colli vertebri, & à prima thoracis quinque paria illa nervorum oriuntur, quæ mirabile illud brachiorum rete constituunt, quod cum vena maiori, & arteria axillari progreditur sub clauicula per internum processum scapulae; quorum vasorum omnium progressu præuiso, atque præcognito, nos plurimos cognoscemus específicos affectus, qui omnino laterent sine hac præcognitione.

Verbi causa, si quis in scapulae interno processu profundè sit vulneratus: quo pacto chirurgus nesciens progressum horum vasorum scire poterit hoc particulare, & specificum, an scilicet vulnus sit lethale, nec ne: nullum ingenij acumen sine cognitione progressus de vulneris exitu aliquid scire poterit.

Qui verò nervorum rete cognoscet illac, id est per internum processum scapulae progredi spatium, & inde exitum ob tale vulnus præuidebit.

Qui illac transire basilicam, & simul videret hæmorrhagiam, pronuntiabit non fore, vt supprimatur, sed vt totus profundatur, & vita cum morte commutetur.

Qui arteriam axillarem illac progredi animaduertit, eam ob magnitudinem vulneris necessariò indicabit esse læsam, pronuntiabit fore, vt exiliat totus spiritus, & mortem vsquequaque esse pertimescendam; quare inferas in omni cognitione, & operatione specifica, & singulari esse perquirendos vasorum, vel fibrarum progressus; quoniam læpissimè cognitio, & curatio ab hoc principio proficiscitur.

Postremò, ne omitam alium nonnullorum abusum, qui similiter contingere solet ob venarum progressus incertam, dico esse illum empiricorum proprium, dum narium hæmorrhagiam suppressere conantes, fronti valentissima attingentia adiungunt, credentes illum sanguinè à naribus exeuntem & venis frontis profluere, quod est falsissimum, quoniam non

à frontis uenis prouenit ille sanguis, sed ab internis uenarum furculis, ad quas uis illa astrictoria nullomodo peruenire potest.

Colligas ergo præcognitionem progressus uasorum tam in cognoscenda, quam in facienda medicina esse adeo necessariam, ut sit omnino impossibile sine ipsa rectè cognoscere, & rectè curare affectus præternaturam.

Progressus non solum partium corporis est præsciendus, sed qua uia humores progrediantur, exempli causa Auic. putat, melancholiam à splene ad uentriculum ferri per uenam coronariam ad os uentriculi. Galenus 3. de fac. nat. cap. 13. uult à liene ad omētum ab hoc in lactes, mox in pylorum, inde ad fundum uentriculi. Quo progressu supposito si melancholia nimium regurgitaret, possemus uti medicamento deorsum ferente, & & euacuante ipsam per aluum: hoc modo melancholia uentriculū non laderet.

Exempla errorum ob numerum partium corporis ignoratum. Cap. XIII.

INter cōditiones, quæ nos docere possunt naturam specificam affectuū tā naturalium, quam præter naturam, est partis uiuentis numerus; hinc uarij committuntur errores ob numeri inscitiam; quoniam aliquādo additur numerus aliquibus partibus non addendus: ueluti (ut in exemplis famosis insistamus) Galenus addere uidetur glandulam amplectentē infernum orificium uentriculi, quam nemmo anatomicorū, quod sciam, uidit unquam in humano cadauere, quod si quis non credat, eat, & uideat.

Audias deinde in quot errores ex falso supposita glādula quis serpere potest; concepta igitur ab aliquo hac fictitia glādula, ille necessarīo imaginabitur, glādulam quoque esse sedem multorum affectuū, supposito hoc, necessarīo proponet pro fictitio morbo pellendo uaria irrita, & uana medicamenta, sicuti faciunt illi, qui credentes sub mucronata cartilagine esse os uentriculi, uarijs modis, & importunis remedijs, illam partem ab ore uentriculi remotam uexant.

Errant non solum, qui partibus uiuen-

tibus addunt numerum nō addendum, uerum etiam errant, qui demunt numerum; ueluti errare uidentur nonnulli dicētes in lienē nec arterias, nec uenas adesse, quæ sententia uidetur falsa, quoniā apertissimè obseruatur, uenæ, quæ uestiūt totum lienem, plurimas, & copiosissimas esse, quæ omnes à uena porta exoriūtur: deinde copiosissimè obseruantur arteriæ, quæ ab Aorta sub septo transuerso mittuntur in splenem, ut à uenis nutrimentum, & ab arterijs uitam suscipiat: hoc experientia, & auctoritate anatomicorum comprobatur: quæ cum ita sint, quis ex hoc concepto numero uenarum, & articularum splenis non admitteret, numerū conferre ad specificam affectuum cognitionem, & curationem?

Numquid non scimus specificas, & ultimas affectuum differentias, quando eius principia, & causæ habentur? an ne qui sciunt esse uenarū furculos, & articularum in splene, sciunt modum, & principium, quo in uiscere colligūtur humores? quoniam perquirimus exordium illarum uenarum; quod sine anatomia fieri non potest, cognouimusque exordium esse uenam portam: inferimus deinde, si à uena porta illi uenarum furculi trahit initium, ergo abundat humor melancholicus, & crassus; quoniam in uena porta naturaliter crassus detinetur, uel quia non potest exiles meatus hepatis peruadere, uel quia à parenchymate hepatis non attrahatur, ideo retinetur.

Deinde cognito numero uenarum, & exordio, inferimus specificum, & particularem modum curandi splenem, deriuando, uel reuellendo humores fluxos, fluentes, & fluxuros in splenem, per hyrudines applicitas hæmorrhoidibus.

Quoniam à porta uena hæmorrhoides trahunt initium, ut maxima sit communicatio, & sympathia inter splenem, & hæmorrhoides; uel per cucurbitulas applicitas natibus, quæ induuntur uenis portæ; & præcipuè sinistre parti, quæ irrigatur quadam propagine uenarum ingredientium splenem; quæ immediatè & naturaliter respicit splenem.

Demum ex concepto hoc numero uenarum splenis, pleræque plures difficultates de medio asseruntur, symptomatum

tum causę inueniuntur, & errores rudiorum medicorum illicc cognoscuntur.

Quare, vt exemplis omnia, quę dicuntur, elucescant, est relata à Columbo, & Valuerde, Historia illa Cardinalis Cibō, qui ob vomitum copiosissimū sanguinis edidit extremum spiritum, genus seccto ca dauere, statim, vnde d. fluxisset sanguis, visum fuit; quoniam dam comprimiebant splenis regionem, ad orificium ventriculi sanguis restagnabat, quare admoniti à splene ad ventriculū mitti propagines venarum, irrigantes tum supernam, tum infernam partem, inuenerūt à splene læso sanguinem fuisse perfusum; quare si quis nesciisset splenem esse venarū numero exornatum, nullo modo potuisset in huius fluxionis causę cognitionem peruenire, qui vero venarum numerum splenis, & exordium sciuisset, & progressum, potuisset non solum inuenire illius vomitus vehementissimi causam propriam & specificam, verum etiam quopacto sanguis potuisset reuelli in contrarium, inuenisset: quoniam ille cognouisset reuulsionem per hæmorrhoidas esse faciendam, non per cubitum, vt rudiores medici affecto splene facere solent seccto saluatellam, perinde ac saluatella à splene pendere, cum nulla sanē sit sympathia inter cubitum, & splenem, neque vlla propago venarum causę venę irriget splenē, vt omnino sympathia lienis cum cubito nulla sit, vtilitas tamē splenis, quę aliquando à seccto saluatella sequitur, est quia iecur subleuatur à sinuissima illa euacuatione, quo adiuto, facile omnia viscera hauriunt emolumentum.

Exempla errorum ob compositionem, vel connexionem ignoratam. Cap. XII.

Sequitur alia partium nostri corporis conditio, quę nos docere potest específicos affectus, estq; compositio vel connexus, qui prædicatur de diarthrosi, synarthrosi, & symphisi, quare de ossium, vel cartilaginum compositione, vel vnione vel connexu est loquendum, cum his partibus solum connexus conueniat; si igitur partes vniantur simul, & habeat motum manifestum, vt habet femur cum tibia, vel vna cum illo appellabitur hæc

Synchondrosi, & diarthrosi Part. I.

compositio, vel connexus Ginglymos.

Si verò vniantur partes & cōponantur habeantque motum obscurum, ut quędam ossa brachialis inter se, & tali os cū calce, appellabitur synarthrosis, uel unūtur, & nullum habent motum nec manifestum, nec obscurum, & appellabitur hæc compositio symphysis, sed quibus generibus nare sunt species, de quibus omnibus singulatim nō est agendum, cum munus hoc ad anatomiam pertineat, nostrum enim est compositionem partium proponere, ut ex hac cognita cōpositione específicas quasdam differentias affectuum cognoscamus; & ceteras uniuersas animaduertamus: sed exequamur propositum secundum stylum, quem ab initio pepigimus, exemplis errorum illustrando hanc conditionem expendendam in ossium, & cartilaginum compositione.

Errare igitur videntur nonnulli credentes decidere mucronatam cartilaginem, quam aliqui appellant gladiolum, uel leuitiformem, & Arabes malum granatum; credunt enim empirici, & mulieres deorsum cadere hanc cartilaginem, cuius casu plurima symptomata inde cōtingere exillunt; deinde ex hac falsa suppositione hauriunt indicationem attollendi collapsam hanc mucronatam cartilaginem; & quod deterrimum est, se exponunt mulierculis, & infimis empiricis, qui conantur manibus trahere sursum benē constitutam cartilaginem, & topica affigunt importuna, & extranea, quibus ægrotos lacerant & in perenni detinent fastidio.

Causa verò huius erroris est, quia non expendunt compositionem, & connexionem huius mucronatę cartilaginis, an uidelicet sit composita, & unita ceteris ossibus superioribus per diarthrosim, uel per synarthrosim, uel per symphysim, quid si expendere, facile specificam cognitionem scirent, an possit decidere nec ne. Modus verò, quo hæc compositio expendi, & cognosci possit, defumitur tū ab anatomice experientia, quę acquiritur in cadauerum diligentissima sectio, tum ab Anatomicis præstantissimis.

Sciunt ergo per experientiam, & ex omnium consensu mucronatam cartilaginē adeo uni partibus, quibus, annexa

tur, & adeo esse imo pectori connatam, ut diuelli non possit, nisi cum violentia: quare colligimus, hanc compositionem non esse diarthrosim, quia hæc compositio supponit motum manifestum, qui non potest seruari in his partibus hoc modo connexis, & colligatis, erit ergo vel composita, & unita per synarthrosim, quæ motum obscurum supponit, vel per symphysem, quæ compositio nullum prorsus supponit motum manifestum, vel obscurum, omnia enim, quæ fortiter adherent alijs partibus, & quæ cum primis sunt annexa, & colligata, dicuntur esse composita, vel connexa per symphysem, vel per synarthrosim.

Dicas igitur, mueronatham cartilagineam non componi, vel connecti per symphysem, quoniam species symphyseos, vel sunt uniones, & compositiones factæ per futuras, ut sunt futuræ commissuræ coronalis, & sagittalis, quæ in serræ modum sunt, vel sunt uniones per harmoniam, ut est ossium unio per simplicem lineam, ut sunt commissuræ maxillæ superioris, & præcipuè commissuræ, quæ in naso habentur, hæc verò cartilago cum ossæ pectoris non vnitur neq; in serræ modum, neq; per harmoniam, vel per simplicem lineam, sed unitur intermedia cartilagine, ergo hæc unio motum obscurum supponit, & vocabitur compositio per synarthrosim, non erit tamen talis, quæ cadere deorsum possit, quinimo adeo est unita, ut in cadaueribus, nisi cum violentia diuelli possit.

Errant dum dicunt caudam, quæ est ultima dorsii portio, quam coccygem uocant non posse in parturientibus loco moueri: lagax enim & prouida natura instituit & parauit omnia illi instrumenta, quibus ad exoptatum finem agentia in suis obediendis muneribus peruenire possunt, ideo parturientibus tanta mole refertis posuit inter primum, & secundum os coccygis maiorem cartilagineam, quæ in uiris, ut in enixu & fætus conatu cauda possit aliquantulum dilatari, & loco dimoueri, ut aditus fieret patentior, non tamen sine cruciati insigni parturitium; quare compositio caudæ mulierum eum ossæ sacro est synarthrosis, quia cauda flectitur, & laxatur uersus postèriora;

in hominibus uerò, cum magis sit connexa & cartilago qua componitur coccyx cum ossæ sacro sit minor; & propterea motum non supponat, ideo potius est dicenda compositio per symphysem facta, quam per synarthrosim.

Postremum exemplum errorum, quod proponimus pro cognoscendis his compositionibus, est, dum mulieres, uel emipici credunt in parturientibus dextram partem ossis pubis à sinistra dimoueri; quæ opinio præcipuè in omnium mulierum animis est inueterata, illæ enim credunt non solū in parturientibus dextram partem ossis pubis à sinistra dimoueri; sed omnia ossa è suis sedibus exilire; Qui igitur uellent certissime cognoscere, an errent mulieres in hac re, nec ne, uideant in anatome, quomodo ossa pubis sint simul composita, quia illis subito uisis sine dubio asseuerabunt nullam symphysem esse posse in humano cadauere maioris nexus, quam sit ista: quoniam dextra pars ossis pubis cum sinistra adeo fortiter coalescit, ut cultro, uel scalpello non possit sine difficultate separari; Quare cum hæc compositio pubis non supponat motum, à synarthrosi, & ab artrodia toto cælo distabit, & vocabitur symphysis, quod opinionibus mulierum relinquitur.

Si uertebra quæ dicitur dens à dentis similitudine in magna luxetur affectus ille anginosus est omnino incurabilis ut admonet Hipp. 2. Ep'd. ab hac uertebra fit motus anuendo & renuendo. Qui igitur connexum huius uertebrae non nouit, dum luxabitur nesciet certè prædicere mortem uel breui aduenturam: causa mortis est quia dum luxatur hæc uertebra facultas animalis influens in spinalem medulam intercipitur, unde necessatio moriuntur.

Exempla ob exordium uasorum, uel partium corporis ignoratum.
Cap. XV.

Sequitur in præsentia, unde necessario aliquot exempla errorem, qui à rudioribus committuntur ob exordium uasorum, seu partium corporis ignoratum: Ceterum, quicquid egimus in secundo lib. de

exordijs musculorum, & nervorum; hic de quibusdam uenarum exordijs ab empiricis ignoratis tractabimus, ut exēplis omnium generum errorum illustremus decem propositas conditiones, quæ dant esse specificum affectibus omnibus.

Agamus igitur, an à diverso siphite exoriantur basilica, & cephalica, quia satis uetusta, & ad hanc usque diem in plurimorum medicorum animis inueterata est opinio, quod scilicet cephalica, & basilica uena oriantur à locis ualde diuersis; dicunt enim uetusissimi medici (qui forsitan sua auctoritate fuerunt causa huius cōmunis erroris) cephalicam originē ducere à iugulari exteriori, basilicam uerò à uenarum trūco magis hepatis propinquo, qui excurrit ad axillas sub clauiculā iuxta primam costam; hinc supposita hac differentia exordij uenarum cubiti non est mirum si nostrates tam sepe digladiantur in ærotantibus curandis, an scilicet cephalica, uel basilica sit secanda.

Isti enim qui in Præceptorum placitū intrant, & qui plus auctoritati, quam sensibus ipsis deserunt; dicunt in affectibus capitis esse eligendam cephalicam, basilicam uerò esse despicendam: In affectibus uerò iecoris uersa uice, scilicet basilicam esse secandam, & nequaquam cephalicā; sed quod deterrius est, tam seuerè ministro præcipiunt, ut modò basilicā, modò cephalicam aperiant pro diuersa morbi opinione, ut debeant sæpe se exponere ad secandā nenam à medico propositam, quāuis omnino deliteat; quinimò coacti à medicis debeant æcorum more experiri, an suo gladiolo possint eam inuenire; ut non sit mirum, si aliquando contingat, ut inaniter feriant bis, & ter lætrem uenam magno cum ægotantium in commodo; quinimò si loco basilicæ secaret cephalicam, omnes enim cum arguerent, & exploderēt, & si exitium ob alias etiam causas internas contingeret, non deessent insani medici, qui necem acceptam omnia referrent ministro.

Expedi igitur huius inneterati erroris radicem amputare experientis anatomie, & auctoritate anatomicorum; experimētis, quia quisque cognoscer cephalicam, & basilicam ab unico puncto, & ab unica concauitate uenæ iugularis simul

enasci, si ad humana cadauera secanda se transtulerit, & ramos illos examinauerit & ad proprios oculos exordium illorum ramorum, tamquam ad proprios iudices detulerit; tunc uidebit, quod Galenus, cui non licuit secare humana cadauera, forsitan non potuit uidere.

Quod autem uerum sit, Galen. in humanis cadaueribus secandis nō fuisse uersatum, antequam ulterius prouehamur, hoc ostendemus, cum multi sint, qui credant, Galen. in secandis humanis cadaueribus fuisse uersatissimum. Legamus igitur librum primum de nat. administ. capit. 2. ubi fatetur, se toto iuxta suæ cūritātum duo uidisse humana cadauera admodum imperfecta, quoniam alterū eorum post aliquot menses sepultum à cuiusdā fluuij impetu fuit delatū ad ripam quandam; alterum erat latronis cadauer à corvis biduo dilaniatum, in quibus cadaueribus imperfectissimis non potuit omnia uidere: etenim si Gal. ut bis nostris temporibus, datū esset, ut corpora humana disseccare potuisset: non esset negandum, quin multo diligentius, quam hæcenus factum fuerit, de hac humana fabrica scripisset.

Nec mihi obijciant, quod omnino temerarium sit, Gal. reijcere, quia respondemus ex propria Galeni sententia 6. de morb. uulg. com. 2. citat: illos potius, qui magis credunt auctoribus, quā experientia, & rationibus, esse temerarios hinc in lib. de libris proprijs Galenus uocat seruos illos, qui hippocraticos, uel praxagoreos se nominant, & secundo methodi Tyranicam doctrinam contentionis, & confisionis plenam illorum, qui dicti a. liorum nituntur ut aperte à uestigijs Galeni recedant illi, qui pluri faciant sententiam Hippocratis, uel aliorum, quam experientiam.

Præterea Aristot. 8. phys. text. 22. dicit, quod illi, qui dimitunt sensum, & rationem quærun, sunt exordes; nos uero addimus, multo magis illos errare, qui sensum ob auctoritatem hominū dimitunt, quia semper apud Galenum, & apud omnes philosophos pluri est faciendū ratio, quam auctoritas: quamuis hodierno die in plurimis Europæ Gymnasijs hæc insania inuale scat, ut magis Ari-

stoteli, Galeno, & Hippocrati credant, quam sensibus proprijs.

Audias vnum, quod non possum subtrahere de quodam nostri temporis peripatetico Gymnasiarcha, qui in philosophia Aristotelis cōsensuerat, is enim videns in Anatome publica venam cauiam multis, & innumerabilibus filamentis, & radicibus cū ginem trahere ab hepate, longo verborum apparatu publicè fatebatur, venas, quo ad sensum poterat sane negare filamenta esse radices ab hepate trahere ortum; sed cum dicat Aristot. venas a corde prodire, addidit quasi suffusione obtenebratus, magis auctoritati Aristot. esse tribuendum, quam *Aristoteli* & proprijs sensibus; dixitque facilius fore, vt sensus nostri decipiantur, quam Aristoteles.

Insuper idem philosophus, cum videret in corde pinguedinem, & eam ad cādelam liquecere, nihilominus vt defenderet Aristotelem negantem pinguedinem esse in corde, audebat quoque in præstantissimorum hominum cetū negare illam esse pinguedinem, quod illis, qui proprijs sensibus sibi constituerant philosophiam addicere, fuit maximæ admirationi, videre scilicet philosophum Gymnasiarcham magis ad auctoritatem, quā ad sensum deferre, tanto magis cum ipse Aristoteles secundo post. circa finem, & primo metaph. dicat a sensibus omnes sententias habuisse exordium; videas igitur in quot absurda incidant, qui iurant in placita magistri.

Quocirca, si vnica est Aristotelis, & Galvov, vt sensibus ipsis magis sit danda fides, quam rationibus, & auctoritatibus virorum, cur, si Gale. aduerfabitur sensibus, ipsum rejicere non poterimus? nunquid non Gale. fuit homo? an ne hominis proprium est errare?

Audias verba Gal. 2. lib. de compositione Med. secundum locos cap. 8. edita hoc ornatu; difficile. n. est, vt qui homo sit, nō in multis peccet, quædam videlicet penitus ignorando, quædam verò malè iudicando, & quædam tandem negligentius tradendo; quare fuit possibile, vt Galen. vel quia fuit homo, vel quia non secuit humana cadauera, in anatomicis a veritate in paucis saltem desisteret; quare cū

Gal. neque meus fuerit affinis, & consanguineus, vel maiorum meorum auunculus, quod sciam, neque in sanctorum catalogo sit collocatus, qui aistatus diuinitate fuerit locutus, non video, cur omnes non possint honorificè, si sensibus aduerferetur, eum relinquere.

Cōcludimus ergo ex ijs, quæ sunt sensibus manifesta, basilicam, & cephalicam ab vnica concauitate venæ iugularis exterioris prodire, quod quoque confirmant omnes anatomici, qui quotidie cadauera dissectant.

Hinc Falopius his verbis suum sensum declarat, a vena magna duas magnas propagines excurrere ad brachia, alterā ad dextrum, alteram vero ad sinistrū sub clauicula iuxta primam costam vsque ad axillas, in qua parte diuiditur vena magna in duos ramos, quorum alter facit cephalicam, alter verò basilicam, vt vnicū tamen sit exordium, vnicum centrum, à quo fluunt cephalica, & basilica, & quamuis Falopius, & Vetalius de progressu harum venarum digladiantur, & sint discordes, attamen in hoc conueniunt cephalicam scilicet, & basilicam ab vno puncto prodire.

Quare audias Falopium, qui iterum his verbis vnicum venarum cubiti exordium fatetur: patet in quo pelago versentur Medici anatomices imperiti, qui in secanda vena in affectibus capitis tam magnū promunt discrimen inter humerariam, & axillarem, ac si illæ ab eodem ramo non prodirent.

Sim lites Vesalius, & Columbus, & ceteri præclarissimi anatomici omnes affirmant, cephalicam, & basilicam ab vnico puncto prodire, vt in schemate ab illis diligentissime obseruato, à nobis, in sequenti capite proponendo videre possumus: quia ab illa communi concauitate, vbi est in vel in vtroque brachio exoritur cephalica, & basilica, quod cum ita reuera sit, secetur basilica, vel cephalica in hepatis, vel cerebri passionibus quod eadē utilitas, & idem fructus sequetur, postquam ab unica concauitate existente in iugulo debeat sanguis necessariò prodire; quare nostrum plurimum male agunt, dum semper chirurgos uexant, ut modò basilicam, modò cephalicam secant.

Hinc

Hinc errant Mundinus, & Quinter-nius in sua institutione, & quamplurimi alij veteres, & moderni; qui voluerunt potius errare cum vulgaribus medicis, quam sensibus proprijs credere, dicen-tes, basilicam sub axillis suam habere, exordium, cephalicam verò iugulari ex-teriori.

Videntes igitur aliqui ex modernis anatomicis cephalicam, & basilicam à com-muni concavitate re vera prodire, valde laborarunt, & multum studij posuerunt, vt modum aliquem inuenerint, quo pos-sent communem opinionem defendere, quæ erat, quod cephalica magis respon-deret cerebro, quàm basilica, inuenerūt, quod paullulum supra hoc cômune exor-dium iterum ab eadem iugulari ramulus quidam mittatur, qui deinde infra com-mune exordium adnectitur cephalicæ ve-næ, ex qua observatione colligunt, cur cephalica magis capiti conferant, quam basilica.

Verum hoc cephalicæ patrociniū nul-lus est cōsiderationis, cum quia adeo rarò in cadaueribus ramulus iste inuenitur, vt in mille vix vnico accidat cadaueri, vt obseruant illi anatomici, qui liberè philo-sophantur, cum, quia ramulus iste à recē-tioribus obseruatus est capillaris propa-go: Quare neque ob ramulum hunc in-uentum, qui adeo rarò obseruatur, vt po-tius inter monstrosa sit ponendus, debe-mus nos in affectibus capitis apertam, & obuiam oculis, & manibus ministri ba-silicam relinquere, & cephalicam abscon-ditam quærere, vel versa vice in hepatis affectibus quærere basilicam latentem, quando cephalica, vel saltē mediana, conspicua redditur: tãto magis, quãto tu-tius fecari potest cephalica, quia sub ipsa neque neruus, vel arteria maior excurrit.

Neq; obieciat aliquando fuisse in-uentum, non oriri cephalicam, & basilicam ab eadem concavitate, & propterea eue-nire posse, vt antiquorum sententia de harum venarum exordio verificetur.

Quia occurrimus in hominis fabrica aliquando accidere monstrosa, vt non solum basilica à loco sub axillis exordiri possit, verum etiã dicimus hepar (vt rela-tum est) si quando fuisse inuentum in parte sinistra, splenem vero in parte dextra.

Arist. 7. de hist. animalium, cap. penultimo, & 4. de gen. anim. 4. refert inuentū fuisse lienem in parte dextra: verum de ijs, quæ rarò apparent non est seruanda norma: certum est, quod ex mille, quæ dissecan-tur cadauera, noningenta, & vltra for-tiantur basilicas, & cephalicas venas exortas à communi concavitate iugula-ris exterioris.

Præterea est communis rudiorum me-dicorum sententia, quod saluatella exor-diatur à vena basilica, vena verò existens inter indicem, & pollicem à cephalica, quorum sententia cum sit hausta potius è triuijs, & circulis empiricorum, quam ab anatomicis auctoribus, vel à diligenti dis-secctione cadauerum, est rejicienda, quoniam hac supposita falsa sententia, & sup-posito quod cephalica ab alia concavita-te exordiat, quam basilica, eadem se-quuntur difficultates in secandis venulis his, sicuti diximus superius de ijs, quæ iunt in cubito.

Vera igitur opinio est illorum homi-num, qui toto vitæ suæ curriculo dissecue-rūt humana cadauera, qui vnanimiter di-cunt, venas irrigantes manus à communi vt plurimum exordiri; audias capit. 8. de venis, & arterijs cap. 8. dicentē à cōmuni vena, postquā à coalitu cephalica, & basilicæ constituta est, mox ab ipsa communi descendente duæ oriū-tur propagines, quæ deorsum excurrētes demum vestiunt summam manum; altera enim ex illis saluatellam facit, quæ cre-dunt vulgares esse hepaticam; altera pro-pago dicta communis venæ, quam me-dianam vocant, excurrrens versùs digi-tum medium facit illam venam, quæ est inter indicem, & pollicem, quam imperiti arbitrantur esse cephalicæ surculum.

Idem dicit Falopius lib. 4. suæ institu-tionis, & ceteri præclarissimi anatomici quod scilicet venæ illæ summæ manus exordiantur à vena communi, & nequa-quam à cephalica, vel basilica; quare con-cludimus, & nos saluatellam, & venam, quæ est inter indicem, & pollicem à vena communi; vel mediana, vt plurimum, exordiri.

Hinc errant Arabes, & nostratū pluri-mi, & inter hos vanissimus ille Oenobar-bus credentes spleni sectionem saluatellæ

prodesse magis, quam sectio venę existentis inter indicem, & pollicem; errant enim isti dupliciter, primò quia vena saluatella, & ea quę est inter indicem, & pollicem à mediana prodeunt tamquam à communi trunco.

Errant secundò, quia dato, quod saluatella à basilica prodiret, & alia à cephalica quid tum? an ne cephalica, & basilica à communi concavitate iugularis venę exterioris oriuntur? quomodo ergo saluatella præcipuè splenem iuuabit, vel præcipuè hepar, cum utraq; vena hepar æquę respiciat.

Quare medici, qui disputant à qua vena manus in ægitudinib. melius sit, sanguinem euacuare, tempus conerūt, imò aliquando hac ignorantia ducti frustra fecant propaginem occultam, & inaniter feriant patientem absque eo quod sanguinis euacuatio fiat.

Præterea, quamvis, vt plurimum verum sit, saluatellam, & illam, quę est inter indicem, & pollicem, exordiri à mediana, attamen aliquando furculi isti venarum irrigantes manus faciunt tam varios, & diuersos implexus, vt eadem origo semper seruari non videatur, sed nos loquimur de ijs, quę vt plurimum contingunt.

Hinc Valuerdes dicit quod aliquando cephalica iungatur basilica, & statim suū amittit truncum, cū desinat in furculos, & distribuatur in venarum ramos, vt nō conspiciatur eadem venarum series idem sit, & idem venarum numerus.

Quinimò Vesalius de ijs furculis loquens, dicit inter quamplurimos homines vix duos æquali, correspondentiq; venarum in ramos distributione inueniri, cū in singulis varię sint venarum manus distributiones, quę tamen distributiones, vt diximus, vt plurimum à mediana oriuntur.

Qui dicunt, venas cubiti dexteri melius euacuare hepar, quam sinistri, videntur ignorare exordium venarum brachiorum. Cap. XVI.

Receptum videtur esse apud omnes, tamquam suppositum, quòd venę cubiti dexteri scilicet basilica, cephalica, &

mediana sint hepatis proximiores venis illis quę irrigant cubitum sinistram, propterea dicūt, sanguinis missionem à dextro brachio factam maius habere momentum, quam è sinistro in hepate euacuando, & refrigerando, & à cæteris affectib. preseruando: & sectam basilicam sinistri non eodem modo deplete sanguinem hepatis vt dextri.

Quod commune commentum, vel falsa sententia ed est perducta, vt sepe cogitauerim, neq; ipsam reiicere, sed opinionis meę vestigia obliterare, sententique obliuisci, & ad flammam dare hanc paginam; quia lectores videntes me cæteris omnibus auctoribus reluctari, facile despexissent, & floccifecissent nouam hanc sententiam; verum hoc me non deteruit quoniam ab initio pepigi vnam veritatem liberè sectari, & omnia satius pati, quam subterfere illud, quod rationibus, & sensibus ipsius obuium & apertum sit.

Quare exequatur propositum, & ostendamus æquę posse depleri vel refrigerari iecur, ob sectum cubitum læuum, quam dextrum, & vnas cubiti dextri non esse hepatis proximiores, nec magis iuuare quam venę sinistri cubiti, vt igitur hoc ostendatur, duo sunt supponenda fundamenta.

Fundamentum primum omnium manifestissimū est, sanguinem è vena cubiti egredientem ad cubiti venas esse missum primo à iugulari, & deinde ad iugularem venam à magno trunco, & ab hepate, vt ob sectum cubitum sanguis existens in caua vena, & in hepate prius ascendat ad communem concavitatem, & deinde ad iugulum, & a iugulo ad cubitū, antequam per sectam venam egrediatur, vnde iccore hoc modo exonerato sarcina, qua premebatur, veluti ilabello ventiletur, & cetera sequantur beneficia quorum meritò, deinde possint mala valetudines superari, & depelli; an ne est verum hoc fundamentum? subest ne in verbis scrupulus? mihi adeo certum esse videtur, ut nulla indigeat probatione.

Quinimo adduci non possum, ut credam inueniri posse hominem, qui reiiciat hoc secundum fundamentum quod assensu omnium philosophorum, & anatomicorum confirmatum est, quòd scilicet ue-

tra caua omnium maxima, cum primum exporrecta est ad iugulum nō magis vergens ad dextrum, quam ad sinistrum brachium bipartitur in duos insignes ramos, vt alter ipsorum diffundatur in brachium sinistrum, alter in dextrum, tamquam caudex in ramos, & deinde isti rami maiores in furculos vocatos cephalicos, basilicos, & communes, & communes venę, vel medianę tandem in germina desinant constitutientia saluatiellam, & ceteras summę rami propagines.

Iactis his fundamentis, non video, cur dici non possit, per sectum cubitum sinistrum æquę iuari hepar, vt per dextrum; quoniam, si sanguis, qui euacuatur per cubitum à venis dilabitur, & ad illas venas mittitur à trunco maiori supra iecur existente, & verum est, tunc iecur subleuari; quia cava vena depleatur, æque vt diximus, auxiliabitur per cubitū sinistrū; quia non magis distant venę cubiti sinistri a trunco maiori, quam distant dextri.

Diuiditur enim truncus faciens venas brachiorum in iugulo, & non magis vergit ad dextrum, quam ad sinistrum brachium, vt omnino æqualis sit distantia, quinimō vbi est cor in læuam partem potius flectit maximus truncus, cogimur ergo inferre ab hac sensata hypothesi æquę hepatis auxiliari sectum sinistrum, vt dextrum.

Sed vt melius veritas appareat experiamur, an res hoc modo se habeat in ischemate obseruato quoque ab anatomis præclarissimis, in quo videmus in ambobus brachia æquę bipartiri, & sanguinem mitti ad uenas cubitorū; nemo sanē audebit asserere; quod detur alia vena, quę mittat sanguinē ad illas uenas cubitorū, quę sit hac breuior; an ne ramus excurrentis ad sinistrum brachium est eiusdem longitudinis cū ramo perreptans ad dextrum brachium? quare si distantia maximę venę quę ad iugulum exporrigitur in parte dextra sit æqualis alteri distantię quę est in parte sinistra, sequitur, quod vniū cubiti sinistri eodem modo proximę sint iccori, vt dextri, ergo sanguis extractus à cubito sinistro æquę ac à dextro hepar iuuabit, quod est illud, quod erat probandum: reliquum ergo est, vt libere communent sententiam, quę negat bra-

chium sinistrum hepatis auxiliari, vt dextrum, dimittamus.

Nec statim obijciant dextram partem esse hepatis proximiorē sinistrę, quia occurrimus, nos debere considerare vasa per quę excurrit sanguis, quoniam sanguis insensibiliter non euacuatur, sed cum sit sua natura crassus, & mistus humoribus debet per vasa sensibilia, vt sunt venę, euacuari, quare nos distantiam volentes metiri, necessariō debemus venas ipsas metiri, quę cum non sint proximiores in dextra, quam in sinistra parte, ideo sectum sinistrum cubitum æquę iuuabit, vt dextrum.

Neque primō obijciant dicentes, experientiam iam docuisse, quod sanguinis missio facta à dextro cubito maius emolumentum afferat, quam à sinistro.

Neque secundō obijciant, naturam reuulsionis nos docere, quod ex eodem latere sit euacuandum, vt seruetur rectitudo; quare cum hepar sit in parte dextra: si fiet reuulsio ab eodem latere, ei certo auxiliabitur, quod non eueniet, si à sinistro cubito euacuabimus.

Primā obiectioni respondemus, non esse eundem inficias, experientiam hæcenus nos docuisse, sectionem cubiti dextri auxiliari hepatis, verum, dum inferunt, ergo sectio sinistri cubiti æquę auxiliari non poterit hepatis, nos negamus consequentiam; quoniam nunquam potest colligi negatina ex puris affirmatiuis, nisi in contradictorijs; in ipsis enim eadem est disciplina; quare, qui non fidunt rationi desumptę ab anatomia (quę scilicet ostendit clarissimē, truncum maiorem existentem propē iugulum æquę à dextro, vt à sinistro distare, & per consequens æquę hepar iuari à sinistro, ut à dextro brachio) longo temporis spatio experitur in affectibus hepatis sinistrum cubitum, & summam quoque in hac experientia obseruanda adhibeat diligentiam, hæc tamen conditione obseruata, ut spoliēt & exuat se antiquę opinionis beneuolentia, quoniam solum hoc modo à multis experientis illibatum iudicium colligere poterit.

Præterea non solum experientia est periculosa, quia primarū opinionum amor est impedimento, ne in nouo experimen-

to veritas cognoscatur, verum etiam, quia experientia re vera est paralogismus, nisi seruentur illæ conditiones, quas declarabimus in lib. de analogismo; est paralogismus, quia est argumentum, quod procedit à particularibus ad vniuersale, & est tale, vt in duos errores semper incidat, quorum primus est, dum inferitur in conclusione, quod non est in præmissis, secundus vero est, dum ex particularibus inferitur conclusio vniuersalis, quod relictatur diuinis Aristoteli principijs, & fundamentis in libris priorum propositis, vbi probat conclusionem non consequi nobiliorem partem præmissarum, sed deteriore.

Insuper argumentum propositum, sumptum ab experientia, quod scilicet euacuatio per dextrum cubitum semper hepatis maius emolumentum afferat, quam per sinistrum, peccat quoque in materia, quia falsum est illud assumptum, scilicet, quod experientia pareat, missionem sanguinis factam à dextro cubito maius beneficium afferre, quam à sinistro, exordium enim venarum vtriusque cubiti docebit falsitatem huius assumpti, docebitque, fore vt missio sanguinis sinistri cubiti æque à dextro hepatis auxilietur, quia exordium harum venarum est in medio, & non magis distat ab hepate, sinistrum, quam dextrum, ergo æque cubitum sinistrum, ac dextrum auxiliabitur hepatis.

Quo ad secundam obiectionem, quæ est, dum inferunt ex natura reuulsionis nos potius ex dextro, quam ex sinistro latere esse consecuturos beneficium in hepate refrigerando. Respondemus, quod in reuellendo sanguine iecur opprimente, quæ seruentur conditiones reuulsionis in euacuatione sanguinis per sinistrum, ac per dextrum cubitum.

Audiasque rationem; ne quattuor sunt vere reuulsionis conditiones; quarum prima est, vt reuulsio fiat secundum rectitudinem, secunda per vasa communia; tertia per distantissima, & quarta, vt semper sint trahendi humores ad origines id est versus illam corporis partem à qua humores habent principium motus.

Age, examinemus singillatim omnes has quattuor conditiones; quare, si de pri-

ma conditione loquamur, dicas mihi quæ rectitudinem vis, vt in reuulsione seruemus, illam scilicet, quæ est vasorum, per quæ humores trahi possunt, vel illam, quæ est in illis partibus, per quas humor reuellendus, neque excurrit, neque excurrere potest dicere nullo modo poteris, esse seruandam rectitudinem illarum partium, per quas humores non possunt transire, esset enim ridiculum considerare illarum partium rectitudinem, qua neque excurrunt, neque excurrere possunt: quoniam illæ partes cum humoribus, qui debent reuelli, nihil habent commune, erit itaque illa seruanda rectitudo, quæ est illorum vasorum, per quæ potest humor reuelli, sed sic est, quod sanguis solum excurrit per venas, & nequaquam per alias partes, ergo si reuulsio debeat fieri secundum rectitudinem, non possumus per rectitudinem intelligere, nisi illam, quæ est vasorum; quæ cum ita sint, quis negabit, seruari rectitudinem in reuellendis humoribus ab hepate in euacuatione sanguinis æque à cubito dextro ac à sinistro; si verum est illud, quod probauimus, sanguinem videlicet euacuatum per cubitos, primo prodire à trunco maiori venarum existente in iugulo, quippe qui non magis vergat ad dextrum quam ad sinistrum brachium, & deinde ab hepate, vbi est sanguinis officina, vt omnino eadem sit rectitudo vasorum ab hepate ad cubitum sinistrum, vt est ab hepate ad dextrum.

Quo ad secundam conditionem reuulsionis, quæ est, quod semper reuulsio fieri debeat per vasa communia, nemo anatomicorum, quamuis stolidus, negaret, uenam cauam esse æque communem brachio sinistro, ac dextro; quare non est, cur aliquis amplius negare possit, quod euacuatio sanguinis per sinistram cubitum æque non sit secundum rectitudinem, & per vasa communia, & æque per distantissima in sinistro, ac in dextro cubito.

Videns igitur Fernellius venas sinistri, & dextri cubiti æque distare ab hepate, vidensque Galenum 3. de crifib. cap. 3. & alibi loquentem his verbis, oportet sanguinem recto cursu fluere ex dextra nare propter hepar, ex sinistra propter lienem, vt seruetur rectitudo partium nostri cor-

poris, nonam quandam causam exco-
gitavit, cur sectum dextrum cubitum,
iecori, & sinistrum spleni magis opem fe-
rat, dixitque id contingere ratione fibra-
rum rectarum, quæ habent vim pellendi
sanguinem in eodem latere, & propterea
secundum eandem longitudinem corpo-
ris servandam esse rectitudinem; perin-
de ac essent à splene ad sinistrum cubi-
tum fibræ, quæ illuc, & non aliud sangui-
nem expellerent, vel essent ab hepate ad
dextrum cubitum alia extensæ fibræ, quæ
per illam partem dextram sanguinem pel-
lerent.

Quæ opinio est falsa; quoniam omnes
venæ habent fibras rectas, obliquas, &
transversas; falsa quoque est, quia suppo-
nit sanguinem per sectum cubitum
finentem esse à fibris rectis propulsum,
quod fundamentum est falsum, & à no-
bis reiectum in lib. de tenuisione, ubi ex
professo de hac re egimus.

Insuper sunt alij, qui dicunt, aliam non
esse causam, cur sectum cubitum dextrum
magis conferat hepati, quam sectum si-
nistrum, nisi, quia euacuato sanguine ab
aliqua parte, illic sequatur magnus
transpiratus illius partis, quæ transpiratio
si erit in parte dextra, iuvabit iecur, si in
sinistra splenem.

Confirmantque exemplis, quantum sit hæc
insensibilis transpiratio facta per partem
proximam, & vicinam in pellendis affec-
tibus, præter naturam, exemplique sunt duo
quorum primum est illud Galeni notissi-
mum, dum dicit, vesicam urinæ omnino
repletam, si non possit expellere lotium
ob nimiam plenitudinem, clysteribus ali-
quantulum depleri, & euacuari, & inde
illo liberari affectu. Secundum est, dum
clysteres tollunt dolorem coxodicum;
colligunt ex ijs euacuationem semper
partibus vicinis, quamvis non sint vasa cõ-
munia, opem ferre: Quæ causa est omni-
nò vera, si est intelligendum de illis hu-
moribus, qui sua natura solent in spiritum,
& uaporem resolui, de quibus forsitan Gal.
loco citato intellexit; quoniam causa,
quæ movet hemorrhagiam narium, de
qua Gal. loquebatur ut plurimum est ua-
por acutus, qui pervadit, & penetrat ad
instar ignis insensibiles poros omnium
membranarum.

Cæterum, quia nos loquimur de mas-
sa sanguinea, quæ est crassa, & omnibus hu-
moribus mista, ideo dicere non possumus
ut post phlebotomiam ea sequatur trans-
spiratio insensibilis, quæ possit hepar iu-
uare, tum, quia sanguis excurrere solum
potest per canales sensibiles & patentes;
tum, quia post sanguinem euacuatam
pars illa, sit dextra, vel sinistra, magis fri-
gescit, & per consequens minus transpi-
rat.

Quare non immeritò de sanguine lo-
quentes dicimus, non esse longius iter ab
hepate ad sinistrum cubitum, quam sit ab
hepate ad dextrum, sed esse eandem re-
ctitudinem à vena cava ad ambos cubi-
tos; ideo eundem fructum, & eandem vi-
tilitatem pro affectibus hepatis pellendis
esse expectandam ab uno, quam ab altero
cubito.

Quæ cum ita sint, facile apparet illo-
rum error, qui in hepate refrigerando,
vel alio modo adiuvando volunt semper,
& seuerè à cubito dextro sangui-
nem euacuare, quamvis illud cubitum es-
set sua natura debile, vel semi stupore af-
fectum, in quo casu euacuatio sanguinis
non potest, nisi cubitum, & totum bra-
chium refrigerare; deberent enim tunc
eligere sinistrum cubitum minus læsum,
& minus operationibus incommodum,
quia idem prorsus hepati beneficium
præstare posset.

*Ut erras Vesalius, dum dicit in omni pleu-
ritide esse à dextro, & non à sinistro
brachio sanguinem euacuan-
dum. Cap. XV II.*

IN omni pleuritide, siue sit dextri,
siue sinistri lateris, tenet Vesalius,
solum à dextro cubito sanguinem esse
euacuandum. Ratio, quæ cogit Virum
præstantissimum ad hoc dicendum, est,
quia, postquam à corde supergressa est
maxima omnium vena, illic mittit à
latere dextro magnam quandam propa-
ginem, quæ vena sola, vel sine pari nun-
cipatus, gratia nutriendi omnes muscu-
los intercostales dextri, & sinistri lateris;
dicitque ab hac vena solum prodire san-
guinem facientem inflammationem
in pleura: deinde insert ex ijs conse-
quen-

quentiam (ni fallor) absurdam, & minimè necessariam, quæ est, quod in pleuritide quoque sinistri lateris sit cubitus dextræ secundum, & nullo modo sinistrum; quinimò addit, numquam in pleuritide evacuationem sanguinis à sinistro latere factam, ob huius venæ sine pari exordium collocatum in parte dextra aliquid opis afferre posse.

Quæ Vesalij sententia hac verborum serie exprimitur; omnes thoracis costas venæ sine pari propaginibus enutriti, hæc Patavij, & Bononiæ vidimus multoties, & nemo ex tanto eruditiorum virorum cœtu inficiari potuit: deinde dicit cum ad novam vertebram pertingat hæc vena sola in duos truncos diuiditur, quorum vnus dextri lateris costarum radicibus, alter vero sinistri exporrigitur; & hæc vena (addit) vergit ad partem dextram: quam ob causam in pleuritide quoque sinistra, à cubito dextro sanguis est euacuandus.

Cōdonemus Vesalio, musculos intercostales dextros, & sinistri lateris solū enutriti per furculos venæ sine pari: condonemus quoque membranā succingentem costas aliunde non trahere alimentū, quam à vena sine pari, & demum omnem pleuritidem fieri à sanguine prodeunte ab illa vena: Quid tum postea? peruenit ne illa vena sine pari ad cubitum? vel ad axillas? propagatur ne ab ipsa in brachium dextrum aliquod germen? nescio sanè quo fundamento vir aliquis solertissimus, & sectatores ipsius potuerint illam sententiam defendere, tum, quia vena sine pari nullum mittit furculum ad brachia, tum, quia vena caua, quæ dumtaxat varijs venarum propaginibus irrigat brachia, æquè distat à dextro, ac à sinistro cubito, tum, demum, quia si debeat exire sanguis existens in vena sine pari per cubitum, plus est omnino necessarium, vt à vena hac sola, vel sine pari vocata excurrat in cauam quæ est omnium venarum maxima, & deinde ascendat ad iugulum, quo in loco existens, vt ostendimus superius, æquali distantia distat à dextro, vt à sinistro cubito, & tam commodè per vnum, quam per alterum latus sanguis hic depleri potest: sequitur ergo quod vna sine pari æquè benè depleatur per sinistrum, ac per dextrum cubitum.

Cur ergo, cum Vesalius viderit valde diligentius, quam ego viderim venarum exordia, & progressus, & venas versus quæ cubiti æquè distare à iugulo, & venam sine pari nullam mittere ramum in brachia, nihilominus noluerit inanitatē huius opinionis animaduertere, quod potuisset milles in anatome rectè cognoscere.

Hinc Valuerdes Vesalij discipulus lib. 6. cap. 7. animaduertens venam sine pari non peruenire ad brachia, fauere videtur sententiæ, quam timeur, ubi dicit, in pleuritide extrahatur sanguis à quouis cubito, semper est necessarium, vt sanguis prius egrediatur à vena maxima, & deinde à vena sine pari.

Potremò errare videtur alio modo Vesalius, & potest quoque alio modo conuinci per fiduciarum reprobationem, scilicet condonando, venam sine pari posse euacuari per dextrum cubitum, & nequaquam per sinistrum, quod est falsissimum occurrimus tamen negando, quod semper pleuritis fiat à sanguine egrediente à vena sine pari, quia accidere potest vt fiat pleuritis à sanguine egrediente à vnīs musculorum thoracis, qui tandem in pleuram excurrere potest, quod facile fieri potest, dum ob frigus, & ventos maximos externi musculi constringuntur, quibus compressis exprimitur sanguis in pleuram: vel ob nimium calorem liquefiat sanguis, & factus liquidus similiter in pleuram stat, quare vnde quaque Vesalij sententia patitur naufragium, patitur, quia licet solum à sanguine venæ sine pari fieret pleuritis, non tamen sequeretur maius emolumentum à secto dextro, quā sinistro cubito, patitur quoque, quia negamus pleuritidem solum à sanguine prodeunte à vena sine pari fieri posse.

Præterea conuinci potest Vesalius, quia Hippoc. lib. de morbis &c. alibi ponit quatuor differentias pleuridis. Prima est intercostalis, quæ est superiorum costarum, quæ fit a ramo intercostali. Secunda pleuritis vocatur hypocondriaca, quæ fit a vena sine pari, quæ pleuritis est costarum inferiorum. Tertia dicitur pleuritis antica, quæ est sterni, hæc fit à vena mammaia. Quarta dicitur pleuritis dorsalis, & fit a ramo dorsali: quomo-

do ergo omnis pleuritis fiet cum Vesalio à vena sine pari?

Aliquos errata adscripta Gal. ob situs, & meatus partium corporis ignoratos. Cap. XVIII.

Maxima sanè esset illius hominis insolentia, & arrogantia, qui vellet in arte medica cum Gal. ingenio certare, qui tam diuinitus scripsit totam artem medicam, ut meritò apud omnes gentes multis ab hinc centennis annis summa veneratione eius scripta obseruentur: Verumtamen, quia Gal. ut probauimus superius, nò licuit humana corpora secare, & corporis particulas expendere, ut est in more hodierno die, idcirco cum sensus præcellat in ueritate comparanda rationi, & auctoritati, nos in explorum formam, ut melius declaretur nostra methodus, proponimus illa Gal. adscripta errata, quæ ueritas, & auctoritas docuit.

Præterea ex hac breuissima enarratione, errorum firmius & constantius colligemus origines omnium errorum consistere in decem partium nostri corporis conditionibus malè perceptis, quales sunt meatus, situs, & cætera non semel propositæ, quoniam ab illis decem solum omnes naturæ specificæ affectuum sũt: quare multis erroribus Galeno adscriptis dimissis, qui in bonum sensum possunt reuocari, aliquos incipiamus proponere: a quibus non uidetur, quod possit uindicare.

Quare si de situ loquamur, quæ est conditio partium uiuentis principalissima, an ne credidit uir præstantissimus in hominib. dextram emulgentem esse altiorē sinistram? attamen clarissimè patet in omni humano cadauere sinistram emulgentem, & renem sinistram esse superiorē, & altiorē dextro; hoc igitur est signum, quod brutorum tantummodo exemplaria in sua anatomia tractauerit; bruta enim habent emulgentia, & renem dextrum altiorē sinistro.

Ex hoc igitur malè percepto situ renum, & uenarum emulgentium Gal. longo discursu inquit, cur factum sit, ut ren dexter, & uena emulgens dexter superior sit in hominib. quàm sinistra, & huius rei

(sicuti est philosophi proprium) multas rationes reddit, quæ ob eius ingenij excellentiam sunt quoque adeo præclaræ, ut ad hanc usque diem renem, & emulgentem dextram esse superiorem sinistra plurimis magis suadeant, quam inspectio propria.

Amplius situm quoque uentriculi uir sapientissimus uidetur non recte nouisse; quia dixit uentriculum magis esse in dextro latere, quam in sinistro, quod non est admissum, quoniam maius spatium relinquitur uentriculo in sinistra parte, quam in dextra ob hepatis magnitudinem, & lienis paruitatem: unde ex hoc situm malè percepto in affigendis stomaticis plurimi possent errare, ipsi enim cerata affigerent magis dextræ parti, quam sinistra; attamen uentriculo occupanti potius sinistram, quam dextram, potius quoque in sinistra parte erunt localia affigenda.

Similiter si de meatibus loquamur, an ne in errores aliquos incidit: an ne primo de usu part. credere uidetur, ossa digitorum non esse concava, sed solida? quamuis apertissimè concauitatem habeant, quod obseruatur non solum in hominib. uerum etiam in simijs ipsis: à quo errore Iacobus Sylius in suis uiculentis depulsionibus aduersus Vesalium non potest vindicare Galenum, quamuis ipsum defendat uarijs auctoritatibus Aristotelis, & Galeni, sed minimè ad rem conferentibus.

Insuper Galenus putauit esse quendam meatum inter oculos & nares, unde dicit, quod medicamenta in oculos propterea immittantur, ut per nares effluant, & uersa uice, aliquando scilicet in nares immittantur, & oculis egrediantur, quod nunquam nostratibus anatomicis est obseruatum, etenim illud quod separar oculos à naribus, est septum subtilissimum qua peruadunt, & exsudent ichores, & lachrimæ, ut in illis, qui, lachrimis conficiuntur, aliquando uidimus, quod septum subtilissimum in mortuorum cadaueribus ob suam tenuitatem rarissimè inuenitur: quia corrumpitur.

Itaque ex unico humore ob uarium partium situm uarij morbi exoriuntur: imò ipse febres uariæ sunt ab eodem humore in diuerso situ existente.

Neque putet Lectores bilem efficientem tertianam non esse ita ardentem, & ita mordacem, sicut est illa, quæ causâ facit: Galenus .n. 2. de crisi. 3. 3. aph. 29. 2. de sympt. causis 5. 4. aph. 48. clarissime dicit, calorem bilis efficientis tertianam esse ita ardentem, ut est calor qui facit causam: ob situm tamen uariantur: quia bilis efficiens ardentem est in uenis proximis cordilibus uerò efficiens tertianam est extra uenas.

Insuper ob situm uarios canalis uesicæ fellæ uariatur habitus corporis: Galenus 2. de ratione uictus in ac. 29. feribit de Paulo Rhetore, & Eudemo Philosopho, dicit ambos fuisse picrocholos: in Paulo tamen ductus ferens bilem perueniebat ad fundum uentriculi, & uomebat bilem: ideo Paulus uocabatur picrocholos. In Eudemo ductus cholidocus excurrebat ad intestinum ieiunum, & vocabatur picrocholos *κατὰ*. Ecce quod ob uarium situm habitus sunt diuersi, sicuti ualde diuersus erat Paulus ab Eudemo.

Insuper ueteres putabāt intestina crassa locata esse in parte inferiori: tenuia in superiori: quare coacti pro colicis doloribus circa pubem topica adiungebant, nihilominus colon quod est crassissimum ad iecoris cauum, & uentriculi fundum peruenit; ileon uerò quod est tenue ad pubem extenditur. Qui ignorant hunc situm, neque dolores colicos, uel iliacos scirent topicis uti.

Decepti sunt ueteres in sectione canū & quadrupedum, quibus crassa intestina in inferiori: tenuia uerò in superiori locata sunt, quorum situs similis non est in hominibus.

Insuper dolores, qui excitantur in abdomine à plurimis uocantur colici. Si intestini coli, & aliorum intestinorum situm bene uidissent non errarent in applicandis localibus.

Diuiditur abdomen in tres partes, nempe in Epigastricam, umbelicalē, & hypogastricā. In Epigastrica, quæ ferè excurrit usque ad umbelicum continentur hepar, Venter, & lien. In umbelicali, quæ excurrit quatuor digitis infra umbelicum in dextra parte continetur una pars coli intestini, totum ferè cæcum cum portuicula ieiunij. In sinistra, coli pars cū por-

tuicula ieiunij. In media ferè totum ieiunum. In hypogastrica, in dextra, & sinistra parte continetur ileon intestinum, idè dicuntur illa. In pectine est intestinum rectum, uesica, & uterus.

Quare si supra umbelicum sint dolores, quomodo ex situ colligemus esse colicos? quomodo si dolores erūt in regione umbelicali in medio ubi solum situm est ieiunum uocari poterunt colici? quomodo in hypogastrica parte dextra, uel sinistra, ubi ileon continetur poterunt dici dolores colici, cum ibi sit intestini iliaci sedes.

Similiter si in pectine, ubi est intestinum rectum & uter, sint dolores, uocari poterunt colici: colligas quod sine anatomia medicus sit uerè cæcus.

Porrò alio modo inflammatio peritonei tractatur, dum est sub umbelico, quæ supra: quia sub umbelico peritonæum est magis duplicatum ob uasā umbelicalia.

Negamus tamen contra Columbum à Xiphoide ad umbelicum peritonæum esse unam tunicam: duplex enim est, neque mirum: quia etiam pia mater, quæ est tenuissima est duplicata. Præterea uena umbelicalis fertur ab umbelico ad scissuram hepatis: ergo duplicata. Quod diximus de inflammatione peritonei potest quoque applicari uulneribus peritonei quæ in præfugiendo, & medicando ualde iuuat.

Colliguntur aliquot errata Galeno adscripta in ijs, quæ pertinent ad figuram, & progressum partium humani corporis. Cap. XIX.

IN partium figuris non semel errare uidetur Galen. & præcipue dum in simijs deceptus habet, quod processus uertebrarum colli integri sint, cum re uera sint bifurcati.

Amplius de osse humeri dixit esse omnium maximum femore excepto, & non excipit tibiam, quæ similiter humero maior est, uel saltem sacrum os, uel os ilium, quæ magnitudine tibiam superant.

Similiter de hepatis, & renum figura dicit in primis, quod hepar humanum in lobos sit ita diuisum, ut in brutis; quis ab hoc errore ipsum uindicaret; nemo qui semel tantum uidisset humanum hepar, affirmaret eodem modo hepar

in lobos esse diuifum.

Similiter, dum de figura renum loquitur, dicit renes ea figura esse donatos, vt cribro in partibus internis conſtituti ſint, de qua re ſuperius egimus, dicitque aliud cribri ſpecimen eſſe in oſſe cuneali, quæ omnia ſenſu ipſo, & non longo diſcurſu ſunt ab anatomicis reieſta.

Amplius de figura ſpinalis medullæ loquens dixit, quod in extrema parte ſpinæ ſit neruus quidam inconiugatus, & ſine pari, quem nemo in humano cadauere vidit vnquam, additque neruum hunc præterlabi per quartum muſculum femoris, quod ſi eſſet verum, ſequeretur hoc inſolitum, & monſtruoſum in morbis; quod nõ poſſet dari paralyſis in vna parte tantum, dextra videlicet, vel ſiniſtra quarti muſculi femoris, quod eſt falſum, quia ſæpiſſimè experientia vidimus muſculum quartum femoris in vnica rãtum parte paralyſi eſſe affectum, & non ſemper in vtraquẽ: ſequitur ergo, quod neruus ille poſtremus ſit cõiugatus; dicimus ergo cum anatomicis noſtris in extrema parte medullæ fieri d'ſtributionem poſtremi nerui in duos furculos, quorum alter excurrat in partem dextram, alter vero in ſiniſtram.

Inſuper de figura pulmonis humani habet Galenus, eſſe diuiſum in quinque lobos, quorum tres dixit eſſe in dextro latere, duos verò in ſiniſtro, quod in brutis obſeruat, in hominibus vero nequam, quoniam humanus pulmo tantum quatuor habet lobos.

Demum lapſus eſſe videtur, dum ventriculi figuram obſeruat, vt pylori oriſcium fundum ventriculi reſpiciat, quod mihi videtur experientiæ, & ſchemati propoſito relictari.

Alia adſcripta errata Gal. de figuris poſſem afferre, volui tamen hæc pauca ſubnectere, cum mihi hæc præcipuè videantur veritati, & ſenſibus noſtris relictari.

Si verò de progreſſu loquamur, inuenimus non pauca eſſe errata ei adſcripta, an ne dicit temporalem muſculum in medio ſiti ipſus eſſe tendinoſum, in exordio verò, & vbi inferitur eſſe carnoſum? quod ſanè in hominibus non eſt reperi- tum, quamuis in lupis, & alijs brutis inueniatur.

Sanctorij Sanctorij Pars I.

Progreſſus ſanè huius muſculi temporalis præcognitus valdè poterit conferre affectibus cognoscendis, & curandis: per hypotheſim ſi vulnerabit muſculus temporalis in medio, vbi credidit Galenus eſſe tendinoſum, cogetur Galenus falli in cognitione naturæ vulneris, in præſagio, & curatione.

In cognitione, quoniam alia eſt natura vulneris partis tendinoſæ, & alia carnoſæ.

In præſagio, quoniam vulnera in parte tendinoſa ſunt deteriora, & aliquando lethalia.

In carnoſa verò ſunt minus periculoſa.

In curatione, quoniam omninò diuerſa ſunt remedia, quæ debent applicari tendini, ab ijs, quæ carnis applicantur; docet enim ipſemet Gal. in methodo, alia eſſe ſuppurantia in tendine, aliaque in carne, alia digerentia, aliaque ſarcotica, vt tota diuerſa reddatur curatio partis tendinoſæ, & carnoſæ.

Videant ergo lectores quanti ſit hæc conſideratio progreſſus partium, quoniam ſicuti, ſi muſculus temporalis eſſet in medio tendinoſus, vultus in medio eſſet ferè lethale: pari modo dicimus, quod ſi muſculus temporalis in principio eſſet tendinoſus, in principio quoque eſſet periculoſum, & d'ficilis curationis, ſi verò in medio eſſet carnoſus, ut omnes anatomici affirmant, vultus medie partis minoris eſſet conſiderationis.

Quod uerò non ſolum partium figuræ ſint prænoſcendæ, patet quia ex Gal. 7. meth. ultimo à figura modus agendi colligitur.

Proponuntur errata Galeno adſcripta in ijs, quæ perſeunt ad numerum partium corporis. Cap. XX.

SI de numero partium loquamur ſæpè decipi uidetur Galenus, numquid non dixit os ſacrum ex tribus tantum oſſibus conſtare? dixitque tria tantum habere foramina, ut forſitan obſeruauit in Canè, & Simia; nihilominus os ſacrum ſeorſum tamen à coccyge conſideratum (ne erremus cum Syluiò, qui ut defenderet Galenum ſub hoc nomine oſſis ſacri

L non

non solum toceygem comprehendit, sed lumborum, & dorsi vertebrae, adeo in Galeni placitum ex animo visus est iurasse) ex quinque, & sex vt plurimum ossibus contextum est, quare si ossa sunt sex, quinque necessarii vniuntur commissuris, & quinque foraminibus utrobique præditum erit.

Hæc cognitio tanti est in medicina, vt sit impossibile rectè mederi, numero partium & foraminum ignorato, an ne si in primo, in quarto, vel in quinto ossis sacri foramine caput aliquod illorum nervorum, per illa foramina exeuntium esset à tumore compressum, & paralyti affectu, esset impossibile rectè mederi ijs affectibus, si numerum, & situm foraminum, & nervorum permeantium usum ignorares? quomodo scire poteris, cui parti sint adicienda emollientia, vel deriuantia localia, quæ à profundo trahunt, veluti sunt cauteria, vel auxilia pyrotica, nisi perfectè scires locum, vbi sunt foramina, quorum si numerum nescias, illa perquirere non poteris.

Præterea Galenus dixit, decimam vertebrae esse mediam vertebrae dorsi, quæ in canibus, & simijs obseruatur, in hominibus verò nequaquam; quia vbi est duodecima, ibi est medium dorsi. qui enim ad vnguem omnium vertebrae numerum, & nervorum prodeuntium ab illis cognoscet, multos affectus animaduertet, & curare poterit, quemadmodum contigit quoque ipsimet Galeno, qui dinitus potuit digitis hominis venientis Romam, percussique in septima colli vertebra ob casum è vehiculo sensationem dare, quod non fecisset, nisi cognouisset à septima vertebra pendere nervos irrigantes digitos illos: tunc enim si Galenus credidisset, non à septima cervicalis vertebra, sed à tertia, vel quarta dorsi prodire furculos nervicos influentes in brachia, & dorso adiunxisset, & non collo topicum illud emolliens, miser ille non fuisset sanatus; est igitur necessarium, antequam cognoscamus affectus pertinentes ad hanc humanam fabricam, vt prius sciamus numerum omnium partium compositarum.

Insuper Galenus putauit os pectoris contextum esse ex tot ossibus numero,

quot sunt legitimæ costæ, vt cuilibet datum esset, cui adhæreresceret, quod in canibus, & simijs, & alijs animantibus ratione carentibus obseruamus, in hominibus verò tria, quæ est quattuor ad summum obseruantur, Ex quo numero præcognito, plura colligimus necessaria in curandis contusionibus, & vulneribus pectoris.

In his affectibus, qui perfectè scit numerum ossium pectoris, necessariò sciet, quot sint commissuræ, vbi sint & vbi sita est cartilago, quæ est osse mollior, & tenerior; his cognitis certò sciet, an vulnus totum sternon peruat, quoniam si vbi est cartilago, vulnus sit, quia est mollior, & tenerior ensis facilius penetrare potest quo percepto, naturam morbi, præ sagium & remedia colligere poterit.

Ad hæc credere videtur lib. de musculis, scapulas à septem musculis moueri, at tamen in hominibus quattuor tantum reperiantur, & optima cum ratione, quoniam in scapulis quattuor quæ obseruantur motus, sursum scilicet, deorsum, ante, & retro: quare horum musculorum præcognito certissimo numero, tunc si scapula amitteret motum sursum, vnicus esset curandus musculus, si verò essent septem musculi scapulam mouentes, necessariò plures essent præcognoscendi, sed in ijs experientia standum est.

Insuper putauit quoque Galenus, musculum cucularem esse duos musculos, quia duos in simijs cuculares reperit, verum in hominibus vnicum tantum omnes anatomici inuenerunt.

Insuper plurima quotidie inueniuntur, non solum ad numerum, sed ad situm, meatum, substantiam, & ad ceteras enarratas conditiones pertinentia; & ne dimittam numerum ossiculorum auris.

Scis ab anatomicis nostris multis ab hinc annis esse inuenta illa tria ossicula, quæ sunt auditus instrumenta, vt primum vocetur malleus, secundum incus, tertium stapha, de quibus apud Galenum neque sub his nominibus, neque sub alijs mentio facta est, quare cum quodlibet ossiculorum in formando auditu necessariò concurrat, sequitur, vt vnicò læso statim lædatur auditus, quare in cogni-

gione auditus erit necessarium cognosce-
re numerum illorum officiorum, si quis
verò exoptat cognitionem omnibus nu-
meris absolutam horum officiorum ad
auditum pertinentium, legat tractatum
Hieronymi Fabricij ab Aquapendente,
qui summo studio ac diligentia de horum
instrumentorum numero, & de cetera-
rum partium figuris & magnitudinibus
adeo diligenter scripsit, ut sine contro-
uersia omnes; qui hactenus de hac re
edidere, præcellat.

Præterea Gal. addit neruorum nume-
rum in coccyge, quos neruos in humano
cadauere nemo vidit vnquam; dixitque à
coccyge oriri coniugationes neruorum,
quod re vera in brutis, quæ habent cau-
dam, repetitur, verum in hominibus ne-
quaquam.

Postremo habet Galenus quod infernū
orificium ventriculi hoc insolito numero
sit præditum, ut glandula circumducatur.

Alij quoque tenent nec venas, nec arte-
rias esse in liene, quæ errata in capitibus
superioribus sunt reiecta; in hæc, & in
alia plura errata Galenus alioquin sa-
pientissimus incidit, quia non potuit hu-
mana cadauera secare, hæc tantum mo-
do proposuimus, non solum, ut metho-
dus proposita magis clarescat, verum ut
omnes videant, quod omnia errata,
quæ sunt, & quæ imaginari possumus,
pendeant ab inscitia decem illarum con-
ditionum partium corporis, quas supe-
rius proposuimus.

*Proponuntur aliquot errata Galeno ad-
scripta in pertinentibus ad substantiam
compositionem, officium, & exor-
dium partium nostri corpo-
ris. Cap. XXI.*

Silouamur de substantia partium, ali-
quando Galenus visus est quoque in
scopulos impingere; numquid non est fal-
sum, dū dicit cerebelli substantiā esse ce-
rebro duriorē; quia falsa positione data,
an ne de vno in alium serpente videtur er-
rorē; dicit enim neruos duos à cerebel-
lo oriri, quia cerebellum est durius, quod
est falsum, ut ostēdimus, quia à cerebello
nullus oritur neruus sed omnes à cerebro
& à spinali medulla; additque tertium

errorem ortum ex prima positione dicē-
do neruos motiuos à cerebello, sensitiuos
verò à cerebro oriri, perinde ac secundū
par, & tertium neruorum, qui manifestē
ex Gal. sententiā à cerebro oriuntur sint
sensus, & non motus auctores, quod re-
sultatur experientiæ, quia, vt superius os-
tendimus, omnia neruorum (optis exce-
ptis) motus, & sensus paria sunt opifices;
ecce quo pacto parua, & exigua erroris
macula in opinione, si longius progredia-
tur mille falsas opiniones parere possit.

Similiter secundo de temperamentis,
& alibi loquens Galen. de substantia spi-
nalis medullæ dixit esse molliorem eā
medullā, quā ossa nutriuntur, quod nul-
lus sensus admitteret.

Amplius Galenus, & cum eo Aristote-
les habent in calida corporis particula; vt
est cor, non esse pinguedinem, cum aper-
tē in hominis corde pinguedo sit, nisi in-
terpretemur Galenum, & Aristotelem,
quod intellexerint, non esse pinguedinē
in intima cordis parte, vbi cor igne pene
est emicans, vbi re vera non est pinguedo
est enim valde rationi consonum, vt cre-
damus, Galenum, & Aristoteli cognouisse
in cordis externa parte, esse pingue-
dinem, quoniam in cordis omnium ani-
malium terrestrium, aquatilium, & vola-
tilium in externa parte reperitur pingue-
do; esset nimium à ratione alienum cre-
dere Gal. numquam vidisse, uel comedis-
se animalium corda, quæ omnia forinse-
cus habent pinguedinem.

Demum 9. de vsu par. habet Gal. appen-
dices esse ossibus duriores, quod superius
est reiectum; habet enim appendix cor-
pus molle, & spongiosum, de hac re ego
quoque Galenum defendi, quod in codice
forsitan sit mendum, quia vix mente con-
cipi potest, quod Gal. in re tam manifesta
errauerit, perinde ac numquam comedis-
set ossa vituli, vel volatiliū, in quibus
canes, & pueri quotidie experiuntur ap-
pendices esse molliores ossibus.

De compositione partium varia Gale-
no adscribuntur errata; hocque prius asser-
rimus, quod scilicet voluerit Galenus lib-
de ossib. vertebrae coniungi per tertiam
tunicam vestientem spinalem medullam,
quod videtur falsum; quoniam re vera
coniungitur medius; propriè ligamentum,

vt mirandum sit, Galenum credidisse, vt tam subtilis tunica posset sustinere ossa illius magnitudinis: Ex qua compositione malè præcognita plurimi errores contingere possunt in curandis luxationibus, & contusionibus.

Præterea habet Galenus. caput in finem vlnæ componi cum brachiali, quod nullo modo in hominibus obseruatur, quia cum nulla parte brachialis videtur habere connexum aliquem; alia quoque attulimus superius pertinentia ad compositionem, propterea paucis hic, & per epilogum hæc collecta sint.

Quantum attinet ad officium partium in primo, & secundo libris plura de officio musculorum, & aliarum partium proposuimus: cæterum, quia officia partium læsa affectus præter naturam pariunt, par est vt hic saltem vnicum exemplum proponamus; an ne ait Gal. quantum musculum hyoidis, illum videlicet subtilem, & longum, ortum quoque ex Galeni sententia ab ipiomet hyoide, & qui terminatur in latus hyoidis, hoc explere officium, vt scapulam attollat? hoc sanè ab omnibus anatomicis iudicatur impossibile, quod scilicet tantum scapulæ pondus ab hoc solo subtilissimo musculo attollatur: supposito ergo errore ab aliquo sectatore, qui in placita iurauerit Galeni, an ne, si videret scapulam non posse attolli, statim firmiter crederet musculum illum subtilem esse læsum, & illi parti topica summo forsitan cum ægrotantis detrimento adiungeret? ecce quanti sit officia omnium partium perfecte cognoscere; quare quod de huius musculi officio animaduertimus de omnibus idem faciendum, hac scilicet perpetua conditione seruata, vt in omni parte affecta cognoscenda, & curanda, prius loci, vel partis affectæ officium cognoscamus.

Postremò de partium exordijs loquens Galen. non semel vius est à veritate deflectere; afferatur exemplum; an ne dicit substantiam penis exordiri à superiori parte penis? quod sanè non recipitur, quoniam penis (vt patet in anatome) exorditur ab inferiori parte, & ab ano origine carnea.

Hæc, & alia plura errata Galeno ascribuntur, quorum aliquot, quia sensu-

bus aduersantur, non possunt defendi: fatemur tamen aliquot esse non omnino spe destituta, vt ab aliquo, qui sit ingenio excellenti, qui tamen non auctoritate tantum, sed ratione, & experientia incedat, non possint in bonum sensum reuocari.

Etenim illorum hominum ingenia in catalogo excellentium nullo modo sunt collocanda, quibus auctoritates magis, quam sensus ipsi persuadent, quinimò sunt fugienda, & præcipue his temporibus, quoniam plurimi alioquin celebres sunt eo ingenio, qui malunt autopsiæ, quam Aristoteli, & Galeno fidem derogare, quique quod deterrius est, tanto odio prosequuntur illos, qui liberè philosophantur, vt audeant conuicia, & liberos contumeliosos promere in sensatos, & liberos philosophos.

Hinc Syluius tanti nominis vir sequens Tyrannicam doctrinam tanto animi impetu inuehitur in Vesaliū de anatomia optimè meriti, totque calumnijs, vocabusque contumeliosis mordet, & lacerat eum, qui tanta industria, & tantis laboribus occultas partium nostri corporis conditiones aperuit, vt ipsum Syluium non pudeat in suis depulsionibus pro Vesalio vesanum perpetuò sustinere, dein de librum Vesalij tot inuentis ornatum vocare rudem, & indigestam farraginis colluuiem, & cloacæ, librum Vesalij dignissimum vocare indignissimum, & hortari tam efficeiter lectores, vt ipsum lacerent, conculcent, & Vulcano deuoeant.

Postremò pergens Syluius impudenter dicat, quod sit multo facilius Augiæ stabulum repurgare, quam centonem huius ex furtis confutum, & calumnijs factum, mendis etiam insignioribus tantum emaculare.

Denique adeò recandescit ira, & in talem insaniam proruit, vt his verbis imploret cæsaream maiestatem, quæ Vesaliū (quia sensibus proprijs magis credidit, quam auctoritati Galeni) tamquam monstrum ignorantie, ingrati tudinis, & arrogantie, impietatis exemplar perniciosissimum, domi suæ natum, & educatum, vt est commertum, malè mulcet; ac omnino comprimat, ne suo pestilenti halitu

halitu Europam reliquam venenat: quid vterius dici posset, si idem Vesalius esset reus, non dicam Galeni, sed ipsæ Cæsareæ maiestatis?

Quare dimisso Sytuo, vt qui non ratione, & experientia aggressus est Vesalius, sed vanissimis, & tumidissimis vobis (sicut in apologia quoque Renatus eloquenter ostendit) & dimissis omnibus qui solum auctoritatibus sunt additi, concludimus primò sensibus, & experientie esse credendum, secundò rationi, tertio auctoritatibus Hippocratis, Galeni, Aristotelis, & aliorum excellentium Philosophorum.

Ex traditis in hoc libro poterimus omnes specificas morborum ideas occultas perquirere, quia in exordio huius libri ostendimus, quòd omnes affectus specifici fiant à decem propositis conditionibus, & quia affectuum curatio pendet à recta cognitione essentiae, ideo declarauimus in sequentibus capitulis, quo pacto recta administratio remediorum in curandis affectibus possit colligi à conditionibus propositis, tamquam ex proprijs fontibus.

Exinde plurimis, & conspicuis exem-

plis ostendimus, quòd omnes errores, qui fieri possunt in specificis morborum ideis perquirendis, oriantur ab inscitia decem propositarum conditionum: postremò aliquot errata Galeno adscripta proposuimus, à quibus vix defendi potest, vt ostenderemus errata omnium generum prodire ex malè intellectis illis decem locorum affectorum conditionibus, quæ sunt situs, meatus, substantia, temperatura, compositio, numerus, officium, exordium, figura, & progressus; quæ conditiones colliguntur ex Gal. varijs in locis, videlicet in methodo, & lib. de const. art. med. vbi considerans structuram domus, dicit considerandum in ipsa rerum numerum, magnitudinem, qua figura sit construenda, quo situ, qua substantia, ob quem finem, & vsum.

Similiter medicus debet omnes has conditiones in qualibet corporis parte, vt sæpissimè admonet Galenus, quas sine anatomia non sciemus. Hinc Galeni lib. de plenitudine, asserit, partem plenitudine laborantem nos non inuenire, nisi scientiam exquisitam dissectionis, & naturæ cuiusque partis, quæ sit in animali, habeamus.

FINIS LIBRI TERTII.





SANCTORII SANCTORII

Olim

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIVM

In Specificis Morborum, & Symptomatum Ideis Metiendis.

LIBER QVARTVS.

*Ostenditur esse metiendos recessus mor-
bificos à statu salubri aduentitio, & ne-
quaquam à primigenio. Cap. I.*

IN præcedenti libro ostendi-
mus vniuersos affectus præter
naturam fieri específicos, dum
corporis nostri partes rece-
dunt à statu salubri in figura, meatu, situ,
numero, compositione, temperatura, sub-
stantia, officio, exordio, & vasorum
progressu: neque alias præterea faciliores
imaginari potuimus partium conditio-
nes, quæ distinctius formare, & consti-
tuere possent affectus específicos, & par-
ticulares.

Relinquitur solum, antequam extre-
mam manum imponamus huic contem-
plationi de affectuum præter naturam
ideis, vt in hoc quarto libro intelligamus,
qualis sit hic status salubris, à quo, dum
recedunt partes, consurgant morbi; quæ

cognitio est valde necessaria: quoniam
ex Galeno, primo ad Glauconem, capite
primo, tantus est morbus, quantus est
hic recessus à statu salubri. Idem testa-
tur Galenus nono methodi, cap. decimo-
quarto.

Quare nisi expendamus, & cognosca-
mus hunc statum salubrem, qui est ter-
minus, à quo partes affectæ recedunt,
numquam sciemus metiri recessum, &
numquam ultimam differentiam morbi-
ficam attingemus, quocirca, ne in æqui-
uoco laboremus, singularis est animad-
uertenda distinctio, quæ est, vt in omni-
bus affectibus præter naturam dupliciter
considerari possit recessus à statu salubri;
alter enim consideratur recessus à statu
salubri primigenio, qui ab exordijs gene-
rationis comparatur; alter verò conside-
ratur recessus ab aduentitio statu par-
tium salubri, qui aduentitius status in vi-
uentia corpora non illud, sed tractu tem-
poris

poris sensum à consuetudine sex rerum non naturalium intromittitur, quippe qui non solum est diuersus à primigenio verum etiam sæpè contrarius; & de hoc præcipuè agere debemus.

Quoniam status salubris, quo nuper ægrotantes, dum erant sani, fruebantur, non potest esse primigenius, sed nouus & aduentitijs videt ab ipso metimur recessum, & ad ipsum pro viribus reducimus ægros, vt ipsos sanos reddamus: hinc Galenus 11. methodi cap. 3. dicit in morbis non debere seruari narium temperamentum, sed aduentitijs: quæ proposita distinctio cum ab empiricis non rectè sit præuisa, non est mirum, si in plurimos labantur errores.

Labuntur in primis Medici Plebei, dum in exordijs suarum consultationum recessum ab aduentitio statu salubri cum primigenio confundunt, veluti dum expendant signa temperamenti ægrotantis sine vlla distinctione duplicis huius recessus: proponunt enim signa temperamenti ab ortu naturæ comparari, & nequaquam pendunt signa aduentitij illius temperamenti, quo nuper, dum erant sani, fruebantur.

Errant quia, vt plurimum primigenium temperamentum, vel primigenia constitutio potest esse adeo remota à constitutione, & ab illo temperamento aduentitio, quod æger recuperare desiderat, vt non solum possit esse diuersa, verum etiam contraria, quinimò talis potest accidere, qualis si a dasset, vitam ægrotantis omnino destrueret.

Hinc Galenus libros de tuend. sanit. 10. præfagus tantis erroris erupit in hanc sententiam: quæ in præsentia sumitur pro principio nostræ considerationis: in debilibus, & senibus esse conseruandam consuetudinem, quamuis deterrimam: idem videtur quoque asserere 11. methodi cap. 3. quare si ex Galeni sententia, ægri, senes, vel debiles sint renouandi ad consuetum siue aduentitium statum, quamuis sit malus, quanto magis licebit transferre ægros ad illum statum aduentitijs non deterrimum, sed salubrem, quo, dum nuper erant sani, fruebantur?

Quorsu ergo nostrates in omni ægro-

tante proponunt signa solum primigei temperamenti? quando in omni viuentis status primigenius tractu temporis multoties aliterari, & mutari possit, vt sæpè tantum abstat à statu salubri, quem exoptamus, quantum ab est morbus à sanitatem: an ne quis nasci potest cum icore calidissimo, & per consequens venas habere latas & amplas, & deinde temporis intervallo adeo in frigidum temperamentum properare, vt tandem cachexia, & iccoris frigiditate prematur? an ne salubris status istius, quo dum proximè erat sanus, fruebatur, fuit potius frigidus, quam calidus? etenim natura non transit ab extremo ad extremum nisi per media: an ne habeat eandem latitudinem venarum in omni aduentitio statu? quia ob temperamentum mutatum à primigenio calido in aduentitium frigidum magnitudo vena cum non minuitur.

Quare cum hæc ita se habeant, quomodo volueris per signa primigenia cognoscere salubrem statum aduentitium? & quod deterius est, volueris varijs phar-macis, ægrum semper transferre ad statum primigenium? Etenim latitudo venarum (ne ab hoc exemplo recedamus) conseruatur in omni temperamento primigenio, & aduentitio, quia est signum insequens conformationem: quare nulla erit consequentia à conformatione ad temperaturam, neque à temperatura ad conformationem, quia sunt status, & naturæ admodum diuersæ, vt propterea illi vulgares medici in maximis irruant errores, qui connectunt has consequentias aliquis habet venas latas, ergo habet iccor calidum, ergo refrigerandum.

Insuper quid verat hominem esse caloris feracissimum à primordijs suæ generationis, qui tamen ob frigidorum assuetudinem sibi naturam frigidam comparauerit: sed sanam, eadem semper manente venarum latitudine?

Qualem ergo naturam conseruare erit medici officium, præsentem sanam, vel vetustam illam primigeniam iam diu amissam? neminem esse puto dicentem, dum ægri tam remoti sunt à primigenia ipsos esse ad eam reducendos, vel eam in ipsis, cum non sit, esse conseruandam.

Quia iam in primo libro docuimus de

ratione indicantis siue fit in method. curatrice, siue in conseruatrice esse præsentiam, docuimusque, quod est in fieri, non indicare: quia, quod est in fieri non est adhuc exactè præsens, quoniam exactè præsens in methodo debet esse in factò esse, stabile firmum & non fluens, quam doctrinam colligimus passim ex Galeno, & præcipue in methodo inodendi loco superius citato, vbi clarissimè dicit in ægris non esse seruandum temperamentum natium, sed illud, quo egri fruebantur paulò antequam inciderent in morbos, ratio est, quia natium non est præsens, vt aduentitium.

Sed ad exempla accedamus, Socrates ab ortu nature humidissimus in ætatis progressu redditur sicus, verumtamen sanus: Socrates deinde in ægitudinem cadit, tunc medici in consultationib. proponunt esse conseruandum temperamentum naturale, & ad illud Socratem reuocandum, proponuntque à temperamento naturali esse metiendum recessum; peto, vt mihi dicant, quale nam temperamentum conseruare volunt, vel à quo volunt metiri recessum à naturali statu primigenio, vel aduentitio? dicere non possunt primigenium esse conseruandum, vel à primigenio esse metiendum recessum; quia non est, & non entis non sunt indicationes.

Quare nullomodo status primigenius indicabit, quinimò potest accidere, vt præsens temperamentum Socratis magis distet à primigenio, quam morbus ab eius aduentitio statu salubrisque cum ita sint, sequitur, vt constitutio aduentitia salubris in ægotantibus sit conseruanda, ab ipsa sit metiendus recessus, & nequaquam à primigenio.

Ad eundem modum biliosa corpora euadunt pituitosa, eaque inter latitudinè sanitatis conseruatur, quoniam sub vtraque sorte æquè benè munerum suorum officia explere possunt: Cur ergo hoc corpus, quod à primodijs suæ generationis fuit biliosum, & deinde factum pituitosum, pristina manente valetudine, si labatur in ægitudinem, vis reducere ad statum primigenium? vel à constitutione primigenia eius recessum metiri.

Quorsum ergo in omni medica consyl-

tatione perpendere vis primigeniam temperaturam, quæ est remotissima, & quæ potest omnino reluctari salubri constitutioni aduentitiæ? cur vis inferre à signis ortis à primigenia constitutione status præsentis conditionem? Sicuti dicèdo est latitudo thoracis, & thorax hyspidus, ergo totum corpus est calidum; quod non sequitur, quia ob longam conseruationem frigidarum rerum, nulla facta mutatione in latitudine, vel hyspiditate thoracis potest accidere, vt cor, & totum corpus acquisierit naturæ frigidiusculam, & sanam.

Neque obijciant signa hæc, & alia id genus esse desumpta à Galeno in art. medicinali. Quia occurrinus Galen. signa tradita in art. medicinali seorsum, & sine sufficienti syndrome aliorum signorum considerata arguere potius constitutionem illam, quæ est à primordijs generationis comparata, quam aduentitiam: idcirco nisi illorum omnium signorum fiat sufficientissima syndrome, numquam cognoscemus præsentem constitutionem, vel aduentitium statum.

Colligere ergo firmiter possumus, nullam esse consequentiam à signis primigenij status ad statum salubrem vt nunc & aduentitium, cum toto celo distent.

Addimusque quod illi, qui sumunt signa primigenij status loco signorum pertinentium ad aduentitium apertissimè labantur in paralogismum æquiuocationis, quod argumentum est in quatuor terminis.

Tandem concludimus ægotantes reducendos esse ad statum, quodum nuper erant sani, fruebantur, & nequaquam ad primigenium.

Ostenditur posse mutari sine morbi introductione temperaturam, metrum, figuram, & figuram partium: exordia vero, substantias, numeros, compositiones, officia, & progressus esse immutabiles. Cap. II.

Ostendimus superius decem tantum esse differentias partium corporis, quæ affectus vniuersos tam naturales, quam præter naturam conseruiunt: hic verò paucis declaratur, quod aliquæ illarum differentiarum ab exordijs nature

non

non possint per totum vitæ cursum in-
animantibus mutari sine noui, & ali-
quando lethalis morbi introductione,
aliquæ verò possint mutari sine morbo.

Quæ verò non possunt mutari videntur
esse exordium, substantia, numerus,
officium, compositio, & progressus partium,
quæ verò possunt mutari sunt temperaturæ,
meatus, situs, & figuræ partium.

Etenim multum interest in aduentitij
status contemplatione scire, quæ conditiones
sint mutatæ, quoniam alio modo
recessus à statu naturali est metiendus le-
sa temperaturæ, vel læsis meatibus, vel fi-
gura, vel situ, quæ si reliquæ conditiones
essent mutatæ: quoniam partium tempe-
raturæ situs, & meatus, & figuræ sæpe al-
terantur, & mutantur, manente tamen
valetudine inter limites naturales, potest
enim esse, vt aliquis habuerit ab ortu na-
turæ ventriculum calidum, attamen tra-
ctu temporis mutauerit in frigidum, &
frigidum aduentitiū, & acquisitum con-
seruauerit sine noua morbi introductione,
quod non euenit in officiorum muta-
tione, quoniam officia videntur esse im-
mutabilia, alterabilia tamen in viuente
secundum magis, & minus.

Hinc si ventriculi officium, quod est
chyl. ficare, & officium hepatis quod est
sanguificare, & alia omnium partium of-
ficia consideremus, videbimus, quod om-
nia, dum viuunt animal, sint immutabilia,
alterabilia tamen secundum magis & mi-
nus, quoniam si destruantur officium ven-
triculi, quod est chyl. ficare, fit statim illa
lienteria, quæ est indelebilis, & lethalis;
similiter, si iecoris officium, quod est san-
guificare, adimatur, nulla amplius salutis
spes est relicta, quare experientia patet, in
officiorum mutatione non solum nouos
morbos sequi, sed aliquando exitia, & ho-
minum mortes.

Quo ad temperaturnas videmus sæpe
illas mutari sine noua morbi introductione,
sicuti patet, dum iecur, quod est sua na-
tura calidum, temporis spatio fit frigidū
sine morbi introductione, similiter caput
ab ortu naturæ, & in prima generatione
humidum redditur siccum eadem ma-
nente valetudine.

Galenus 2. de temperamentis 4. dicit,

quod occasione alicuius cōsuetudinis ali-
quis calidus cum venis latis fieri possit
pinguis, humidus, & frigidus: addit inue-
niri interdum gracilem occasione con-
suetudinis vinendi ex calida in frigidam,
& frigida in calidam mutari sine morbi
introductione.

Quo ad meatus, eadem videntur dici
posse, quia sæpe corporis meatus sunt
maiores, vel minores, & valde dissimiles
à primogenia constitutione, attamen in
latitudine sanitatis conservari possunt;
ita vt non semper affectus in meatibus
recedant à statu salubri.

Simili modo figura omnium partium
potest adeo mutari, vt nulla similitudo
illarum amplius conservetur, attamen
non semper ob figuræ mutationem na-
scitur recessus à statu salubri.

Cæterum hæc quæ dicta sunt de tem-
peratura, meatu, & figura partium, non vi-
dentur posse observari in cæteris condi-
tionibus; non enim videmus homines cō-
servari sanos iam mutatis partiū aliqua-
rum exordijs, officijs, numero, & reliquis
propositis; quoniam, si neruorum, vena-
rum, siue arteriarū numerum quis amitte-
ret esset impossibile, vt inter limites sa-
nitatis conservari posset.

Ad eundem modum, si quis amitteret
alicuius partis propriam substantiam,
veluti si ossa sua substantia dura euade-
rent mollia, absque dubio morbo aliquo
uexaretur. Quod diximus de ossium sub-
stantia, de quolibet partium substantia di-
ci potest.

Similiter videmus uasa, & partes cor-
poris nō amittere suum progressum sine
morbo, & maximo recessu à statu salubri,
quoniam si uenarum, uel neruorum sur-
culi mutarēt progressum, illic in egritu-
dinem talis fieret lapsus, ut sæpe de ani-
malis uita actum esset; quare uasorū pro-
gressus debēt seruari ab exordijs naturæ
usque ad ultimū diem, etenim si uena
magna, quæ est in iugulo, uel sextum par
neruorum mutarent suorum surculorum
progressus, ut surculi uenæ iugularis non
excurrerent in caput, vel surculi sextæ cō-
iugationis neruorum non progredierēt
ad pulmonem ad icent, & ad os ventricu-
li, tunc hæc mutatio progressus non so-
lū ægritudinem; sed certum exitium

promitteret.

Similiter compositio quælibet mutata, vt omnes sciunt, siue sit synarthrosis, siue sit diarthrosis, siue symphysis sine morbo mutari non potest.

Hæc sanè de temperatura mutata non sequuntur, quia vt diximus ventriculus æccus si fiat humidus, non solum destruitur, sed conseruari potest inter salubres limites.

Neque in meatibus mutatis videmus semper sequi malas valetudines, cum magis, & minus aperti seruentur, eadem manente bona valetudine.

Nec denum videmus, ob figuram mutatam illic ægitudines suboriri, quoniã si de figura loquamur, vt faciei & aliarum partium externarum, & internarum aliquid quando figura mutatur secundum totum, attamen nulla sequitur ægrotudo, quemadmodum in illis obseruatur, qui ab infanzia usque ad senectutem numquam in ægitudinem prolapsi sunt: in quibus figuræ omnium partium internarum, & externarum sunt nullies mutatae sine morbi introductione.

Colligimus ergo mutari posse sine morbi introductione temperaturam, figuram meatus, & situm partium: non mutari sine morbi introductione exordium, officium, numerum, substantiam, progressum, & compositionem partium corporis.

Ex ijs quoque colligimus, quæ sint illæ conditiones, quæ magis pertinet ad primigenium, & quæ ad statum aduentitiu, quæ enim magis pertinent ad primigenium sunt illæ, quæ in viuente difficilè mutantur, vt sunt quæ sine morbo non mutantur; cæteræ verò, quæ promptè mutantur, magis pertinent ad statum aduentitiu.

Habet latitudinem venarum ergo, iecur habet calidum, ostenditur consequentiam esse nullam. Cap. III.

EXtraditè faciliè colligimus, quomodo errent qui volunt intelligere, morbosicium recessum à statu naturali aduentitio per illa signa, quæ declarant morbosicium recessum à primigenio statu: quoniam ob hanc signorum æquiuoca-

tionem, incidunt in paralogismum quatuor terminorum; aduentitius enim status in ætatis progressu à causis externis introducitur, & valdè differt à primigenio statu, qui in primis generationis exordiis acquiritur; cum igitur status isti sint diuersi, ualdè miror nonnullorum medicorum inscitiam, qui ex signis primigeniæ constitutionis colligunt aduentitiæ, & præsentem constitutionem, sicuti dum ex latitudine venarum, quæ tales factæ sunt in prima nostra generatione, colligunt, hepar esse calidum, in qua re maxime decipiuntur.

Quoniam hepatis caliditas præsens, & aduentitia nõ est illa, quam in prima nostra generatione acquisimus, quandoquidè tractu temporis temperamēta variantur, & viscera, quæ ab initio erant calidissima ob usum, & consuetudinem externarum rerum possunt in temperamēta frigidiora degenerare, & varijs modis alterari tam secundum passiuas, quàm actiuas qualitates, eadem manente vasorum magnitudine, & figura.

Hinc hepar, quamvis in maximas incidat febres, & infinitas temperatura ipsius mouetur, & permutetur, magnitudo tamen hepatis, & venarum seruat immutabilis; Similiter videmus homines, capite magno præditos modò in calidam, modò in frigidam, modò in siccam, & modò in humidam dyserasiam corrui, eadem magnitudinæ capitis sub omni sorte perseverante.

Quæ cum ita sint, faciliè patere potest, quantum errent, qui ex venarum latitudine caliditatem iecoris necessariò inferunt.

Errat primò quia cõfundunt signa ostendentia recessum à statu primigenio cū signis ostendentib. recessu à statu aduentitio.

Secundò errant, dum credunt solâ latitudinem venarum caliditatem iecoris significare, quod videtur Gal. aduersari, quoniam in arte medicinali non inferebat ardorem hepatis solum ex latitudine venarum; sed ex syndrome signorum sufficientissima, scilicet ex fluxu bilis abundantia, ex atra in cõsistenti ætate ex corpore vniuersim calido, ex ventre, & hypocõstrij hirsutis, & ex latitudine venarum calidam iecoris temperiè colligebat.

Tertiò errant, quia magnitudo nõ pertinet

tinet ad temperiem, sed ad compositionem, ergo magnitudo venarum non arguet hepatis temperaturam calidam.

Præterea possumus quoque altioribus principijs probare, venas nullum habere nexum necessarium cum hepate, quoniam potest defendi, quod venæ in prima generationis nostræ origine non trahant ortum ab hepate, quod probatur tum ratione, quæ est desumpta à Galeno secundo de temperamentis, ubi affirmare videtur hepatis esse parenchyma venarum: tum experientia, quæ observatur in formatione fetus pulli, in quibus fracto ovo, quod quatuor dierum spatium à gloriante gallina sit fotum, antequam aliquod vestigium, & rudimentum hepatis appareat, venula quædam conspicitur.

Quæ cum ita sint, dicere non possumus, quod venæ sint hepatis germina, cum re vera in ipso fœtu venæ prius generentur; quare nullo modo venarum conformatio caliditatem iccoris significabit, si illo erunt priores.

Præterea potest comprobari virtute analytica, quæ re vera cogit, & deinceps animos, quod scilicet nullus sit necessarius nexus inter venas, & hepatis, & per consequens neque icterus calidum magnas venas facere: neque magnas venas ostendere caliditatem ipsius.

An he Aristoteles 2. post. habet, si causa est temporis momento prior effectu, illam nullum habere nexum necessarium, & per se cum effectu, & per consequens illam non esse veram causam illius effectus, & ratio est, quia si effectus non semper est in sua causa, sed aliquando tantum, causa illa non prædicabitur de illo affectu de omni, de ratione cuius due requiruntur conditiones, altera est æternitas, altera verò, quod ille effectus sit in omnibus individuis illius speciei, veluti (vt exemplis nobis illustramus) si homo esset prior risibilitate horæ momento, sequeretur quod homo non esset risibilis, quia hæc propositio, quæ dicit, hominem esse risibilem, non esset semper vera, & ratio est, quid non esset de omni, illud enim quod non est semper, non est de omni, & quod non est de omni, non est per se, & quod non est per se est accidentale, & quid est accidentale, vt sustinet Averroes potest esse falsum, er-

go venæ, quæ erunt horis, & diebus in generatione priores hepate, vt patet per experientiam propositam; non erunt causa hepatis, nec hepatis causa venarum: similiter, neque venæ indicabunt iccoris conditiones, neque hepatis venarum magnitudinem, vel parvitatem; quomodo ergo poterunt venæ latæ, & amplæ ostendere caliditatem iccoris intensam.

Quare nisi dicamus, latitudinem venarum cum syndrome aliorum signorum tantum posse indicare caliditatem iccoris, nullo modo colligere poterimus ex latitudine venarum caliditatem iccoris, quia signa per syndromem collecta sunt omnia accidentalia, signum enim proprium, & per se vnicum est, quia vicius rei vnicum tantum est signum per se, quia de ratione signi proprii est, vt conveniat omni, soli & semper, & conuersum dicatur de eo cuius est proprium: propria enim signa collocantur in secundo modo dicendi per se, hæc sola sunt, & non plura, in vna specie.

Quando verò sit syndromis, ed sit, quia proprium signum est ignotum, & innotum, ideo multis alijs circumferibitur.

Hactenus arguimus per instantiam, & ostendimus latitudinem venarum non significare temperaturam iccoris, quia venæ non produnt à parenchymate: Nunc illud met infringi potest per fiduciarum reprobationem, dato scilicet, & non cōcesso, quod venæ sint hepatis germina, negamus tamen latas, & magnas venas semper fieri à magno visceris calore; ratio est, quia partium magnitudo non sequitur primas qualitates calidas, vel agentia calida, sed formatricem, & multitudinem materię.

Quod reprobari potest auctoritate, ratione, & experientia, auctoritate, quia Galen. 2. de temperamentis, ca. 8. habet partium magnitudinem sequi virtutem formatricem, & multitudinem materię.

Similiter lib. de art. med. cinali ubi agit de capite paruo, & magnos, dicit magnum caput fieri posse vel à virtute facultatum, vel à multitudine materię non regulatæ à virtute, cuius facultates instrumentum ex Galeno est calor: Ecce ergo quod magnum fieri potest à multitudine materię tantum,

rantum, & non semper ab aliqua virtute determinata calida, vel frigida; quare si non semper à calore, ergo non erit per se hæc propositio, calor efficit magnas partes, ergo erit per accidens, ergo erit falsum, dicere, esse caloris proprium efficere magnas venas, & magnum caput, & cetera viscera maiora.

Insuper probatur ratione, quoniam si materie multitudo possit reddere viscera maiora, hæcque materie multitudo possit sequi modò frigiditas, & modò calidas causas, ergo cōtingens erit, ut calor efformet magna viscera, contingens inquam, quia si calor debet efficere hæc viscera magnitudinem, requiritur in primis, ut materia sit proportionata, ut abint impedimenta, ut materia non sit euapotabilis, & diaphoretico modo exhallet, uel calor nimius non sit; qui exsiccat resolucendo, & absorbendo aquam humorem, quippe qui auget continuando partes terrestres, easque secundum omnes dimensiones distendit.

Postremo experientia cōfirmatur, quoniam uidemus, Germanos, qui sunt ut plurimum proceres, calore uacare, uel talē esse feruoris expertes, ut hinc pituitæ grādem copiam coaceruent, & eorū corpora undique pituitosis scateant recrementis: Similiter uersa uice obseruatur, inueniri homines parue stature, qui sunt caloris feracissimi, quinimò ut plurimum obseruamus paruos esse calidiores, magnos uerò esse frigidiores, quare nullo modo dicendum est, calorem, qui est instrumentum facultatis, efformare partes, sed dicendum, pertinere ad formatricem, quæ uariis instrumentis, & non calore tantum id efficit; quæ autem sint hæc instrumenta formatricis facultatis, hic non est locus.

Relinquitur ergo, ut in hoc capite inferamus has consequētiās non ualere, est latitudo uenarum, ergo hepar calidum, est hepar calidum, ergo latitudo uenarum, lata enim uenæ modo sua natura magnæ sunt, modò parue uidentur magnæ ob distensionem factam uel à copia sanguinis, uel ab impetu spirituum, ut in uolentissimis exercitijs, & balneis obseruatur.

Similiter dicimus, uenas ab octo naturæ

magnas reddi adeo flaccidas, & paruas ob spirituum, uel sanguinis caritatem, ut uix conspici possint; quare inferimus esse uanissimum colligere ex latitudine uenarum iecur esse calidum, uel ex paruitate uenarum iecur esse frigidum.

Demum tanto maior istorum error redditur, quia si latitudo uenarum ostenderet temperamentum, quod (ut probauimus) est impossibile, ostenderent temperamentum primigenium, & nequaquam aduentitium, quod querimus, & à quo metimur recessum morbificum, & ad ipsum conamur ægrotantes transferre: quare patebit experientia, auctoritate, & plurimis altissimisque rationibus latitudinem uenarum non ostendere iecoris caliditatem.

Ostenditur aduentitium statum solum, acquiri per consuetudinem sex rerum non naturalium. Cap. IV.

EX præcedentibus patet, omnes illos errare, qui in specificis cognoscēdis affectibus solent à statu primigenio metiri morbificū recessum: supponunt enim morbos uniuersos à primigenio statu recedere, & ad ipsum solum ægros esse reducendos: quod est omnino falsum; etenim ægrotantes alium non exoptant statum, quam illum, quod cum proximè erūt sani) iruebantur, & talis est aduentitius, & nequaquam primigenius.

De hoc igitur aduentitio agendum relinquitur in hoc quarto libro: Ceterum cum aduentitia natura ex omnium opinione fiat à lōgo uis, & cōsuetudine sex rerum non naturalium, quatenus uidelicet causæ non naturales alterando mutāt constitutiones tam naturales, quam præter naturam, & mutatis illis nouæ gignitur, proinde uolētes agere de statu aduentitio, uel de nonis constitutionibus, non possumus de alia re agere, quæ melius statum nouos declaret, quam de cōsuetudine, quoniam à longa cōsuetudine omnes noui & aduentitij status seu constitutiones introducuntur.

Propterea non est mirum, si à plurimis cōsuetudo uocetur altera natura, quam opinionem auctoritate, & experientia nostrates cōfirmant, auctoritates, quia Gale-

nus lib. de assuetud. cap. 2. habet hæc verba „ quæ longa consuetudine sunt comparata , vim ferè proprietatis naturalis contrahere . Experientia , quia à consuetudine sex rerum non naturalium omnes facultates, animales, vitales, & naturales adeo alterantur , vt temporis cursu infinitos status possint recipere .

Quæ omnia exemplis confirmantur, an ne corpus quod est à primordiis naturæ calidum tractu temporis ob assuetudinem rerum non naturalium frigidarum fieri potest frigidum, eadem manente valetudine ? Similiter biliosa corpora fieri possunt pituitosa, & talia inter limites sanitatis possunt conservari .

An ne (quod maxima admiratione dignum est) ob assiduam consuetudinem , & vsum cicutæ tolli potest etiam eius venefica virtus ? sicuti relatum est à Galeno de Anni quadam , quæ cicutam ob longum vsum in nutrimentum conuertit .

Similiter in facultatibus vitalibus idem obseruatur , timidos videlicet assuetudine belli fieri corpore , & animo fortes , thymodes verò ob contrarios vsus fieri timidos . Demum animales tam rectrices, quàm cæteræ omnes longa , & varia assuetudine adeo alterantur , vt novos habitus , & nouas naturas recipiant , & tales inter latitudinem quoque sanitatis conserventur .

Constare igitur videtur auctoritate, & experientia , omnes aduentitios status à consuetudine , & vsu sex rerum non naturalium habere originem . Quod cum ita sit, videtur rationi consentaneum , vt de consuetudine , tamquam de principio omnium nouarum cõstitutionum verba faciamus agentes prius singillatim de ijs quæ à consuetudine alterantur, deinde de definitione , & proprietatibus consuetudinis, quibus præcognitis, plurima ad medicinam pertinentia fient clariora .

Adest enim inter cæteras consuetudinis proprietates illa admodum præcipua , quod scilicet assueti minus lædantur à contrariis, cuius rei cognitio quanti sit in arte medica infra quoque patebit .

Similiter in arte medica videmus consuetudinem tantum posse vt assuetus rhabarbaro ab ipso non purgetur , assuetus lactucis à lactuca non alteretur assuetus

veneno ab ipso non interficiatur , Quid multa ?

Audias demum quantum potuit consuetudo: noui hominem, qui tractu viginti annorum vitam in obscurissimo carcere traiecerat, qui vt primum tenebris carceris & putridis illis halitibus fuerit liberatus in ægritudinem inciderit lethalem, eaque ægritudine liberatus vixit anni spacio malè affectus, data tamen occasione, vt iterum mitteretur in carceres , incepit sanari, & sanus conservari .

Hinc Galenus dicit in senibus, & debilibus non esse mutandas consuetudines quamuis deterimæ sint; Quare cum tantum sit hæc de consuetudine inquisitio , summa diligentia de ipsa est agendum .

Exemplis ostenditur à longa consuetudine, & vsu externarum causarum corpus in varias, & aliquando contrarias naturas mutari posse. Cap. V.

Cum optimus Medicus vltimas affectuum differentias consequi non possit, nisi recessum ab aduentitio statu sciat metiri; & quilibet aduentitius status à longa consuetudine sex rerum non naturalium suum initium trahat; par est, antequam consuetudinis definitionem excutiamus, vt luce exemplorum pertinentium ad omnes facultates corporis ostendamus, quanta perennis rerum externarum consuetudo potentia, & virtute polleat , & quæ sint illæ animantium facultates, quæ adeo mutantur ob longam aliquam consuetudinem , vt status aduentitios & novos acquirant .

Videbinus assiduam consuetudinem tantum posse, vt modò facultates animales, siue sit rectrix , siue motrix , siue sit sensatrix alterentur , & in ipsis ingenerentur noui & aduentitij status, modò vitalem, & naturalem adeo mutari, & alterari , vt diuersos & contrarios suscipiant habitus .

Sicuti si de intellectuâ potentia loquamur , videmus solertes homines ob præceptorum consuetudinem in falsa dogmata vocari .

Si de vitali potentia , videmus fortes malo vsu: ineptos , & debiles assiduo vsu in omni opere aptissimos reddi .

Si de naturalibus facultatibus, videmus eo usque potentiam longæ consuetudinis peruenire, ut venena in optima conuertantur alimenta, sicuti de vetula longo temporis tractu alia cicuta Galeus refert. Expedit ergo quamplurimis exemplis tantam virtutem consuetudinis præcognoscere: quoniam illa virtute præuisa status aduentitios ingenitos in corporibus nostris promptius perquiremus, nec aduentitias constitutiones cum primigenijs confundemus.

Quantum igitur attinet ad rectricem animalem; qualis est discursiva facultas, si hanc diuinam facultatem expendamus quoties ob longum, & malum usum falsarum opinionum perueritur, atque decipitur; possumus exemplis sexcentis hoc demonstrare, quomodo scilicet falsæ opinioniones longa consuetudine ab illis, qui sunt addicti sectis iudicantur veræ, & rationi consonæ.

Platonici enim ad credendum soliti rerum species, & ideas non hinc, sed in mente sub Deo locari, eo veniunt, ut dicant in Mundo hoc sublernari non esse verum hominem, & verum equum, vel alias species; sed dumtaxat vestigia & simulacra specierum, vel (ut aiunt illi) essentiarum umbras; & vterque dicant, Deum carere intelligentia, esse tamen intelligentiæ fontem, mundum habere animam, & Demones plures varijs modis vagari, & alia innumerabilia sustinent, quæ sunt veræ philosophiæ aduersa: nihilominus fabulosis his opinionibus ita accommodantur, & assuescunt, vtralio modo ob illius doctrinæ consuetudinem Platonici nec velint, nec possint, nec sciant philosophari.

Peripatetici verò ita ex animo philosophi vestigia sequuntur, ut in ultimo senio credant, & ad mortem usque defendant varia ipsius dogmata, perinde ac essent coacti, & deuincti, quinimmo uel illi, qui peripatetico diceret dari vacuum, dari infinitum actum, mundos plures esse posse, inmundumque non esse æternum: negaretque nunc esse copulam temporis præteriti cum futuro, uel alias rationes, quæ re uera sunt paulò fortiores, sicuti ueluti dum dicunt mundum non esse factum, quia ab agente antiquo non pro-

ueniat actio noua, uel quia motus quilibet semper alium motum supponat usque ad infinitum.

Similiter inter illos uali illi qui negaret dari quintam essentiam, dari elementum ignis supra aerem sub-orbe lunæ, unicuique esse intellectum agentem in tota humana specie, & alia plurimæ id genus: quibus firmiter credunt, sed non statim, quando addiscunt, sed quando hanc philosophiam temporis cursu defendere assuescunt, tunc enim firmiter, & pertinaciter illis opinionibus, siue sint falsæ, siue veræ æquæ adhærent: tuncque dicimus in animis ipsorum consuetas opinioniones tam altas agere posse radices, ut ipsi uidentes philosophos alites sentire, illos urgeant conuicijs, & putent re uera esse mentis lumine obsecratos.

Sed Aristotelem dimittamus; quia forsitan quamplurima obscura, & quæ tenebrarum uelo prius erant obducta, aperuit; adeamque Aristotelis interpretes, si uelinius cognoscere quantum possit opinionum consuetudo, sunt aliqui assueti principijs & opinionibus Scotistarum, quibus si anni spatio assuescant, inde toto uitæ suæ tempore sectam illam tantconstanter sequuntur, ut philosophis aliarum opinionum inter crimen ignorantie liberè obijciant, dicuntque præcipuè à ueritate desistere Thomistas, tantoque animi impetru pro sua opinione disputado, ut odio prosequantur alios philosophos.

Ex altera parte non desunt Thomistæ de illis malè cogitare Scoti doctrinam explodendo, sectatoresque ipsius increpando, quinimmo tanta animi uis sententias aduersariorum arguunt, ut illos detrectent, & crimina seu *σχίσματα* illis inurant.

Eodem serè obseruantur contentiones inter expositores Græcos, & Arabes, ut nemo sententiam longo usu creditam odio habere possit, quamuis esset falsissima; Tale quippiam in iuris prudentiæ scriptoribus accidit, ut pro consueta opinione quilibet pertuaciter in arenam conscendat.

Denique si consuetudines diuersarum gentium consideremus statim obseruamus, proptios mores omnibus uideri optimos, & rationi consentaneos. Liceatque mihi aliquas diuersarum regionum consue-

suetudines paucis afferre, vt videamus quantum consuetudo placeant.

An ne Turcæ consuetudinem ducendi plures vxores, vel maximè approbant? quam nos refellimus; diuino tamen afflati spiritu, qui fallere non potest.

An ne in Germania vino repleti, & ebrietate lymphati ob vsum, & cōsuetudinem vitium minimè considerationis iudicatur? quinimò vino hilari animo obrui apud illos vt (vidimus) erat signum probi, & synceti hominis; in Italia tamē, & varijs Europæ partibus, vbi non viget hæc bibendi libido, ebrietas indicatur summum probum, & extrema turpitudine.

Similiter, an ne apud Herodotum legimus lib. 1. Messagetes cum senes parantes extrema ingrauescerēt ætate interfecisse, & comedis? & illorum tantummodo, qui à filijs proprijs occisi, atque comesti erant, scriuabantur honoris condigna, elogia; quo apud nos nullum esset facinus magis durum, atque scelestum.

Insuper, an ne apud nos vxores violari est maximè vitium? verum audias quantum possit consuetudo: Ferunt relationes in quodam Indig loco, quādo vxores ducuntur, maritos prius ipsas ducere ad sacerdotem illius loci, qui octo dierum spatium illas coeūdo exerceat, & colligat primitias, & mox maritos sic stupratos recipere, vt digniores, & præstantiores; quia talis est consuetudo, vt illæ mulieres, cum quibus sacerdotes primò non coierit, non sint admixtæ, vt inter alias versetur, quod apud nos nulla mulierum infamia, nullaque turpitudinis nota maior esset; videas ergo quam variae sint assuetudines gentium, quæ infinitos mores monstruosos approbant; quinimò tanta obseruatur varietas consuetudinum diuersarum gentium, vt omne quod in nostris regionibus videatur turpissimum apud aliquas gentes iudicetur pulcherrimum, & quod est apud nos falsum, apud alios ob malas aliquas consuetudines verissimum existimetur.

Ademum (ne prætermittamus hoc exemplum, quod est adeo cōmune, vt quilibet ab ipso quantum possit consuetudo colligere valeat) an ne qui capiuntur amore, qui est re vera quædam species humanæ

stultitiæ orta ob assuetudinē obiecti amati, aliquando tam turpissimo obiecto flagrent, vt omnes mirentur irrideantque quo pacto homines alioquin sapientes in hanc insaniam cadant? quod sanè fit, quia toties approbatur obiecta, vt inde approbandi repetitio fiat consuetudo, vnde à consuetudine oriatur amor: quare rectè inferre possumus, quod nihil magis impediat veritatis cognitionē, quā cōsuetudo.

Verum ne scrupulum criminis quispiā mihi inurat, quod tanti faciam consuetudinem adamus Aristot. 2. metaphysices tex. 15. qui de consuetudine loquitur hac verborum serie, cōsuetudo maximè impedit veritatis cognitionem, quod leges declarent, in quibus puerilia, & fabulosa magis possunt, quam veritas in se; ecce igitur quod consuetudo auctoritate quoque philosophi impedire potest cognitionem, & quod deterius est facit, vt fabulosa magis possint, quam veritas ipsa.

Possim hic proponere quamplurimos auctores, qui de moribus gentium monstruosis agunt, sed ne lectores diutius demorer, dimissis alijs afferam solū, quæ referuntur à Sexto Empyrico, qui hac verborum serie de varijs gentium cōsuetudinibus scripsit, Indis eum primis placeat cum vxoribus in propatulo congregari, quod à nobis ridiculum existimaretur: in Tauris Scythiæ lex erat, & consuetudo, peregrinos Artemidi immolari, quod apud nos adeo est vetitum, vt non solum non interficiantur homines in templis, verum si iussu principis quis debeat interficere, si templum ingreditur, sit turtus; pergit, apud Persas esse consuetudinem vt Veneri præpostera, apud nos verò nihil est tam vetitum; apud Persas licitū esse matris concubitus, apud Ægyptios posse cum sororibus contrahi nuptias; quare quemadmodum nos illorum consuetudinem increparemus, ita illi nostras accusarent, vt omnes assueti laudent, & extollant ad sidera proprios mores, quia omnes gaudent assuetis.

Ceterum non solum variae consuetudines mentem sepe perturbant, sed quod miserrimum est, decipiunt sensus ipsos, à quibus omnium nostrarum cognitionū exordia desumimus, & bona doctrinæ semina

semina colligimus, quod potest ostendi lucidissimis exemplis; incipiamus à sensu gustus, qui est manifestissimus omnium, & ne illud lectoribus videatur paradoxum, quod scilicet ob consuetudinem decipiat gustus: afferamus Aristotelis auctoritatem sect. 21. problemat. 14. ubi hæc verba leguntur, consuetudine sunt alimenta gustui suauiora.

Ostendamus ergo exemplis gustum ob consuetudinem, & vsus varios sapissimè alterari & mutari: quinimò aliquando accedere, vt quæ visui nostro sint accommodata, morib. diuersarum gentium sint inuisa, & ferè deleteria, & versa vice: An ne Tartari assueti à primis annis incoctæ carni equinæ, ea oblectantur? quæ nobis insolitis adeo esset inuisa, vt illicò gustus prorsus exploderet.

Insuper referente Sexto empirico in pyrrhonicis tempore Hippocratis in variis ægritudinibus dabatur caro catulorum, quam nostrates valde abhorrent.

Similiter nos ranis vescimur; Germani, & Græci respuunt: quinimo consuetudines variant, & alterant gustum in hominibus vnus ciuitatis, inueniuntur enim aliqui, quibus ita displicet appium, quod seleno vulgariter vocatur, vt priusquam assuecant, varijs refellat iurgijs, quippe qui, si assuecant, nesciant carentes illo comestationes adire, & quod de appio dictum est, idem de caseo, & de sexcentis alijs potest dici.

Tale quippiam mihi contigit, dum in Hungariam secessi; quia primis mēsis panem illum azimum Hungaris assuetum abhorri, attamen paulo post, dum assuecerem dulcior mihi est vsus. Similiter vinum, quod Italico erat aliquantulum dissimile mihi videbatur minus suaue, itidem de omni ferculo, denumquamē acquisita illorum cōsuetudine, reuersus in Italiam amissa aliquantulum nostratum ciborum consuetudine, agrè sanè in primis mēsis paternis cibis potui me accommodare, vt propterea nouæ introducantur consuetudines, quæ amitti, & iterum acquiri possint.

Patet postremò sensum gustus ob vsum lōgum omnibus accommodari exemplo illius vetulæ, quæ cicuta alebatur, cui cicuta gustui fuit tandem gratissima.

Colligimus ergo quam sapè errare possint medici, qui degustant, an vinum sit profuturum conualescentibus, & sine alio examine colligunt ex proprio gustu, quod illis sit collaturum, quod non semper sequitur, quia si conualescens dum optimè sanus erat, erat quoque assuetus illi vino, licet à medici gustu non probeatur, esset tamen vinum solitum approbandum; requiritur ergo, vt obseruentur ægrotantium consuetudines, & dispositiones, de quibus dispositionibus hic non est locus vt agamus, quia in primo libro de his actum est, & in 6. quoque diligentissimè agemus in capite de signis dispositionum ægrotantium: hic tantum exemplis colligimus sensum gustus omnium manifestissimum à consuetudine decipi posse.

Quæ verò pertinent ad sensum visus, ea solum, quæ longa assuetudine oculis plurimorum hominum arrisere vocantur pulchra, quæ verò displicere, vocantur: Hinc cum soliti simus credere mulieres ornatas margaritis esse pulchriores, tantum potest assuetudo, ut plurimæ alioquin deformes illis ornate oculis tantum arrideant, ut pulcherrimæ, & elegantissimæ videantur.

Similiter soliti longo usu uidere mulieres capillis ad instar cornuum eleuatis sine hoc fuco hic eas despiciamus, quibus ornamentis si ab exteris exultæ uideantur, putent nil turpius illis uideri posse.

Si uerò nostrates incipiant Germanas mulieres ornatas orbiculis super clauiculas statim illas, ut insolita ipernunt, & irrident ornamenta, ut consuetudo sola uideatur esse iudex pulchritudinis.

Insuper si de oculorum pulchritudine loquamur, an ne in tota Europa his temporibus creditur nigros oculos magis exornare, quam albos, & glaucos: nihilominus in Africa pulchræ mulieris oculus albis donatæ præteruntur cæteris omnibus: Similiter præcis temporibus Anacreon Poeta Lyricus celebrans excellentes pulchritudines oculorum amicæ suæ refert glaucæ oculis fuisse donatam.

Similiter Petronius arbiter ad sydera extollens pulchritudines elegantissimæ iuuenis refert habuisse oculos albos, qui

stellæ

stellæ lucētis specimē emularentur.

Si de partibus nostris corporis loquamur, Arist. Galenus, & anat omittant de rebus sensibus nostris subiectis: Aristoteles 3. de part. anima sūm dicit in corde tres esse ventriculos, tamen Galenus & anatomistæ dicunt esse duos, quos non semel vidimus. Similiter de multis alijs dicendum.

Hæ varîe atque diuersæ opinionēs pertinentes ad sensum visus sensum ferme comparantur, quoniam à pueritiâ, vel long. temporis tractu incipimus ab alijs edocti dicere hoc esse melius, & pulchrius deinceps facile ex labimur, quo ob vsū, & consuetudinem firmiter credamus.

Præterea, vt plurimis exemplis ostendamus consuetudinem alterare sensus visus, libeat hæc subdere: qui incolunt Mauritaniam putant feminas nigras, ut atramentum, esse pulcherrimas; Qui Europam albas, simulque colore roseo præditas; in Mauritania (ut aud'o) luciferum pingunt album, nos uero melioribus fundamentis, edocti, nigrum.

Concludimus ergo, dum assuescimus uocare aliquid pulchrum, uel turpe, hanc consuetudinem tantum posse, ut sensus uisus facile deſcipiat, quinimod, si soliti essemus uidere homines cornua gestare, ut boues, si duos oculos in frōte, quatuor nares, aures asini, dentesque elephantis, ubi sine his monstruosos conditionibus uideremus hominem, ut insolitum indicaremus esse turpem, indecorum, & monstruosum, meritoque circulatores possent obolum pro ostensione insoliti hominis exſlagitare; patet ergo experientia sensum uisus omnium præstantissimum in addiscendo quam sepiſſimè falli posse.

Sensus odoratus simili modo ob consuetudinem decipi potest; hæcque sunt exempla: plurimi sunt, qui laudant muscum, rustici non assueti illum arguunt, & proiciunt: Viri politici alij odorem excludunt, rustici uerò alium præferunt musco orientali: Indi (ut refert Nicolaus Monardes loquens de assa fetida) ferculis, assam fetidam, ut suauius oleant, immiscent; Nos autem præfatore illius sepe morimur.

De auditu uaria sunt exēpla, quæ ostē-

Sanctory Sanctory Pars I.

dunt, quo pacto sensus iste à consuetudine decipi possit: adest Turcarum musica auribus nostris insuauis, nostra uerò artificiosa Turcis est inuisa, Turcis enim cum primis placent rhythmi improporionati, quia illos audire soliti sunt, proportionēs uerò nostræ ipsorum auribus insolite reprobentur.

Sed ut familiarissimis exemplis cognoscamus auditum à consuetudine mirum in modum moneri, & alterari, dicas mihi quid auditum nostrum magis lædere potest, quam fabricorum limæ sonus ille acutus? uihilo secius fabri soliti libenter eliminare audiūt, quinimod quo acutior est sonus, illis est eo gratioꝝ, quare tantum abest, ut limæ sonum acutum abhorreāt, ut potius approbet, laudentque limam dicentes ex optima materia esse factam, & eis maxime arridere; nemo sanè dicit mihi aliam causam harum uariarum opinionum pertinentiū ad auditum, quam consuetudinem & uisum.

Concludimus ergo quemlibet sonum alicui insuauem posse alteri assuetolo tempore cursu placere, nisi sit ita uehemens, ut sensum corrumpat, ueluti sunt instrumentorum bellicorum bombi, tonitrua, & fulmina potētissima, quæ suo impetu acrem ingentium auris eueruant, & expansum illum neruum ualde percutiunt, quod contigit præcipue in debilioribus, quoniam fortiores possunt quæ assuescere bōbis illis uehemētissimis instrumentorum bellicorum, & inde illis potius oblectari, quā uexari; ratio autem, cur uisus longus uehemētissimū strepitus auditum non lædit, eadem est, cur uetula ob longum vsū cicuta non lædatur, quinimod ea oblectetur, de qua ratione, & causa infra diligenter agemus.

Postremo tactus longo vsū, & consuetudine potest plurimis rebus contrarijs atque aduersis assuescere, quemadmodum illi, qui incolunt regionem frigidissimā, si eant in Syriam nemini dubium, quod primis mensibus insolitum calorem vix possunt sustinere, cui tandem assueti aptentur illi regioni, quæ antea erat contraria, & nullo modo uerentur.

Similiter si homines, qui in delicijs uiuere conueuerūt fiant heremitæ, nudisque pedibus incedant, primis diebus an-

M

tequam

tequam cutis callo obducta sit, valdè torquentur, quippe qui si assuescant adeo apertur frigidis obiectis, ut per niues nudis pedibus incedant.

Præterea non modò intellectiua, & sensitiua potentia à longo vsu, & consuetudine decipiuntur, & alterantur: verum etiam virtus motiua, quod experimentis plurimis ostendi potest, sicuti quando videmus homines fieri in illo motu, quem exercent validiores, quamuis debiles extiterint, antequam se illi exercitio tradidissent; imbecilles enim consuetum motum facilius exercent, & ad illum se præstant validiores insolitis, qui robore validissimo essent donati, ut ex ijs certò colligere possumus à robore differre consuetudinem, esseque aliquid aliud: hæc quoque ab Hippocrate paucis explicata sunt 2. sect. aph. 49. ijs verbis: quotidianis laboribus assueti, si inualidi sint, aut senes, insueti, quamuis robusti, & iuuenibus facilius consueta ferūt exercitia: Potest ergo consuetudo indere robur facultatibus naturalibus, quia assueti sunt promptiores, & validiores ad actionem, quam robustissimi insoliti.

Similiter obseruare possumus vitalem facultatem à consuetudine alterari: spiritus enim vitales, qui sunt instrumenta huius facultatis, ob longos vsus, & consuetudines diuersas, & aliquando contrarias suscipiunt dispositiones, sic timidus in bello detentus adeo assuescit, ut audax euadat, & versa vice fortis cum timidus vitam agens fit timidus, idemque obseruatur in omnibus passionibus pertinentibus ad cor, ut non sit, quod in re manifestissima tempus conteramus.

Demum in facultatibus naturalibus obseruare possumus, consuetudinem dare robur alteratrici, expultrici, attractrici, & retentrici facultati; hinc Galen. 2. de ratione vict. 33. habet pro hac opinione hanc sententiam; cibos, quibus vi consueuerunt faciliè ferūt, tametsi haudquaquā boni fuerint nature; idemque de potu dicit, ut alteratrix facultas ob consuetudinem cibos perniciosissimæ coctionis coquat, sed quid ulterius dici potest, quod magis ostendat virtutem consuetudinis in roborandis facultatibus naturalibus, quam historia illa vetulæ Atheniensis,

cuius memoria est percelebris, à Galeno quoque citata 3. simp. Med. Fac. cap. 18. quod fuerit enutrita cicuta, & illa Mitridatis, qui longo vsu ueneni reddidit se à uenenis immunem; Hinc nō est mirum, si Tartari carnem crudam equinam digerant, quia à pueritia assuescere incipiunt, unde illis redditur caro adeo familiaris, & amica, ut sine controuersia, uentriculus amplectatur eam, & in sui substantiam faciliè conuertat.

Vidēs igitur Aristoteles in philosophia, & in Medicina perspicacissimus naturæ ope consuetudinis fieri familiarem uenenis, & medicamentis, & pharmaca reddi familiaria, & similia, & per consequens nullius uirtutis: quia actio medicandi nō uersatur inter similia, sed inter cōtraria; tradidit nobis mirabile præceptum in asfigendis localibus, 1. sect. probl. 46. quod est, ut ex certis interuallis debeant mutari cataplasmata, quāuis sint eiusdem nature, ubi habet hæc uerba, cataplasmata permutari ex certis interuallis, quamuis isdem prorsus uiribus sint, si debeant sanare, quia natura contemnit consueti pharmaci uires, quod Aristoteles tradit de cataplasmatibus intelligitur de omni locali, & de omni medicamento tam alterante, quàm cathartico, quoniam hæc omnia propterea agunt, quia sunt contraria, quando ergo ob consuetudinem, sicut similia, amplius agere non poterint, quia à similibus, uel ab assuetis non fiunt passionēs.

Hinc erant sepius illi rudiores medici, qui in affigendis ceratis pice confectis dicunt tamdiu patri læte affixa detinenda, quamdiu cerata, uel emplastra spontè cadant, quod spatio aliquando quindecim dierum nō contingit, ut adeo mollescant, ut spontè cadant: dicant mihi quæso, quod nam emolumentum post diem consequi poterit ex ijs emplastris, si fuerint reddita familiarissima, assueta, & similia.

Si natura dici spatio venenum superet, ut de Anu, quæ quotidie ueneni modicū comedebat, ut assuesceret, quanto magis emplastra, quæ malæ qualitatē sunt experta, poterunt uinci, & superari à natura dici spatio.

Præterea errant quoque, quia aduersantur

santur Gal. & Auicenne, quorum vnica est vox, naturam non esse medicamentis intrinsecis, vel extrinsecis faciendam consuetudinariam: infra enim diligentius declarabimus, medicamenta eatenus operari, quatenus inter naturam, & medicamenta conseruetur discordia, quando vero assuescimus medicinis, & venenis, tunc natura, medicamenta, & venena inuicem talem contrahunt pacem, & amicitiam, vt nullum amplius sequatur certamen; colligas ab experimentis propositis omnes facultates viuientis corporis à consuetudine alterati, & mutari in varios habitus, & status aduentitios.

*Agitur de consuetudine ex Gal. sententia
& agenda in hoc libro proponuntur. Cap. VI.*

Cum ope consuetudinis tam varios status aduentitios cognoscere valeamus, & varias morborum ideas, indicationes, præfagia, & remedia ex tanto principio colligere possimus, propterea, vt statim principijs philosophemur, valde conuenit, vt prius addiscamus ea, quæ nos docuit Galenus libello de consuetudine, in toto enim illo tractatu docet, quomodo fiat consuetudo in facultatibus naturalibus, in potentijs animalibus, intellectiuis videlicet, sensitiuis, & motiuis, & demum cur in externis tantum possit consuetudo.

Primo igitur reddit rationem, cur facultates naturales assuescant, redditque rationem, cum alteratrix, si aliquo longo vsu assuescat, non solum cibo malo, & ab omnibus expulso, uerum etiam ueneno non lædatur, ut dictum est de uetula iam citata, assert Galen. rationem his uerbis, ex differentia, quibus uescimur, particulæ nutriuntur illo sanguine, ut ad uenena fiat consuetudo, afficitur natura tractu temporis, & aucta differentia notabilis sit, addit, quæ sunt longa consuetudine comparata uim ferè proprietatis naturalis contrahere; uo ostenderet igitur facultates naturales assuescere, & accommodari posse omnib. cibis, quamuis sint durissimæ roctionis, ostendit prius facultates naturales ob consuetudinē digerere, & concoquere posse uenena, quia

inde ualebit hæc consequentia, assuetus uenenis nenena digerere potest, ergo eo facilius assuetus ferulis durissimis ea digerere poterit quoniam si de quo minus uidetur inesse, & inesse, ergo & de quo magis, quod autem alteratrix facultas uenena possit in alimentum, & in sui substantiam conuertere, patet exemplo illius uetulæ Atheniensis, quæ longo usu cicuta ea nutriebatur.

Quo pacto autem natura id efficere possit, paucis docet Gal. dicens, naturam nutriri ueneno, & tractu temporis naturam fieri similem ueneno, uerbi causa, minima cicuta quantitas non est tantæ virtutis, vt facultatem alteratricem euincat, celinquitur ergo, ut euincatur & superetur à natura, mox superata illa exigua, & paucilla ueneni dosis conuertitur in sanguinem, quo sanguine partes corporis aluntur: altis particulis ueneno, si iterum sumatur uenenum, concoquendi negotium non est ita difficile, quia ob similitudinem partes corporis expeditius illud euincunt, ut longo tempore assuetus peregrinæ portioni ueneni possit inde liberius illo nutriri, quod quoque à Gal. non solum in hoc libello de assuetu. l. declaratur, verum etiam in 3. de temperamentis cap. 4. ubi altiorib. fundamentis ostendit, cur inter facultatem alteratricem & ea quæ ingeruntur in uentre contrahi possit familiaritas, & amicitia.

Sumit primò Gal. hoc principium quod omne agens corporeum quacunque virtute præditum agendo repatiatur, & omne patiens patiendo reagat, quod principium desumit ab Arist. tum in 3. lib. physico-rum tex. 8. & tex. 16. dum dicit, omne mouens physicè in mouendo moueri, tum in primo de generatione & corrupt. tex. 53. ubi dicit, omnia, quæ conueniunt in materia, agere, & pati inuicem.

Deinde Gal. dicit, quemadmodum facultas alteratrix agit in obiectum, ut in sui similitudinem illud conuertat, similiter obiectum reagendo conatur reddere facultatem sibi similem, unde colligimus, agentia, & patientia concorditer in hunc finem conspirare, vt inuicem contrahant similitudinem, eaque contracta inde necessariò sequi, ut sibi inuicem non reluctentur: ubi enim est similitudo, ibi est

amor & pax, vbi verò est dissimilitudo, ibi est lis & discordia.

Quibus positis principiis. Sequitur nō esse impossibile, vt natura tunc assuescere possit veneno, cum prima vice pauxillum veneni superauerit, & in nutrimentum conuerterit, quoniam secunda vice cum minori difficultate idem superabit, sibi-que assimilabit.

Huius. n. rei dūz afferri possunt rationes potissimè, altera est, quia si primavice assimilatur, quando adhuc non est contraria similitudo, quāto magis secunda vice quādo iā incipiet contrahi amicitia & familiaritas, natura illud euincere poterit?

Secunda ratio est, quia veneni per exigua portio prima vice assimilata imprimat qualitates similes, sed euictas & superatas in sanguinem, quo si nutriatur corpus, corpori venenum inde reluctari minus poterit.

Quare non est mirum, si vetula Atheniensis, superatis primis difficultatibus liberè, & copiosè cicutam comederet, cicuta enim sua natura frigida non est tantæ virtutis, quantæ sunt venena cortodentia; & calida, vt est arsenicum, sublimato: & napellus.

Nunquam sanè vetula potuisset assuescere sublimato, vel napello; non sublimato, quia licet pauxillum quid sublimati prima vice sumpsisset, attamen ob corrosiuam eius virtutem à natura non potuisset assimilari; quare illud, quod esset sumptum secunda vice, vnitum cum primo loco sumpto non assimilato maiorem dissimilitudinem fecisset, & inde maius damnum secutum esset: non napello, tum quia erosione, & putredine enecasset vetulam, tum quia est calidissimus, & per consequens insuperabilis; docet enim Gal. 3. de simp. med. f. c. 18. calida venena non posse vinci, & superari.

Quare in hoc loco non possum committere, quin valde mirer Valesium, qui à Galeno desumens historiam vetule Atheniensis in locum cicutæ substituerit napellum, audias igitur Valesium lib. 8. controuer. c. 5. his verbis loquentem, non solum alimentis, & medicamentis assuescit natura vsque adeo, vt ab illis minus alteretur, sed etiam venenis, quod aperte ostendit vetula Atheniensis, quæ

frequenter vescebatur napello; Gal. 3. de simp. med. fac. c. 11. Nescio sanè vnde Valesius in Gal. hoc acceperit, cum de vetula non loquatur c. 11. sed 18. vbi hæc verba leguntur, si vero exiguum cicutæ sumatur, mox tamen homini nequaquam infereat. Id, quod Anus Atheniensis experimento docuit, cuius apud omnes percelebris memoria est, etenim ea ab exigua cicutæ portione auspicata nullo detrimento ad permagnā progressa est copiam.

Quod caput, si vidisset Valesius vti que non incidisset in errores: in primis enim errare videtur, quia Gal. non refert vetulam fuisse nutritam napello, sed cicuta.

Secundò quia napellus, nec tēpore Atheniensis, nec tēpore Gal. erat cognitus.

Tertiò, quia natura non potest superare calida venena, vt ipse Galenus capite iam citato fortissimis probat rationibus.

Cæterum dimissis alterationib. concludimus ex superius dictis, consuetudinem, & vsum reddere omnia magis familiaria, & amica, vt merito Galenus lib. de assuetudine dicat, longa consuetudine comparata uim ferè proprietatis naturalis contrahere.

Colligimus non esse mirum, si assueti bouina carni eam citius digerant, quam pisces saxatiles, qui insoliti sint; ratio ex enarratis colligitur, quia assueti sunt similia, & illud ea amplectimur, & sine lite in nutrimentum transeunt, quoniam inter symbola facilius est transitus: quare quanto passum est agentis similis, eo citius assimilabatur: quo discrepantius, eo tardius ad finem optatum perducitur: hinc omnia illa, quæ propius accedunt ad naturam sanguinis, uelocius in sanguinem conuertuntur: hinc caro, panis, oua, quæ sanguini similia sunt, citius quoque in sanguinem transeunt, quam brassica, & cæpæ, nisi consueta facta sint, & per consequens similia, quoniam hæc promptè admodum à facultatibus superantur, & assimilantur.

Postquam Galenus declarauit, quomodo fiat consuetudo in facultate alteratrice: deinde ostendit, quomodo introducatur in externas corporis partes, dicit, quæ hoc nobis innotescere, dum videmus rusticos gelida hyeme sub dīo minus frigore premi, atque vexari, quam insoliti

ciues vtentes hypocaustis. Similiter dum videmus quod melius vim consuetudinis declarat Monachos, & heremitas nudis pedibus per niues incedentes ob assuetudinem nullas pati lésiones, licet aliqui ex ijs inueniantur, qui primò luxui dediti vix hyberno tempore pellibus induti potuissent hypocaustis egredi.

Reddit rationem Gal. cur assueti minus externo lædantur frigore, dicendo, in his fieri cutim densam, & callosam è frigore astringente, & exsiccante, & propterea frigus non sentiri.

Quo pacto verò frigus habeat vim exsiccandi, & per consequens callum inducendi, docet Gal. id contingere posse per se, & per accidens: per se, quoniam frigus astringit, & astringendo exprimit, & absumit pabulum partium proximarum, quo absumpto partes corporis statim durefcunt: per accidens quia cure frigore condensata, calor, qui perpetuò è corporib. nostris exhalare solet, illicò detinerur, detentusque adeo crefcit, vt inde maxime exsiccat corpus, & callum inducat.

Hinc Galenus colligit durefcere quoque externas corporis partes sole æstiuo, quoniam degentibus aliquantulum sub radijs solaribus cutis non exsiccat, quinimmo humores funduntur, cutisq; lenitur & mollis redditur, si vero diutius in sole, quis moratur, adeo exsiccat eius cutis nimio calore radiorum, vt epidermis corij specimen æmulari videatur.

Postremo Galenus de consuetudinis vi in animi, & corporis exercitijs agēs dicit vim memorandi, & intelligendi exercitio augeri, ocio verò contrabescere; quod auctoritate Platonis, & Erasistrati confirmat, qui dicebant vsum robur addere, ocio verò dissoluere, & enervare.

Credimus nos, facultates animales vsu & exercitio augeri, quia assiduo exercitio spiritus animales excrementis purgantur, vnde puriores redditi reddunt quoque mentem & memoriam vegetiorem, & puriorem: Etenim sicuti exercitium, vel motus corporis expurgat musculos excrementis musculiq; dar robur; Similiter si spiritus animales, qui sunt instrumenta propria intellectus, & memorie expurgentur per assiduam contemplationem, quæ est horum facultatũ pro-

prium exercitium, vsq; adeo puri redduntur, vt acutissima, & maxima virtute polens fiat intelligentia, & memoria.

Quod quoq; videtur experientia constare quoniam videmus, quando quis se tradit exercitio intelligendi, & memorandi, facultates has fieri potentiores: idem obseruatur in sensibus ipsi, qui nisi exerceantur contrabescunt.

Exercitium functionum pertinentium ad quinque sensus vsq; adeo est necessarium pro confirmandis sensuum facultatibus, vt nisi in videndis nos ipsi exerceremus, amittere quoque possemus visionem, sicuti contigit cuidam misero in obfensissimo cateere multo tempore detento, qui statim egressus cognouit se in vinculis functionem videndi propter dissuetudinem amisisse.

Hinc quoq; fit, vt si quis incipiat conspiciis vti, intra breue deinde spatium sine illis minus videat, quam ante.

Similiter, quod ob ocium facultates quoque motrices diminuantur, exempla plura sunt in primis illi se offerunt homines, qui cum vel multos dies iacuerint, vel plures sederint horas, cum postea resurgunt uix incedere valent.

Idem auiculæ in caueis diu retentæ, si exiliant, volare nequeunt. Pater igitur vsum consuetudinem, vel exercitium dare robur facultatibus animalibus, vitalibus, & naturalibus: parer quoque id contingere, quia ob exercitium instrumenta omnium facultatum excrementis liberantur: ob ocium uero maiori copia excrementorum premuntur, & inde contrabescunt, & diminuantur.

Cæterum præter hæc, quæ à Galeno tractantur de consuetudine, variæ se offerunt excutiendæ difficultates, ideo anrequam huic contemplationi finem imponamus in hæc capita diuidemus tractatum.

Primo agetur, an uera sit communis illa sententia, quod consuetudo in naturam conuertatur.

Secundò quid sit consuetudo declarabitur.

Tertiò ostendemus errare, qui uolunt inueteratas consuetudines, quamuis deterrimæ sint, statim amouere.

Quartò ostendimus, illos errare qui uo-

sunt amouere senum, & debiliū deterimam consuetudinem, cum nec statim, nec sensim sit amouenda.

Quintò ostendetur, errare illos, qui volunt aegrorum, vel robustorum malas, & vetustas consuetudines indicare sui ablationem.

Sextò ostendetur, assuetum plurimis rebus minus lædi à contrarijs.

Septimò errare ostendimus, qui non mutant alterantia in aëris curandis, quādo ob consuetudinem omnes vires amittantur.

Octauò ostendimus errare, qui introducunt consuetudinem sumendi medicamenta soluentia, & alterantia.

Ostenditur consuetudinem non posse conuerti in naturam; & argumenta in contrarium adducta solvuntur.
Cap. VII.

Est serè communis opinio, quod consuetudo sit altera natura; an verò idem sit cum natura, vel possit in naturam conuerti, excutiendum est; Etenim plerique incidunt in hanc sententiam, vt credant, consuetudinem in naturam trāsire; ideoque præstat in primis fundamenta istorum proponere, deinde sententiam, quam arbitramur esse veram, in medium asserere; demum pro viribus dubia soluere.

Qui igitur dicunt, consuetudinem in naturam posse conuerti, illud probare videntur auctoritate Aristotelis 7. Ethicorum cap. 10. vbi philosophus non solum dicit, consuetudinem esse similem naturæ, verum etiam in testem vocat Euenum Poetam, qui his duobus carminibus clarè affirmat consuetudinem esse naturam.

„ *Vsus longus mos est, ac meditatio crebra*

„ *Hunc tandem assero naturam mortalibus esse.*

Insuper afferunt historiam illius vetule à Galeno citatam 3. de simp. med. fac. cap. 18. ex qua colligunt, longum usum, & consuetudinem cicutæ ueriam fuisse in naturam: Demum referunt historiam Regis Mitridatis, qui ob nenenī usum se à uenenis immunem reddidit, quod non

contigisset, nisi ueneni usus uersus esset in naturam.

Ceterum, antequam horum argumentorum inanitatem amputemus, præstat probare auctoritate, ratione, & experientia, quod nullo modo consuetudo uerti possit in naturam: audias igitur philosophum lib. de memor. & rem. cap. 3. consuetudo est tamquam natura, & naturæ similis, nunquid non ex hac philosophi sententia statim inferre possumus, consuetudinem non esse naturam: quoniam si esset natura Arist. non dixisset, consuetudinem esse tamquam naturam, uel similem naturæ, sed expressè dixisset, esse naturam.

Præterea 2. Ethicorum ca. 7. dicit: consuetudo propterea est ualida, quia naturæ infidet, quare si naturæ infidet, consuetudo erit accidens, natura uerò subiectum: cui dubium, quod est discrimen inter accidens & subiectum.

Amplius primo, Rhetoricorum cap. 45. de assuetudine, philosophus habet hæc uerba, consuetum quasi naturæ institum est. Simile enim est naturæ, quod enim sæpè fit propè accedit ad semper, ex quibus uerbis colligere ualemus, consuetudinem non solum in naturam conuerti non posse: uerum prædicari per accidens de natura, ratio est, quia prædicatum, quod est per se, & naturale supponit inherentiam perpetuam, si igitur consuetudo accedat ad semper, & non sit semper naturæ insita, non erit de omni, erit ergo naturæ accidens separabile.

Insuper Aristoteles 7. ethicorum, capite 10. his uerbis clarissimè ostendit: consuetudinem differre à natura, facilius curari possunt, qui per assuetudinem, quam qui per naturā incontinentes sunt, quare colligimus, naturam differre à consuetudine, quia nisi differret, æquè difficilis esset cura incōtinentis per assuetudinem, ac per naturam: colligas ergo non solum consuetudinem esse diuersam à natura, uerum etiam morbos introductos à consuetudine esse diuerso modo curandos.

Postremò dicit philosophus 2. ethicorū in exordio libri, & alibi, affectus duū generum inueniri, alios scilicet naturales, qui eduntur *κατὰ φύσιν* sicuti dicimus naturaliter, & secundum necessita-

tem

tenit lapidem tendere deorsum, quem si millies (ait philosophus) sursum proieceris nūquam lapis huic motioni assuesceret: aliquos deinde dicit esse affectus, qui per cōsuetudinem acquiruntur, qui non sunt naturales, & necessarij; Patet ergo pluribus philosophi auctoritatibus naturam adeo differre à cōsuetudine, vt nulla assuetudo, quamuis sit vetustissima, possit cōuerti in naturā; quoniam sicuti lapis semper sursum proiectus, semper tendit ad centrum, & nunquam assuescit alijs motionibus, similiter affectus per cōsuetudinem introductus, quia non est naturalis, & necessarius aliter se habet, quia assuetudines variae, & aliquando contrariae suscipi possunt, vt nullomodo consuetudo dici possit natura.

Verum, vt exactius probetur, consuetudinem non esse naturam, praestat quoque, vt secundum stylum medicū ostendamus consuetudinem differre à natura, indicationesque vario modo desumi; remediaque amouentia affectus naturales esse omnino diuersa ab ijs, quae conueniunt affectibus introductis à mala consuetudine.

Exequamur ergo, sit aliquis tali modo assuetus, vt ei viginti annorum cursu annuatim secta fuerit vena, singas causam tam longae consuetudinis fuisse, quia annuatim colligebatur bilis, quae nisi ope phlebotomiae fuisset repressa, & retusa, in morbos semper ille incidisset, nec si cōtingeret, vt post 20. annorum spatium bilis amplius non colligeretur, & per consequens ab illa non vexaretur, esset irritum, & vanum, sanguinem euacuare? absente scilicet bile, quae est causa, & quae est indicans phlebotomiae? Siquidē ablata causa, aufertur indicans, quo ablato amplius non debent indicata seu remedia administrari; quare si vetusta consuetudo phlebotomandi necessitati nō indicabit, consuetudo non erit signum indicantiū per eternum, & verum, & per consequens toto cōlo à natura distabit, quae semper, & in omnibus est inuariabilis.

Præterea alio quoque lucidissimo exēplo ostendamus oportere hōc dīscrimen inter naturam aduentitiam, & consuetudinē: Sit igitur vit temperamenti calidi in primo gradu, hicque ob consuetudinem, &

vsū calidorū sit effectus calidus in secundo gradu: Si que alter tēperamenti calidi in tertio qui vsu, & cōsuetudine frigidiorum ad secundum similiter peruenerit: cui dubium, quod in vtriusque idem erit aduentitium tēperamentū ob assuetudines tamen cōtrarias acquisitum; singas ambos in frigidum morbum corrumpere, calidique auxilijs ambos esse medicandos: quem credis citius sanari posse? qui erat in tertio assuetus frigidis? vel alter assuetus calidis? dicere minime possumus citius sanari solitum frigidis, quia hic nō potest tam promptē ad calida, quae sunt ei insolita transire, sequitur ergo quod alter assuetus calidis, qui erat temperamenti calidi in primo citius sanetur, quia deceptē, & sine periculo calidis vti potest, ad solita enim facilius est transitus, & ad insolita difficilius; est enim Hippoc. & Galeni praeceptum ad insolita non esse transire, & Aristotelis libris de generatione inter symbola semper facilius esse transitum: ecce ergo quod eadem aduentitia natura acquisita per contrarias consuetudines varias, & contrarias indicationes habet, quas non haberet, si consuetudo in idem recideret cum natura.

Insuper si idem esset consuetudo, & aduentitia natura, sequeretur, quod ambo vnum indicarent; est enim Galeni 2. meth. 13. & 9. meth. 12. quod vnum, vt vnum indicet solum vnum, quod altioribus principijs in lib. de indicatione à nobis quoque probabitur, quod verò consuetudo indicet vnum: natura vero vel temperamentum aduentitium aliud, non solū ex ratione proposita facile colligere possumus; verū ex Aristotelis auctoritatibus allatis, & præcipuē ex illa, quae colligitur 7. ethicorum cap. 10. vbi dicit, facilius curari posse, qui per assuetudinem, quam qui per naturā incontinentes sūt: Quae cum ita sint, sequitur necessariō, quod consuetudo differat à natura primigenia, & aduentitia.

Quantū verò spectat ad aphorismata, cognita veritate statim, quae in contraria sunt adducta, ruunt: Erat enim primum argumentum aduersariorum, consuetudo est similis naturae, ergo est natura.

Respondemus, consequentiam esse
M 4 nullam

nullam, quoniam similitudo non est idé-
titas, quinimò contrarium inferimus,
scilicet consuetudo est similis nature, er-
go non est natura: error hic sanè est satis
communis.

Liceat mihi alium similem paralogis-
mum, qui per scolas vagatur, subdere, vt
melius argumèti vanitas innotescat, est-
que dum colligunt calidum innatum esse
cæleste, quia Aristoteles lib. de gen. ani-
mal. dixit proportionem, & similitudine
respondere elemento stellarum, quod
tantum abest, vt sequatur, vt potius con-
traria consequentia sit vera, scilicet cali-
dum innatum proportionem respondet cæ-
lesti calori, ergo nullo modo est cæleste,
quoniam ea, quæ proportionem, & simili-
tudine conueniunt; non sunt vniuoca,
sed distant genere, & prædicamento, si
prædicamenta vniuoca sunt: ad eundem
propterea modum errant, qui dicunt con-
suetudinem esse naturam, quia est similis
naturæ: quia contrarium necessariò col-
ligitur, scilicet consuetudo est similis na-
turæ, ergo non est natura.

Demum, vt altioribus principijs argu-
mentum inanitas innotescat, confugas ad
Aristotelem, vbi de Elenchis agit, qui il-
lic docet argumentum propositum esse
Elenchum compositionis, ratio est,
quia colligitur in conclusionem, quod non
est in præmissis, assimilaturque illi ex-
plo, quod proponitur pro declaratione
argumenti malæ compositionis, quod est
tales, qui sedet potest iacere: Socrates se-
det, ergo iacet, consequentia non valet,
quia aliud est posse iacere, & aliud actu
iacere, similiter aliud est dicere consue-
tudinem esse similem naturæ, & aliud re
ipsa esse naturam, sequitur ergo, vt argu-
mentum propositum sit paralogismus,
qui vocatur Elenchus compositionis.

Quo ad Euenum Poetam, dicimus in
carnibus nomina sumi latiori modo,
quam sumantur à philosophis, qui de re-
rum naturis profundè philosophantur,
poetasque multò amplissimas loquendi
licentias habere; solent enim poetæ mo-
res, vitia omnia accidentia nature vocare
naturas quoniam furore poetico perciti
non expendunt, quid conueniat per se, &
quid per accidens rebus omnibus, quare
in tradendis definitionibus longè melius

est vt credamus philosophis, quam poe-
tis.

De Vetrula Atheniensis, & Mitridate,
quod nouam comparauerint naturam;
Respondemus Galenum non dixisse na-
turam nouam, sed consuetudinem nouam
esse acquisitam: Colligas ergo con-
suetudinem non esse alteram naturam,
neque in naturam vllò vnquam tempore
transire posse.

*De consuetudinis definitione, eiusque
declaratione. Cap. VIII.*

Reliquum est, vt breuiter, quid sit ip-
sa consuetudo, explicemus: commo-
dè enim ex dictis colligi potest, quoniam
patet in primis ex omnium consensu,
consuetudinem esse qualitatem aduenti-
tiam; patet quin etiam, consuetudinem ab
assiduo exercitio sensim introduci, vt ex
traditis exemplis colligere possumus: pa-
tet similiter, omnia agentia, & patientia
ob consuetudinem & vsum sibi inuicem
reddi similia. Demum patet ob lon-
gum vsum, & exercitium semper dimi-
nui patientium resistentiam, indeque
agentia in obeundis officiis fieri paratio-
ra.

Quib. positis, mihi videtur, quod breui-
ter colligi possit hæc consuetudinis defi-
nitio: Consuetudo est dispositio constitu-
tionis naturalis sensim introducta ab as-
siduo exercitio agentis, & reagentis, vt
agentia, & patientia reddantur inter se
similia: in qua definitione omnes quat-
tuor causæ continentur: dispositio enim
sensim introducta est causa formalis: con-
stitutio verò naturalis est causa materialis
& subiectiua: ab assiduo exercitio a-
gentis, & reagentis est efficiens: vt agen-
tia, & patientia reddantur similia, est finis
quæ omnes causæ singillatim sunt decla-
randæ.

Quantum igitur attinet ad causam for-
malem dicimus esse dispositionem; per
dispositionem verò intelligimus primam
speciè qualitatis, quæ prædicatur (vt opti-
mè dicit Arist.) de habitu, & dispositione;
habitus enim, & dispositio non sunt duæ
species qualitatis diuersæ, quoniam dis-
ferunt solum secundum magis & minus;
quare si consuetudo fuerit inuetera-
ta,

ta, vocabitur habitus, si vero fuerit noua, & non confirmata, vocabitur dispositio, quæ facile mutari, vel aboleri poterit.

Valesius tamen libro 8. controuersiarum medicarum considerans quo pacto consuetudo possit dici dispositio incidit in hanc sententiam, quod consuetudo sit dispositio respectu naturæ, natura verò respectu consuetudinis sit tamquam habitus, dicitque naturam esse tamquam habitum, quia firmitioribus, & stabilioribus principiis innititur, consuetudinem esse dispositionem, quia est facilioris mutationis.

Quæ Valesij sententia nullo modo defendi potest, quoniam natura neque propriè loquendo, neque metaphorice potest esse habitus consuetudinis, non propriè, quia si natura propriè esset habitus, consuetudo verò eius dispositio, sequeretur hoc inconueniens, quod aliquando consuetudo in naturam transire posset; omnis enim dispositio ob vltimum longum transit in habitum, & hic transitus sanè non est impossibilis, quoniam (vt dicit Aristoteles) habitus, & dispositio differunt tantum inter se secundum magis, & minus.

Præterea an ne natura differt specie à consuetudine naturam enim est subiectum dispositionum, & vt subiectum ingredi non potest primam speciem qualitatis; quoniam subiectum à prædicato accidentali differt genere, & genera sunt impermiscibilia, vt nullo modo detur transitus de genere in genus, nec de specie in speciem. Sequitur ergo naturam non posse esse habitum respectu consuetudinis, ob hanc singularem rationem, quia nulla consuetudo conueniri potest in naturam.

Demum si natura esset habitus, consuetudoque dispositio, daretur transitus de accidente in subiectum, quod relictatur veris philosophiæ principiis: consuetudo sanè est accidens naturæ separabile: quare si propriè loqui velimus, dicere non possumus, naturam respectu consuetudinis esse habitum: Si verò Valesius non propriè, sed per quandam similitudinem intelligeret, naturam esse tamquam habitum consuetudinis, apertè quoque erraret, quoniam dantur aliquæ consuetudines, quæ respectu naturæ videntur esse habi-

tus, quæque tam firmis plantantur radicibus, vt potius mutantur, & persèpe inouentur naturæ, quàm illæ consuetudines.

Quocirca sæpè videmus in sene septuagenario conseruari puerilem aliquam consuetudinem; quare natura non erit habitus respectu consuetudinis propriè, nec metaphorice; quia experientia docet, nonnullas consuetudines inueniri, quæ sint difficilioris mutationis, quam ipsa natura; quare potius est dicendum consuetudinem esse habitum, & dispositionem: habitum, quando est difficilis mutationis: dispositionem verò, quando facilis: eam tamen in definitione vocauimus dispositionem, quia dispositio (vt diximus) prædicatur de habitu, & dispositione, & sub dispositionis nomine habitus, & dispositio continentur.

Quo ad causam materiale diximus esse naturalem constitutionem, quæ reuera est subiectum omnium consuetudinum: naturalis constitutio prædicatur de partibus similaribus, & dissimilaribus, in similaribus tamè continentur consuetudines pertinentes ad facultatem naturalem: in dissimilaribus verò pertinentes ad animales, & vitales, ut superius docuimus.

Quo ad causam efficientem; est virtus agentis, & reagentis assidua, non solum enim assiduam exercitium agentis parit consuetudines, sed reagentis, quia nil patiens patiando reageret, nulla posset patientium similitudo conseruari: confirmatur experientia, & ratione; experientia, quoniam videmus patientium similitudines in prolem, sobolemque transire: ratione, quia omne patiens patiando agit, & quatenus agit conatur pro viribus suam ideam multiplicare.

Postremò est Galeni auctoritas, qui 3. de temperamētis circa finem de cibo loquens, quatenus patitur, & in nutrimentum conuertitur, dicit cibum non solum affici, & assimilari, verum etiam afficere, & assimilare, & merito, quoniam n' si patiens quoque reagendo afficeret, & assimilaret nunquam sequeretur ille amplexus, illaque indolētia, quæ temporis cursu obseruatur in aëtib; & patientibus: quinimò hæc est ratio, cur ab assuetis nō fiat passio, vel cur post longā, & diuturnā litem agentium cum patientibus oriatur amicitia.

amicitia, & pax.

Diximus itaque ab assiduo exercitio; quoniam nisi assidue, & quotidie agētia, & reagētia sibi inuicem vestigia suarum similitudinum imprimerent, primo impressa certò euanescerent, vnde nunquam fieret consuetudo, & amicitia.

Diximus tandem sensum consuetudines introduci, quia natura proprium est sensum & *κατάμυρρον* omnia facere, ne agentia destruantur: etenim si anus prima vice cicuta copiam comedisset, interisset: si timidus illico in acerbum, & exitiosum bellum se conferret, adeo perhorresceret, ut pro ineptissimo exploderetur idemque de alijs dici posset. Quare merito inferre possumus, ea esse amica, ea; nos citius amplecti, & minus ledere, quae ab assiduo, & diuturno exercitio sensum comparantur.

Hinc oritur dubitatio, quod alimenta magis consueta non videtur semper minus ledere; extat enim illa satis vetusta & peruulgata sententia, videlicet omnis repletio mala, panis autem pessima, quae videtur id comprobare, panis enim ex omnibus cibis, quibus homines pascuntur, est maxime consuetus.

Respondemus illam sententiam esse legendam, sicuti à Graecis citatur, quod scilicet omnis repletio sit mala, sed *τῆς σαρκὸς*, idest carnis sit pessima, & non panis, & merito quia minus assueti sumus carni, quàm panis, caroque in minori quantitate comeditur, & demum caro putredini est magis obnoxia, quam panis.

Nec obijciant plures homines inueniri pane parcos, qui carnis multum comedant, & homines in Scythia, qui melle, & lacte, & nunquam pane vescantur: quoniam concedimus, illis, qui non consueverunt pane vesci, panis repletionem esse pessimam; credimus tamen sententiam potius legendam esse quod repletio carnis sit pessima, & non panis, quia ut plurimum homines in Europa pane replentur, in Scythia verò ubi panis non comeditur, ubi disciplinae non coluntur, hanc sententiam non esse prolatam.

Demum diximus, causam finalem esse, ut agentia, & patientia reddantur inter se similia, ratio est, quia non solum omnium agentium, verum etiam patientiū

quatenus reagent est naturalis conditio; ut conentur introducere pro posse suum simile, ne propria species aliquando definit, quod ab Arist. 2. de anima tex. 34. diuinitus explicatur ijs verbis, cum natura non potuerit conseruare aeternitatem in diuiduorum, fuit saltem sollicita speciem ipsam conseruare, quae alio modo non conseruatur, nisi quatenus agens naturale agēdo suū simile generat, & multiplicat. Colligas ergo consuetudinē esse dispositionem sensum introductam ab assiduo exercitio agentis, vel reagentis ut agētia, & patientia reddantur inter se similia.

Errant, qui volunt malam consuetudinem statim amouere, cum sensum sit amouenda. Cap. I X.

Cum sit consuetudo dispositio sensum introducta ab exercitio assiduo agētis, vel reagētis, sensum quoque mala aliqua consuetudo erit amouenda; eadē. n. est via (ut Aristotelis exemplo vtat), à Thebis ad Athenas, quae est ab Athenis ad Thebas: eandem sententiam habet Galenus 2. de ratione vict. 33. quae ijs verbis explicatur consuetudinem plurimum posse, & repentinam mutationem corpora non me. diocriter offendere, ratio est quia consuetudo, quae sensum increbuit, & paulatim inoleuit; sensum quoque, & paulatim amouenda, & *κατάμυρρον*.

Similiter fauet huic sententiae Auicenna, qui par. 2. cant. cap. 2. dicit, quod omnis consuetudo subito, & sine graduatone ablata nocet, & offendit illū, cuius est.

Seneca dicere solitus est, naturam hoc praerclaram homini dedisse ut etiam miuerrae assuetudine imminuantur.

Ecce igitur, quod auctoritate Galeni, & Auicennae patet sensum consuetudinem esse introducendam, & sensum amouendam: Hinc errant plurimi, qui consuetudinem inueteratam, quae iam calum obduxit, & quae altas egit radices, volunt ē vestigio depellere.

His positīs, an ne facile est colligere plurima empiricorum errata? numquid non errant, dum illis qui sunt soliti multorum annorum cursu potationibus meracioris vini dant consilium, ut illico se ad tenuissimum vinum, & *υγρότερον* tran-

sferant, spreta omnino hac consuetudinis lege, quod sensim, & paulatim sint amouenda, quæ sensim, increbuerunt, & paulatim inolerunt, hoc præceptum sanè, & inconsideratum confutendi genus relinquitur naturæ, quæ tali pacto est instituta, ut saltus non patiatur, quæque non transit ab extremo ad extremum sine graduatone.

Quare si esset demanda consuetudo generosi vini, in primis oporteret ut minus potente, & deinde sensim ad tenuissimum deveniendum, quod non statim, sed mensium, & annorum cursu esset faciendum.

Audias pro huius rei confirmatione, quid mihi contigit, dum in Hùgaria Medicum agerem; erat percelebris quidam comes assuetus toto vitæ suæ cursu vino meracissimo, hic detentus lassitudine, & capitis dolore me accessit, ut aliquid opis sibi afferrem, ego (spreta aliquantulum consuetudinis lege) dedi id consilij, ut meracissimum deponeret, hauriretque tenuissimum vinum: ille ut primum est executus, in talem lassitudinem incidit, ut anima deficere videretur, unde consilio mutato ad solitum usum meracissimi me consulente se transtulit; & illicò renouatae sunt vires, quæ antea ferè erant collapsæ; patet ergo ex hac experientia, malam consuetudinem inueteratam in egrotantibus, & debilibus, ut dicit Gal. lib. de tuenda valetud. indicare sui conseruationem, in robustis vero non statim, sed sensim, & per gradus tantum esse amouendam, & ratio est; quia subita mutatio ad opposita sæpè in grauissimorum morborum culpam transire solet.

Præterea errare quoque videntur empirici, dum coitus consuetudinem inueteratam prorsus, & illicò auferendam proponunt; errant primò, quia illicò, & omnino inueteratum usum demere, est impossibile; Secundò, quia coitus assuetis quoque debilibus non est omnino interdicendus, quoniam esse sua natura salubris, si tantum intervalli in eius usu adhibeatur, ut resolutio non sentiat; hæc sunt Galeni verba lib. de art. med. c. 86., venerorum vero iuxta Epicuri sententiam, nullus est usus salubris: re vera autem confert, si tantum intervalli in eorum usu adhibeatur, ut neque resolutio aliqua sen-

tiatur, & per ipsa se ipso homo quodammodo leuior factus, ac melius spirare videatur.

Tria igitur proponuntur à Galeno signa, quæ nos possunt docere quantum intervalli in coitus usu debeat adhiberi; primum, ut resolutio aliqua post coitum non sentiat; Secundum, ut homo post coitum sentiat se leuiorem; tertium, ut melius, & facilius spiret, quæ signa salubria in omnibus assuetis uenerico exercitio post aliquod temporis intervallum, possunt observari; hæc tamen differentia, ut in debilibus post longum, in robustioribus uerò post breue intervallum observentur: quare si coitus usus est sua natura salubris, assuetis non debet omnino prohiberi.

Verum data, & non concessa Epicuri opinione, quod uidelicet uenericorum nullus usus sit salubris, numquid non errant empirici nostrates, dum illicò, & omnino inueteratum usum coitus proponunt esse amouendum? natura sanè non patitur saltus ab extremo ad extremum sine læsione, quare si esset consuetudo coitus auferenda, in primis usus, qui multorum annorum spatio increbuit, & inoleuit, aliquantulum esset moderandus, deinde post menses, & annos cohibendus, & non subito consuetudo, quæ altas habet radices, esset submouenda.

Insuper falluntur, dum consuetudinem illorum, qui durissimis cibis uescantur, rejiciunt, putantque, eam esse confestim amouendam: nec vident præter allatas rationes, experientiam oppositum docere, quod uidelicet qui piscibus perpetuò uescantur, si semel parvis pullis, ouis recentibus, & similibus insolitis utantur, magnos inde languores experiantur.

Hinc quædam optima Religio monachorum pisces perpetuò comedentium, uidens monachos iamdiu insuetos pullis, ouisque recentibus, ab ijs maxime lædi posse, decreuit, ut in posterum ob nullam ægritudinem Monachi carne, similibusque cibis insolitis uescantur.

Similiter aliquando conualescentes leguntur, dum id consilij recipiunt à rudioribus medicis, ut pro sanitate recuperanda aerem patrium, & consuetum mutant, eligantque siccum & subtilem, quamvis

uis aer, in quo fanitatis sue tempore conseruabatur humidus, & australis esset.

Falluntur primò, quia transitus ad opposita semper nocet: oporteret sanè, quando aer siccus prodesse ab humido ad minus humidum transire, & deinceps ad moderatè siccum, & demum ad subtilem confugere.

Secundò errant, quia naturæ, & consuetudini reluctantur.

Tertiò quoniam ipsi qui sunt assueti aeri humido, humidum cælum conferunt, & oppositum nocet idemque de omnibus regionibus, & aeris constitutionibus est dicendum, quod scilicet ad oppositam aeris constitutionem non sit transeundum, nisi prius per media fiat transitus; merito enim Hippocrates, & Gale. concludunt mutationes temporum morbos parere, quia alteratur aer, quo alterato, necessarius spiritus, humores, & solida continentia alterantur; unde omnia morborum genera oriri possunt.

Aniplius aberrant, dum spernunt somnum meridianum multorum annorum cursu consuetum, perinde ac carmina Scholæ Salernitanæ non patientur castigatores, dum dicunt fuge somnum meridianum; tot enim sunt crases, & tam diuersæ constitutiones naturales in humanis corporibus, ut nihil sit tam noxium, & tam incommodum infinitis hominibus quod alicui non possit esse medicina, vel suauissimus cibus: quare qui somnū meridianum consuetum omnino reprehendunt, primò reluctantur consuetudini, deinde experiētīæ; vident enim nos per experiētiam somnū meridianum adeo aliquos iugare, ut nisi statim à meridie paululum dormiant summa lassitudine vespere detineantur; quare ubi esset opus somnū meridianum aliquibus interdicere ob aliquas urgentes causas, tunc non illico esset consuetudo amouenda, sed sensim, & per gradus faciendum.

Postremò sunt, qui plurimis persuadent, ut exercitiū toto vitæ suæ tempore consuetum omittant, & ad subitam quietem se tradant, neglectis antiquissimæ consuetudinis conditionibus; nec ridet quanti sit consuetudo vetusta, quæ licet mala sit in senibus, & debilibus attrahere non est omnino mutanda.

Hinc mihi videntur illos decipi, qui præcipuè Medicis, vel aduocatis senibus id dant consilij, ut omnino deponant vetustissimum exercitiū, & se quieti otiosè tradant, quia excrementa, quæ solito exercitio absumebantur, congeriuntur, & in agritudinem labuntur, & miseri ante diem è viuis decedunt: his & similibus erroribus illidunt, qui malè obseruant consuetudinis vetustatē potentiam, & virtutem.

Errant dum inueteratam malam consuetudinem in senibus & debilibus amouent, cum nec statim, nec sensim sit amouenda. Cap. X.

Constat ex superius traditis deterrimas, & inueteratas consuetudines non esse statim amouendas, sed sensim, quod temporis progressu fieri potest: Nunc ostendimus deterrimas consuetudines antiquas in senibus, vel debilibus vel ægrotantibus nec statim, nec sensim esse auferendas: ratio est, quia satius est permittere, ut debiles, & senes uiuant cum malis, & inueteratis consuetudinibus, quam vitam periclitari ob consuetudines nouas, quæ licet sua natura bonæ sint, non possunt tamen introduci in corpora debiliū sine maxima virium dissolutione; quare, qui malas consuetudines vetustas debiliū conantur amouere experiētīæ, rationique & auctoritatibus Galeni, & Hippocratis aduersantur.

Dicit enim Gale lib. 5. de tuenda sanit. cap. 10. loquens in senibus, & debilibus nec statim, nec sensim consuetudines esse amouendas: Hippoc. verò 2. sect. aph. 50. habet, consueti deteriora minus molesta esse insuetis melioribus; quare si consueti deteriora sunt minus molesta insuetis melioribus, sequitur necessario consuetudines inueteratas; quamuis sint, deterrimæ, non esse amouendas, quia amouere solita, & insolita introducere in senes, & debiles, qui habent vires diminutas, est vires ipsorum opprimere, & per consequens mortem illis inferre.

Omnes enim qui ad insolita se transferunt, debent magna virtute esse præditi, ut resistat insolitis obiectis, quia agritudines oriuntur, dum obiectis non resistimus

mus, quare cum senes, & debiles vix solitis resistant, nō par est, vt consuetū dimittant, & insolita amplexentur.

Hinc experientia obseruatur, dum senes, & debiles ad insolita se transferunt, illos in maiores ægitudines prolabi: ratio est manifestissima, quia ob nouas consuetudines, vt diximus, summum laborē patiuntur, & inde debilitantur, vnde excrementa plura colliguntur, & tandem ægitudines sæpē incurabiles fiūt: & versa vice obseruantur senes in primo senio alioquin debiles assueti violētī exercitio, qui in illo sunt fortiores iuuenibus, sicuti aliquando videmus senes, & debiles esse saltatores, qui velocius, & excellentius saltant, quam insoliti robustissimi: Similiter Natura optimis confirmatus viribus si non est solitus equitare, multa incommoda equitando sentiet, quæ non patietur assuetus debilis.

Denum si quis robustus, sed non assuetus iret in tiremes ad temigandum, & triduo ibi se exerceret: hic sciret vtique explicare, quam suis viribus resolutus, & destitutus redderetur, mirareturque hominum illorum fortitudinem, qui assueti triennio, & ultra tot labores paterentur: possem alia plura exempla proponere, sed cum in re tam aperta hæc mihi videantur sufficere, concludimus consuetudines antiquas in debilibus non esse amouendas.

Vt non vident vitiosas, sed inueteratas consuetudines agrorum etiam robustorum indicare sus conseruationem; sane vero sui ablationem. Cap. XI.

PAtet ergo inueteratam, & deterrimā consuetudinem in senibus, & ijs quibus vires contraxerunt sui conseruationem indicare: reliquum est, vt obliteremus illud, in quod incidunt empirici, erratum, dum non animaduertunt consuetudinem malam non esse demendam, dū morbis vexamur, sed solummodo, quando sanitate, & optima valetudine fruimur: adsunt enim plures rudiores Medici, qui simul morbum præsentem, & malam consuetudinem euellere volunt, quāuis consuetudo callum obdlexerit, & ad summum increbuerit, in quorum opinionem mulieres sæpē incedunt, quæ deinde

præcipiti consilio in suum sensum ægros facile trahunt: age, tanti erroris exempla afferantur.

Solent aliquando homines destillatione vexari, tussi, vertigine, vel alijs plurimis affectibus à cerebro prodeuntibus, an ne si ægrotanti iuncta sit antiqua consuetudo dormiendi à prandio rudiores plerique omniū morborum causam statim referunt in somnum meridianum: dicuntque primum, & principale auxilium esse tunc meridianum somnum fugiendum: vnde miseri morbis perculii incipientes consuetum somnum dimittere in tales languores inde cadunt, vt nisi sint fortes, erroris huius causa aliquando ad exitium perueniant: nec vident in debilibus nullo modo esse amouendas consuetudines: nec vident ægrotantium statum nullo modo posse tantam alterationem sufficere, vt mutantur inueteratæ consuetudines, quæ solum depulso morbo, essent tollendæ, quia Gal. 8. method. c. 9. dicit naturam gaudere consuetis.

Quare credimus eos dupliciter errare; primò, dum tollunt consuetudines inueteratas ægrotantium, quando essent tollendæ, morbo euicto, & restitutis viribus. Secundò, quia tollunt illicò, quando nec statim, nec sensim essent auferendæ.

Afferatur aliud exemplum, sit quispiam vrinæ suppressione detentus, cuiusque consuetudo fuerit vt sæpē coitu; videmus empiricos infcios virtutis inueteratæ consuetudinis hoc præcipere, vt à coitu prorsus, & immediatè abstinat, quod sensim esset faciendū. Errant enim, tum quia omnino, & subito inueteratum vsum tollunt, tum quia coitu omnino dimisso excrementum consuetum non excernitur, sed retinetur, quo retento parastates implentur, quæ impletæ compriunt meatum vrinarium, vnde vrina longè magis suppressitur.

Ecce ergo, quā maxima sit iactura, dū volumus statim amouere inueteratum vsum, iactura enim ex duplici causa potest oriri, vel à symptomatibus ortis à retentis excrementis ob consuetudinem dimissam vel à virium dissolutione, quia nunquam potest introduci noua consuetudo, quamuis optima sit, sine virium iactura: etenim

om-

omnia insolita sunt nobis contraria, & aduersa; quinimò, si rectè expendamus, uidemus naturam solum pati, & affligi ab insolitis.

Redeuntes igitur unde digressi sumus, d'icimus, si ægrotantes maxima cum difficultate possint morbi impetum superare, cur uolunt in ea natura afflictione, in eoque nature certamine, amouendo solitas, & consueta, naturam uexare? deberet sanè Medici sua arte auferre contraria, & non similia: consueta enim omnia sunt similia quinimò nihil est natura similis consuetudine.

Quare meritò dicere possumus, dum medici consuetudines ægrotum tollunt, ægrotantes habere duos hostes, scilicet morbos, & Medicos: Concludimus ergo nullas malas, & inueteratas consuetudines in ægrotantibus esse omninò, & subito auferendas.

Quinimò si hac ætate inueniretur illa uetula, quæ olim cicuta nutriebatur, & incideret in febrim, ego pro eius salute (si uera sint illa duo prima Medicinæ axiomata, ut sunt uerissima, alterum scilicet, quod similia similibus conferuntur, alterum uerò, quod contraria contrarijs curentur) pro uirtute conservanda cicuta non esset spernenda, quia cicuta erat usque adeo facta ob longum usum similis, ut in nutrimentum abiret; quare in ægrotantibus non oportet malas, uetustasq; consuetudines euellere, & nouas introducere, quia hoc facientes euellimus similia, & introducimus contraria, uel in labores nouos reducentis miseros ægrotantes, quia, sicuti quilibet robustissimus uir sanus ob nouum, & insolitum exercitium languet, & facta assuetudine nihil patitur, similiter ægrotus non solum debilis, uerum etiam ille, qui firmioribus est uiribus in tollenda consuetudine uetusta, nouaque introducenda patietur, uires amittet, & demum uita ipsius in discrimen adducetur.

Ostenditur assuetum plurimis rebus minus ledi contrarijs. Cap. XII.

SI consuetudo sit dispositio, qua agentia, & patientia reddantur similia, sequitur necessariò, quod consuetudo sit

causa, cur agentia promptius, sine indolentia amplectantur consueta obiecta, quia simile non patitur à simili, sed à suo contrario: Sequitur quoque, quod quanto copiosiores, & potentiores sint impressæ in agentibus dispositiones, & consuetudines, tanto minus agentia à contrarijs lædi possint.

Quare mihi uidetur necessariò sequi, quod plurimis rebus assuetus minus lædatur ab extrinsecis ocurrentibus; hincque assuetus plurimis cibis tam facilis, quam difficilis digestionis ob tam multas dispositiones, & usus habeat uirtutes naturales digerendi, & concoquendi meliores, & fortiores.

Ratio uerò potissima est, quia usus longius diuersorum esculentorum imprimit illorum omnium similitudines in uentriculum, hepatis, & cæteras corporis partes, quibus impressis, uentriculi, uel hepatis facultates non refugiunt diuersos cibos, sed promptius amplectuntur, quod exemplis ostendi potest: an ne uenter senis, & de bilis rustici hominis alium melius, ocyusq; digerit, atterit, & in nutrimentum conuertit, quam uiri politici robustissimi, illud comedere non sit solitus? an ne solitus aquæ potioni sine lesione, tempore hyberno eam uincit, & superat? quam insolitus summoque robore donatus non audet haurire.

Similiter, qui solum pusillis, ouisque recentibus utuntur, & dimittunt cetera firmiora fercula, si aliquando iuillam carnem, caules, fabas, & cætera diuina comedunt, non faciunt: sed summo angore in digerendo afficiuntur, quod assuetis omnibus ferculis non accidit, quamuis debiles sint.

Causæ uerò, cur assueti minus lædatur à contrarijs: ex dictis, & ex dicendis quoque colligi poterunt; ex dictis enim colligimus, assuetum minus lædi ab obiecto simili, quia agentia non refugiunt obiectorum similium amplexum, quare, cum non refugiant, minor sequitur resistentia, & per consequens actio fit celerior, quod enim impedit, & moratur actionem est solum passus resistentia, quæ consistit in dissimili, quia inter symbola semper facilius est transitus.

Præterea assuetus minus læditur, quia plu-

plurimarum rerum assuetudo reddit fibras fortes, quod probatur tum auctoritate Erasistrati, & Platonis dicentium, vsum robur dare, otio verò omnia contabescere, & enervari, tum ratione superius allata, quæ scilicet est, quia vñs absumit corporis excrementa, quibus absumptis, semper facultatum instrumenta efficiuntur validiora.

Insuper assuetus plurimis rebus minus læditur, quia non solum ab ijs, quibus est assuetus, verum neq; à similibus læditur; habet enim assuetus omnibus rebus tot dispositiones, & cōsuetudines impressas, vt data occasione noui obiecti (vel si de cibis loquamur) noui obsonij, & non amplius vis, quamuis sit senex, & non valde robustus melius conficiet, quàm ille, qui paucis est assuetus, verbi causa si esset aliquis, qui numquam comedisset cepas, haberetque consuetudinem comedendi alium, oui dubium, quod ob similitudinem, quam habet allium cum cepis propius iste digeret cepas, quam alter assuetus pullis, quamuis fortis sit?

Demū assuetus paucis cibis adeo eius natura abhorret insolita, vt in ipsa non agat, sed semper refugiat, quare non est mirum, si ab illis patitur, & aliquando vincatur, qui enim vincere vult non debet refugere, quoniam obiecta reagendo possunt cum vincere, & superare, quod in illo, qui est omnibus assuetus, nunquam accidet, quia non fugit certamen, sed agit quantum potest, & agendo, facilius est vt vincat, & superet.

Postremo, an ne experientia patet plurimis rebus assuetos difficilius in morbu prolabi, quam paucis? ratio sanè est, quia tot habent cōsuetudines, vt rarò accadat, vt ab illis omnibus sint dissimiles, etenim isti non possunt morbis premi, nisi recedant ab omnibus illis cōsuetudinibus; vetula enim ob cōiectū vsum poterat cætera venena similia facilius superare.

Vnde colligimus, quod quanto maiores, & copiosiores sint vsus, & consuetudines externarum causarum, tanto minus illis nos lædi posse.

Quod cum ita sit, si solitus paucis, & solitus plurimis, exempli causa vnà proficerentur in Regionem remotam, vbi aer, cibus, potus, & omnia externa essent

illis insolita, absque dubio assuetus plurimis minus altero læderetur; ratio est, quia plurimis assuetus, quamuis exteris illis non esset assuefactus, facili tamen fieri posset, vt haberet aliquas consuetudines similes, quibus facili posset amplecti obiecta illa noua, & ipsa vincere, & superare.

Hic enim plurimis rebus assuetus ali potest herbis, quia habebat aliquas impressas herbarum cōsuetudines ob vsum saltem acetariorum; hic hauriret nutrimentum ex cepis, ex carnis durissimis, & tandem ex glandibus, si pasceretur illis; nec tamen facili incideret in morbum: huic non officeret aer nocturnus, palustris, & conuallium, quia eius corpus ob plurimas consuetudines externarum rerum, omnibus edulij factum est simile; ideo tam firmis, & duris filamentis est contextum, vt aliquando paruipendere possit, non dicam aerem nubilosum, verum etiam pestilentem: Qui vero admodum paucas habet consuetudines, ab infinitis lædi poterit, & quotidie vita periclitabitur, & innumerabilibus morbis erit obnoxius.

Audias quam leui morbo potentissimus, & ditissimus vir, quia paucis erat assuetus, è viuis decessit: Hic, vt diutissime huius lucis vsura frueretur, deposuit vsum & antiquā consuetudinem omnij ferculorū, quibus libere antea vrebatur, proposuitque sibi Caponis stillato solum vesci, rarus non solum eo viuendi genere naturam melius, & sine labore faueri, verum etiam ex tam substantifico alimento ea congeri non posse excrementa, quæ possent mobos excitare: is tamen non multo post interuallo in leuissimam incidit diarrheam, quæ incipit ob animi passionem; contingit deinde, vt protrahēta affectione, non amplius poterit conficere, & in nutrimentum conuertere illud substantificum edulium, quare conuocauit Medicos, vt inirent consilium de nutrimento, quibus conuocatis, innumerabilia fuerunt proposita obsonia, quorum nullam ab illo poterat confici, quia omnia erant difficiliora, & insolita magis; itaque nullo deprehēso obsonio, quo posset resciri, adeo confirmata fuit illa ventriculi leuitas, vt immaturè obierit.

Videas ergo quo pacto homines paucis afsueti facile pereant, ille enim si confueuerit vti carnibus omniũ generum, cafeo, fabis, & cæteris cibis pericaciffimæ coctionis fine difficultate in affectu illo nullius considerationis fillatum confecifset, & per consequens euafifset.

Hinc quoque fit, vt rustici omnibus cibis, & omnibus incommodis in fanitate accommodati, si in morbum fauiffimum cortuant, vbi quiefcant, & optimo vino vtenur, adeo reficiantur, & recreentur, vt sine pharmaci ipforũ spiritus refurgant.

Nec obijciat, quod leuia cibaria rustici ſint inſolita, & propterea conſuetudinem non eſſe cauſam facilioris coctionis, ſed propriam naturam.

Quia occurrimus, Ruſticos omnibus aſſueſcieri, & aliquando inedia, quæ eſt omnium (vt ait Hippocrates) tenuiſſimus victus, quare omnibus ſerè accommodatur, quia multos vſus, & multas conſuetudines habet impreſſas, merito quarum omnibus externis accommodantur.

Præterea dicimus ab illo, qui eſt ſolitus diſſiſſima ſuperare, & vincere, leuiſſima quoque vinci, & ſuperari poſſe.

Neque iterum obijciat ex Gal. paſſim & in methodo, quod biliſi bovinam carnem melius, & facilius coquant, quam piſces ſaxatiles.

Reſpondemus hoc ab alijs prodire cauſis, dicit enim Galenus, quod bilis collecta in ventre digerat dura obſonia, ſed non conuertit illa in biliolum ſucci, dicitque, quod eadem bilis non ſolum digerat ſaxatiles, verum etiam eos conuertat in bilem, quod non accidit in carne bubula, quare ſi qui diſſiſſima coquit, aliquando non coquit leuiſſima, accidit ratione bilis collectæ in ventre, & nequaquam ratione virtutis concoquentis.

Ex dictis ergo patet, ſatiuſ eſſe de ſanis loquendo in diſſenteria paſci quolibet obſonio in proportionata tamen quantitate, quam ea ciborum tenuitate nutriri, qua ægrotantes aluntur.

Accedit, quod ſanguis ex cibis tenuibus confectus reddit homines debiles, & effeminatos, ſpiritus enim vitales à ſanguine tenui prodeuntes ſunt adeo languidi, & flaccidi, vt facile reſoluantur: Similes ſpiritus animales ſequuntur mala

veſtigia vitalium, quoniam ſicuti ſanguis eſt pabulum ſpirituum vitalium: Simili modo ſpiritus vitales ſunt pabulum animalium, & quod diximus de cibis, ideam de omnibus ſex rebus non naturalibus eſt dicendum, quod videlicet ſit melius omnibus aſſueſcere, quam paucis.

Conditiones verò, quæ ſunt obſervandæ, vt aliquis omnibus aſſueſcat, hæc ſunt, prima, vt ſit ſanus, & ſatis robuſtus, in ſenibus enim, & debilib. hæc conditio non habet locum, quia vbi ſenes, vel debiles ſe inueteratis moribus ſpoliarent, & nouos induerent, inſtaret periculum, ne illorum robur corrueret, & vitam amitterent.

Secunda debet à teneris annis, vel ſaltem à iuuentute ſenſim aſſueſcere omnibus externis cauſis, cibis videlicet, vigilijs, æri, & exercitijs omnium generum, quibus obſervatis habitus adeo firmus in membris ingeneratur, vt niſi magnum quidpiam accidat, ſanus, & incolumis ad extremam ſenectam cõmodè trãſferri poſſit.

Errant dum dant ægrotantibus alterantia, eaque non mutant. Cap. XIII.

Oſtendimus, quòd omnibus rebus aſſuetis minus lædatur à contrarijs, quoniam ea, quæ prius erant contraria, ob longam aſſuetudinem redduntur ſimilia, & ea, quæ ſunt ſimilia vix habent vim alterandi, quod probatur tum auctoritate Ariſt. dicentis, quod alteratio verſetur inter contraria, & nequaquam inter ſimilia, tum Gal. 3. de temperamenti loco citato, & ſexcentis alijs in locis, vbi dicit lacteam aſſimilatam non refrigerare; quam philoſophiam cum empirici non animaduertant, in plurimos errores incidunt, dum alterantibus vtuntur.

Etenim ſi de alterantibus extrinſecis, vt vnguentis, emplatris, & reliquis topicis loquamur, in ijs adminiſtrandi ſapè falluntur, dum ea permittunt debito diutius adhæreſcere partibus affectis: nec vident conſuetudinem reddere topicæ calori partium ſimilia, redditaque ſimilia nullas amplius habere alterandi facultates, & ratio eſt maniſeſtiſſima, quia alterantia vniuerſa tam diu alterant, quamdiu ſunt diſſimilia.

Ceterum errata illorum animaduertenda;

da: sunt, qui semel in die oleum rosatum, vel infrigidans Galeni adiungunt renibus gratia ipsos refrigerandi; cui dubiū, quod spatium quatuor vel quinque horarum amplius hæc topica non refrigerent? quoniam à calore partis hæc topica illo intervallo à natura adeo superantur, & redduntur similia, & consuecunt ut ferè amittant totam reagendi virtutem.

Alterantia enim non agunt, ut alimentas, quæ solum dum sunt victa, & superata nutriunt, & augent vires, sed priusquàm vincantur; verbi causa alterantia frigida dum reagent, refrigerant; quando verò sunt superata, certamen & alteratio cessat, & inde ab illis nullum est sperandum refrigerium.

Hæc sanè ex tam firmis philosophiæ fundamentis pendunt: quod, si cum philosophis agerem, nullum ulterius esset mihi verbum proferendum; sed, quia cum rudioribus loquimur, propterea vberius omnia debent explicari, auctoritateque, & ratione confirmari.

Audiamus in primis Aristotelem 1. sect. probl. 46. ubi ostendit consuetudinem vires alterantium auferre his verbis: cur mutari cataplasmata debeant? an ut plenius sentiantur, solita enim, ut ea, quæ ventriculo mandamus, non amplius medicamenta sunt, sed pro alimentis recipiuntur; sic etiam hæc fungi suo munere nequeunt: philosophus in hoc problemate supponit tamquam notissimum, quod debeant sæpè mutari cataplasmata, cur vero sint mutanda, docet, inquit igitur, si cuti ea, quæ vetriculo mandamus, si medicamenta morentur temporis intervallo non amplius medicamenta sunt, sed alimenta: Ad eundem modum cataplasmata, consuecunt non funguntur munere.

Quod verò de cataplasmate dicit philosophus, de omnibus alterantibus extrinsecis, & intrinsicis est intelligendū, quod ob consuetudinem reddantur similia, & à similibus non oriatur passio, quia omnis actio, & omnis passio versatur inter contraria, & nequaquam inter similia.

Eadem ferè explicantur à Galeno 3. de temperamentis capite 4. ubi dicit omnia alterantia afficere, & affici, agereque, & pati, dicitque alterantia vires alteran-

di amittere, quando sunt superata: habetque hæc verba, lactuca, prislana, & quelibet alterantia intrinsicis exhibita afficiunt, antequam sint assimilata, assimilata non afficiunt, sed agent calorē nostrum, & non refrigerant, dicit igitur, quod lactuca refrigerat tantum, antequàm sit assimilata, quando vero est assimilata, & conuersa in nutrimentum calfacere, & nequaquam refrigerare; & quod de alterantibus intrinsicis dictum est, de omnibus est intelligendum.

Quare his positis principijs, numquid non errare videtur empirici (ut de topicis loquamur) dū cryselati apocruistica, & cætera refrigerantia semel, vel bis in die applicata debereut sanè, dum pars aliqua ardore flagrat non bis, sed decies in die superlinire, tum quia topica quanto minus consuecunt, tãto magis alterant, & per consequens iuuant, tum, quia singulis horis partes affectæ ob perustos humores fluentes recandescunt, nouo indigent refrigerio.

Præterea errare quoque videtur, dū spleni, vel stomacho læsio iubent, ut cerata eo vsque teneantur affixa, quousque spontè cadant, quod post quinque & sex dies, & ultra accidere solet; creduntque ceratorum casum esse signum perfectæ sanitatis illius partis.

Errant in hac re dupliciter, primò quia diei spatium euanesceit omnium localium virtus, calor enim diei cursu assimillat cepsas, allium & similia, tanto magis poterit ceratum reddere sibi amicum, & familiare: quare frustra eo intervallo affixa tenentur cerata. Secundò errant, quia cerata affixa non redduntur mollia, quia trahant forinsecus humores causantes morbum, sed quia retinent, & colligunt halitus transpirantes, quibus collectis cedunt in excrementosam humiditatē, quæ est illa, quæ adeo mollia reddunt emplastra, vel cerata, ut amplius, cum non possint adhærere necesseariò decident.

Insuper errant dum pro alterantibus refrigerantibus dant ea, quæ sunt valde consueta, vt est cichorea, & lactuca: errant, quia natura cum his talens consuetudinem, amicitiam, & familiaritatem contraxit, ut ab ijs nullum certamen, & per consequens nullum beneficium sit expectandum;

dum; quoniam ijs aſſueti, dum ſani ſunt, integram lactucæ, vel cichoreæ patinam, quotidie comedunt, quare vaniſſimum eſt credere quod homines iam diu nutriti lactuca, & cichorea poſſint duobus, vel tribus ſolijs refrigari; quinimmo eſt valde ridiculū tam ſæpè audire medicos pro morbis diffiſſimæ coctionis præſcribentes duos, vel tria folia lactucæ, vel cichoreæ pro illorum ſalute, qui erant ſoliti in prima menſa maxima lactucæ, vel cichoreæ copia ſe implere.

Idem dicendum de cæteris oleribus conſuetis, vt de petroſelino, & ſimilibus, quæ ob amicitiam contractam ab illis, qui ſoliti ſunt ijs paſci, nullum afferre poſſunt fructum, quia ab ijs natura non patitur.

Audias cuiuſdā medici erratum quod contigit ob neglectam coſuetudiniſ virtutem; Erat æger quidam pertinaci artritide catenatus, hicque accerſiuit hunc Medicum, vt ſibi aliquomodo præſto eſſet pro morbo demulcendo, hic multis anodynis prætermiſiſ, quæ potuiſſent ægrotanti aliquam pacem afferre, propoſuit pro ſingulari remedio, vt quotidie duas petroſelini radículas in iure coctas comederet.

Primò errauit, quia æger erat conſuetus non duas tantum radículas quotidie comedere, ſed decem, & ultra, ab aſſuetis enim certantem non fit.

Secundò ex duabus radibus expectare victoriam conſeclamati affectus erat ridiculum.

Tertiò petroſelinum non poterat demulcere dolorem, cuius occasione ſuit vocatus hinc podagricus ille cognoscens remediij vanitatem, non potuit ſe continere, quin in Medicum, me præſente, his verbis eruperit, abi veſane, neque dicas amplius radículas duas petroſelini tam graui affectui vexatis allaturas beneficiū, quia ſi paululum auxiliarentur, ego non duas, ſed ſaccum integrum radicum illarum quotidie comederem: videas ergo quo pacto rudes homines inanitatem remediorum non animaduertunt: videasque quanti faciendū ſit in quaſitio omnium conſuetudinum, antequam præſcribantur alterantia ægrotantibus, niſi enim rectè examinemus, quæ ſint conſue-
ta egro-

tantibus & quæ non, committere non poſſumus, quin ſæpè erremus in præſcribendis receptis.

Vi errant, qui introducunt conſuetudinem ſumendi medicamenta ſoluentia, & alterantia. Cap. XIV.

EX traditis optimè colligere poſſumus non eſſe introducendas conſuetudines ſumendi medicamenta ſoluentia vel alterantia: Colligimus enim à definitione conſuetudinis, quod patientia ob uſum longum ſiant agentibus adeo ſimilia, vt arcèſſimo amoris vinculo deuinciantur, & facta pace, nulla ſequatur diſcordia, vel alteratio, & meritò, quoniam diſcordia, & alteratio excitatur inter contraria, & nequaquam inter ſimilia.

Quod autem ita res ſe habeat, patet experimentis, ſicuti numquid non, vt reſert Galenus 3. de ſimp. med. facult. 18. vetula aſſimilauit ſibi ciuitatē? an ne hiſtoria Miſthridatis eſt porcelebris quod ob uſum, & conſuetudinem non læderetur veneno? an ne ut reſert Auicenna lib. de uirib. cordis ex ſent. Ruſſi, fuiſſe puellam, quæ ueneno alebatur, quæque ſuo amplexu alios uenenabat? an ne plures inueniuntur infecti gallica peſte, qui ob uſum illam non ſentiant, alios tamen inſiciant? Similiter an ne plurimi inſiciuntur peſte, quippe qui, ubi mel curantur, amplius ab ea non lædantur, alios tamen inſiciant.

Quare, ſi conſuetudo tantum poteſt, qua ratione igitur moti noſtratum plures introducunt conſuetudinem medicamentorum ſoluentium, & alterantium? num quid non vident, lues uarias, & mortiferas longo poſt intervallo reddi adeo ſimiles naturæ humanæ, ut nullam alterationem, vel diſcordiam pariant? quanto igitur magis ob longum uſum medicamenta ſoluentia, & alterantia amittent ſuas vires purgandi & alterandi?

Præterea patet Galeni auctoritate, quod uſus & conſuetudo medicinarum non ſit introducenda; audias igitur Galenum 3. aphoriſmorum 14. ſic loquentē, & ſi uolueris; ne aggregentur ſuperfluitates, bis in menſe, aut ſemel ſui pharmaco, præterquam nocebit, trahet corpora in malam conſuetudinē: Ecce ergo, quod

Galenus clarè docet, si semel in mense pharmaco utamur, nos in malam consuetudinem trahere corpora: audias demum Auicenn. lib. primo fen. 4. ubi habentur hæc verba, naturam non esse faciendam consuetudinariam medicinis: quid clarius apud celeberrimos auctores esse potest, quam hoc, quod non assuecimus medicinis?

Rationes demum, quæ nos cogunt medicinarum consuetudinem refellere, plurimæ sunt, omnesque à definitione consuetudinis colliguntur, prima colligitur, quia ob vsum obiecta euadunt similia, inter quæ non est alteratio.

Secunda ab assuetis non fit passio.

Tertia, quia, si medicamenta ob consuetudinem non euacuuantur necessariò assimilantur, si verò non rectè assimilantur, saltem ex Gal. sent. 3. de simp. med. c. 24. conuertuntur in illud humoris genus quod debebant euacuare, vnde medicamento consuetudine affectus præternaturam non auferetur, sed augebitur.

Quarta ob vsum medicamentorum necessariò naturales facultates expellendi, & reliquæ desides, & ociosæ redduntur, tum quia tollitur expultrici facultati expellendi occasio, tum, quia medicamenta promptè euacuant materiam biliosam, quæ est naturalis nostra medicina, quæ vellicans partes corporis sentientes tamquàm calchar excitat, & irritat facultatem expultricem ad excrementa expellenda.

Quinta ob vsum medicinarum alteratrix, cuius robur fouetur solum à calidis, & humidis, leditur, quia omnia medicamenta exsiccant, & impediunt coctionem, qua impedita, plura excrementa congeriuntur.

Sexta consueta omnia non afficerent, neque agerent, sed solum afficerentur, & paterentur, & per consequens non euacuarentur, quia essent facta similia naturæ, vt Galenus docet libro de assuetud. cap. secundo his verbis, quæ longa assuetudine comparantur, vim ferè proprietatis naturalis contrahere; Quare concludi-

mus coacti experientia, auctoritate, & ratione fugiendam esse consuetudinem medicinarum, quia consueta purgantia tandem eo veniunt, ut non euacuent: alterantia vero, ut non alterent.

Egimus in his quatuor libris de omnibus methodis, quibus valeamus non solum affectuum omnium præter naturam ideas cognoscere, verum etiam omnia Empiricorum errata, quæ in perquirendis morborum formis contingunt, corrigere: Etenim in primo libro egimus de tribus methodis, quibus genericis morborum ideas cognoscere valeamus: sed quoniam affectuum ideæ modò per essentiam, & modò per consensum competent partibus nostri corporis, idcirco in secundo libro illas methodos declarauimus, quæ possunt nos docere omnes sympathias, & idiopathias partium humani corporis: cognitis his genericis morborum formis, in tertio libro egimus de methodis quibus perquirere possumus vltimas, & específicas morborum differentias: quibus cognitis, reliquum erat antequam ad extremam coronidem de ideis perueniremus, vt declararemus modum, quo possent metiri omnium morborum recessus, idcirco in quarto lib. in primis ostendimus, omnes affectus Nos metiri à statu aduentitio, & nõ primigenio: deinde diligentissimum examen instituimus de statu aduentitio: ostendimusque primo omnem statum aduentitium acquiri ob vsum, & consuetudinem sex rerum non naturalium: deinde quantum possit assidua consuetudo in mutandis, & alterandis omnibus corporis potentijs, & facultatibus.

Demum ostendimus in plurimos errores rudiores medicos incidere ob naturam consuetudinis ignoratam sicuti dum falluntur volentes in debilibus, & senib. consuetudines inueteratas mutare, cum non liceat deterrimas consuetudines ab ijs, qui sunt debiles amouere: similiter, dum falluntur non mutantes alterantia extrinseca, & intrinseca; & tandem errare ostendimus dum introducunt consuetudinem medicinarum.



SANCTORII SANCTORII

Olim

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIUM

In Humoribus peccantibus per propria signa perquirendis.

LIBER QVINTVS

*De Numero, & Differentia peccantium
Humorum. Cap. I.*



MActenus eovsqve
Lectorem tran-
stulimus, & in-
tali semita ipsum
locavimus, qua
nullo modo in-
morborum ideis,
& formis perqui-
rendis (nisi nie
fallat opinio) er-
rare possit. Nunc expedit efficientes mor-
borum causas perquirere: Ceterum, quia
confusum omnium, quæ efficiunt mor-
bos, aliquæ sunt internæ, & aliquæ externæ
quæ sunt sex res non naturales, de quibus
agemus in seq. lib. & præcipue in lib. per-
tinentibus ad fontem diætereticum; inter-
narum verò aliquæ sunt, vt morbi effi-
cientes alios morbos, de quorum omnium
ideis egimus in quatuor libris superio-

ribus; & aliquæ demum sunt efficientes
internæ, quæ in contentis collocantur;
reliquum est, vt in seqq. sex libris agamus
de illis causis efficientibus, quæ in con-
tentis, vel in humoribus continentur.

De humoribus ergo acturi, valdè con-
uenit, vt hic acta, & probata à Galeno, &
Auic. supponamus, & ex ijs ad alia maxi-
mè conferètia mentis aciem dirigamus:
Supponamus ergo in primis cum Gale-
no, Hipp. & Auic. quatuor esse suprema
humorum genera, pituita in videlicet, bil-
lem, melancholiam, & sanguinem: dein-
dè sub his, quamplurimas esse famosas
humorum species; in primis enim sunt, vt
dicit Galen. 2. de differ. febr. c. 6. quatuor
pituitæ, dulcis videlicet, acida, acerbæ, &
salsa: Auicenna verò in prima sen. cap. de
humorib. similiter ponit alias quatuor
differentias pituitæ penes sapores; sed
præterea ponit alias quatuor differentias
penes substantiam, quæ sunt vitrea, gyp-
sea, aquosa, & dissimularis.

Galenus 1. de alimentis cap. 2. ponit differentiam inter pituitam & crudum succum: ibi enim habet hæc verba, urina hypostasius siue sedimentum propriè vocatur crudus succus, qui est puri similis: sed neque grau toleus, neque lentus est, ut pus.

Primo verò præfag. vltimo inquit sedimentum esse corpus vix diu per negationem extremorum inter humorem, & pus: ergo nulla pituita potest dici humor crudus. Præterea Gale. 1. de alimentis citato ait, crudum succum non solum obseruari in febricitantibus, sed etiam aggregari in sanis, quando post multos & exantlatos labores sumunt cibos coctum difficiles.

Demum 2. de facul. nat. vltimo dicit, mucus qui stillat à cerebro, & grauedine facit non esse propriè pituitam, sed crudum succum: quia non potest fieri pituita præter naturam, nisi antea fuerit pituita naturalis: sed crudus succus proprio modo superius nunquam fuit pituita naturalis: ergo non debet vocari pituita. Hinc pituita gypsea ea de causa dicitur pituita, quia in origine fuit pituita naturalis, & apta, ut ad benignum statum posset reduci, quare differentia inter pituitam, & crudum succum est, quod pituita illa dicatur, quæ in sua origine fuerit capax coctionis: humor verò crudus nullo vnquam tempore.

Duo in hoc loco sunt notanda: primo dari crudum succum in urina, in febricitantibus, & in sanis, dum cibos non digerunt: vel dum sanguis destitutus cerebri nutritioni couertitur in catarrhum omnino coctioni rebellem. Demum illa omnia, quæ effugiunt primam coctionem pertinent ad crudum succum. Hinc Gal. 4. de tue n. san. cap. 4. & 3. de alimentorum facultatibus cap. 33. loquens de crudo succo inquit præcipue generari ex usu piscium crustaceorum: causa est quia tales pisces in ventriculo ingesti effugiunt primam coctionem.

Secundò notandum est, quod crudus succus fieri possit, vel defectu caloris, vel excessu caloris prohibentis coctionem: sic ventriculus, iecur, & cerebrum generare possunt crudum succum defectu caloris, & excessu caloris.

Ventriculus defectu caloris generat crudum succum ex prauo alimento: quia prauum alimentum conuertere non potest in

chylum, vel in pituitam naturalem; quo casu effugiens coctionem, & attractus ab hepate non conuertitur in sanguinem, vel pituitam, sed relinquitur crudus, qui est omnino & coctioni, & nutritioni ineptus: sic Galenus 3. de alimentis 33. dicit, pisces crustaceos producere crudos succos & non pituitam: est nutritioni ineptus; quia ex Gal. 3. in 6. epid. 1. error primæ coctionis non corrigitur in secunda, sed vel in sedimentum cedit, ut dicit Gal. 1. præfag. vltimo, vel retentus in corpore ad cachexiam disponit. Excessu verò caloris ventriculus efficit crudum succum quando ob cibos præcalidos, vel putridos fuit corruptelæ, & liquidæ deiectiones, antequam fiat chylus; Galenus autem 11. methodi cap. 15. habet ex errore primæ coctionis duo mala oriri. Primum quod cibis nullam afferat utilitatem. Secundum, quod expellatur per aluum aliquid prioris cibi cõcocti ex ipsius corruptelæ, quod non sit sine corporis detrimento.

Iecur similiter efficere potest crudos succos defectu, vel excessu caloris, defectu caloris veluti quando ex intemperie frigida hepatis fit fluxus hepaticus, vel ascites; aqua enim hydropicorum non est pituita, sed crudus succus. Pari modo excessu caloris iecur efficit crudum succum, quando sunt deiectiones biliosissimæ, & fetidissimæ, quæ sunt crudæ, & ut dicit Hippocrates 4. aphor. 47. perniciose.

Simili modo cerebrum defectu caloris efficit mucum, qui stillat à cerebro, quem mucum Galenus 1. de facul. nat. vltimo asserit non propriè vocari pituitam, ergo vocabitur crudus succus. Idem catarrhus tenuis, & aquosus, qui descendit per nares est crudus succus. Insuper cerebrum excessu caloris efficit crudum succum, ob intemperiem calidam cerebri, dum catarrhus tenuis sit acris, & mordax, ut in Matrona Romana obseruauit Galen. 5. methodi 13. qui minabatur erosionem pulmonis.

Quo ad differentias bilium Galenus lib. de atra bil. cap. 2. & alibi ponit septem videlicet pallidam, flauam, vitellinam, porraceam, æruginosam, ceruleam, quæ laticidis dicitur, & rubram.

Sed de his humoribus distinctius, quia differentie bilium ascendunt 21. Prima

est bilis pallida, mixta est ex bile pallida, & pituita aquosa, indicatque naturam frig. d. ureculam, & vocatur bilis ochrea, quia assimilatur terre ochreae, i. figillatae.

Primus enim gradus coloris pallidi à Platone in Timoe vocatur *αἰσχροῦς* de hac bile mixta cum pituita aquosa mentionem facit Galenus 2. prognost. 38. Secunda bilis vocatur subrufa, quæ est simplex pallida, non commixta ex bile & pituita, sed habet proprium ichorem copiosum, qui non est pituita aquosa: de hac mentionem facit Galenus primo de natura humana vice simo quinto: quod verò quilibet humor habeat proprium ichorem, qui non pertinet ad pituitam aquosam, docet Galenus secundo in sextum epid. 37. Hæc bilis subrufa est intensioris coloris, quam callida mixta ex bile & pituita: & remissioris coloris, quam rufa seu rutila, seu ignea, quæ nomina idem significat. Tertia est bilis rufa, cuius color à Græcis vocatur *κνίσις*, idest igneus, rufus siue rutilus, qui color ex Galeno secundo de crisi-bus duodecimo est remissior flauo: inde errant plurimi, qui putant colorem rufum significare rubrum. Quarta est subflaua, quæ assimilatur cortici citri non exatè maturi. Quinta est bilis flaua, quæ assimilatur cortici citri bene maturi.

Pari modo apud Platone in Timeo obseruantur isti quinque gradus coloris: quorum primus est *αἰσχροῦς* idest pallidus: Secundus est *σνέφους* idest, subrufus: Tertius est *κνίσις*, i. rufus: Quartus est *κροκόειος*, idest subflauus: Quintus verò est *ξανθός*, idest, flauus. Sexta bilis differentia est vitellina, quæ mixta est ex bile, & pituita crassa, de qua Auicennas egit superius, & Galenus 2. prognost. com. 38. Septima est vitellina simplex, quæ non est pituita commixta, assimilaturque vitello oui recentis, hæc fit, vt docet Galenus 5. in 6. epid. 14. ex flaua crassescente. Octaua est vitellina, quæ assimilatur vitello oui vetusti, quæ eadem ratione fit intensioris coloris, quam vitellus oui vetusti, nempe per resolutionem ferositatis, quæ resoluta, dum assatur non exudat. Nota est bilis rubra, quæ a Galeno lib. de atra bile cap. 2. accedit ad sanguinis tenuis naturam: illam tamen vocat bilem, & non sanguinem, quia non concretit. Similiter

Galenus quinto in 6. epid. 14. ferositatem sanguineam vocat bilem. Decima est bilis quedam rubra proniciens à sanguinis tenuis effluencia, quæ differt à ferro sanguine, qui non concretit: hæc enim concretescere potest; ex hac effluente sunt erysipelata, & febris synochos: hæc Galenus primo de natura humana 4. videtur collocare inter alias biles non naturales, quæ ex putredine sunt. Undecima est bilis rubra facta ex bile & melacholia fecali, quæ est rubra, quia fex sanguinis adhuc conseruat rubrum colorem: de hac bile Auicennas mentionem facit in prima seu. Duodecima est bilis crocea, quæ vergit ad rubrum colorem, efficitque morbos lethales, & sitim inextinguibilem: de hac bile Rasis 2. continetis, & Actuarius lib. de inditijs vrinarum loquuntur. Decimatercia est bilis alimentalis, quæ est rubci coloris, & est veluti spuma, de qua Auicennas distinctè egit. Nonnulli ponunt inter biles rubras bilem rufam: sed reuera rufa inter pallidas reponi debet. Decimaquarta est bilis porracea, quæ solum fit in vetriculo ex esu olerum, cuiusmodi sunt brassica, beta, & aliæ herbe virides, de qua Galenus 3. de alimētis, & alij in locis: hæc bilis potest conuenire sanis. Decimaquinta est porracea facta ex corruptela, quæ non solum fieri potest in vetriculo, sed in qualibet corporis parte, de qua agit Galen. secundo de facul. nat. & tertio de alimentis cap. de melle, quæ ex cepis corruptis in sanis quoque corporibus aliquando fit: fieri quoque potest in infantibus, in quibus si fac corruptatur, per alium excrementa viridia excernitur.

Quod hæc viridis bilis ex corruptela possit fieri in singulis corporis partibus, patet experientia: quia ex capite mucus per nares viridis aliquando emungitur, ex pectore sputa viridia: in gonorrhæa gallica excrementa viridia apparent: pari modo in vlceribus malignis pus viride fit.

Præterea sanguis è vena extractus aliquando serum habet valde viride. Demum nulla est corporis pars, in qua ex corruptela non possint viridia excrementa generari, quæ reducuntur ad bilem æquiuocè sic dictam; dicimus æquiuocè quia hæc viridia non sunt amara.

De-

Decimafexta est porracea, quæ ex aduſtione fit in iſtis venis, & eſt verè bilis: de hac Galenus agit 2. prægnoſt. 39. quæ eſt adeo ſæua, vt omnes ferè interimat; parum enim diſtat ab atra bile, quæ exedit, & lethalis eſt.

Galenus enim primo in primum prædicto de bile habet hæc verba, *ſiana cum ſupra modum aſſat, prius migrat in æruginofum deinde in nigrum*. Imò Auicennas in tex. ſuperiori col locat hanc bilem inter venena.

Decimaſeptima eſt æruginofa facta ex porracea ex eſu olerum, à qua diſfert ſecundum magis & minus: quia in iſta renittuntur aliquid de colore viridi de hac Galenus agit ſecundo prægnoſt. com. 39.

Decima octaua eſt æruginofa facta ex corruptela.

Decimanona eſt bilis iſatodes, quæ glaſto ſimilis eſt, de qua Galenus lib. de atra bile cap. 2. & alijs in locis ſuperius citatis inquit quod hæc bilis iſatodes fiat ex flaua iuperafſata, ſed adhuc non conuerſa in aliam bilem.

Vigeſima datur bilis iſatodes, quæ fit ex eſu olerum.

Vigeſima prima eſt bilis iſatodes ex corruptela: harum duarum bilium color eſt magis fuſcus, quam color braſſicæ, vt animaduertit Galenus decimo de ſimp. medicina cap. de ſelle.

Vigeſima ſecunda eſt bilis quedam cærulea, quam proponit Galenus 10. de ſimp. medicina cap. de ſelle, tanquam diuerſam ab iſatode.

Vigeſima tertia eſt bilis æruginofa, quæ fit ex bile naturali, & atra bile aduſta, quæ ſæpe in excretis per aluum apparet: de hac loquitur Auicennas hæc dicitur rubiginofa, quia aſſimilatur ærugini ferri.

Vigeſima quarta eſt bilis cærulea facta per congelationem: qua Auicennas in primam ſen. Nos verò arbitramur, hanc cæruleam fieri per congelationem, dum partes externæ ob frigus denſantur, quibus denſas prohibeatur perſpiratio, ob cuius prohibitionem calor ita augeatur, vt exurat bilem flauam, & inde illam cæruleam, ſeu fuſcam reddat; quæ reuera parum diſſert à cærulea per aduſtionem.

Præterea à Gal. primo de natura humana com. 4. proponuntur aliæ biles, quæ

nomine carent, quæ præcipuè obſervantur, (vt ibidem docet) in morbis qui ſunt ex putredine: hæc de numero bilium dicta ſunt. Sed aliæ plures ex dictarum bilium mixtione fieri poſſunt. Cæterum in quaſtionibus in prima ſen. quæ non ſolum nobis inſtruent pro intelligentia, ſed etiam pro exacta generationis prædictarum bilium cognitione quamplurima conſiderabimus.

Si de differentijs melancholicorum ſuccorum agamus, in communis noſtris primæ ſenſatis ſuperque egimus. Intè tim colligere poſſumus has differentias.

Prima eſt pars craſſior melancholiæ naturalis, quæ eſt ſæx ſanguinis, dicimus pars craſſior, quia melancholia naturalis habet partem craſſiorem, & ſubtiliorem, vt dicit Auicennas in textu.

Secunda differentia melancholiæ naturalis eſt eius ſeroſitas.

Tertia eſt eadem ſæx melancholica aduſta.

Quarta eſt eius ſeroſitas aduſta: memoria enim repetenda ſunt, quæ dicuntur a Gal. 2. in 6. epid. 37. vbi aſſerit, quod quilibet humor habeat proprium ichorè.

Quinta eſt atra bilis facta ex aduſtione bilis flauæ.

Sexta eſt eius ſeroſitas aduſta.

Septima eſt melancholia facta ex aduſtione craſſi ſanguinis de qua Auicennas in prima ſen. quam Gal. 2. de temp. ultimo, & alibi videtur admittere.

Octaua eſt eius ichor ſanguineus aduſtus.

Nona eſt melancholia facta ex aduſtione viſcoſi phlegmatis.

Decima eſt eius ichor.

Vndecima eſt melancholia facta ex aduſtione aquoſi phlegmatis.

Duodecima eſt eius ichor.

Decimatertia eſt ſanguis à vehementi frigore concretus, qui ab Auicenna in cap. de humoribus vocatur melancholia, quæ ſolet effecere catalepfim, & hyſtericas paſſiones ſæuiſſimas.

Decimaquarta eſt eius ichor.

Decimaquinta eſt melancholia alimentalis, quæ nutrit oſſa, & alias partes craſſas: hæc melancholia eſt ipſemet ſanguis redditus ſimilis oſſibus, antequam conuertuntur in oſſa: dicitur me-

lancholia alimentalis, quia dum unitor ossibus fit frigidus, & siccus: hæc caret ichore: quia est omnino similis. Nos inter differentias melancholicorum humorum posuimus ichores melancholicos: quia ichores efficiunt morbos diuersos à morbis, qui sunt ab humoribus ipsis, ut docet Galenus lib. de tum. præter naturam cap. 10. ubi loquens de ichore bilis, & de ipsa bile inquit, quod ab humore bilioso ichore aliqua ex parte destituto fiat herpes; ab eius ichore uerò fiat erysipelas.

Præterea possunt multiplicari melancholicorum succorum differentiæ ratione causæ efficientis uario modo exurentis melancholias, ut docet Galenus 14. methodi 9. dicens melancholias aduri, uel à putredine, uel à febre phlegmonode: hæc sunt Gal. uerba, *si incaluerit aut propter putredinem, aut febrem phlegmonodem, sit nigra bilis, quam nullum animal, nec ipsi quidam mures gustauerint*: ideo medici debent distinguere dictas melancholiæ adustiones: quia prout uaria est causa adustionis, sic uaria est curatio: quare tredecim reuertantur melancholiæ adustæ ab ipsa putredine, & totidem à febre phlegmonode, quæ efficiunt 26. differentias melancholicorum succorum: addêdo uerò melancholiam naturalem non adustam eiusque ichorem, & melancholiam alimentalem, omnes peruenient ad differentias nouem supra uiginti. Demum ex mixtione dictarum differentiarum poterunt aliæ quam plurimæ suboriri, quæ quot sunt facile colligi poterunt ex regula à nobis proposita lib. 7. huius methodi nostræ uitandorum errorum cap. ult.

Postremo est sanguis, qui copia tantum peccare potest; hæc sunt igitur efficientes causæ internæ in humoribus collocatæ, quæ certissimis methodis sunt præcognoscendæ, ut rectè sciamus, quando extra limites naturales elabuntur, & quando uario, & diuerso impetu modò unam partem, modò aliam adoriuntur, perturbant, quæ uiuentia: ab ipsis enim innumerabilia morborum germina exundant.

Cum igitur ego uiderim Tyrones Medicos de humoribus loquentes, uel sæpius in errores prolabi, optimum factu existimaui, in quolibet libri limine affer-

re methodos perquirendi omnes modos, quibus partes humani corporis à peccantibus humoribus vexentur & perturbentur; etenim ueritate methodicè acquisita quisque melius, & facilius animaduertet, an decipiat nec ne, & nunquid à recto calle abscedat, & demum promptè uniuerfos errores, qui fieri possunt in peccantibus humoribus perquirendis dignoscet.

Quinq; in sex libris sequentibus proponentur capita generalissima, quæ methodis declarabuntur: & ad quæ errores omnes, qui fieri possunt in peccantibus humoribus perquirendis, reducuntur: Primum, quod proponitur est dignoscere, an humor peccans sit pituita, uel bilis, uel alter humor, quod in hoc libro, & in sequenti perficitur: quia in hoc quinto libro agemus de signis proprijs, & in sexto de syndrome signorum communium ostendentium peccantes humores.

Cæterum, quia, ut plurimum humores peccantes sunt misti: ideo hoc secundum caput se offert statim examinandum, an scilicet mixtura peccantium humorum sit facta ab humore intrinsecus ob varias alterationes transmutato, uel ab humore extrinsecus adueniente per hypothesim, an ne potest esse in uenis, uel in alia corporis parte bilis cuius portio tantum, & non tota ob nimium calorem aduratur, & conuertatur in atram melancholiam: hæc igitur portio adusta, si erit commista cum reliqua bile adhuc non adusta, faciet mixturam, quam uocat Auicēnas intrinsecus factam; Si uerò mistio fiat ab humore non ibi existente, sed aliunde proueniente, mistio erit alterius generis, & vocabitur mistio ab extrinseco humore facta, quarum mixturarum varietas non solum cognitionem, verum etiam curationem morborum variat.

Cognitis ergo sigillatim omnium humorum mixturis: cadit considerandum quo pacto humores tota substantia, & occultis qualitatibus operentur, ageturque de primis reconditarum qualitarum exordijs, quibus initijs perceptis, magna rudiorum medicorum confusio ob perperam intellectas qualitates occultas animaduertitur.

Exinde, qua quantitate humores per-

turbent patientes, methodo declarabitur.

Postremo agetur de ijs, quæ pertinent ad peccantium humorum morum.

Quare omnia si perceperimus, plurimos quoque empiricorum errores inde animaduertere, & rejicere poterimus, quorum omnium intelligentiam, si rectè assequemur, quam sit profuturum, cæteri iudicent, quoniam nullus datur effectus, pro cuius recta intelligentia, & medela non conspirent interni humores, quia illos in omni morbo euacuamus, illosque alteramus, quinimò neque de tabidissis tractamus, quin eorum humores aliquando alteremus, & euacuemus.

Denique adeo hæc humorum peccantium cognitio medicis vilis est, ut quando morbi idea specifica omnino latet, peccantes tamen, & prædominantes humores internos consequimur; nostras quoque pacto in re medica adhuc videmur absoluerè partes; quoniam ab humoribus præcognitis saltem indicationes alterandi, & euacuandi colligimus; quibus si satisfaciamus, aliquid opis necessàriò ægrotantibus afferre possumus.

Quibus methodis sit incedendum in occultis humoribus vitiatis perquirendis.

Cap. II.

Cum in hoc, & sequenti libro nostrum sit propositum, vias aliquas tradere, quibus faciliè dignoscere possimus, quisnam sit humor peccans in quolibet malè affecto corpore, an bilis videlicet, vel pituita, an melancholia, vel sanguis peccet: idcirco in tanto negotio, si profundè philosophari vellemus, non possumus committere, quin ad principia analytica, tamquam ad proprios fontes confugiamus; ab ijs enim solum haurire possumus infallibilem sciendi modum, quem dum consequimur, illud animaduertere quoque possumus, quam sæpè rudiores in qualibet facultate, & præcipuè in arte medica curatrice, dum insalubria corpora sibi poponunt consideranda, atque curanda, falluntur.

Etenim sæpè contingit, ut in corporum latebris causa morborum sit melancholia, at tamen non desunt Empirici, qui

credant esse bilem; interdum verò corpora ægotantium sunt biliosius recrementis vexata, atque percussa; nihilominus hauriunt indicationes à pituita, vel viceversa; itaque sæpissimè nesciunt nostrates alogiatri, an sit vnus, vel alter humor, qui peccet.

Causa verò, & radix tantorum errorum est, quia sine methodo, & cæcorum vires, signique communibus inartificiosis examinant peccantes humores, quò sit, ut non sit mirum, si curationes creberrimè, instituant in magnam ægotantium pernitiem.

Quatuor per scholas circumferuntur loca, quibus occulti humores peccantes indagantur, quæ tamen, nisi ad bonum vsum reuocentur, potius confusionem, quam rectam intelligentiam nobis afferunt: Loca verò sunt quatuor, scilicet antecedentia, consequentia, iuuantia, & ledentia, quippe quæ (si philosophicè loqui vellemus) ad bimembrem diuisionem bellissimè redigi possunt: omnis enim diuisio melius, & commodius docet, si (ut ait Boetius) ad bimembrem reducat.

Dicimus ergo, quod omnia loca, per quæ animaduertimus, & perquirimus humores peccantes in aliqua penitissima corporis parte sint antecedentia, vel consequentia, quia omnia iuuantia, & ledentia sunt consequentia.

Asteramus igitur distinctius omnes modos antecedentes, & consequentes, qui possunt nos ad cognitionem peccantium humorum ducere, ut possimus antecedentia, & consequentia vtilia ab inutilibus separare, exordia namque ab antecedentibus.

Antecedentia omnia, quæ in congerendis humoribus præter naturam concurrunt, & quæ possunt docere, quisnam sit humor peccans, ad tria genera dumtaxat reducuntur, quoniam aliqua antecedentia sunt sex res non naturales; aliqua sunt causæ remotæ, quæ differunt, ut infra patebit, ab ijs sex rebus non naturalibus; & aliqua demum antecedentia sunt causæ proximæ efficientes humorum peccantium; alia non dantur, quæ possunt nos docere, an peccet humor, & quando peccet, & an sit bilis, vel pituita, melanch-

cholia, vel sanguis.

Cum igitur lex res non naturales primæ sint, quæ collocantur in numero antecedentium, videamus, an ab ipis colligere possimus aliquam notitiam peccantium humorum: sex sunt genera rerum, non naturalium, ut dicit Galenus libro de tuend. sanit. scilicet aer, cibus & potus, somnus & vigilia, exercitium, animi passiones, inanitio & repletio; sub his tamen non omnia externa continentur, quoniam nec medicamentâ, vel alterantia extrinseca, ut vnguenta, & alia topica id genus, quæ alterant, & sunt externa, & sunt res non naturales sub aere, cibo, & potu, & sub alijs enarratis non continentur.

Ideo longè melius Gal. 5. de tuenda sanitate capite 10. reduxit omnia externa procataretica, vel omnes res non naturales ad quatuor capita, ut primum continentur ea, quæ assumuntur: secundum ea, quæ sunt animo, vel corpore: tertium ea, quæ excernuntur, & retinentur: quartum ea, quæ foris adhibentur: ad quæ summa genera omnes res non naturales quas possumus imaginari, reducuntur.

Hæc igitur antecedentia externa, quæ vocantur res non naturales, quamvis alterent humores, ab erroribus tamen in ijs externis causis commissis non possumus cognoscere peccantes humores, quia, ut humor evadat vitiosus, aliæ plures causæ internæ concurrunt, sicuti est dispositio multorum viscerum, ut ostendimus in primo lib. cap. 9. & 10. hic tamen exemplis confirmare possumus eadem sententiam, quod scilicet externi errores occultos humores peccantes non manifestent.

Sit igitur eger in aere feruido, sique in malum valetudinem cadat, valebit ne dicere, aer feruidus præcessit, & deinde in morbum est lapsus, ergo humor peccans est bilis? nemmo sane mentis inferre poterit hanc consequentiam minimè necessariam; quoniam potest contingere, ut in calida illa aeris constitutione collegerit magnam pituitæ, acerrum, quo in anafarcam potius posset labi, quam in ardentem febrem.

Similiter numquid non videamus in gelido anni tempore multos biliosus humoribus premi, & in solstitijs hiemalibus aliquando corpora ignitis contlagrare,

humoribus.

Simili modo, si de cibo loquamur, non semel observauimus in cachexiam illos cecidisse, qui continuo aromatatis, & calidissimis potationibus se tradidere, quare causæ istæ externæ nos fallere possunt, calidæ enim frigidos, & frigidæ calidos morbos, aliquando facere solent.

Ad eundem modum de ætate dici potest, quia non valet, est ætas senilis, ergo humor frigidus, & melancholicus necessariò peccat, quoniam sæpè vidimus, senes effrenabilem feretos in ardentissimas febres cecidisse.

Postremo, neq; longa consuetudo harum omnium rerum non naturalium etiam tanti, ut necessario hunc, vel illum humorem predominari doceat, quoniam sæpè contingit, ut videamus affluetos maluitico vino, veneri, exercitio, & cibis calidis vexari paralyti, & cachexia; qui affectus a frigidis humoribus sunt; sequitur ergo, quod nullo modo possumus inferre ab externis rebus non naturalibus calidis, calidos humores in corporibus predominari; neque ab externis frigidis, frigidos: Sequiturque, ut omnino errent illi, qui ex antecedentibus externis (nisi ad meliorem usum antecedentia reuocentur) solent colligere humores peccantes.

Insuper ratione, & auctoritate pater, ab externis rebus non naturalibus non posse colligi peccantes humores, quia res non naturales nec signa, nec causæ peccantium humorum esse possunt; non signa, quia hæc externa sunt antecedentia, & priora morbis, de ratione vero signorum est, ut sint morbis posteriora: non causæ, quia vel essent proxima, vel remota, non proxima, quia causâ illa, quæ posita non ponit effectum, vel non est causâ, vel si est causâ, est remota; nemo est, qui dicat, posita ætate statim sequi febrem: neq; sunt remota, quia effectus fieri non potest sine causâ remota, atamea sine procatareticis calidis calidus humor fieri potest, sicuti dum gignitur bilis sine errore in rebus non naturalibus: calidis, & pituita sine errore commissio in frigidis, quod non euenit in causis remotis, quoniam remotæ necessariò ad effectus productionem concurrunt.

Hinc Auerroes videns effectus non sequi sine

sine causis remotis in libris poster. passim dicit, remotas causas omnes esse uirtute in proximis, sicuti uirtus solis, quæ est causa remota hominis, est in homine ante generationem filiorum, quinimò, si auferantur causæ remotæ, omnia sequentia pereant oportet.

Hinc philosophus de remotis causis efficientibus uerba faciens 9. metaphysices tex. 17. dicit, nisi darentur substantiæ separatae, quæ sunt motores primi, & remoti, nil ulterius repeteretur; & Auerroes 2. de substantia orbis, si cælum non esset, desinerent inferiora moueri, & mundus rueret, ut remotæ causæ necessarîo concurrant in effectum productione, quod de sex rebus nō naturalibus respectu generationis humorum dici non potest; quoniam, quamuis omnia externa frigida auferantur, attamen morbi, & humores frigidi gigni possunt; similiter, si omnia calida externo amoueantur, humores tamen calidi fieri possunt, quod non euenit, si amouerentur causæ remotæ humorum; quare sicuti ualet consequentia, fuit homo, ergo fuit Sol; & ualent fuit bilis, ergo fuit hepar, fuit homo, fuit animal, & fuit Sol: Similiter hæc non ualebunt, fuit bilis, ergo fuit ætas florens, fuit æstatis tempus, & aer calidus.

Præterea principijs analyticis ostenditur sex res non naturales non esse causas remotas generationis humorum, quoniam omnes causæ remotæ de effectibus affirmatiuæ, & de omni, quod est semper, & in omnibus prædicantur, quæ conditiones non possunt cōuenire externis rebus non naturalibus, cum neque semper pituitosis humoribus antecellant procataretica humida, & frigida, neque in omni pituita generatione.

Postremo non solum hæc res non naturales separatim cōsideratæ possunt dici causæ remotæ, uerum neq; omnes simul collectæ tantam efficaciam habent, quantum remotæ causæ ex Aristotele dare possint quæsitum quod res sit, ab his uero procatareticis nullo modo quæsitum quod colligi potest: quare ex illis peccantes humores non colligemus.

Per hypotesim sit aliquis morbo correptus, sique hydropicus, ponamus præ-

cessisse acrem æstium, usum ciborum calidorum, animi passionem, coitum, exercitium, & adesse ætatē in iuuenilem, quæ omnes sunt res non naturales calidæ, ex ijs poterimus ne inferre necessariò hanc consequentiam, quod scilicet humor, qui dominatur in hoc corpore sit bilis? posset forsitan, ut plurimum contingere, sed quod semper accidat, nemò sanè affirmabit; quia hydropici, & paralytici, & cachexia correpti mille inueniuntur, quibus omnes res non naturales calidissimæ præcessere, quare cum non sit de omni, consequentia nulla erit; videmus enim sepius post usum calidorum in ætate ægrum pituitosis destillationibus constitari.

Hinc Hippocrates, & Galenus videntes res non naturales nullo modo esse posse causas proximæ, vel remotas internotum affectuum, eas noluerunt appellare causas, sed *προποδους* idest occasiones.

Rationes denum, cur non sint causæ, longiori discursu à nobis allatæ sunt in primo libro capite 21. diximusque causas peccantium humorum esse dispositiones viscerum, & quæ necessariò ad has dispositiones concurrunt.

Galenus enim lib. de causis morb. cap. 2. dicit, quod sine subiecti aptitudine neque ignis comburere, nec gladius abscindere valeret; & Aristot. 2. de anima text. 24. dicit, quod actus adiuuorum est solum in patiente disposito; quare hic inferre rectè possumus sex res non naturales omnes vnitas sine viscerum dispositione nō posse esse causas generationis peccantium humorum; & per consequens ab illis hæc indicationes, nec cognitionem necessariam de statu peccantium humorum, sed solum *παραποδους*, idest euidentem coniecturam nos colligere posse, vel signa, quæ concurrunt ad faciendam perfectissimam syndromem, de qua in sequenti libro agemus.

Si igitur externæ illæ sex res nō naturales antecedentes certò non poterunt naturam humorum peccantium nobis significare, sequitur, ut diligenter inquiramus an per alia antecedentia, vel consequentia possimus in morbis cognoscere, quis sit humor peccans. Alia igitur præter sex

sex res non naturales antecedentia non sunt, nisi causæ proximæ humorum, vel remotæ: Si de proximis loquamur, facile patebit causas proximæ nobis præstare non posse quæsitum quod, vt scilicet cognoscamus in morbis, an peccet vnus, vel alter humor; & ratio est, quoniam causæ proximæ dant propter quid, nos autem querentes humores peccantes querimus an res sit, quod quæsitum contentientibus omnibus logicis, non habetur per causas proximæ.

Præterea per causas proximæ generationis humorum procedere, est ardua, ac difficilis via, quoniam vt plurimum causæ sunt effectibus magis abstrusæ, & reconditæ: debemus ergo aliquam viam facilem inuenire, quæ nos semper doceat illud, quod quæsitum, & per notiora nobis, ne in principi petitionem incidamus.

Quare cum quæsitum an sit vnus, vel alter humor in corpore ægrotantis non possit colligi ex erroribus commissis in sex rebus non naturalibus, nec ex causis proximis: relinquatur ergo, vt colligatur, vel ex causis remotis, vel ex signis consequentibus; quia non datur alter modus cognoscendi, an insit aliquid alicui.

Hinc diuinus philosophus, cui in tradendis methodis summum deferri debet fastigium, primo post capite 30. clarissime docet, duplicem esse methodum, quæ nos docere potest, an aliquid inexistat, aliam scilicet esse demonstrationem quia aliam vero demonstrationem à causa remota; aliamq; nec Aristoteles, nec posteriores philosophi vnquam inuenerunt.

Cæterum, quia demonstratio per causam remotam nihil affirmatiue concludit, cum nullus detur concludendi modus affirmatiue per medium remotum, vt probat Aristoteles in prioribus analyticis idcirco nos, qui volumus affirmatiue colligere, an peccet bilis, uel alter humor sequitur, ut demonstratio per causam remotam pro inueniendis humoribus uitiatis, qui sunt causæ efficientes morborum, sit prorsus inutilis.

Sequitur ergo, ut demonstratio quia, quæ procedit per signa consequentia, sit illa, quæ nos unice docere possit, an sit vnus, uel alter humor: Sed quoniam signa

consequentia, quæ necessariò & non per coniecturam docent, debent esse conuertibilia; de signis conuertibilibus erit agendum.

Scias igitur conuertibilia signa esse duplicis generis, alia propria, & alia communia, sed per syndromen collecta, & coarctata determinato subiecto, ut docet Arist. 2. post. dum coarctat animal habens ventres per conditiones illas habere cornu, & carere dentibus superioribus. Similiter Gal. in tota arte medicinali procedit declarando uiscerum temperaturas per syndromem signorum communium; idcirco nos amulantes diuinos hos Auctores non solum per propria signa, uerum etiam per syndromem communium signorum procedemus.

Agemus enim in hoc quinto libro de signis humorum peccantium proprijs, quæ tria solum uidentur esse, sapor, uidelicet colores, & periodi, uel motus humorum, ostenditurque quod, qui ex proprijs credunt procedere in perquirendis humoribus per alia signa, quam per illa tria, necessariò incidunt vel in signa communia, quæ faciunt parallogismum secundæ figuræ ex duabus affirmatiuis, vel in signa partialia, quæ faciunt parallogismum à particulari, ad uniuersale quod est monstruosum, vel in signa extranea, unde oritur elenclaus vocatus non causa pro causa, quia sumitur pro medio signum, quod nullo modo potest esse causa cognitionis, cum sit extraneum & alterius generis.

Deinde in 6. lib. agemus de signis communibus per syndromem collectis amulantes Aristotelem, qui solum uirtute logica potuit vereres philosophos conuincere, potuitq; primo phy. inuenire materiam primam, & veteres philosophos rejicere: Eadem via primo post. in principio inuenit dari scire de nouo: & alijs in locis quanti sit hæc meth. ostendit; vt nihil videatur esse inuentum ex omnium inemoria, quod sit ea facultate diuinius, illa enim expurgat in scientiis contingentia & probabilitatem, & sine illa difficile admodum est in rebus arduis, & abstrusis consequi ueritatem.

*Offenditur, quomodo ex saporibus, tam-
quam ex signis proprijs colligere pos-
simus, quinam sint humorum pre-
dominantes. Cap. III.*

SExdecim videntur esse famosi, & ma-
gis præcipue humorû nostri corporis
differentiæ, in primis enim Gal. 2. de differe-
rentijs feb. c. 6. enumerat quatuor species
pituitæ, dulcem videlicet, acidam, vitream,
& salfam: deinde lib. de atra bile cap. 2. &
alibi proponit septem differentias humo-
rum biliosorum, scilicet pallidâ, flauam,
vitellinâ, porraceam, æruginosam, caru-
leam, quam Græci *κίτριαν* appellant, &
rubram: demum eodem loco, & 3. de loc.
affectis quatuor facit melancholias, faciem
sanguinis naturalem, eandem faciem adu-
scam, sanguinem crassum adustum, & bilem
flauam assatâ, postremò est sanguis.

Ad has differentias à Gale. obseruatas
referantur humores, qui copia, vel quali-
tate humana corpora perturbare possunt.
Quj verò quâtitate solû peccant, sunt pi-
tuita dulcis, bilis pallida, flaua, rubra, san-

guis, & sex sanguinis: quoniâ in quolibet
sano corpore hi humores reperiuntur,
quique dum quantitate non excedunt,
magnum fructum afferunt humanis cor-
poribus: quinimò, si horum aliquis desti-
ceret, viuens non posset conseruari.

Humores verò, qui qualitate peccant
sunt vitellina bilis, porracea, æruginosa,
cerulea, sex sanguinis adusta, sanguis cra-
ssus adustus, & bilis assata, pituita vitrea,
gypsea, salis, acida, ab ijs re vera prodehit
innumerabiles affectus præter naturam,
quare erit, perneccesarium, vt prius per si-
gna propria, antequam ad signorum syn-
dromem accedamus illos humores per-
uestigemus.

Ceterum, quia superius dictû est, quod
omnia signa propria peccantium humo-
rum reduci videntur ad tria capita, ad sa-
pores, colores, & periodos humorum; de
saporibus prius est agendum: Sapores igitur
humorum peccantium, quantum men-
te, animoque colligere potuimus reduci
videntur ad ista sex capita, quæ sunt dis-
tinctè declaranda, si uelimus humorum
existentias peruestigare.

In humoribus igitur nostri corporis videntur obseruari posse solum hæc sex genera saporum, quæ sunt	{ dulce insipidum —	{ pituita aquosa similis, uel dissimilis
	{ dulce manifestum —	{ sanguis
	{ dulce nauseabundum —	{ ichor sanguinis alteratus
	{ amarum —	{ bilis
	{ salium —	{ pituita falsa
	{ acetosum —	{ melancholia, & pituita
	{ ponticum —	{ melancholia adusta vitrea & pituita

Hæ igitur valent consequentiæ, est sa-
por insipidus, ergo est pituita aquosa si-
milaris, uel dissimilaris, h'nc Galen. 2. de
differentijs feb. c. 6. dicit, quod insipidus
sapor conuenit pituitæ aquosæ: Est sapor
dulcis manifeste dulcedinis, ergo est san-
guis per se, ichor uerò sanguinis, uel ru-
bra bilis per accidens; quia ex Galeno 9.
methodi 12. & ex Aristotele 2. post. unum
ut unum solum unam indicat naturâ, &
2. priorum habetur, ab unica natura
unam tantum prodire proprietatem, & u-
nicam proprietatem unicum fontem, &
unicam solum originem arguere, quare
licet dixerimus insipidum significare pi-
tuitam aquosam, uel dissimilarem, quæ
est illa, quæ partim cruda, partimque est
cocta, unicum tamen intell'ginus, quod

est aquosum, experisque aliorum sapo-
rum.

Ad eundem modum dicimus, saporem
dulcem manifeste dulcedinis, sanguinè,
uel ichorem indicare; quia sanguis est per
se dulcis, ichor uerò per participationem,
quia dicit Galenus 2. de fac. naturalibus
9. quod dulcedo est proprietas sanguinis,
quare ichor est dulcis per accidens: qua-
propter supponere semper oportet, quan-
do duo humores habent eandem quali-
tatem, uel non esse diuersos, uel alteri eo-
rum per se, alteri uerò per participatio-
nem, & per accidens illam qualitatem
conuenire.

Post dulcem sequitur amarus sapor,
ex quo necessàrio colligimus biliosorum
humorû genus, ut est bilis pallida, flaua,
uitelli-

uitellina porracea, æruginosa, & aliæ bilium differentiæ quæ bilis species sũt omnes amarissimæ, & nullus in corpore datur succus amarus, qui non prodeat ab his speciebus, uel saltem sit mistus ex illis.

Quo pacto autem possimus distinguere cognoscere, quādo est bilis flaua, uel porracea, uel æruginosa, uel aliæ species enumeratæ, ex coloribus facillè colligemus, quoniam si humor fuerit amarus, & pallidus arguet bilem pallidam, quæ est mitior omnibus, mista enim est ex flaua, & aquosa humiditate, ut dicit Galenus lib. de atra bile cap. 2. & alibi.

Si uero humor fuerit amarus, & citrinus arguet flauam bilem, quæ est paulo calidior, quinimò hæc flaua bilis, si eruperit per aluum, ex solo colore eam cognoscemus.

Si uero sapor amarus erit cum colore, & crassitie præferente specimen vitellorum uorum, vitellinam bilem significabit.

Item amarietates cum porraceo colore prassimam choleram ostendent.

Demumque eadem amarietates cum æruginis colore æruginosam bilem declarabit.

Si uero amarietates copulabitur cum colore tendente ad cæruleum, isatidem colligemus.

Demum, si videbitur sanguis, qui non possit congelari, dicemus cum Gal. loco citato esse rubram bilem.

Postremo si congelabitur, dicemus esse sanguinem.

Si de saporibus pituitosorum humorum loquamur. Salsus sapor illicò pituitam saliam, non bilem, uel melancholiam indicabit; quia bilis, uel melancholia non potest falsedinem acquirere. Quopacto autem fiat falsedo, & à quibus causis, an à putredine, uel à mora, uel tandem à mixtura biliosi succi cum pituitoso, & cui per se, & cui per participationem conueniat in libro de mixturis, & in comm. nostris primæ sen. in cap. de humorib. ut in proprio loco sententiam meam explicabo; Sufficit in præsentia, ut salsus sapor saliam pituitam perpetuò ostendat.

Quantum attinet ad acetosum saporem, dicimus significare rem siccam, & frigi-

dam, etenim sapor acetosus ostendit in halitum resolutum fuisse humidum tenue, & calidum proprii temperamenti audias experientia, an ne dulcia dum ebulliunt resoluunt tenue? quod sua natura est humidum, & calidum, unde mutata crassi, uel temperamento dulcia euadunt siccia, & frigidiore, & acetosa? hæc enim obseruantur in officinis, quia dum muiua, & cæteri succi dulces sponte ebulliunt acetosi euadunt: tale quippiam in uino contingit, quia si à calido extraneo separetur, aqua uitæ, quæ pars tenuis, & calidi uini, illico fit acetum, acetum enim est uinum, sed sine aqua illa ardente experientia enim docet, à uino in acetum conuerso nullam, uel per exiguam extrahi posse aquam ardentem; hinc melancholia, quæ est fæx sanguinis, quia est priuata parte tenui calida, est acida, quoniam acetum fit ob resolutas portiones illas calidiores, & humidiores, quæ aquam uitæ constituunt, ad differentiam uappæ, quæ fit ob resolutum humidum non tenue, sed oleaginosum, quo mistum est mistum; sed de his in libro de mixturis diffusius agemus, hæc dicta sint, ut experientia aliqua edocti possimus colligere acetosum significare unicam naturam, id est succum non adustum, sed terreum frigidum, ob separationem aquæ uitæ.

Quod uero acetum sit frigidum, legi potest caput 19. primi de simp. med. fac. ubi potentissimis rationibus, & experientis ostendit Galenus, acetum esse frigidum: An uero acidus sapor indicet pituitam acidam, uel melancholiam, quæ est fæx sanguinis, uel aliam naturam, non hic, sed in libro de mixturis sermonem habebimus.

Postremo ponticus sapor, cum sit in pituita nitrea, & in face melancholica illa adusta, unicam tamē naturam solum declarare potest, cum unum (ut dictum est) unum indicet: indicat ergo solum frigiditatem intensiorem, quam illa, quæ est in salso; ponticitas enim introducit modum à frigido congelante, & resolvente humidum, modum à calido adurente, & resoluente, quare eo maior erit ponticitas, quo calor, uel frigus uehementius fuerit; cur autem, & quomodo hæc fiant in libro septimo, & in commentariis nostris in pri-

primam sen Auicennæ in tractatu de humoribus plenius declarabimus.

Quomodo ex coloribus colligere possimus prædominantes humores. Cap. III.

OVemadmodum humorum sapes vnicè declarare possunt, qui sunt illi humores, qui peccant, & prædominantur in corpore; similiter varias humorum species prædominari colligi potest ex colorib. excrementorum, & humorum sub cute immediatè existentium, dicimus immediatè sub cute existetium, quia faciei, & aliarum partium colores non possunt indicare humores altas partes insidentes vt ait Gal. 1. aphorismorum com. 2. dum recitat hanc Hippocratis sententiam, humorem autem superabundantem ex co-

lore debemus coniectari, nisi aliqui fortè in profundum recesserint, color enim similis efflorescit humoribus, si non retrò regurgitauerit.

Similiter 4. in 6. de morb. vulg. com. 28. docet ex colore oculorum nos peruenire posse in cognitionem internæ valetudinis habetq; hæc verba, si oculi benè colorati sunt etiam 3. in 10. hoc est corpus totum, declarant esse offensum, atq; in oculis propter eorum munditiam atq; nitorem celerius, quam alijs in partib. coloris mutatio perspicitur: subdit, ex signis, quæ in oculis apparent nos peruenire posse ad totius corporis cognitionem: nec obijciant, naturam, & quidditatè non posse cognoscere ex coloribus, quia occurrimus hic nos proponere, quinam sit in corpore humor peccans, & nequaquam quid sit.

Dicimus ergo, quod omnes humorum colores, qui possunt obseruari in humanis corporibus, ad hæc colorum genera reducantur.	(Album —————	est pituita
	(rubrum —————	est sanguis, & bilis rubra
	(pallidum —————	est pallida bilis
	(flauum —————	est citrina bilis
	(vitellinum —————	est vitellina
	(porraceum —————	est porracea bilis
	(æruginosum —————	est prassina bilis
	(cæruleum —————	est isatidis bilis
	(liuidum qui est via	ad nigrum
	(nigrum turbidum	est melancholia, quæ est sæx sanguinis
	(nigrum splendidum	est atra bilis

Modò colligimus peccantes humores ex solis coloribus, modò ex coloribus & saporibus simul: Ex solis coloribus, veluti, dum videmus album colorem in humoribus, statim dicimus esse pituitam aquosam similem, vel dissimilem: dissimilari est species pituitæ aquosæ adhuc crudæ, quia caloris actione adhuc non est æquata, minus sanè cruda est, quam similari aquosa, quoniã dissimilari est crassior, dicit enim Aristoteles 4. meteororum capite de coctione, quod coctio fiat incrassando, & propterea diximus, quod dissimilari pituita partim est cocta, & partim cruda, quia partim crassa, & partim tenuis existit.

Similiter rubeus color primo, & per se ostendit sanguinem, secundariò bilem rubram; pallidus color pallidam bilem, flauus flauam, porraceus significat porraceam, quamvis porracea sit mixtura ex

æruginea, & pituita, de qua in libro de mixturis agemus: vitellinus color vitellinam bilem significat; sit enim hæc bilis vitellina, vt dicit Galen. 5. in 6. de morb. vulg. text. 13. ex flaua crassescens, crasse scit enim dum à calore aliqua portio aquosæ assumitur, sed hæc seruata lege, vt sine adustione humiditas illa serosa resoluitur, quia quæ aduritur, nigrum, vel obscurum colorem necessariò acquirunt: quousque enim conseruatur color flauus, eo usq; humores non possunt dici adusti: vitellina bilis ex Galeno 2. de fac. nat. capite 9. incipit esse præter naturam: videmus enim per sæpe in officinis, dum rectè coquitur mel, vel iulapium, quæ flaua sunt, nisi adurantur, flauities suas conseruare, & nequaquam nigrescere, si verò plus iusto ebulliant, incipiunt statim post vitellinum colorem nigrescere, & amara fieri, quare donec conseruabitur

color

color flauus in humoribus, minimè dici poterunt adusti.

Æruginosus color supponit æruginosam bilem, quæ fit à calore magis adurent. humores enim si plus iusto coquantur, eo vsque aliquando absumuntur ipsorum ichores, vt inde supramodum torrefiant, fiantque æruginosi, & deinde cærulei, & demum nigri. Hinc Galenus 2. præfag. c. 47. loquens de gradibus adustionum habet hæc verba, flauus color fit seroso absumpto, pallidus fit immisto ex misione flauæ bilis in serosa humiditate, æruginosus fit seroso valde torrefacto, niger fit seroso supra modum torrefacto, qui nunc atra bilis exedens vocatur: quomodo autem fiat cærulea bilis, & quem gradum teneat adustionis inferius agemus.

Niger turbidus ex Galeno 4. de loc. aff. 7. alter est in sæce sanguinis, estque admodum spissus, & est sæcis vini haud absumilis, estque melancholia naturalis acidæ; hic humor subit naturam terræ, vt ex colore, & spissitudine cognoscitur, est sæcis vini haud absumilis, quia sicuti sæx vini est tartarum, quod est sua natura acidum, similiter hæc melancholia terrestris est acidæ, nigra, spissa, turbida, & nequaquam splendida, tum quia non est à calore ingenti perusta, tum quia est confusa, & non supercocta à calore, neque reddita ad paucas superficies, cum sit opaca.

Postremo est color niger splendidus, qui indicat validam adustionem, quæ in sæce sanguinis vix videri potest, quia sæx non est capax tanti ignis: valebit ergo cōsequentia est color niger & splendidus in humorib. ergo est atra bilis facta à combustione flauæ, quod Galenus clarissimè 3. de sympt. causis capite 2. docet, quare meritò colligere possumus prædominari atram bilem, si color niger, & splendidus appareat in excretis humorib. per aluum, per vomitum, vel per vrinam.

Adest vltimò color niger turbidus cum sapore pontico, qui non potest conuenire atræ bili, quia atra sua natura splendet: neque conueniet sæci sanguinis, quia hæc melancholia sua natura est acidæ; Sequitur ergo, quod conueniat sæci adustæ, quæ est nigra, & turbida ob terrestres portiones inæquales, estque pontica, quia quod est sua natura acetosum, si adura-

tur, amittit acetositatem, & ponticitatem acquirit.

Possumus quoque persæpè ex coloribus & saporibus simul sumptis humores peccantes cognoscere, sicuti colligimus ex amaritie, & flauitie flauam choleram, ex amaritie, & ex colore simili luteis ouorū vitellinam, ex amaritie, & viridi porraceam; ex amaritie & æruginoso colore prasinam bilem, ex amaritie & cæruleo isatidem.

Similiter ex acido sapore & albo colore pituitam acidam: ex acido, & nigro melancholiam, quæ est sæx sanguinis colligimus.

Ad eundem modum ex sapore pontico & nigro colore cum splendore colligimus iubeffe atram bilem illam exedentem, quia ab intensissimo calore necessariò oritur splendor, vt in officinis videre possumus, dum emplastra à vehementissimo igne vsque adeo indurentur donec splendorem acquirant.

Ex sapore verò pontico cum nigredine turbida colligimus melancholiam illam, quæ est sæx sanguinis adusta, non melancholiam naturalem, quæ non est pontica, sed acidæ, & turbida; turbidus color in nigra, & pontica melancholia significat humorem illum esse duntaxat à calore commotum, & confusum, sed non combustum, quia vbi calor comburit, semper gignit splendorem, vbi commouet tantum, turbidum efficit colorem: quemadmodum videri sæpè potest in vrina subiugali, & in musto, quæ turbida apparent, quia eorum partes similes à calore confunduntur, & nequaquam comburuntur.

Hinc optimi medici (& hoc obiter adiiciatur) dum vident in febris maligis vrinam splendidam, magis de patientis vita verentur, quam si turbida, & subiugalis reddatur: Hinc Hippocrates in Sileno cum vidisset quinta die vrinam lucidam apparuisse, mortem futuram die vndecima prænouit, vt maiorem colorem indicet vrinæ splendor, quam turbulentia.

Ex ijs igitur confici possunt propositiones conuertibiles, sicuti dicendo est albus color in humoribus, ergo est pituita aquosa, similis, vel dissimilis; est pituita aquosa, ergo albus color; est flauus color,

ergo bilis flaua, & vice versa; est viridis, ergo porracea, est porracea bilis, ergo viridis color, est niger splendens color, ergo atra illa exedens, & furiosa, & è conuerso; est niger turbidus cum acetositate, ergo est melancholia, quæ est sæx sanguinis non adusta; est niger turbidus color cum ponticitate, ergo est melancholia, quæ est sæx sanguinis adusta, & viceversa, & sic de alijs: ex ijs ergo, quæ inuicem conuertuntur solum poterimus infallibiles conclusiones colligere in ijs, quæ pertinent ad peccantium humorum cognitionem.

Quod ex periodis, vel ex motu morbi tanquam ex signis proprijs colligere possimus peccantes humores. Cap. IV.

INter signa propriissima malorum humorum corporis in parte aliqua penitissima recidentium sunt periodi, temporum morborum velocitas, & tarditas: quando igitur neque coloribus, neque humorum saporibus ad cognitionem humorum peccantium peruenire valeamus, tunc virtute periodorum, & aliarum motionum morbi certò illos cognoscemus, & ratio est, quoniam si peccant humores, necessarii facient insultus, & motionem aut tardam, aut velocem, quæ determinatisque temporibus fiet.

Humores enim præter naturam quatenus cause morbi, cum non vincant naturam, vel ab illa vincantur in vnico certamine, necessarii naturæ, & morbi conatus iteratis inuasionibus fieri debent, vt superentur, & quemadmodum omnia quæ fiunt, & mouentur, certas, & infallibiles periodos sortiuntur, similiter humores peccantes, & perturbantes corpora debent certis Typis, & motionibus viuere corpora adordinari, quarum motionum, seu inuasionum varietas nobis certò indicare poterit varietatem peccantium humorum, quod inducendo per omnes morbos qui fiunt ab humoribus peccantibus ostendi potest; etenim, si obseruetur inuasio, quæ fit alternis diebus, bilem peccare dicimus; si de quarto in quartum, melancholiam, si quotidie spiritum; & demum, si inuasio sit sine periodicatione, sangui-

nem peccare colligemus, insultus tamen à sanguine facti tres habent differentias, suntque vel homotoni idest vniformes, vel acmaltici idest crescentes, vel paracmaltici, idest decrescientes.

Nec mihi est obijciendum, quod in febribus putridis tantummodo periodicatione obseruetur, & nequaquam in morbis particularibus; propterea periodos non esse collocandas in catalogo signorum propriorum prædominantium humorum.

Instantia est nulla, quia experientiæ relucatur; innumerabiles enim inueniuntur morbi, qui sine febre, & sine putredine certas habent periodos; quare afferantur exempla: an ne, qui patiuntur dolorem capitis prodeuntem à morbo gallico, quotidie vexantur vesperti dolore; certis, ac determinatis horis in Solis occasu redeunt; perinde ac contingere solet melancholicis, qui vesperti semper magis infestantur.

Medici dicunt, & optimè, quod lues venerea comitetur, hæreatque prædominantibus humoribus nostri corporis, illosque inde exsiccare, & in melancholicos conuerrere; hancque dicunt esse causam, cur infecti lue gallica, eadem hora, qua melancholici, vexantur; sed vt vt sit, mihi in præsentia satis est, quod inueniri possit periodicatione in morbis sine febre.

Ad hæc, an ne hemigræca conflictati determinatis quibusdam temporibus, & statis quibusdam diebus solent inuasionibus tentari.

Insuper quis negabit non obseruari periodos in Epilepsia? in melancholia hypocondriaca? in morbo articulari? in lippitudinibus? in aurium dolore? audias Galenum primo de differentijs feb. lippitudines nonnullæ quotidie, nonnullæ alternis diebus magis infestant. Similiter aurium dolor atque articularum.

Amplius obseruatur periodicatione in passione nephritica, in qua statim quibusdam temporibus dolores non solum excitantur nephritici, verum etiam lapilli conglobantur: vidimus amicū, qui semper post quattuor menses lapillum excerneret, præsciretque lapilli partus diem.

Præterea circuitus obseruatur aliquando in gonorrhæa, in morbo arquato, in eruptionibus cutaneis, in vertigine, in cancro; in morbo pediculari, in alopecia, in cordis palpitatione, & in alijs pluribus affectibus præter naturam.

Galenus 5. de loc. affect. cap. 2. proponit casum cuiusdam, qui verno tempore per tres annos corripiebatur palpitatione: qui deinde faciendo phlebotomiam antequam palpitatione inuaderet, præseruabatur.

Postremo, si hæmorrhagias narium, uteri, hæmorrhoidum, & aliarum partium examinabimus, videbimus firmis, & statutis temporibus sanguinis fluores redire, quinimò illis suppressis, varia inde sequi symptomata obseruabimus.

Arist. 2. & 4. de gen. animal. dicit non solum menstrua periodicè moveri: Sed tradit causam periodicationis dicendo, Lunæ motum esse causam periodicæ excretionis menstruum, vultque decretescente Luna potissimè expurgari mulieres.

Arabes dicunt: Iuvenes noua Luna: vetulas veteri expurgari: vnde legitur hoc carmen,

*Luna vetus vetulas, iuvenes noua Luna
reputat.*

Sed quid multa? an ne aliquando leues quidam insultus determinatis quibusdam horis dici obseruantur in illis, qui nulla febre, nulloque alio effectû præter naturam premuntur? sicuti obseruatur in melancholia adhuc inter limites sanitatis constitutis, quorum humores sæpè alterantur vesperi, nulla tamen actione læsa existente, sicuti quoque videmus in pituitosis, qui noctu qualibet grauantur, in biliosis, qui meridie: & in sanguineis, qui prima luce; quare vanissimum erit credere, quod periodi solum febribus putridis, vel morbis per se conueniant: ratio autem, cur non ita apertè periodi in morbis particularibus: sicuti in febribus putridis obseruentur, est, quia huiusmodi putredinosi, dum adoriuntur partes solidas non obsecrè, sed apertè vellicant, & pungunt facultates expultrices, vnde necessariò humores peccantes debent efficere periodos prædominantium humorum,

quod in cæteris morbis particularibus non ita apertè obseruatur.

Amplius, si periodicatio per se conueniret morbis, sequeretur, quòd omnibus morbis conueniret: at quis dicit periodos, vel circuitus paroxysmorum conuenire, febribus hæcticis? & cæteris morbis, qui sunt in habitu, & non amplius fiunt, sed facti sunt: vt sunt vlcera, luxationes, lapsi in vesica, & cæteri innumerabiles affectus facti.

Quocirca, cum periodicatio per se non possit conuenire morbis; & præter motus nihil aliud sit in corpore ægrotanti, quod possit esse principium eorum, quæ fiunt, nisi humores peccantes, & prædominantes, in illos potius tamquam in causas efficientes reducemus circuitus, & ex circuitibus necessariò colligemus, qui sunt humores peccantes.

Accedit quòd non solum ab humoribus prædominantibus pendent periodi, verum etiam velocitas, & tarditas omnium affectuum præter naturam; eatenus enim morbi dici possunt veloces, vel tardi, quatenus continuò ab humoribus crassioribus, vel tenuioribus pendent, suntque in motu, & per consequens in fieri: Qui verò non amplius ab humoribus fiunt, sed sunt facti, vt est hæctica, & cæteri morbi in habitu, nullo modo poterunt dici veloces vel tardi, quia de ratione motus 3. physic. tex. 6. est actus entis in potentia, vt in potentia, id est in fieri; morbi verò in habitu sunt actus entis in actu, & in facto esse, quare cum morbis in habitu non possit conuenire motus definitio, morbi per accedens tantum dici poterunt veloces, vel tardi.

Insuper, cum quatuor morborum tempora insequantur per se motum, sequitur, quòd morbi in facto esse, & in habitu, quatenus nò sunt amplius in fieri, & dependentes ab humoribus, non habeant, neque habere possint quatuor morborum tempora, principium scilicet, augmentum, statum, & declinationem, quoniam eatenus sunt, habent insultus, & sunt veloces, vel tardi, quatenus pendent; quando verò non amplius pendent ab humoribus, cessant periodi, cessant morborum tempora, velocitas, vel tarditas: iure merito ergo nos ex moribus morborum per-

uenimus in cognitionem peccantium, atque prædominantium humorum, qui sunt efficientes causæ motionum vniuersalium, & particularium.

Emulabimur Aristotelem, qui hac via 8. phy. ex motu scilicet æterno Motorem æternum cognouit, & primo cæli ex motu circulari simplici inuenit cælestia corpora quintam habere naturam, diuersam scilicet à quatuor elementis, quod consequi non potuit Plato, quia non ex motu, ut Aristoteles, sed ex lumine colligere uolebat cælorum essentiam, dicebatque cælestia corpora, quia erant lucida, constare ex igne: & Solem formaliter esse calidum, & deum ex eminentijs elementorum cælum constare; causa erroris Platonis fuit, quia non poterat imaginari, lumen ex alia causâ, quam ab igne prodire: ex moribus ergo procedendo firmiter colligemus peccantes, & prædominantes humores, hac consequentiarum serie; morbus ab humoribus pendet, ergo fit; fit, ergo habet morborum tempora; habet morborum tempora, ergo est uelox, uel tardus; est uelox, ergo humor peccans est tenuis, calidus, & biliosus: est tardus, ergo humor peccans est crassus, & uiscosus.

Nec dicant, nos in soritem syllogismum uitiosum incidere, dum ex coacervatis consequentijs colligere uolumus peccantes humores esse calidos, uel frigidos, tenues, uel crassos.

Quia occurrimus fortites uitiosos esse illos, qui congregant, & coacervant prædicata accidentalia, dicimusque sortem propositum in cathalogo optimi syllogismi collocari, quia ex prædicatis essentialibus constat; etenim ab humoribus pendere; fieri, habere tempora, esse uelox, uel tardum, sunt prædicata essentialiter connexa, quare si ex ijs colligimus humorem esse crassum, uel tenuem, calidum, uel frigidum, mihi uidetur, quod necessariò alterum ex duobus sequatur nempe tempus uelox uel tardum.

Denique uelocitas temporum morborum tam necessariò indicat humores tenues, & calidos, & tarditas contrarium, ut uelocitas quoque unius temporis morbi possit nobis significare uelocitatem, uel

tarditatem totius morbi, & per consequens caliditatem, uel frigiditatem peccantium humorum.

Quod igitur ita re uera sit, quod scilicet, ex ueloci principio morbi breuitate, & ex tardo, totius morbi longitudinem necessariò possumus inferre, consugiamus ad historias Epidemicas Hippocratis, unde Gal. omnia medicinæ arcana desumpsit. Loquens igitur Galenus de Philisco, qui acutissimo, & uelocissimo morbo corripiebatur habet, si tertius, & quartus dies habent grauius symptomata, expectabis iudicium sexta, uel septima die; in Philisco tertia die apparuerunt grauius symptomata, quia nigra minxit, & lingua inaruit, habuitque spiritum magnum, & rarum: hæc sanè signa lethalia non apparuissent in principio, nisi morbus ob uelocissimum, & acutissimum motum humorum esset ualde progressus.

Colligit ergo Galenus ex uelocitate principij aliorum temporum breuitatem, dum dicit expectandum iudicium sexta, uel septima; ualebit ergo consequentia apud Galen. & Hippocratem, morbi principium est uelox, ergo erit uelox augmentum, status, & declinatio, licet post principium contingere possit recidua, & morbus nouus, quippe qui supponeret humorem peccantem esse alterius generis?

Ad eundem modum ex tardo, & longo principio colligitur tardum esse augmentum, statum, & declinationem, sicut obseruatur ab Hippocrate in casu Anaxionis plenitudine affecti, qui octaua die adhuc habebat tussis siccas, cuius principij tarditate cognoscens Hippocrates in 8. die secuit cubitum præuidens tarditatem aliorum temporum; peruenit enim cum affectu Anaxiona ad 34. diem: ualebunt ergo consequentiæ, uelox est principium morbi, ergo ut plurimum morbus totis breuis, ergo bilis peccat: ualebunt quoque, tardus morus est principium morbi, ergo longus erit morbus, ergo lentus, uel crassus humor peccabit: nõ uegamus morbos aliquando solui per apocopem i. per amputationem augmenti, ita ut uel in principio morbi sanentur, uel sanari & deinde excidentur recidive.

Neque istæ consequentiæ sunt ita certe, vt sunt mathematicæ: neque præfagia nostra sunt vatum sententiæ. Hinc Galenus de const. ar. med. habet: esset ridiculus, qui crederet tale esse medicorum præfagium, quale profitentur vates: Hinc enim dicunt resolutè homo liberabitur nona die: nec adiungunt, si omnia rectè agantur: Medicus verò dicit liberabitur, si omnia rectè agantur, si æger errata non commiserit.

Exsurgens dubitatio ex superius dictis soluitur, agiturque de periodorum causis. Cap. V.

Verum magna confurgit dubitatio, quia non videtur, quod pituita, quæ est frigida, & viscosa habeat tardam motionem, bilis vero, quæ est tenuis, & calida velocem; quoniam pituita quotidie inuadit, bilis vero solum de tertio in tertium diem, & melancholia de quarto in quartum: pro cuius dubitationis solutione Priscii, & Moderni valde laborarunt, vt nodum hunc soluerent, quare breuiter aliorum solutiones proponuntur, quia ex huius dubitationis solutione cognoscemus, non solum cur pituitosæ febris paroxysmi velocius moueantur, verum etiam, quænam sit periodorum causa.

Auer. 4. coll. cap. 27. dicit has periodos pendere à natura & calido innato, redditque rationem dicendo naturæ, & calidi innati proprium esse mouere, coquere, attrahere, & retinere amicum, & familiare, & expellere inimicum, & nature noxium.

Hæc Auerrois solutio tantum abest, vt tollat dubitationem, vt maiorem reddat difficultatem, quia frigidi humores pituitosi deberent à calido innato, & à natura tardius moueri, & nequaquam velocius biliosos: Præterea non soluit nodum, quia iterum quærere possumus, cur natura citius moueat pituitam, quam bilem: amplius afferendo pro causa periodicationum naturam, transcendit de genere in genus, scilicet ab ijs, quæ sunt secundum naturam, ad eas, quæ sunt præter naturam; paroxysmi non mouen-

tur à causa naturali, sed à causa præter naturam; Denique videtur Auer. supponere febrilem motum non oriri ab halitibus putridis, sed esse conarum naturæ, vt tenet Christoforus à Vega, quæ sententia in Galeno non potest defendi.

Conciliator differentia 88. soluens instantiam dicit, periodos à motu Lunæ, & ab humorum forma pendere: afferens verò causam, cur pituita quotidie inuadat, & bilis alternis diebus, dicit, Lunam præesse omnibus humiditatibus, vt patet dum fluxum, & refluxum maris facit, quare pituita, quæ est aquæ similior citius ab ipsa Luna mouebitur, additque in pituitam modicam causam comprehendendi, quia in Luna ob epicycli paruitatem non percipitur statio, directio, nec retrogradatio, deinde sequitur bilis, cum plurimis abundet ichoribus, & postremò melancholia, quæ est aquæ minus similis.

Primò errare videtur Conciliator, quia vt aliàs diximus ex causa remota nihil affirmatiuè colligi potest, vt Aristoteles in prioribus analyticis altissimis rationibus probat.

Secundò, quia vnus rei vnica debet esse causa, & non duæ, ille enim vult motum Lunæ, & formam humorum efficere periodos.

Tertiò, dicere formam humorum, & Lunam esse causam circuituum non tollit dubitationem, sed eam reddit obscuriorem, quia nec quomodo Luna, nec quomodo forma humorum periodos faciat, declarat.

Postremò dum colligit esse modicam causam in pituita, quia in Luna non percipitur ob eius epicycli paruitatem statio, directio, nec retrogradatio, videtur errare; quoniam dum hæc dicit, supponit Lunam re vera esse posse retrogradam, stationariam, & directam, alioquin modicam quietem à Luna colligere non potuisset, quod suppositum est falsum, quia concentricis Lunæ ferens epicyclum mouetur 27. diebus: epicyclus vero 32. dierum cursu suam perficit motionem; implicat contradictionem dicere: concentricum esse velociorem, & epicyclum tardiorum, atque Lunam exist-

stentem in epicyclo pati stationem, directionem, & retrogradationem; quare nullo modo quies, & pausa illa Lunæ admitti potest.

Fernelius libro quarto de febr. ca. 12. dicit, causam periodorum esse qualitatem quandam initam, & propriam, quæ vocatur *idiosyncrasia*, dicitque hanc qualitatem esse contractam à putredine, explicat suam sententiam his verbis: Non igitur sola exerementi copia, sed alia quædam vis maior necessario vnumquemque humorem ordine, certaque regula ciet, ac impellit: hæc autem propria est contractæ putredinis, qualitatis vis natura, atque conditio, quæ omnem corporis statum immutat, ut epilepsiæ insultus, aut hydrophobæ impetus, non humoris genus, sed qualitatis natura in humore sita excitat, huic mensuræ purgationes, quamvis paucus sanguis sit, singulis mensibus erumpunt, & sic de alijs diuinibus refert.

Hæc Fernelij sententia non recipitur, quoniam sequeretur quoddam humores possent putrescere, atqueam mouerentur, quia vult (de putridis febribus loquendo) ut prius à putredine contrahatur illa qualitas propria, quæ non subito fit, quia solum contracta, & non ante, vult humores periodicè moueri, quod videtur inconueniens, quoniam non post factam putredinem, sed dum fit, excitantur paroxysmi: deinde afferre hanc qualitatem propriam pro causa periodorum est nihil docere, quia æquè scio de periodis, dicendo causam esse qualitatem propriam, ac si nunquam loqui audiuissem de periodis.

Gentilis, & Herculanus in com. Auenennæ dicunt, periodos à proprietatibus occultis prodire: quorum opinio supponit substantiam primò, & per se edere operationes, quod fundamentum quia est falsum, & origo multorum errorum, nos in octauo libro longo discursu conabimur euertere, ostendemusque omnino operationem immediatè prodire non posse à substantia, sed à qualitatibus, & per consequens non dari illas occultas proprietates.

Hieronymus Capivaccus libro 6. de febr. cap. 12. dicit, periodorum causam

Sanctiorij Sanctiorij Pars I.

esse naturam humoris.

Huius viri excellentissimi opinio nihil videtur docere; quoniam dicere causam periodicationis esse naturam humorum æquè docet, ac Fernelius dicens esse qualitatem propriam humorum: ac Gentilis, & Herculanus, dicentes esse proprietatem occultam: ac Conciliator, qui præter lunam, dicit esse formam humorum, quare his dimissis, conuertere expedit mentis aciem ad causas magis sensatas, & quæ aliquantulum possent animum nostrum componere.

Valesius lib. 3. c. 25. controuersiarum; & plurimi recentiores causam magis sensatam querentes, dixerunt, copiam humorum causate periodos, atque pituitam moueri velocius bilis, quia est cæteris humoribus copiosior.

Horum tamen sententia, quamvis sit magis sensata, non recipitur, quia primò sequeretur, quoddam bilis in maxima copia extra venas existens oculus moueretur, quam si esset pauca, quod non videtur, cum semper tertiana de tertio in tertium moueatur, videmus enim aliquando de tertio in tertium moueri omnes paroxysmos cum vomitu copiosissima bilis; nihilominus de tertio in tertium sine paroxysmi antepositione moueris: ergo copia non potest esse causa periodorum.

Est demum Minadoi opinio, quoddam inquinamenta varia putredinis, varias periodos faciant: deficit quoque hæc causa; primò, quia non declarat, cur inquinamentum putredinis pituita moueat quotidie, bilis de tertio in tertium, nisi dicat, hanc esse naturam illius inquinamenti, & sic incideret in opinionem illorum, qui dixerunt causam periodorum esse naturam humorum, esse propensionem, esse proprietatem occultam, incideretque in principij petitionem inexcusabilem, afferendo pro declaratione quæstui ignoti aliquid, quod sit ignotus.

Secundò, inquinamenta non possunt esse causæ periodorum omnium, sed affectuum tantum, qui sunt à putredine: Qui circuituum causas querunt, querunt aliquid vniuersalius, quia dum melancholici vesperi assiguntur magis,

dum hemicranca, vel epilepsia determinatis diebus redeunt, hæc ab inquinamenti fieri non possunt.

Postremò est Franciscus Parellus lib. de feb. in terminat. qui dicit causam periodicationis, esse distantiam illorum viscèrum, quæ sunt domicilia humorum ab ore ventriculi; nam ventriculus, qui est sedes pituitæ, cum sit proximus ori ventriculi, si peccat eius humor, quotidianos facit circuitus; iecur, quod est humoris biliosi domicilium, cum magis distet, eius humor de tertio in tertium mouetur; lien, qui est sedes melancholiæ, & maxime distat à stomacho, facit periodos de quarto in quartum; quam sententiam colligit ex Galeno primo à Glauconem 5. ubi dicit, quotidianam in ventriculo, tertianam in hepate, quartanam in liene fieri.

Hæc opinio propius re vera accedat ad veritatem, si melius fuisset explicata; quoniam in primis videtur errare, dum supponit non fieri tertiana m, nisi humor peccans sit in iecore; non fieri quartanam, nisi in liene sit humor melancholicus; etenim fit tertiana, bile peccante extra iecur; & quartana, melancholia peccante extra lienem, deinde vult periodos varias esse ob distantiam ab ore ventriculi, quasi quòd febris sit affectus oris ventriculi; debebat potius dicere, variam distantiam à corde, periodos varias facere, quàm ab ore ventriculi.

Dicimus ergo nos coacti veris medicinæ, & philosophiæ principijs, quod humores prædominantes ob locorum, & partium affectuum situm, & distantiam à corde sint causæ periodorum; ostendimus quoque lib. 3. à decem locorum affectuum conditionibus omnes affectus naturales, & præter naturam trahere esse specificum; atque ne quis admiretur, audiat quot modis tantum fundamentum comprobari possit, an ex Galeno in primis patet 3. de sympt. caus. c. 2. quòd bilis in toto faciat icterum, in parte erysipelas? ergo locus, & non humor dat esse specificum morbis, & periodis morbos consequentibus: Similiter, an ne eadem bilis, si est in pleura, faciet pleuriticum affectum, si in cerebro, phrenesim? Si in

venis proximis cordi, ardentem? si in venis meserei, tertianam? ad eundem modum pergens Galenus loco cit. an ne dicit, si atra bilis redundet in toto, elephantiasim facere, si in parte cancerum? quare si humores ob locorum affectuum differentias varios affectus, & periodos faciunt; causa proxima, & immediata periodorum nullo modo poterit esse in humoribus, sed in partibus affectis, & vario modo dispositis.

Amplius à Galeno aded apertè, & perspicuè eadem sententia exprimitur 2. de differentijs febrium, cap. vltimo in postremis verbis, vt nihil apertius dici possit: hæc sunt verba: Quæcumque per circuitus aliquos agriudinum accessiones fiunt; ex membrorum dispositionibus ortum habent, quæ succos generant, aut concoquunt, aut attrahunt, aut expellunt: quare si periodi habent ortum ab ijs dispositionibus, sequitur necessariò, quòd membra ob varias dispositiones pariant omnes differentias morborum, & periodorum; decem enim traditæ sunt differentiæ membrorum lib. 3. de quibus hic non est locus, ne iterum acta proponamus.

Præterea, si humores per se efficerent periodos, vt plurimi, & ferè omnes videntur asserere, valeret hæc consequentia, ergo semper, & vbiq; essent collecti humores, facerent similes circuitus, quod experientiæ omnino reluctatur, quia iam dictum est, bilem in venis proximis cordi facere ardentem febrem, in cerebro phrenesim.

Insuper altiora adhuc sunt initia, quæ nos cogunt ad dicendum, quòd periodi, & affectus vniuersi humani corporis trahant esse à locis affectis, & audias; an ne affectus sunt proprietates subiecti? definiunturque per subiecta? suntque in secundo modo dicendi per se? nemo hæcenus est inuentus Philosophus, qui tantum principium non veneretur; ergo & periodi, quatenus sunt affectus, debent definiti per subiecta, quæ sunt loca affecta, ergo vanum erit desumere rationem, & causam immediatam periodorum ab humoribus, cum debeant desumi à locis affectis, tamquam à subiectis.

Hinc

Hinc, si humores biliosi sunt in loco proximo cordi naturā adoritur malos humores sine circuitu, quia agens proximum non impeditum semper agit, & patiens reagit, quando uero peccantes humores sunt in loco magis distantī, & remoto à corde, tunc cor uarijs partibus circumscriptum exemplo in humores non agit, nec humores in illud reagent, sed solum per circuitum; hinc sequitur, quod quanto maior sit distantia loci affecti à corde, tanto periodus erit longior; quibus principijs nixus Franciscus Parellus rectē dixit, causam circuituum esse distantiam membrorum, confirmauitque suam sententiā Galeni auctoritate 1. ad Glauconem cap. 5. ubi habetur hæc uerbis quotidiana ratio aduenit, quin os uentriculi patiat, quemadmodum quartana ex malè affecto splene generatur, tertiana ex hepate laborante.

Dissentimus tamen à Parello, quia dicebat causam periodorum esse distantiam ab ore uentriculi; nos à corde; ille credebatur bilem facientem tertianam semper esse in icore, in melancholia in liene, quod non potest defendi, cum bilis faciens tertianam modò sit in hepate, modò in mesenterio, modò in uarijs partibus hypochondriorum; in melancholia uerò, quia magis distat à corde, cum eius sedes sit in liene, efficit quartanam, modò tamen est in porta uena, modò in cæteris partibus; pituita tamen faciens quotidianam intermitterentem semper suam sedem habet in uentriculo; & quia proximus est cordi; ideo quotidie mouetur, namque si pituita putrescens esset in pedibus, utique ob hanc distantiam non faceret quotidianam, similiter si bilis esset in inguine, uel in alia parte inferiori non faceret tertianam.

Neque obijciant, quod febris cōtinua fieri possit, quamuis melancholicus humor sit in uena cava infra renes in loco magis distante, quam sint hypochondria.

Quia occurritur dicunt quemlibet furculum uenæ cavae à corde remotissimum propter communem meatum adeo cordi respondere, perinde ac esset in loco proximo, per eandem enim cauitatem halitus putredinosi perunt cor, & febrem

excitant, absque eo, quod aliqua pars corporis impediat transitum putredinosi exhalationibus: concludere ergo rectē possumus, primam & immediatam causam periodorum esse à locis, ubi peccant humores, desumendam, & nequaquam, ab humoribus peccantibus, quia sunt causæ remotæ.

Huic nostræ sententiæ non solum fauent præcipua fundamenta, rationes & experientia, ut ostendimus, verum etiam per celebres plurimi auctores inter quos Eulachius Rudius vir perspicacissimus amicus noster ex animo, qui lib. 3. de serie omnium causarum periodorum loquens habet insitam, & naturalem propensionem cuiuslibet humoris ad putredinem, concipiendam esse causam communem periodorum.

Deinde profundè considerans rationem magis specificam cur pituita, de qua lis est, quotidie inuadat, & velocius moueri videatur bile, addit cap. 9. in fine, & c. 27. citati libri, in pituita esse lentorem cuius ratione portio putrescentis pituitæ, necessariò cum ea, quæ iam putrescet contigua est, quo fit, ut portione vnica absumpta, illic putredo aliam fomiti contiguam inuadat, quod non euenit in bile lentore spoliata.

Postremò cap. nono & 27. de immediata causa loquens dicit à loco desumi debere, itaque argumentati cum illo tali pacto possumus, ab illa causa debet desumi prima, & immediata ratio periodorum putridarum febrium, à qua oriuntur differentie putridarum, sed differentie putridarum oriuntur à loco, ergo & periodi eorum à loco desumi debent; maior his altioribus principijs probatur, in quolibet contemplatione, quod dat quid, dat quoque consequentia quid, & est Aristotelis primo, & secundo post. omnem questionem esse medij: quod uero à locis affectis desumi debeant circuitus, est Galeni secundo, de differentijs feb. ult. à membrorum scilicet dispositionibus circuitus ori.

Quare non possum committere, quin valde miter nonnullos qui scripserunt, ipsum credidisse propensionem humorum esse immediatam causam, cum cla-

riffimè dicat primo requiti propenfionem humorum, addatque de pituita loquens, quod pituita lentior, & vifcofitas fit caufa magis proxima, cur quotidie moueatur, & demum eloquentiffimo difcenfu referat circuitus, feu periodos putridarum febrium in locum venarum portarum, ad differentiam continuarum, quæ fiunt, ab humoribus peccantibus in quæ venis, vt apud illum eft videre locis citatis.

Verum ex fuperius dictis apparens quedam contradictio magni momenti videtur emergere, quoniam in limine libri diximus ex periodis nos cognoscere humores peccantes; hic verò dicimus periodos non produci primo, & immediate ab humoribus, quare videmur verfati in antilogijs; quoniam ex Ariftotele res ficut fe habent ad eife, ita & ad cognofci, quare fi humores non funt caufæ periodorum, vt probauimus, non valebimus quoque ex periodis humores cognoscere, quod eft contra illud, quod pro fundamento huius libelli pofuimus.

Tollitur apparens contradictio dicendo, quod cognoscere ex periodis peccantes humores dupliciter intelligi poffit, vel quo ad existentiam, vel quo ad effentiam humorum: dicimus, quod periodi nobis declarare poffint humores quo ad existentiam, fcilicet humorum peccantem effe bilem, pituitam, vel melancholicam, & nequaquam quo ad effentiam; & quidditatem humorum, quoniam humorum natura & definitio alijs principijs eft perquirenda.

Audias quibus fundamentis fuffulci hæc dicimus, humores funt caufæ remotæ periodorum, & non proximæ: hinc valet confequentia, funt periodi, ergo funt humores prædominantes, & non verfa vice, fcilicet funt humores prædominantes, ergo ex neceffitate debent obferuari periodi.

Hinc philofophus primo pof. tex. 30. loquens de caufa remota dicit, quod caufa remota non poteft dare propter quid, fed tantum quod, quare humores peccantes, cum funt caufæ remotæ periodorum, vt oftentum eft, nullo modo poterunt dare propter quid fiant periodi, fed

folum quod fiant, fed non per argumentum affirmatiuum, quia à caufa remota, nullum affirmatiuum colligi poteft: quo pacto verò [quod] colligi poffit ex caufa remota, hic non eft locus, de hac re loquendi, cum ad logicum pertineat.

Ex ijs igitur, & ex enarratis fuperius facile erit colligere, quo pacto periodi poffint nos docere, qui nam funt humores peccantes fiue prædominantes, & quæ nam fit potior periodorum caufa.

Ve errant, qui ex vrina infpectione prædominantes, feu peccantes humores, eorumque coctiones, & cruditates neceffario colligunt.

Cap. VII.

S Equitur ergo, quod cætera figna ex quibus empirici colligere folent peccantes humores, quæ non defumuntur à faporibus, fiue à coloribus, fiue à periodis, vel motu morbi, funt communia, vel partialia, vel extranea, quia figna, quæ non funt propria fub ijs tribus generibus continentur.

Cæterum, quia multi inter propria, & præcipua figna peccantium humorum, eorumque coctionum, & cruditarum collocant vrinam, & pullum; ideo in præfentia præftat iftorum fententias examinare.

Ifti igitur, qui putant ex vrinis colligi poffe peccantes, & prædominantes humores, tali pacto argumentantur. Qui cognofcent coctionem, & cruditatem humorum, cognofcent humores prædominantes, at ex vrina coctionem, & cruditatem cognofcent, ergo ex vrina humores prædominantes cognofcent. Confirmant maiorem, quia ex veloci coctione colligunt peccare biliofos humores, ex tarda melancholicos, & pituitofos: deinde minorem probant ex confuetudine omnium ferè medicorum, qui vt cognofcant coctionem, vel cruditatem humorum in omnibus morbis vrinas infpiciunt.

Quod argumentum reluctari videtur auctoritati Galeni, rationi, & experientia; quoniam vera vrina (fi proprie loqui velimus) neque eft proprium fignum peccantium humorum in omni morbo, neque

neque eorundem peccantium humorum coctionem, vel cruditati semper ostendere potest, quod, ut melius pateat confugiamus primo ad Galeni auctoritatem, vbi declarat Historias Epidemicas Hippocratis, à quibus sanè omnes medici ante Galenum, & Galenus ipse potiora totius Medicinæ arcana desumpserunt.

Loquens igitur Galenus de Pythione, qui febre, & pectoris affectione erat correptus, dicit iudicationem factam fuisse in Pythione die decimo, sed cum vrinis crudis: videns igitur Galenus post coctum morbum perseuerare vrinas crudas, subdit, coctionem, vel cruditatem humorum in pectore residuum non cognosci per vrinas, sed per sputa.

Quo pacto ergo volunt empirici coctiones, & cruditates humorum in omni morbo & in qualibet parte corporis residuum ex vrina colligere? Si in Pythione est cruda, quando cocti sunt humores pectoris.

Propterea meritò Galenus cognoscens vrinam non posse iudicare coctionem humorum extra venas retiditum, habet hæc verba 4. aphorismorum com. 77. cum enim ex venis vrina veniat, in renib. autem percoletur, in vesicâ verò aggregatur; quicquid in ea præter naturam apparuerit, aut venas, aut renes, aut vesicam male se habere indicabit: videas ergo vrinam minimè ostendere posse humores peccantes in ventre, in pectore, & in cæteris partibus corporis residentes, quoniam dicit clarissimè Galenus, vrinam solum ostendere venas, renes, aut vesicam malè se habere.

Similiter legitur 4. de tuend. sanit. in principio libri, de ijs, quæ intra venas sunt nullum sanè nec manifestum, nec evidens signum habemus præter solam vrinam, sequitur ergo, quod reluctentur Galeno, & veris Medicinæ fundamentis, qui in omni morbo ex vrina credunt, colligi posse coctiones, vel cruditates humorum.

Verùm quo pacto lotium ostendat humores peccantes in venis, & quarum venarum humores ex lotio cognosci possint, non video: quod ab alijs melius nōdus hic discutietur, quam à Galeno, qua-

re alijs omiſſis confugiamus ad præcipuum Galeni locum, vbi agit de Muliere decumbente apud Pantimidem: ibi habet hæc verba, vrinæ crudæ ostendebant in gibba iecoris redundare succos crudos; euacuationes verò tenuiam in venis mesceri; patet ergo vrinam potius ostendere conditionem humorum existentium in caua vena, quam in porta, & in venis mesceri à porta prodeuntibus.

Amplius dicere possumus cum Galeno, si ex proprijs velimus philosophari, vrinam aliquando coctam apparere, crudis existentibus humoribus in caua vena, pro qua te legamus Galenum, vbi de Historia Cleonactidis verba facit, dicit enim in Cleonactide, vrinam, quæ modò cocta, & modò cruda redditur, indicare, humores aliquos eoqui, & alios manere crudos; ecce igitur, quod existentibus in venis humoribus crudis, reddi potest aliquando vrina cocta, quare si semel eam coctam videbimus, non poterimus dicere in venis non esse crudos humores, quia die sequenti potest reddi cruda.

Similiter si cruda apparuerit, non poterimus absolute dicere, humores crudos esse, quia die sequenti possit cocta excerni, ut contingit Cleonactidi.

Similiter Galenus 2. præfag. comm. 26. habet, contingere potest, ut aliquis vrinam, quæ reprehendi non possit, emittat, attamen sequenti nocte aliam reprehendendam reddat, & rursus sequenti die manè bonam, vespere malam, quæ vrinæ ostendit partem humorum in venis esse coctam: partem incoctam, addit illam vrinam optimam esse, quæ inter coctas nulla cruda reddita sit: quare, qui colligent ex vrina cocta semel visa morbi victoriam, valde errabunt.

Ratio verò, cur vrina potest nos fallere, est, quia humor crudus non totus simul coquitur, sed prius vna pars, deinde alia, quare vrina cocta non potest ostendere primo, & per se coctionem totius humoris, sed solum portionis humoris nuper cocti.

Consequitur enim natura in certamine cum morbo non vnicam victoriam, sed plures, quia post multos insulsum, & post

post coctionis plurimarum portionum peccantium humorum æger ad portum salutis transferri solet.

Insuper, si lotium per se, & propriè ostenderet speciem peccantium humorum, vel coctionem, & cruditatem, sequeretur, quod humores mali semper per urinam euacuarentur, quod aduersatur Galeno, & experientie.

Galenus enim ad posthumum cap. 3. habet hæc verba, multa sunt viæ, quas natura aperit pro expellendis excrementis, per vomitum videlicet, per alui proflutium, per sudorem, per sanguinis eruptionem, per hæmorrhoidas, & per alias vias; cur ergo volunt urinam semper, & in omni morbo ostendere conditionem peccantium humorum, si per sputa expectanda est crisis: ut de Pythione dixit Galenus; Cui, si per alui proflutium eijciuntur excrementa, volunt per lotium statui, & conditionem humorum peccantium cognoscere cum euacuationes per aluum sint illæ, quæ hoc debent declarare, ut de Muliere decumbente apud Pantomilem docuit Galenus.

Quare concludimus, urinam præcipuè ostendere cruditatem, vel coctionem humorum in vena cava residentium, & non in alijs partibus, hæc seruata conditione, ut per duos, vel tres dies cocta emittatur, ut dicit Galenus 2. præfag. comm. 26.

An verò urina ostendere possit determinatam aliquam humorum dominantium speciem in venis peccare, an scilicet peccet bilis æruginosa, vel vitellina, vel porracea, dicimus solum per probabilem aliquam coniecturam, & nequaquam certa, & demonstratiua cognitione nos consequi posse.

Quodquidem cognitio ex periodis de tertio in tertium peccare bilem, alia præterea requiritur signa, quæ nobis melius ostendant varias has biliosorum specierum species, veluti si peccet bilis vitellina, vel flaua, hæc sanè in primis cognoscitur ex periodis de tertio in tertium, sed non fat est, quia omnes species biliosæ mouentur de tertio in tertium: quare adduntur alia signa, veluti si natura promptè, & ordinatim aggregatur coctionem, scilicet determinatis diebus,

& horis, dicimus peccare bilem non valde existiosas, ut sunt vitellina, & flaua: demum ex mitiori morbo colligimus flauam, ex paulo vehementiori vitellinam.

Similiter si in urina coctio, vel breui incipiat apparere, colligimus humores tennes, & biliosos, non melancholicos, & pituitosos, si tardè coctio in lotio appareat, colligimus melancholicos, & pituitosos.

Quare si uelimus peruenire ad cognitionem specierum humorum melancholicorum, & pituitosorum peccantium, debemus ex periodis, saporibus, & coloribus colligere, uel ex syndrome aliorum signorum, de qua in sequenti libro agemus; itaque nullo modo urina erit proprium signum peccantium humorum.

Præcepta de urinis nos sæpè fallunt: si de urina nigra cum sedimento nigro loquamur Galen. 1. de crasis 12. Hippoc. 2. progn. & in coactis dicunt urinam nigram cum sedimento nigro esse exitialem: imò Galenus dicit cum tali urina uix aliquem uidisse seruatum: idèd per exitialem intelligere debemus, ut plurimum, sicuti interpretatur Galenus comm. 18. sextæ sectionis aph. quod ita re uera sit, patet in ægrotantibus Hipp. in Epid. quod sex cum urina nigra, & cum sedimento nigro euaserint, suntque Meton, Horophons, Vxor Epicratis, Heropitus, Nicodemus, & Mulier Morosa. Ratio incertitudinis utinæ est, quia nigredo modò ob micellam nigri humoris fit nigra: modò ob adustionem, modò ob alias causas: quare urina solum inter probabilia signa collocantur, & non inter propria salutis, vel mortis.

Postremò si urina posset nobis significare peccantes humores, eatenus id præstaret, quatenus est excrementum; quia, ut dicit Galenus 2. de natura humana com. 7. excrementa cuiuslibet particulæ corporis, quænam affectio particulam ipsam uixet, declarant.

Cum igitur tres sint in corpore animato coctiones, primaque sit in uentriculo, secunda in iccore, & tertia in cæteris partibus corporis, & in qualibet harum coctionum duo sint excrementa, alterum cras-

crassum, & alterum tenue, & vrina sit tantum excrementum vnius coctionis, qui dicere volumus, vt nam ostendere ea, quæ pertinent ad cæteras coctiones?

Si in pectore fuerint excrementa, si in capite? & ea proveniant à tertia coctione, cur volunt illa cognosci per vrinam?

Similiter an ne excrementum crassum primæ coctionis sunt fæces? quare si in hoc excremento erit aliquod signum proprium, quod ostendet lésiones primæ coctionis, id non posset ab vrina propriè significari, sed per accidens, & ratio est, quia quod conuenit vni per se, & propriè debet ex necessitate alteri conuenire per accidens, quod principium ab Aristotele primo cæli & à Galeno in methodo est probatum.

Præterea neq; dicere possumus, quod vrina propriè ostendat pertinentia ad secundam coctionem, quia secunda coctio habet tria excremēta, quæ sunt bilis, melancholia, & vrina, quare sequitur necessarîo, quod ea, quæ propriè ostenduntur à bile, non possint ostendi ab vrina, uel à melancholia: Similiter, quæ à melancholia, uel ab urina ostenduntur non possint ostendi per se à bile, quoniam unum per se unum indicat, & quod uni conuenit per se, alteri per accidens debet conuenire.

Postremò experientia docet, urinam aliquando ad eò crudam reddi in fine morbi, ut post consuetam sanitatem multorum dierum spatîo cruda perseveret, quod potest contingere, quia causa morbi erat extra uenas, uel in pectore, sicuti accidit Pythioni, uel in capite, uel in uenis mæseret, uel demum in uenis ipsîs cauis: quoniam sæpè contingit, vt superata putredine in vena caua existente, cruda reddatur vrina, vel ex nimia potatione, vel ob vigilias, quilibet enim conualescens, & qui sit optima valetudine præditus, si diminutè dormitet ob cogitationes, vel ob alias animi passiones, crudas redderet vrinæ, cocto etiam & superato morbo.

Demum cocta redditur vrina, morbo aliquando existente in augmento, veluti dum quis diarrhæa tentatur, quoniam

materia moueatur per aluum: vrina verò cocta redditur, quia non est significatrix illius affectus, & sic de alijs.

Errant ergo, qui in omni morbo, & in omnibus humoribus vbiq; locorum peccantibus ex vrina, speritis alijs signis, colligunt coctionem, cruditatem, & speciem peccantium humorum, quandoquidem id est impossibile, nisi id per syndromem aliorum signorum fiat.

Colligimus tamē ex vrina salutis spem quemadmodū doctissimus Galenus expendens casum Mæletis decumbentis apud Tisamenum, quæ iliaco affectu erat corrupta, animaduertit spem in illo sequisimo morbo sumendam esse ab vrinis bonis, quia (vt inquit) si bonæ sint, signum esse vitæ nutritionis, quod est hepar, non pati: subdit deinde, nō solum in iliaco, verum etiam in morbis thoracis, ventris, pulmonis, & neruorum bonam vrinam bonum significare, quia colligimus ex illis morbis hos non tantum scire, quantum iecur possint destruere, quod illæ deinde bonam spem comprehendimus, quia re vera exitiales euentus non possunt accidere sine maxima præcedente iactura hepatis: videas quo pacto Galenus almonet quid dici possit in morbis, qui per vrinam propriè, & per se cognosci non possunt.

Et errant, qui credunt pulsus per se indicare prædominantes humores, eorumq; coctiones, & cruditates. Cap. VII.

Sequitur quoque, vt errēt, qui credunt pulsus ægrotantium propriè & per se indicare, qui nam sint in ægrotis humores peccantes, & eorū coctiones, & cruditates: radix erroris est, quia non animaduertunt hoc philosophi fundamentum, quod per se vni conuenit, alijs per accidens necessarîo conuenire, & vice versa, verissimū enim est fundamentum quia vnica species, & natura non potest habere nisi vnicam proprietatem, & vna proprietas non potest nisi vnicam naturam, & non plures indicare.

Quo infallibili principio Aristoteles primo cæli suffultus ad quintæ essentia cognitionem nos transtulit; quinq; illud negaret, totam seriem illarum demon-

strationum philosophi destrueret, quare qualibet species pulsus propriè, & per se indicabit vnicum cordis affectum, & non plures, quamuis per coniecturam, & per accidens, & sine necessitate infinita ostendere possit.

Hinc qui dicunt ex pulsibus certò cognosci posse humores esse in venis, vel extra venas: humores esse coctos, vel crudos, relictur non solum philosophiæ Aristotelis, sed etiam Galeno, qui semper sustinuit, quod vnum, vt vnum solum vnum indicet, & non plura, & si plura ab vno, id per accidens, & per coniecturam indicari, quare cum humores immedieatè non respiciant cor, à pulsibus illorum statum, & conditionem ex necessitate colligere non possumus.

Quamuis Galenus semel dixerit, quod humorum coctio ex valido pulsu cognoscatur, non propterea ei aduersamur, quia optima coniectura, & non certa, & infallibili scientia ex valido pulsu colligebat coctos esse humores; etenim pulsus validus per se indicat vnum solum, scilicet validam virtutem vitalem, cetera verò per accidens, & per coniecturam à valido pulsu indicari, si vera sint Galeni, & Aristotelis prima philosophiæ principia.

Hinc, cum ea, quæ per accidens indicantur, ex Aristotele possint aliter se habere, & per consequens non sint semper vera, non est mirum, si tam sæpe manifestè errent, qui ex valido pulsu semper coctionem humorum colligant, & quod magis est, optimis medicis, & philosophis ritum concitent: quia non solum rationi, vtrum etiam experientie aliquando aduersantur: sepius enim reperitur homines ualidissimis pulsibus donati, qui in principio morbi humorum crudorum copia referti antequam perueniant ad statum uitam cum morte commutent.

Cæterum ostendamus per inductionem variarum differentiarum pulsum, quod à qualibet pulsum differentia unicus tantum affectus per se indicetur qui neque ad coctionem, uel cruditatem, neque ad specificam humorum differentiam pertineat.

Incipiamus à pulsum inæqualiū dif-

ferentijs; an ne pulsus inæqualis in eodem ictu secundum eandem arteriæ partem, sed inæqualis secundum diuersas partes non arteriæ, sed illius dilatationis ostendit febrem esse putridam?

Hanc inæqualitatem Galenus primo ad Glau. cap. 6. & 4. de causis puls. cap. 14. dicit esse communem omnibus febribus putridis, quæ inæqualitas est, quia arteria in unico ictu habet dilatationis principium uelocius, & in medio dilatationis uelocitatem amittit, in fine iterum uelocitatem recuperat; ex hac igitur inæqualitate febrem putridam necessario, & per se colligimus.

Hinc Galenus primo ad Glau. 2. de unico pulsu ostendente ephemeram dicit, cum pulsus nullum inflammationis signum habuerit, neque omnino inæqualitas in unica arteriæ pulsatione apparuerit, erit febris diaria.

Similiter unicus tantum erit pulsus significans inflammationem, si uera est sententia Galeni 4. de causis puls. cap. inscripto de pulsu inflammationis; habet enim hæc uerba, omnem inflammationem habere pulsum ueluti ferrantem, & proinde durum, causa autem cur in lethargo, & peripneumonia non appareat durus, uel ferratilis infra declarabitur.

Quare concludimus inæqualitatem in unico ictu per se ostendere febrem putridam, & ab alio pulsu non posse ostendi, nisi per accidens, & per coniecturam; æqualitatem verò in unico ictu ostendere ephemeram, & ab alio pulsu non indicari: duritiem verò ostendere tumorem, & ab alio pulsu tumorem, vt tumor est, non significari. Ecce quod pulsus per se non indicat coctionem, uel cruditatem, neque prædominantes humores.

Ad eundem modum obseruatur in qualibet pulsum differentia, vnicum affectum, non plures indicari: pulsus enim mollis, latus, & vndosus indicat per se mollietatem arteriæ, per accidens tamen potest iudicare peripneumoniam, vel anasarcam, in quibus affectibus cor ab ingenti humiditate læditur; & fit molle, quia à pulmone sua natura molli communicatur hæc mollietatis cordi; nulla ta-

men erit consequentia, est pulsus vndosus, ergo pituita dominatur, ergo anasarca, ergo peripneumonia, & alia id genus in corpore existere, quia accidit cordi, & accidit arteriæ, vt fiat lata, vndosa, & mollis ab anasarca: plurimi enim possunt esse affectus, & causæ, quæ impertiuntur cordi humiditatem, & mollietatem.

Similiter pulsus durus, & serratilis an ne significat per se duritiem arteriæ? an ne hæc durities per se ostendit duritiem membranosi generis? an verò hæc durities sit facta à pleuritide, vel Tympanite, vel ab alijs affectibus, hoc non potest sciri ex pulsibus, quia ex signis generis colligere specificas ideas esse prolabi inparalogismum secundæ figuræ ex duabus affirmatiuis.

Sed antequam vterius prouehamur; audias erratum manifestissimum cuiusdam, qui omnia ex pulsibus profitebatur diuinare: Erat æger tussi affectus ob frigidæ potum, huic aderat pulsus durus, & ferè serratilis, illico ex pulsu tantum, nulla alia signorum syndrome expensa, colligebat egrum pleuritide detineri, quia putabat ferrinum pulsus esse proprium non inflammationis, vt inflammatio est, sicuti ex Galeno 4. de causis pulsuum colligitur, sed pleuritidis, quæ re vera non à pulsu ferrino, sed à quatuor illis signis à Galeno propositis prima aph. comm. 12. & à nobis limitatis ibidem & primo lib. cap. 24.

Ratio potissima cur pulsus ferrinus per se, & propriè ostendere non potest pleuritidem est, quia vnum per se vnum indicat, an ne ferrinus pulsus propriè ostendit duritiem arteriæ, & cordis? ergo per accidens ostender pleuram esse læsam; patet enim, quia ferrinus quoque fit, non solum in pleuritide, verum etiam in alijs affectibus hinc Auicennas lib. 4. fen. prima tract. 2. cap. 2. dicit, durities pulsus fit quoque à potu aquæ frigidæ, & ab alijs causis, quæ indicant pulsus, & sic non ostendit semper apostema esse in membrana.

Præterea loquens Auicennas de pulsu adeo duro, vt ferræ tactum æmuletur libro 3. fen. 10. capitibus de pleuritide dicit, vt fiat serratilis pulsus, duo concurrunt, primum durities, secundum facul-

tas aliquo modo imbecillis, & cum acuto calore, quare cum nemo pleuritico- rum in morbi limine possit esse imbecillis, non habebit pulsus ferrinum.

Hinc primò colligimus, ægrum, de quo loquimur, non habuisse ferrinum pulsus; Secundò ferrinum non esse proprium pleuritidis, quia si veras pulsus ferrinus esset proprium; conueniret soli, & semper; Tertiò omnes causas, quæ habent vim exsiccandi tunicas extendendo, vel constringendo dicimus efficere pulsus, si verò inualesceret affectio, facultas fieri quoque posset adeo imbecillis, vt æqualiter arteriam non valeret attollere, vnde statim fieret serratilis pulsus.

Quia quando in unica pulsatione in diuersis arteriæ partibus motu interciò inæqualitatis per sentitur, enascitur pulsus ferrinus, qui non solum in pleura valdè læsa contingere solet, sed in omni inflammatione, & præcipuè in omni affectu partium corporis, quæ in thoracis concauo continentur, quia omnes sunt induræ eadem pleura, hinc si diaphragma inflanmetur, manifestissimè ferrinus pulsus obseruatur tum ratione inflammationis, cui per se competit ferrinus pulsus, tum quia diaphragma supernè induitur pleura.

Hinc in Tympanite serratilis obseruatur, quia status distendit spirales partes, & perurit membranas, extendit, atque duritiem cordi inducit; non valebit tamen consequentia, est serratilis pulsus, ergo pleuritide, ergo inflammatio diaphragmatis, quia per accidens contingit, vt durities fiat ab inflammatione pleuræ, vel à Tympanite.

Sed ex dictis duæ dubitationes videntur emergere, prima, dum diximus ex Galeno 4. de causis pul. cap. de pulsu inflammationis, scilicet omnem inflammationem habere pulsus ferrinum, quod videtur falsum, quoniam in pulmonis inflammatione, & in lethargo pulsus est mollis, & nequaquam durus, & ferrinus.

Secunda, non videtur, quod durus pulsus, & ferrinus sit proprius inflammationis, quia pulsus ob potum frigidæ quoque sit durus.

Primæ dubitationi occurrimus, duritiem pulsus in peripneumonia, & lethargi occurrari à pituita dominante, & fluctuante, & magis posse pituitam in mollioribus introducenda, quam inflammationem cerebri, uel pulmonis in duritie efficienda, & ratio est, quia durities pulsus tum proueniat à læsis membranis, atque pulmo, uel cerebrum tenuissima, & per exigua minge sit intertextum, adeo ipsa durities exigua fit in pulsū, ut à dominante pituita omnino occultetur, & mollioribus aperta introducatur.

Secundæ dubitationi occurrimus, duritiem, de qua loquimur, & quæ sit ab inflammatione, esse permanentem, quæ uero sit ob frigida potum breui, & facile mutari.

Insuper, si alias pulsuum species expendamus, idem luce clarius colligemus; age, breuiter exequamur: Vibratus pulsus per se indicat instrumentum facultatis uitalis esse induratum, indicatque ex maiori duro nasci in motu necessario maiorem collisionem, & ex maiori collisione per se prodire maiorem calorem; per accidens vibratus indicabit conuulsionem, uel pleuritidem, aliquando enim in pleuritidis adeo tenditur, & induratur pleura ob tensionem factam ab apostemate, ut cor uibratum pulsū efficiat, hinc dicere solent medici, quod uibrati sint serratilibus similes, quare, qui inferret ex uibrato pulsū conuulsionem, erraret, quia incideret in argumentum à positione consequentis ad positionem antecedentis, scilicet, si est conuulsio est uibratus pulsus, sed est uibratus pulsus, ergo conuulsio, consequentia est absurdissima; ualeret tamen est conuulsio, ergo est uibratus pulsus.

Ad eundem modum pulsus formicans per se significat facultatem imbecilliorē; causas tamen imbecillitatis antecedentes ab hoc pulsū colligere non possumus, quoniam in modum accidit, ut reddatur pulsus formicans ob ueneni potum, modò ob pestem, modò ob egressum à balneo, & ob mille alias causas, quoniam causæ, quæ alicui conueniunt per accidens, non mille, sed infinite esse possunt, quare qui ex hoc pulsū formicante uellet colligere summam malignitatem esse in

uenis, cum per accidens malignitas humorum formicantem pulsū efficiat, uel maximè erraret.

Similiter uermiculares pulsus indicant quoque absumi natium calorem, sed cum non adsint ita exiles, ut formicantes, non ostendunt tantam cordis tinnam; qui igitur uellent ex pulsū uermiculari colligere causam efficientem, uel humorem peccantem, cum per accidens uermicularis pulsus possit fieri ab humoribus transcenderet de genere in genus, quia ea, quæ per accidens alicui conueniunt, genere differunt ab ijs, quæ per se; Hinc est ualde ridiculum audire Medicos aliquos dicentes à pulsibus per se cognosci posse causas antecedentes ægitudinum, & coctiones humorum.

Hinc simili errore capiuntur, qui in febribus putridis ex pulsū colligere solent, peccantes humores esse bilem, uel melancholiam, nec non ipsos humores esse coctos, uel crudos, nisi id coniectura, & non certa scientia cognoscere profiteantur: Dum Galenus dixit, se ex pulsū pleno, & valido colligere coctionem humorum, id solum coniectura consequitur, quæ nisi aliqua artificiosa syndrome roboretur, potest quoque millies fallere: ratio enim huius est, eaque potissima, quia si erit uerum, quod coctiones, uel cruditates humorum existentium in caua uena ab unico signo ostendantur, ut prima philosophiæ initia docent, scilicet unicum ab unico indicari, & non à pluribus seorsum consideratis, erit quoque uerum, coctionem horum humorum cognosci ex urina, & nequaquam ex pulsibus, ut ualeat hæc consequentia, ab urina ostenditur coctio, ergo non à pulsū.

Denique non solum pulsus propriè indicabunt coctiones humorum, uerum, adeo sunt difficiles, ut ex pulsibus vix quæ per se ab illis prodeunt colligere aliquando ualeamus: tanta est affectuum in hoc nostro corpore varietas, & implicatio. An ne superius ostendimus ex Galeno, omnem inflammationem habere pulsū durum? quamuis peripneumonia, & lethargus habeant mollem; causa obscuritatis est; quia occultatur durities ab ingenti mollioribus membrorum, &

à copiosa

à copiosa pituita putrescente.

Quocirca, si ex pulsibus aliquid diuini in arte medica colligere velimus, duo mihi videntur seuerè obseruanda: alterum est, vt illa tantum arcana pulsuum præcognoscamus, quæ per se & propriè cuilibet speciei pulsus conueniunt: alterum est, vt in applicatione; & (vt aiunt) in actu practico sciamus exauctè conferre pulsus præteritarum accessionum cum pulsu præsentis; quoniam solum ex hac collatione certum & infallibile iudicium colligimus, an æger sit in meliori, vel deteriori statu.

Solet medicus aliquando inuenire pulsuum sani hominis adeo inæqualem, intermittentem, & alijs deterrimis conditionibus donatum, vt Medicus, qui alias non tetigerit, & obseruauerit, in cognitione, & curatione cæcorum more incedat.

Esset igitur operæpretium in sanis hominibus semper motum præcipuè obseruare, quia in ægritudine longè melius crebritate pulsus, & cæteras conditiones metiri, & certò scire possemus, quantum recedant à naturali statu, possemusque omnes proportionés obseruare, & intermittentiæ, si adsit dimetiri, & plura alia ad motum pertinentia; pro qua cognitione exactè, & citò comparanda instrumentum pulsilogium inuenimus in quo motus, & quietes arteriæ quisque poterit exactissimè dimetiri, obseruare, & firma memoria tenere, & inde collationem facere cum pulsibus præteritarum dierum; Exhibet enim instrumentum omnes æqualium motuum differentias, quæ sunt centum & triginta tres incipiendo ab obseruatione rarissimi motus vsque ad creberrimum: cur autem non sint plures, in proprio libro de instrumentis medicis non amplius visis Deo fouente declarabitur: totidem obseruatur differentia inæqualium motionum.

Ex pulsilogij obseruatione primò colligimus qualibet die, & hora quantum æger recedat in crebritate à statu naturalis: secundò infallibilem noticiam præbet, quæ hora desinat augmentum, incipiatque status, & declinat: tertio obseruatur virtute proportionum æqualium motionum

in pulsilogio obseruatarum, quam crebritatem, quam intermissionem, & quietem externam quodlibet indiuiduum perpeti, & non perpeti possit: Quartò metiri possumus quietem diallois, & quanta sit quies externa, qua cognita, illic morbi magnitudo, & cachectiæ vehementia, cognoscuntur: postremò cuilibet sensatus Medicus intermittentiæ cognoscat, an scilicet arteria per vnum ictum quiescat, vel per duos, an per vnicum, cum dimidio, vel cum tertia ictus parte, vel quarta, & sic vsque ad decimam, quæ, sine instrumento est prorsus impossibile dimetiri.

Sed quia in proprio libro de hac re sumus acturi, non est, vt omnes instrumenti vti reseramus: Satis enim est in hoc capite nos ostendisse per inductionem multarum specierum pulsuum, nos posse scientia infallibili cognoscere peccantes humores, sed solum ex accidenti, & per coniecturam, quod erat ostendendum.

Vi errant, qui ex antepositione, & postpositione paroxysmorum peccantes humores, eorumque collisionem, vel crudelitatem colligunt.

Cap. VIII.

OVamuis dictum sit periodos propriè indicare prædominantes humores, non propterea antepositio, vel postpositio paroxysmorum indicabunt humorum dominium, quoniam eo modo antepositio, vel postpositio accidit humoribus præter naturam, quo longitudo & breuitas paroxysmorum, quia temporis breuitas, longitudo, antepositio, & postpositio inter se differunt solum secundum magis, & minus.

Quare quemadmodum ex Galen. sententia 2. de diff. feb. c. 11. accessio fit longissima ob quatuor causas, quarum prima est materiæ inutilis multitudo, secunda crassities, & lentor humoris, tertia imbecillitas potentiæ, & quarta meatuum angustia.

Breuis accessio fit à contrarijs causis, quarum prima est materiæ inutilis subtilitas, secunda materiæ paucitas, tertio

tia potentia vigor, & quarta meatuum apertio; Simili modo dicimus, si materia vel fuligines, quæ excitant paroxysmos, erunt multæ, fiet anticipatio, si materia erit tardi motus, fiet postpositio, si velocis motus, anticipatio, si potentia erit fortis, & materia fuliginosa non possit alio modo, quam à calore febrili absumi, antepositio; quare ex his mihi videtur satis patere, antepositionem, & postpositionem non indicare determinati humoris dominium, quia modò antepositio fiet ob meatus apertos, modò ob oclusos, modò ob potentia vigorem, modò ob copiam peccantium humorum, & modò ob mordacissimas qualitates irritantes, & postremò fiet quoque antepositio, quia cinis in quem putredo præteriti paroxysmi est resoluta, totus cadat super illum humorem, & reparatum, qui die sequenti putrescere, & offat: quæ cum ita sint, sequitur, quod anticipatio, & postpositio non possit indicare peccatum humorum dominium.

Insuper maxime errare videntur, qui ex anticipatione paroxysmorum colligunt crudeles esse humores, & ex postpositione coctos, ægroscque esse in declinatione.

Error hic est adeo manifestus, ut nulla esset ineunda disputatio, si cum viris artis medicæ expertis loqueretur, sed cum in hoc capite alloquar Tyrones, non grauabor probare, quod anticipatio paroxysmorum neque materia cruditate, neque morbi augmentum ostendat, similiter postpositio neque coctionem, vel morbi declinationem.

Ratio in hac re, quæ sensu, & experientia patet, non habet locum, sæpissime enim videmus, paroxysmos anticipare non solum in morbi augmento, & statu, verum etiam in declinatione, quando scilicet materia est cocta, & expulsiioni prona atque propensa: quoniam in minimo a liquando contingere solet antepositio illa die, qua eger morbo omnino lenatur.

Præterea est Galeni auctoritas 1. de crisisibus 3. manifestissima, ubi dicit, quod anticipatio accessionis non semper arguat incrementum; quid clarius dici potest?

Demum ex natura rei colligere possumus anticipationem non insequi crudita-

tæ, quoniam insultus seu accessiones non fiunt immediatè ab humoribus peccantibus, sed ab halitibus acerbis, & mordacibus ob adiapneustiam retentis, qui cum non possint per poros cutis, vel per alias latiores vias diffilari, necessariò omnes corporis partes irritant ad eorum expulsionem, unde nascitur febris, quæ deinceps tamdiu durat, quamdiu dissipantur, in quo motu seruatur principium, augmentum, status, & declinatio.

Obiter hic rejicitur opinio illa citata à Traliano lib. 12. quæ deinde fuit Christofori à Vega, & multorum dicentium febres esse solum naturæ conatus ad expellendas noxias causas, & propterea ob naturæ laborem, & conatum incendi calorem, & nequaquam ob halitus putridos, & perustus ferientes cor, quorum error cognoscitur ex pulsu, & respiratione; ex pulsu, quia in principio accessionis pulsus sunt contracti, habentque systolem velociorem diastole, quia arteria per diastolem attrahit aerem gratia refrigerandi cor: per systolem propelluntur fuligines à corde transmissæ, per vniuersas arterias: diastoli deinde fit velocior: quia expulsi fuliginibus putridis deinde in sine crescit diastoli: ergo prius ex fuliginibus putridis petentibus cor fit febris, & non ex conatu tantum; similiter exspiratio, quæ diastoli respondet, maior erit systole, quæ inspirationem respicit.

Præterea multo magis à veritate aliena erat Erasistrati opinio citata libello de, procatasticis causis: quæ erat quod omnis febris sequatur phlegmonem.

Rejicitur à Gal. quia datur febris à assidue, quæ victus ratione instituta illi cessant, quod non esset, si phlegmonem sequerentur: erant Erasistrati adeo pertinaces in hac, & in alijs suis opinionibus, ut nullis rationibus poterant vinci: dicere solebant potius Patriam prodendam, quam proprium dogma.

Ad rē igitur redeuntis dicimus, accessiones fieri ab halitibus retentis; quare quanto copiosiores erunt halitus, eo citius accessio infestabit cor, quanto prohibita transpiratio fiet maior, eo citius quoque accessio inuehetur, tum quia colliguntur halitus copiosiores, tum quia magis acres, & mordaces redduntur.

Simi-

Similiter quanto potentia naturalis erit vegetior, eo citius cor animaduertet accessionem, quo latiores erunt meatus, si copiose erunt fuligines, maxima fiet antepositio, quia aura illa putrida ocys tranet.

Demum data paritate loci, si eleuentur fuligines à bile citius, quam à pituita sola fiet accessiones, & antepositiones, si à pituita mixta cum bile, citius quam à pituita sola, si è pituita cum melancholia, tardius, quam à sola melancholia, nisi locus, ubi resident humores, impediatur: attamen ex antepositione colligere non possumus humores peccantes, quia humorum quantitas, vel eadem non seruatur, vel non seruatur qualitas, vel diuersus est locus, quamuis enim quantitas, & qualitas humorum accellerent paroxysmum, non tamen periodorum sunt causa, vt superius ostendimus.

Similiter melancholia aliquando redditur adeo effrenis, abitque in tam ignitos spiritus, vt multò antè inuadant paroxysmi.

Demum ex alio Gal. loco infra citato rationem antepositionis, vel postpositionis colligimus, & nequaquam ab humoribus peccantibus, & est, quia exhalationes, quæ fecerunt præteritum paroxysmum (vt dicit Galenus) in cinerem conuertuntur, quo cinere, si portio illius humoris apti, vt proximè accendatur est respersa, cinis ad instar fermèti adeo reddit humores mordaces, vt illicò ab illis eleuentur halitus putridi, qui irruant in cor, & à corde ad ceteras partes. vnde fit antepositio: verum, quia cinere præteriti paroxysmi non semper æquè materia obnoxia, putredini est respersa, quia potest contingere, vt cinis parum immoretur super materiam procliuem ad putredinem pro adueniente paroxysmo, & euacuetur per vrinam, vel alias partes, & inde difficilius incendatur materia apta putredini, & per consequens cunctetur insultus, & fiat postpositio.

Quod verò cinis reddat humores propensos ad putredinem, non vno loco à Galeno declaratur, sicuti 3. præfag. 32. & 2. de differentijs feb. 11. dñ sic dicit, sed si natura illum veluti cinerem humorum, supra modum adustorum vacuare nō an-

teuerterit, ille rursus in corpore manens, & concalesctus contrahit propensionē iterum ad putredinem, & addit, concepto feruore aliam febrē denuò suscitatur, quare si cinis erit copiosus, cum subeat fermenti vicem in excitandis putridis halitibus, citius fiet putredo, & fiet antepositio, si humores erunt respersi cinere, & cinis non euacuetur, citius quoque ebullitionem, & putredinem excitabit.

Similiter postpositio fieri potest ex contrarijs causis; nullè ergo erunt cōsequentiæ, est anticipatio paroxysmi, ergo morbus est in principio, vel augmento, ergo humor est crudus; similiter est postpositio, ergo coctus, ergo declinatio morbi, non valet, quoniam in principio morborum aliquando paroxysmi irruunt postponentes, & aliquando accedit mors, omnibus tamen paroxysmis cum postpositione irruentibus, & aliquando homines illa die febre liberantur, quando maxima fit accessionis antepositio; quare vanissimum erit credere ex postpositione declinationem, & remissionem, affectus, & ex antepositione scuitiam, & cruditatem affectus colligi posse.

Errant, qui ex colore intensè rubro faciei colligunt sanguinis dominium.

Cap. IX.

Ostendimus superius ex coloribus eorum, quæ excernuntur, necessariò colligi posse peccantium humorum dominium sicuti ex colore flauo colligimus bilem citrinam, ex viridi porraceam seu prassinam, ex æruginoso æruginosam, & ex nigro melancholiam: Verum, quia colores faciei, & aliarum partium corporis non possunt indicare humorum inter eorum dominium, quia dicit Galenus prima aph. comm. 2. hac conditione colorem ostendere humores, si in profunda commorantes non differant ab ijs, qui sub cute sunt effusi.

Ideo illos errare credimus, qui ex colore valde rubro faciei colligunt sanguinis dominium: errant primò, quia dato, quod rubor intèsus faciei indicet sub cute copiosum sanguinem esse effusum, nō tamen valet consequentia, ergo idem est in profundo; quia Galen. loco citato habet hanc sententiam, humores ex colore

coniectari, nisi aliqui forte in profundum recesserint.

Secundò errant, quia Galenus negat valde rubrum colorem faciei ostendere sanguinis dominium, ut declarat secundo prædictionum 14. dum dicit, quod valde rubrum est, id ad melancholiam idoneum est, ait in epidemiorum secundo, cuius signum mæstitia existit, ecce, quod Galenus vult valde rubrum, si mæstitia præcipuè existat, significare melancholiam, dicitque si mæstitia existat, quia in parte interna potest esse alter humor, mæstitia non potest à melancholia externa solum gigni, nisi in penitioribus partibus habeat altiorē sedem.

Experientia quoque docet, rubros in facie ut plurimū esse melancholicos, vel saltem in melancholiam proclives; ab Aristotele, & à natura rei colligere possumus valde rubrum esse melancholicum; ab Aristotele, quia ruber color inter medios colores collocatur, constat igitur ex opaco, & diaphano, ex nigro videlicet, & albo, ex pituita, & melancholia, valde ruber color ex multo opaco nigro, & melancholico humore constabit, quare merito intensè ruber in facie ostendet multum opacum dominari, vel saltem magis de opaco, quā diaphano participare, quare nisi erit melancholicus, erit saltem proclivis valde ad melancholiam.

Ex natura rei probatur, quia dum tinctores exoptant colorē intensè rubrum non semel tingunt, sed bis, & ter, & donec partes terrestres vberimè adhærescunt.

Nec mihi obijciant, colores non intendi ratione quantitatis materiæ adhærescentis, sed ratione qualitatis, ut oprimè docet Galenus primo de humoribus his verbis: neque nix potest esse candidior, si inspissetur, neque pix nigrior, vel aurum fulvius, datoque quod fulvius redderetur, illud esset non ratione quantitatis materiæ, sed ratione qualitatis extensa in materia, quare intensè rubrum non fiet à maiori quantitate materiæ, neque infectores valde rubrum facient ex maiore quantitate tincturæ.

Respondemus cum Galeno ratione, qualitatis colores intendi, sed tincturas differe à niue, & pice, quæ sunt similia,

tincturæ enim sunt dissimilares, similium enim minima pars perinde ac infinita præferret eandem qualitatem, sic dicimus minimam niuis quantitatem tantam albedinem ostendere, ac si esset infinita; proinde, cum in dissimilares qualitates sint dispersæ, tinctores toties tingunt, donec qualitas copiosè adhærescat: quia in maiori quanto dissimilari, qualitas maior est.

Hinc est, quod sanguis, qui sua natura est dissimilaris, in maiori opaco erit intensior color: quare concludimus in valde rubro esse copiosius opacum, nigrum videlicet terrestre, & melacholicū, quam in rubro minus intensio, & in pallido.

Sed cū triplex sit melancholia sex sanguinis, sex sanguinis adusta, & bilis flava exsiccata, & adusta; dicimus in valde rubro esse melacholiam, quæ est sex sanguinis; cognoscimus verò hanc fecem sanguineā aduri in his, qui intensum ruborē habent in facie, si in maiorem, & mæstitiam sint propensi: Verū, qui exactè cupit scire, quis nā humor peccet, & prædominetur, adeat tres propositos fōres, colores scilicet, humores, & periodos: vel syndromē signorum sufficientissimam pro cognoscendis humoribus libro sequenti proponendā.

Neq; iterum obijciant, nos dixisse colores esse signa propria ostendentia peccantes humores, quod manifestè reluctatur Galeno, Aristoteli, & experientiæ: Galeno, quia 3. de sympt. causis c. 4. dicit colorem aut parum, aut nihil conferre ad cognoscendum temperamentum.

Aristoteli, quia secundo de anima non dixit colores oriri ex temperatura, sed ex opaco, & diaphano.

Experientiæ, quia inveniuntur frigida, quæ sunt nigra, ut opium; & frigida, quæ sunt alba, ut nix, & diaphana, quæ sunt calida, ut sibiū, & elementum ignis, & diaphana, quæ sunt frigida, ut camphora, glacies, & crystallū; & alba, quæ sunt frigida, ut nix; & alba, quæ sunt calida, ut calx; quare, qui vellent ex coloribus rerum naturas, & temperaturas colligere, errarent toto cælo.

Occurrimus tamen nos non dixisse ex coloribus colligi posse naturam, & temperaturam humorum peccantiū, sed existentiam, & per consequens dominium, quod

quod uerò signa ostendentia naturam, & signa ostendentia existētiā inter se differant, & nihil habeant commune, declarabimus exēplis: tan ne eclypsis est signū, quod terra sit interposita inter solem, & Lunā? attamen eclypsis non declarat naturam, & essentiā terræ; Simili modo colores possunt ostēdere humores existere, & dominari, quamuis non declarēt naturam; quatuor. n. sunt dumtaxat humores principales in corpore, quorum unus est ruber, & hic est sanguis, & alij nō dātur humores, qui rubrum colorem habeant; nisi merito sanguinis: alius est flauus, & ex flauo colore necessario inferimus bilem: quia non datur in corpore alius humor flauitatem habens, qui non significet bilem, alius datur color albus, & ex hoc inferimus pituitam: & demum est niger, ex quo melancholiam, ecce igitur, quod signa existentia, & essentia nalde differant.

Demum sunt qui ex lingua & oculorū coloribus putāt perueniri posse ad cognitionem peccantium humorum: quia Galenus 5. in 6. epid. 14. dicit lingua ostendere humores perdominantes non minus quā urina, & Hipp. 4. in 6. tex. 28. de oculis dicitur ualent oculi ita totum corpus, quare præter tria signa superius proposita erunt lingua, & oculi. Accedit quod præcipue oculi uidentur ostendere inter nos affectus & internos humores. Alexander Aph. dicit oculos esse speculum animæ: ergo tanto magis corporis: oculi enim sunt indices concupiscentiæ, amoris, iræ, feruoris, misericordiæ, & ultionis. In audacia exiliunt, in reuerentiā subident, in amore blādiuntur, in odio offeruntur, gaudente animo hilares subident, eodē inextente languescunt, animo ira flagrate exasperantur, in cogitatione quiescunt quasi cum mente simul intenti, ergo ex lingua & oculis cognoscimus prædominantes humores.

Respondemus nos superius proposuisse tria signa propria, ita ut singula seorsum sumpta indicēt humorem peccantem.

Dicimus ex oculis & ex lingua colligi solum per coniecturam prædominantes humores. Multi sunt qui oculis ridet: tamē ira in corde premuntur. Multi ex amore oculis blandiuntur, attamen odio

intestino premuntur, quod non potest dici de sapore, quia amarus certò indicat bilem, non potest dici de colore quia flauus indicat bilem: non potest dici de periodis, quia periodus de tertio in tertium indicat bilem dominari, de quarto in quartum melancholiam.

Errant Oribasius, & Montanus, dum à coloribus Lumbriorum uolunt dominium peccantium humorum colligere. Cap. XI.

ORibasius, & inter recentiores Montanus non solum ab humorum coloribus dominium peccantium humorū indicari credebant, uerum etiam à coloribus lumbriorū, quod nullo modo uidetur esse admittendum; dicebant igitur rubros Lumbricos sanguinem, flauos bilem, albos pituitam, & nigros melancholiam indicare: Moxque à lumbrieis flauis hauriebant indicationem euacuandi bilē, ex rubris sanguinem, ex albis pituitam, & ex nigris melancholiam, quæ opinio ob plurimas rationes argui potest.

Prima ratio est, quis, si fiat mixtura pituitæ cū bile cruginosa, & ne ex omniū medicorum cōsensu generatur porracea bilis? at sic est, quod adueniente porracea statim color pituitæ, & bilis æruginosa destruitur, ergo tanto magis destruetur color bilis, uel alterius humoris generantis lumbricos, quoniam plures alterationes præcedere debent generationem insectorum uiuentium, quam porraceæ bilis.

Secunda potest ab altioribus principiis desumi, quia apud Aristotelem admitti non potest, quod accidentia corrupti conferuentur in genito; est enim definita generatio primo libro de ortu, & interitu tex. 23. quod sit mutatio totius in totum nullo sensibili remanente, quare nō solum accidentia corrupti, uerum etiam tota substantia mutatur, quia illud, quod sit, fit ex eo, quod non est, quæ definitio æquē conuenit mistis uiuentibus, & non uiuentibus.

Præterea experientia docet, dum homo fit ex semine, semen in aduentu formæ hominis una cum omnibus suis accidentibus destrui, idemque esse dicendum

de plantis, de insectis, & cæteris omnibus viventibus, & merito, quoniam destructa substantia, statim destruuntur & cessant omnia accidentia.

Nec obijciat colorem rubrum esse accidens commune, atque accidentia communia in generatione non destrui, quia, primo errarent, dum vellent ex communi signo colligere naturam specificam, quod relictatur principiis analyticis.

Secundò, quia dicit Auerr., in generatione misti omnia accidentia communia, & propria rei corruptæ corrumpi, & cessare, alioquin, si aliquid seruaretur post destructas misti formas in aduentu nouæ formæ, sequeretur ex necessitate, quod præter materiam, & formam daretur aliud internum principium generationis, quia seruatum accidens non posset inhærere primæ materiæ, quæ ex Aristotele 7. metaph. tex. 8. non est quid, nec quale, nec quantum, nec vllum aliorum generum, quinimmo si materia haberet accidens terminatum, per se esset formata, & terminata, & esset quid: similiter non posset inhærere formæ, quia forma in generatione destruitur, ergo daretur tertium, quod relictatur Aristoteli.

Tertiâ, si aliquid accidens à forma humorum, qui debent corrumpi, & destrui, antequam lumbrici fiant, transiret ad insectum nouiter genitum, daretur transmutatio accidentis de subiecto in subiectum, quod est omnino impossibile.

Quarta si transiret aliquid accidens determinatum à re corrupta ad rem genitam, necessariò in generatione duo inconuenientia sequerentur, quorum primum esset, quod in generatione misti perfecti non destruerentur omnes formæ componentium, quoniam accidens terminatum, quod transiret necessariò supponere debet propriam formam.

Secundum sequeretur, quod noua forma, quæ gignitur, numquàm esset substantia, sed accidens, quia adueniret rei formatæ; hinc Auerrøes primo phys. com. m. 63. probat, quod omne adueniens enti in actu sit accidens, quare si ruber color sanguinis, antequam hoc insectum fiat, non cesset esse, sed trãseat à sanguine ad lumbricos, necessariò transibit cum aliqua

forma, quia non datur accidens terminatum, quod à forma non terminetur: quare his positis lumbricorum forma adueniet rei formatæ, & per consequens erit accidens, & non substantia, quod est falsum; nullum enim datur animal viuens, quod saltem duas non habeat formas substantiales, vegetatiuam scilicet, & sensitiuam.

Neque obijciat, destrui hominem, at tamen seruari cicatricem: Similiter plantas mortuas, exsiccatasque odores suos conseruare, vt de rosis, & de alijs omnibus videmus: Similiter ne dicant de illis lumbricis, qui sunt à sanguine, sanguinem nimium destrui, eius tamen colorem conseruari.

Respondemus enim cicatricem, odorem rosarum, & cæteram herbarum, esse accidentia mistorum, vt mista sunt, propterea cicatrix non homine ablato, sed misto corrupto tollitur; similiter de rosis dicendum: similique modo respondemus, quando fit insectum animal, tunc fieri nouum mistum, quia immediatè ab humoribus, qui sunt veluti elementa in animantibus, generantur, quare adueniente forma misti omnia accidentia humorum debent destrui.

Neque iterum occurrant, scilicet lumbricos tam promptè fieri, & per tam simplicem alterationem, vt colores humorum generantium vermes non sint adhuc rectè alterati, & mutati.

Quia instantia nulla est, quoniam, si in mistura duorum humorum bilis nimirum æruginosa, & pituita, illièd mutantur colores, & viridis color statim emergat, quantò magis in mistione humorum generantium lumbricos mutabitur color? similiter si quis vinum nigerrimum bibat, an ne post horam vrina incipit moueri albissima?

Præterea non solum in mistione miscibilia amittere solèt colores proprios, verum etiam in iuxta-positione, in qua nulla suboritur alteratio, colores abeunt, & euanescent; liceatque experimentis hæc confirmare, sitque primum, accipiat aqua in qua ebullierint gallæ, quæ est clara, & perspicua, accipiat quoque aqua in qua ebullierit calcanthum, vtramque videbis scorsum claram, & perspicuam,

atta-

attamen, si vnam in alteram infundas illicò sine aliqua alteratione maxima cum admiratione videbis fieri colorem nigrerrimum, similemque attramento scriptorio.

Secundum experimentum, accipias aquam rosaceam stillatam per plumbeū alembicum, quæ sit peripicua, & clarissima, accipias deinde aquam communem, & has simul misceas, illicò videbis ex illa missione lacteum nasci colorem; quinimo ex lacte hoc animaduertimus alembico plumbeo fuisse stillatam rosaceam aquam, etenim cerusæ vis, quæ à plumbo producitur addita aqua communi conspicitur.

Tertium experimentum, quod mutant colores in iuxtapositione sine alteratione, erit, si acciperis acetum stillatum lymphidum, & tartarum stillatum, quod erit quoque clarum, si infundes & miscebis protinus color suborietur similis lacti, idem obseruatur, si aqua fontis misceatur cum aqua anisorum stillata.

Postremò audias experimentum pulcherrimum, ex quo illicò cognosces, colores mutari ex sola iuxtapositione sine ulla alteratione; accipias vitrum rubrum, & iuxtaponas ceruleo vitro, protinus videbis, ex vtriusque vnitis emergere colorem violaceum; Similiter, si vnies vitrum ceruleum cum luteo, confurget statim viridis color; quare si in iuxtapositione mutantur colores, quanto magis in ijs, quæ misceantur, & alterantur, & in generatione insectorum mutari debent, in quibus formæ substantiales nouæ sunt.

Alia quoque sunt experimenta plurima apud Pictores, & insectores, quæ possent huc afferri, si hic esset locus de ijs verba facere, satis enim est nobis, vt pro comperto habeamus, quod ea, quæ misceantur, & iuxtaponuntur sine aliqua alteratione primarum qualitatum mutant colorem, & nouum induant, quoniam, hoc supposito, rnet sententia dicentium in Lumbriis ob perexiguam alterationem sanguinè, vel ceteros humores generantes vermes nō amississe colores proprios: etenim argumentamur experimentis propositis fuisse tali pacto, si ex simplici vnione sine alteratione illicò mutantur miscibiliū colores, quanto magis in missione humo-

rum generantium insecta mutari debent in qua missione primò introducitur vita plantæ, deinde vita animalis, quod non potest fieri sine maxima alteratione, & mutatione colorum, & substantiæ humorum.

Quibus positis fundamentis incipit clare patere in omni missione, & iuxtapositione illicò mutari colores, neque in mutatione esse necessarium, vt concurrat aliqua alteratio, sicuti colligere possumus ab experimentis citatis.

Similiter patere videtur, colores reuera non pendere à primis qualitatibus, tum quia colores ex miscibiliū non alterationum vnione illicò oriuntur, quod non accideret, si colores fierent virtute primarum qualitatum, quoniam primæ qualitates in tempore alterant, & mutant, & nequaquam in instanti, tū quia nulla coloris species indicat primā aliquam qualitatem, etenim si quis diceret, albedinem significare frigiditatem, quia nix est frigidissima, statim quis obijceret, calcem significare caliditatem, si quis diceret nigredinem significare caliditatem, quia atra bilis est huiusmodi, illicò proponi posset opium, quod est nigrum, & frigidissimum. si quis colorem rubrum diceret significare calorem, non deerunt plurima rubra, quæ frigida sunt, & sic de alijs sexcentis, vt nullus color indicet aliquam primarum qualitatem.

Quare si rationibus, & experimentis standum sit dicere non possumus colores insequi primas qualitates, sed alia sortiri principia, & exordia, quæ sunt illa duo à Perfectius rectè expensæ, & considerata, scilicet diaphanum, & opacum.

Quinimmo ipsemet philosophus videns ab opaco, & diaphano sine alteratione primarum qualitatum fieri colores, in definitione coloris proposita lib. de sens. & sensu. 3. non per primas qualitates eos definit, sed per diaphanum, & opacum dicēs color est extremitas perspicui in corpore terminato: ecce quod Aristoteles in hac definitione vniuersi vult omnium colorum principia esse perspicuum seu diaphanum, quod idem est, & corpus terminatum, quod est opacum habens perspicuitatem non penetrantem; neque poterat diuinus philosophus alia principia

adinuenire, quæ omnium colorum essent prima, & immediata, quam illa duo propo-
sita, quoniam posito, quod perspicuum
terminetur a diaphano, statim perspicuum
in colorem migrat, & varijs consurgunt
colores, prout diaphanum illuminatum
varijs modis terminatur ab opaco.

Arbitror, plurimos peripateticos in co-
lorum essentia perquirenda à veritate,
desectere, quia pace multorum non in-
telligunt quid sit diaphanum, & quid opa-
cum, quibus ignoratis colorum principijs
non est mitum, si dicant essentiam colo-
rum pendere à primis qualitatibus.

Albertus dicit diaphanum sine perspi-
cium à raritate corporis constitui; opa-
cum à densitate.

Iacobus Zabarella libro 1. de visu cap.
3. à corpore tenui fieri diaphanum, habet
enim hæc verba, perspicuum quatenus
est medium deferens colores ad viuum a
duobus his partibus constitui, à corpore
tenui tamquam à materia, & a lumine
tamquam à forma.

Quorum excellentium virorum sen-
tentia manifestissime relinquitur experi-
mentis, quis enim non videt crystallum
& adamantem esse densissima, & non ra-
ra, & tenuia, atramen esse transparentia,
& diaphana, quinimo si crystallum, vel
adamans in tenuissimum puluerem rede-
geris, an ne crystalli, seu adamantis sub-
stantia facta puluis tenuissimus erit ra-
rior, & tenuior? ergo si vera esset senten-
tia Alberti, vel Zabarellæ, quod scilicet
diaphanum constituatur à raritate, vel
tenuitate materię pulvis crystalli esset
transparentior, quod sensui aduersatur.

Præterea aqua transparent, & splendi-
da, si eo usque agitur quousque spume-
scat, non ne sit rarior? atramen perspicui-
tatem amittit: adhæc fumus est rarissi-
mus, atramen est opacus, quare nec rari-
tas, vel tenuitas corporum constituunt
diaphanum, neque densitas, & crassities
opacum.

Vera igitur est sententia Perspectiuorū
quod illud sit diaphanum, quod nullas,
vel paucas habet superficies, ubi. n. multe
sunt superficies, limen in qualibet re-
frangitur, & refractum amittit vim pe-
nervandi, hinc est quod per crystalli pul-
uorem ob multitudinem, & varietatem

superficierum granorum, radij toties re-
franguntur, ut nihil eorum penetrare
possit, & inde fiat opacum: Similiter dum
aqua agitata (spumescit) ob spumam varie
sunt superficies, unde lumen non amplius
transit; hinc est, quod cum nodus asseris
pauciores habeat superficies, quam asser,
nodus quamvis densior, sit tamen peruius,
& transparentior: Similiter qui volunt
specula reddere perspicua, eo usque per-
fricant, donec ad vnicam tersam superfi-
ciem reddant crystallum; item lapides
tersi, & optime dedolati, & lævigati dia-
phanum quid tenere videntur, quia arti-
fices ob iugem consfricationem inæqua-
litates auferunt, & ad pauciores superfi-
cies reddunt, unde lumen parum refran-
gitur & potentius transat; quinimo, si
lapidum innumerabiles internæ superfi-
cies possent cōfricati, & ad pauciores re-
duci, possent componi lapides transparen-
tes, sicuti vitra, quæ re vera dum fundun-
tur repurgantur, & aliena substantia de-
mitur, quæ plures superficies faciebat,
dempta igitur aliena substantia à vitro,
deinde fit splendidus, quia ad pauciores,
reductum est superficies.

Similiter aer & ipsum cælum habent
paucas superficies per quæ visibilia à li-
mine feruntur ad oculum: si ubi est dia-
phanum esset vacuum, neque posset de-
terri visibile: neque per vacuum lumina
transirent. Quare qui dicunt si inter cæ-
lum, & terram esset vacuum videretur
musca si esset in cælo.

Quocirca si colores sint extremitates
perspicui in corpore terminato, & totum
suum esse prodeant ab opaco, & perspi-
cui, & opacum non fiat à crassities, & de-
sitate, sed ab innumerabilibus superficie-
bus, in quibus refranguntur radij, donec
penetrandi facultatem amittant, & dia-
phanum, vel transparent corpus sit per-
uium hac de causa, quia radij, vel nihil,
vel parum refranguntur ob paucas su-
perficies: nemo dicere poterit colores in-
dicare primas qualitates, indicare tempe-
raturas, & tandem prodire à primis qua-
litatibus, quia si ab illis prodirent, illas
quoque indicarent.

Similiter, qui rationib. & experimen-
tis philosophantur, non poterunt de fen-
dere cum Auerro: 2. de anima, & cæteris
peri-

peripateticis dari colores, qui habeant suum esse, nequam adueniat lumen: quoniam si color ut color recipiatur hanc definitionem (ut dicit Aristoteles) quod sit extremitas perspicui in corpore terminato, & non detur perspicuum, vel diaphanum, quod idem est, nisi lumen aliquod transeat, refrangaturque ab opaco, numquid non esset ridiculum dicere absente lumine aliquid esse perspicuum? quare si perspicuum ingreditur definitionem coloris, ut color est, in obscuro, & sine lumine colores nullum esse, nullamque quidditatem habebunt.

Enit igitur vera sententia illorum, qui dicunt ex diaphano illuminato, & terminato ab opaco dari colores, sicut Auicenna ab Auerroce citatus 2. de anima, & Alhazen optime sentiunt, dicunt. n. quod colores sunt lumina vario modo refracta, & colores nullum esse in tenebris habere & omnes esse huiusmodi, quia vnicus effectus ab vnica tantum causa prodit, quando vnica definitione traditur: dicendum igitur est caeruleum colorem lapidis lazuli, & caeruleum Iridis ab eadem causa prodire, idemque de alijs coloribus.

Sed dubitatur: quoniam experientia patet, dum oculus in tenebris torquetur & mouetur aliquid videri: Imo ipse Aristoteles libro de sensu & sensibili cap. 2. & 4. meteororum dicit, dum oculus mouetur & torquetur in tenebris aliquid videri: ergo dantur colores actu in tenebris.

Respondi potest huic obiectioni, quod dum oculi torquentur exeant lumina pauxilla, vel quia tales sunt spiritus animales, vel quia in agitatione accedunt ut oculi, vel quia ut tersi & leuigati splendent. Dicimus igitur quod illius luminis oculorum virtute actuentur colores & aliquid conspiciatur: sed quia de hac re hic non est locus, ulterius non prouehar, ne in alienas menses videar ponere falces, satis mihi sit in hoc capite ostendisse, quod illi, qui dicunt colores lumbricorum ostendere dominium humorum, reluctentur experientiae, & Aristotelis fundamentis, dum tradit, quae ad naturam generationis pertinent, & demum naturae propriae coloris declaratae.

Errant, qui reijciunt Orisbasium, & Afontanum dicentes ex bile, & melancholia gigni posse lumbricos. Cap. XII.

Quamuis superius diximus colorem flauum lumbricorum non indicare bilem, nec nigrum melancholiam; nihilominus credimus cum Orisasio 3. aphorismorum 30. & Montano lumbricos fieri posse à bile, à melancholia, & à cæteris corporis excrementis: quia, quando Aristoteles 5. de generatione animalium cap. 19. loquens de ijs, quæ oriuntur à putredine dicit, aliqua ex animalium excrementis oriri, atque hæc ipsa *lupulus* seu lumbricos esse, loquitur absolute, de omnibus scilicet excrementis, non magis intelligendo de pituita, quam de alijs, quamuis natura promptius ex pituita, quam ex bile, & melancholia vermes educat.

Qui igitur reijciunt Orisbasium, inter quos quoque fuit doctissimus Mercurialis, vtuntur tali argumento, si infecta fierent ex bile, & melancholia, sequeretur, quod bile, & melancholia possent nutrir iuxta Aristotelem 2. de gen. tex. 50. dicentem, omnia nutrir ex eisdem, ex quibus sunt, at illis ob amaritiam, & acrimoniam non possunt nutrir, ergo illis quoque non poterunt constare: roborat argumentum auctoritate Galen. 4. de simp. med. fac. ubi scribit, in mari mortuo, in quod flumen Iordanum recipitur, nullum animal generari, vel conseruari propter bitumen, quo aqua illa redditur amarissima.

Confirmant quoque, quia Paulus Aegineta lib. 4. c. 27. dicit, hæc infecta non posse gigni ex humoribus vllis calidis: addunt ex Galen. 3. aphorismorum 26. lumbricos fieri ex humoribus crudis, quare inferunt ex bile, & melancholia vermes non fieri.

Quo ad argumentum admittimus Aristotelis sententiam citatam 2. de gen. tex. 50. asserimus tamen in omni humore putrido, & amaro aliquid dulcis inueniri, quo fieri, & nutrir possent vermes, quoniam omnis humor putridus duo habet, humorem coctum, qui est causa materialis, & spiritus acres, & fermento similes, à quibus, vt à causa efficiente, totus humor coquitur, fit dulcis, & ua-

aus, ex quo immediate, vt ex causa materiali generatur animal.

Hinc solertissimus philosophus 3. de gen. anim. cap. 11. loquens de ijs, quæ sunt ex putri dicit, cum enim dulce in principium constituendum secernitur, & quod superest talem accipit formam, nihil autem gignitur putrescens, sed concoctum, putredo verò, & putridum rei concoctæ est excrementum, quare materia proxima vermium, vel eorum, quæ generantur ex putri non est putrida, quia sunt ex eo, quod coctum est, & quod est dulce; quæ cum ita sint, dicere quoque possumus ex bile, vel melancholia putrescente fieri posse lumbricos, quando ab ijs humoribus secernitur aliquid dulcis apti generationi, & nutritioni vermium.

Dum dicunt de mari mortuo, quod ob amaritatem non generentur animalia: Respondemus, ibi non gigni animalia ex putredine, quoniam bitumen relictatur putredini, namque sine putredine non potest crudum coqui, & reddi dulce, & aptum generationi, & nutritioni.

Dum roborant sententiam auctoritate Gal. dicentis ex crudis humoribus gigni vermes, & Pauli Æginetæ, quod ex calidis non fiant vermes, nobis non relictantur, quoniam omnia concedimus scilicet ex crudis humoribus fieri vermes, quatenus putrescunt, & ex calidis non fieri, quia causa materialis animalium generatorum ex putri est suauissimum, dulcissimum, & temperatissimum, causa vero efficiens est calida, & acerrima; dum Paulus Ægineta dixit ex calidis non fieri, intellexit de causa materiali, non de efficiente, quia Gal. 3. aph. 26. clarissime dicit ad generandos vermes, putredinem, & plurimum calorem requiri.

Confirmatur experimentis Alchimistarum, quod in omni re amarissima, salissima, & bituminosa sit aliquid dulcis, quoniam per sublimationem à calidis omnibus, ut à sale, ab aromatis virtute ignis aliquid dulcis colligere possumus quod est naturæ amicum, ex quo animalia, quæ ex putri sunt, gigni, & nutriri possunt; quare quanto magis à biliosis, & melancholicis humoribus putrescentibus natura virtute plurimi caloris seligit dul-

ce, & amicum animantibus? quæ gubernantur facultatibus, quæ attrahunt dulce, & expellunt amarum, ut hinc in mari generentur pisces dulcissime carnis, quia facultates naturales attrahunt, quod est dulce, & expellunt amarum, quod est naturæ animantium inimicum.

Hinc obiter animaduerti potest illorum error, dum pro necandis lumbricis utuntur odore Theriacæ, vel leuissimis quibusdani remedijs, quæ diminutam habent uirtutem necandi, illosque occidendi, quoniam vermes sua expultrice facultate leuia amara, & alia leuiora expellunt; hoc enim obseruamus, dum pueri tentantur lumbricis, & diarrhæa biliosissima, bilis enim sua natura amara eos non occidit; quare nisi in lumbricis necandis ad ualida præsidia confugiamus, ut ad aloem non lotani, vel ad mercurij scrupulum cum aloes, & terebentinæ pauxillo ad pillulæ perexiguæ formam recepti, nihil fit.

Præterea uellè, ut mihi diceret aduersarius, cur lumbrici, sicut dicit Hippocrates 3. aphorismorum 26. in lactantibus pueris non generentur? Si Galeno credendum est, dicit in comm. quod sola hæc putredo in pueris non est sufficiens ad generandum, sed & calore plurimo indiget, ecce quod, quæ plurimum habent calorem, vt bilis, & melancholia, non possunt impedire, quin lumbrici, & ascarides ab ea generentur.

Causa verò, cur in lactantibus non gignantur vermes, est lactis maxima dulcedo, quæ adeo obtundit acrimoniam putredinis, vt non possit educere de potentia ad actum lumbricos.

Hinc est, quod pueri, qui pubertati sunt proximi, præcipue lumbricis tentantur, incipit enim calor ex humido putrescente gignere vermes, si dulcia, vt lac, carnes multas, & alia humida edulia comedunt, & præcipue si soliti sint comedere panem triticeum albißimū, dicit enim Galenus 6. de morb. vulg. com. 7. tex. 7. lumbricos ab hoc pane fieri; propterea panis laudatur, qui cum paucio fursure sit confectus, quoniam hic abstergit, & occasionem gignendi lumbricos aufert; quinimo omnia deterfiora, quantum sint dulcia, vermium erunt inimica.

Hic non possum committere, quin rejiciam erratum cuiusdam nostratis, qui mihi præscribenti decoctum ficuum pro puero variolus affecto, ut materiam truderem ad cutem remedium exprobrauit dicens gignere lumbricos, credens omnia dulcia gignere posse vermes, quod est à ratione alienum, quoniam dulcia deterforia, ut sunt fici, cassia, liquiritia, & alia id genus, quæ incidendi & detergendi virtutem habent potius prohibent, ne gignantur, dulcia verò apta generationi lumbricorum sunt alterius generis, ut butyrū, lac, carnes, fructus, panis albus quæ omnia vim incidendi, & abstergendi non habent: hinc Gal. 7. in 6. de morbis vulg. tex. 7. dicit à leguminibus, & ab oleis, & à crudo succo debent pueri abstinere: quia hæc apta sunt generationi lumbricorum.

Perrant, quæ ex lingua ægrotantium semper proficiuntur colligere prædominantes humores. Cap. XIII.

Non desunt Medici credentes ex alijs fontib. & præcipue ex lingua ægrotantium colligi posse peccantium humorum dominium, eò magis, cum Galenus quinto in 6. de morb. vulg. tex. 14. de lingua habeat hæc verba, linguam non secus quam urinam indicare, quamnam sit affectio in humoribus.

Cui difficultati occurrimus, quia, quæ ex lingua certò colliguntur, prodeunt à sapore humorum lingue herentium, vel à colore humorum linguam tingentium, quare si lingua ex alijs causis maculetur, & alteretur, dicimus nos ex signis lingue non posse semper aliquid certò colligere de internis humoribus prædominantibus.

Hinc, qui inferunt hanc consequentiam, lingua est aspera, nigra, & sicca, ergo humores peccantes sunt calidi, & feruentes, valde errant, quia consequentia non est de omni & per se, cum multi sint, qui habeant glabram, & siccam linguam non obibilem peccantem, sed ob alias causas; etenim non vno in loco à

Galeno, & Hippocrate relatum est, linguas asperas, & siccas reddi in illis, qui tenent os apertum, quia aer absumit lingue madorem, similiter asperam reddi, dum catarrhus stillat à capite, & hæret lingue; ad hæc aliquando nos videre in hypocondriacis sine febre linguam reddi adeo asperam, & siccam, ut corij speciem æmulari videatur, & demum talem reddi ob immoderatam caliditatem peccantium humorum.

Quare dum volumus accuratè constituere aliquod decretum, & rectissimè examinare, & philosophari, nisi id ope logica fiat, necessariò confusè agemus; pro qua re audias Gal. 1. de elementis, neminem unquam posse decretum aliquod accuratè constituere absque ope ipsius logicæ disciplinæ, quocirca licet Galenus dixerit linguam non secus, ac urinam indicare humorum affectionem; nihilominus est distinguendum, quando urina ostendit affectionem humorum, & quando non ostendit, & quando lingua sit læsa, quia os fuerit apertum, vel ob alias causas; proponendæq; sunt omnes causæ illius effectus, & eligendæ, quæ sunt per se, alioquin in tam prolixo Galeni colloquio tot verba, & sententias possemus inuenire ut ijs sine methodo logica acceptis, omnem inanitatem defendere possemus.

Quinimmo nulla esset tam mala opinio, quæ non posset aliqua apparente Galeni auctoritate defendi, & roborari.

Sed redeamus vnde digressi sumus scilicet ad linguam Glabram, asperam, nigram, & siccam, ostendamusque non solum ponere in humoribus summum ardorem. Audias Avicennam lib. 1. de hac re loquentem, & quandoque denigratur lingua ex duritie splenis, quæ durities aliquando est cum febre; aliquando sine febre, ergo non semper nigra lingua, glabra, & sicca ostendit humores æruginosos, & feruentissimos.

Præterea Avicennas lib. 1. sen. 1. doct. 3. cap. 3. dicit, cognoscere ex colore lingue cõplessionem stomaci, & intestinorum, est difficilè, quare si est difficilè ex colore lingue cognoscere, quæ sunt in vetriculo, quanto difficilius erit cognoscere hu-

humores peccantes in venis, & in alijs partibus?

Ex traditis ergo patet, nos posse ex faporibus tamquam ex signis proprijs colligere humores peccantes, deinde ex coloribus, sed non partium affectarum, sed excretorum, & demum ex periodis colligere, quinam sint humores peccantes, & prædominantes in humanis corporibus: patet similiter, nos non semper ex vrina certa, & infallibili scientia posse

perquirere peccantes humores, neque ex pulsibus, nisi per coniecturam, & per accidens: & demum ostendimus solùm, ex coloribus excretorum humorum, & nequaquam partium affectarum, & lumbricorum nos ad cognitionem humorum peruenire, & de natura colorum secundùm sententias Opticorum peregrinus, vt nonnullorum errata clariora, & patentiora fierent, & methodus melius duceret.

FINIS QVINTI LIBRI.





SANCTORII SANCTORII

Olin

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIVM

In Humoribus peccantibus per signorum communium syndromen
perquirendis.

LIBER SEXTVS.

*Declaratur methodus, quæ per syndromen
signorum communium conuertibilem
aperit latentes humores peccan-
tes. Cap. I.*



Stendimus superiùs, nullam
viam dari, qua melius per-
quiri possint famolæ peccan-
tium humorum differentia,
quàm illa, quæ progreditur
per signa consequentia, quæ sunt conuer-
tibilia: verùm, quia horum signorum ali-
qua sunt propria, de quibus in superiori
libro actum est: aliqua verò communia,
sed per syndromen collecta, quovisque
conuertantur; quæ indicat humores in
imis corporis partibus stabulantes. In
hoc libro de hac syndrome signorum
communium pro viribus agere cona-
bimur.

Occasio verò huius inquisitionis est,
quia dum humores insident penitus

mas corporis partes, nos recta non pos-
sumus semper per sapores, vel colores
eos cognoscere, quinimò neque per pe-
riodos, quoniam accidere potest, ut pe-
riodi occultentur, vel ob diuersam hu-
morum misturam, & farraginem, vel
quia à Medicis, qui perpetuò non assi-
stunt ægrotantibus, non possint animad-
uerti.

Quocirca, cum propria aliquando ma-
neant adumbrata, & quodammodo cali-
gine obuallata, expedit aliquam Metho-
dum perquirere, quæ omni tempore, &
in omni ægrotante possit nos docere oc-
cultos humores peccantes: Hæc Metho-
dus erit, quam philosophus 2. post. circa
finem docet, scilicet quo pacto ex syn-
drome signorum communium aliquid
immanifestum, & carens proprio signo,
cognoscatur: hæcque est illa, quæ uti-
tur quoque Galenus in arte Medicina-
li, dum per syndromen multorum si-
gno-

gnorum communium perquirat viscerum temperaturas, hacque nos amulantes diuinos viros in primo libro ad cognoscendas affectionum occultas ideas, vsu fuimus, & in hoc loco vtetur ad cognoscendos internos humores predominantes.

Verum, cum signa cuiuslibet rei sint propemodum infinita, illa tantum, ceteris omnibus prætermisissis, hanc demonstratiuam syndromem ingredi debent, quæ ex antecedentibus, & consequentibus necessarijs colligi possunt; quia hæc solum vicem propriorum subeunt, & certissimam cognitionem humorum, peccantium afferre possunt: antecedentia verò necessaria, quæ habent hanc prærogatiuam docendi occultos humores, sunt haurienda à duobus fontibus, qui necessariò antecedunt generationem humorum. Consequentia verò à quatuor, per hypothesein, an ne humores antequam aruginem, vel porraceum colorem acquirant sunt tales à visceribus talimodo dispositi: an ne quoque viscera disponuntur ab vsu rerum non naturalium?

Quod cum ita re vera sit, sequitur, quod omnia antecedentia ad duos fontes reducantur: vt primus comprehendat omnes res non naturales disponentes viscera: Secundus verò omnes viscerum dispositiones, quorum meritis gignuntur humores peccantes: at quia genitis humoribus peccantibus ab alijs antecedentibus, & externis causis procatactis necessariò confurgunt morbi, & à morbis prodeunt symptomata, quapropter dicimus tertium fontem signorum esse à morbis colligendum: quartum à symptomatibus, quia morbi, & symptomata necessariò insequuntur suas causas.

At quoniam humores peccantes, prout in diuersis residunt partibus, varios efficiunt morbos, & varia symptomata pro diuersitate locorum affectionum, propterea oritur quintus fons, qui est de locis affectis; bilis enim si est in corde potest efficere syncopem, eadem si in cerebro, phrenesim; si in venis, ardentem febrem, si extra venas, intermittentem; si in pulmone, peripneumoniam; si in toto, morbum regium, si in parte, erysipelas, Melancholia si est in corde facit palpitatio-

nem, si in corporis superficie impetiginem, & phagædenas; si in toto melancholia adusta redundet excitatur elephantiæ affectus, si in parte, cancer. Audias de hac re Galenum 3. de sympt. causis cap. 2. amara bilis si peccat in toto facit morbum regium, si in parte erysipelata, si melancholia adusta redundet in toto, elephantiæ, si in parte, cancerum facit; Similiter pituita in capite existens apoplexiam facere potest; eadem in pectore asthma, & sic de alijs infinitis dici posset affectus, quippe ob partium affectionum varietatem varij atque diuersi fiunt ad instar Prothei, qui semper idem manens varijs, atque diuersis formis indutus, varijs & multiplex esse videtur.

Postremo nos ex iuuantibus, & laudentibus necessariò aliquando colligimus peccantes humores, quia si iuuent calida, inferimus humores, peccantes siue frigidos, & versa vice: Pater ergo lex esse fontes signorum communium necessarios, sed vt sciamus fructus, & vtilitates, quæ colligi possint ex ijs fontibus: singillatim omnes sunt examinandi.

Primus fons continet omnes res non naturales, quæ omnes à Galeno 3. de tuenda sanit. cap. 10. ad quatuor capita referuntur, dicitque primum continere omnia, quæ assumuntur: Secundum, quæ sunt animos, vel corpore: Tertium, quæ excernuntur, & retinentur: quartum, quæ foris adhibentur: In quibus capitibus (vt alibi ostendimus) plura continentur, quam in illis sex rebus non naturalibus in scholis citatis.

Vt igitur aliquem fructum ex primo fonte colligamus, expedit philosophari, & videre quæ res non naturales viscera ad calidorum, & quæ ad frigidorum humorum generationem disponent. Sed, quia à Galeno hæc omnia colligi possunt, ad illum confugiamus, & in eius auctoritate conqueſcamus: dicit igitur lib. de causis morbi. cap. 2. loquendo de causis caloris, quod omnes causæ caloris ad quinque, & non plura capita reducuntur, scilicet ad motum, ad viciniam corporis calidi ad alimentum, ad putredinem, & denique ad ripationem: statim loquentes de procatactis calidis colligimus tria ex ijs

ijs pertinere ad res non naturales disponentes corpora ad bilem, motum nimirum vicinitatem, & alimentum, quia stipatio, & putredo ad affectus præter naturam pertinent.

Ex ijs inferimus, si causæ non naturales efficere debent humores calidos, nullo alio modo posse operari, nisi motu, vel vicinitate corporis calidi, vel alimento, quia Galen. alios calefaciendi modos inuenire non potuit: ad hæc tria igitur omnes res non naturales disponentes viscera ad generandos humores biliosos, & adustos reducuntur.

Ad morum referuntur vigilie, coitus, exercitia, & omnes passionis animi, dicimus, quod coitus calefaciet, sed ratione motus, quia Gal. de tuenda sanitate cap. ultimo & lib. ad Trasib. c. 40. ponit coitum inter ea, quæ sunt. Ergo ratione motus calefaciet dicimus, quod omnes animi passionis calefaciant, ne credant solum iram suscitare, & incendere calorem, quia Galenus multis in locis testatur, non solum iram ratione motus calfacere, verum etiam iram, & mestitiam, & præcipue de differentiis feb. c. 3. dum habet hæc verba ob iram aliquando calefit spiritus, & aliquando sanguinis substantia, unde oritur febris, dicimus igitur hanc febrem ab ira factam, habere originem à motu, atque feruore naturæ caliditatis; Quæ autem ex tristitia fit, ex solo motu, non autem ex feruore generatur.

Ecce igitur quod omnes animi passionis calefaciant ob motum spirituum, quia vel concentrantur, vel seruescunt, vel cum impetu diffunduntur.

Ad vicinitatem, vel adhæsum quod idem est corporis calidi reducuntur aer vnguenta, & omnia externa, quæ habent virtutem calefaciendi: Ad alimentum vero cibus, & potus.

Similiter ex Galeno cap. 3. de causis morbi. colligimus, quibus, & quot modis res non naturales disponent corpora ad generationem humorum frigidorum: refertque se x esse causas extinctionis caloris, adhæsum rerum frigidarum, alimentum, stipationem, rarefactionem, ocium, & motum immodicum: ex quibus eligimus quattuor, quæ pertinent ad res non

naturales disponentes viscera, ut generent humores frigidos, adhæsum nimirum, alimentum, quietem, & motum immodicum; stipatio enim & rarefactio ad constitutiones præter naturam pertinent.

Ad rei frigide adhæsum aer, aqua, vnguenta frigida, & alia topica id genus innumerabilia reducuntur.

Ad alimentum cibus frigidus, aquæ potio, & cibi quantitas nimia.

Ad quietem, nimius somnus, & ocium, nimiaque coitus abstinencia, quæ ut obiter hoc quoque dicamus ex Galeno 6. de loc. aff. 5. præter alia mala inducit torporem, & reddit coctionem diminutam.

Ad motum immodicum referri possunt nimius coitus, nimia vigilie, nimium exercitiū, & immoderate animi passionis, quæ omnia immoderata non per se, sed per accidens refrigerant, quatenus scilicet resoluunt calorem, quo resoluti, necessario frigidi gignuntur humores. Nec nimium exercitium: nec nimia quies conferunt sanitati dicimus nimium exercitium esse nocuum, quia moderatum est saluberrimum, ideo Hipp. 6. epid. sect. 4. 22. habet hanc sententiam optimum studium sanitatis citra saturitatem vesci & impigrum esse ad laborem. Similiter Gal. de cibis boni & mali succi cap. 3. nulla maior pestis bonæ valetudinis est quam corpus ex toto in quiete tenere, quare moderatum exercitium maxime confert ad sanitatem quia nimius motus bilem colligit, nimia quies pituitam: Ex ijs ergo colligemus modos, quibus res non naturales disponent corpora ad generationem peccantium humorum, esse quattuor tantum, suntque adhæsum, motus, alimentum, & quies.

Sed, ut ex hoc fonte colligamus aliquem fructum in cognoscendis peccantibus humoribus, semper est distinctio hæc animaduertenda, & ante oculos proponenda, an scilicet res non naturalis operetur per se, vel per accidens, & ratio est, quia motus, adhæsum, & alimentum calidum per se disponunt corpora ad generationem humorum calidorum, per accidens verò ad generationem frigidorum.

Etenim videmus per experientiam, nimium motum resolvere calorem, & inde

visce-

viscera eo priuata humores frigidos gignere : Similiter videmus adhæsum calidissimum resolueri, & resolutum calore, frigidos à visceribus fieri humores.

Addimus adhæsum frigidum efficere calorem ingentem & præcipue illis qui crudis succis referti sunt : Galenus 11. meth. cap. 20. ait, caueant habentes crudos succos in frigido solio diutius morari transpiratio impeditur & prohibita augetur calor.

Ad eundem modum videmus alimenta calidissima, qualia sunt aromatis confecta, & vina potentissima, si calorem resoluunt, affectus efficere frigidos ; vel si nimia quantitate hauriantur, suffocare ; & inde paralyfim, & sexcentos frigidos affectus molliri posse.

Ingruit igitur necessitas, si velimus aliquod signum à rebus non naturalibus colligere, quod vnitum cum alijs possit indicare humorum dominium, vt nos examinemus prius, an dispositione viscerum sit introducta à motu, vel ab alimento, vel ab adhæsu per se, vel per accidens ; quia hoc non præcognitum esset impossibile, aliquid certi ex hoc fonte colligere.

Demum est quies, vel otium, quod si nimium sit, semper suffocat, & per consequens ad frigidos humores generandos corpus disponit : Si verò quies sit moderata, per se iunat, & disponit viscera potius ad calidos, sed temperatos humores : isti igitur sunt modi quibus externa procatartica agunt, quæ si, vt posuimus, considerabuntur, illa ab hoc fonte colligemus signa, quæ cum alijs ab alijs fontibus hauriendis coniuncta necessario aperire poterunt humores peccantes alioquin occultos.

Afferatur exemplum, præcessit aer æstius quod signum pertinet ad adhæsum corporis calidi, tunc illico expêdere opus est an illa aeris caliditas fuerit talis, quæ potuerit resolueri, nec ne, quia ex resolutione caloris viscerum colligemus frigidos, ex calore non resoluti calidos.

Idem examen faciendum est in ijs, quæ pertinent ad motum, scilicet an coitus, animi passionem, vigilie, exercitium fuerint in excessu, quoniam ad frigidos tunc disponunt viscera.

Similiter quæ ad alimentum, an fuerit calidum in excessu, vel copiosissimum,

quia calidum in excessu resoluit, copiosissimum suffocat : omnia enim capita sunt examinanda, quia quanto ex vno fonte plura haurientur signa, tanto ostendentia, tanto magis demonstratiuum syndromem colligemus.

Secundus fons cõtinebit omnes patientis corporis dispositiones sine quibus, vt optimè dicit Galenus lib. de causis morborum 2. nec gladius abscindere, nec ignis cõturbare posset, de quo vberinè egimus lib. 1. cap. 21. diximusque nullam esse causam non naturalem, quæ tantum possit, vt sine dispositione subiecti suam intro-mittat ideam : res quoque experimentis redditur manifestissima, quia sæpè videmus in æstate aliquos repleti vino maluatico, attamen calore non vexari, aliquosque ob maluatici ciathi in ardentissimas febres prolabi, caloreque exuri, & tandem è viuis decedere : quare præstat, vt lectores promptè dispositiones corporum sanorum præsciant, quia illis in imaduensis facile poterunt præcognoscere non solum quibus humoribus preman-tur ægrotantes, verum etiam in quas humorum proluxus corpora sanorum hominum sint prona atque propensa : Signa igitur erunt desumenda in hoc fonte, vel ab antecedentibus, vel à consequentibus.

Antecedentium dispositionum quinque constituuntur capita, in quæ illico oculos conijcere debemus : Primum caput continet dispositiones hæreditarias, quare in examine dispositionum viscerum ægrotantium primò est considerandum, à quibus parentibus æger ortus sit, quoniam si parentes fuerint biliosi (nisi ali-quod signum ægrotantis ab alijs fontibus depromptum obstitit) dicemus in filio peccare bilem.

Intelligimus peccare bilem à prima constitutione, vt scilicet talis sit temperatura simularium partium, quia morbi hereditarij sunt in facto esse, & non in fieri. Pestis, febris putrida filijs non communicantur, quia in humoribus, & non in solidis assitit : arthritide correpti, calculosi phthisici habent dispositionem in solidis, in quibus semina horum morborum ideam conseruant in filijs.

In secundo capite expêdimus ætatem, dici-

dicimus enim, senes esse refertos frigidis humoribus, iuvenes calidis.

In tertio considerandum est, an æger sit debilis, vel fortis, quoniam ex debili pituitosos, & crassos, ex forti calidos, & tenues humores colligemus.

In quarto expendimus corporis proprium habitum, an sit macilentus, & gracilis, quia inde calidos, & an sit obesus, quia inde frigidos humores dominari dicemus.

In quinto & ultimo, quod est summi momenti inquirimus, an sit intermissa aliqua euacuatio, quia si fuerit intermissa bilis, colligemus bilem peccare, si melancholia, quæ per secesum, vel hæmorrhoidas euacuabatur, erit suppressa, melancholiam, si pituitæ, pituitam dominari iudicabimus: Hæc sunt quinque loca seu capita ante oculos obijcienda, quæ valde conferre poterunt ad cognoscendas viscerum dispositiones.

Subsequentes verò dispositiones, vel dispositionū subsequencia signa in quatuor capita diuiduntur generalissima, quoniam dispositionum signa colliguntur ab actionibus animalibus, vel vitalibus, vel naturalibus, vel excrementis: Quantum attinet ad actiones animales, si æger sua natura sit vigil, mutabilis in sententia, ingenio celeris, in motu agilis, inedia deditus, & sæpe in somnijs ei arma, vel alia iram mouentia occurrant, erit biliosus: Si verò erit discursu tardo, attamen in re apprehensa firmus, somnumque habeat longū, non facile sitiatur, neque abhorreat cibum, cibus tamen sit molestus, dum à somno excitatur, indicabitur pituitæ dominium: Si verò erit ingeniosus, astutus, & cautus, melancholia dominabitur.

Quantum attinet ad actiones vitales, si pulsus fuerint sua natura veloces, hique in venerem sint furiosi, sed *per dympnos*, bilis prædominabitur, si verò pulsus sint tardi, & molles, pituitam colligemus.

Quo ad naturales functiones pertinet, si cibus in ventre numquam sit molestus, signum est bilis: contrarium dicimus indicare pituitam.

Ab excrementis quoque plurima signa colligimus in cognoscendis viscerum dispositionibus: Hinc dicimus, si homines careant sua natura facie, vel in auribus

excrementa citrina colligant, indicari bilem, & contrarium ostendere pituitam: verum paullo infra, dum de quolibet humore peccante agemus, declarabimus differentias humorum, & hauriemus à proprijs fontibus signa magis particularia, quæ firmitatem adhuc præstabunt cognitionem.

Tertius fons continet morbos, à quibus sæpissimè humorem peccantem cognoscimus, quod exemplis varijs declaratur: an ne à quartana humorem melancholicum dominari colligimus? à tertiana biliosum? à quotidiana pituitosum? an ne erysipelas, & phrenesis ostendunt bilem peccare? hydropisis pituitam & sanguinis plethora melancholiam? tertio enim de morb. vulg. 3. text. 7. dicit Galenus, si aliquis nimia quantitate sanguinis vexetur, faciem esse melancholicam, quia in multo sanguine est multa sæx, unde symptomata melancholica prodeunt: Similiter ex alijs plurimis morbis colligi potest humor peccans.

Quartus fons continet symptomata, quæ sunt excreta, qualitates mutatae, & actiones læsæ: si de excretis loquamur, plura sunt exempla, quæ per urinam, per sudores, per vomitum, & per alias partes ostendunt humorum prædominium; namque ab urina colligimus humores, quia si appareat multum sedimentum in urina alba, statim pituitam peccare dicimus: A sudorib. quia si corpus sæpe madore diffluat, tunc pituitam exundare putamus: A vomitu, si excernatur bilis, statim dicimus bilem peccare.

Næque obijciant, si ex symptomatibus certo colligimus peccantem humorem, nos non indigere cæteris fontibus.

Respondemus hæc signa sumpta solum à symptomatibus non esse æternæ veritatis, quia symptomata per se morbum sequuntur, per accidens humores.

Hinc contingit aliquando euomi bilē; attamen humorem redundantem in corpore esse pituitam, vt doctissimè Gal. in historia Cleonactidis 1. de morb. vulg. 3. com. 23. obseruat, ibi enim legitur, Cleonactidem per vomitum eiecisse bilem æruginosam, attamen ex syndrome aliorum signorum Galenus colligebat humorem redundantem in illo esse pituitam: Syn-

drome, quæ docebat in Cleonaetide humore frigidum dominari, quamvis euomuerit æruginosam, erat tribus signis confecta, quorum primum erat non abhorreere cibum: Secundum non sitire: tertiū non esse insomnem, dixitque hanc syndromem tantum posse, vt magis ostendat in corpore esse dominium pituitæ, quam dominium æruginosæ bilis.

Si vero de qualitatibus mutatis loquamur, dicimus corpus albi coloris, & tactu frigidum pituitæ dominium indicare: Si flauus coloris, & corpus tactu calidum sit, bilis redundantiam.

Demum si de actionibus læsis loquamur, si naturalis actio sit diminuta, & præcipuè alteratrix, tunc dicimus dominari pituitam: si corrupta bilem, si fame non naturali æger irritetur, dicimus melancholiam redundare, si sensus sint obtusi, & mens hebes, pituitam indicari, si insomnis erit, bilem, scire: hæcque dicimus summam vim in indicando habere, si cæterorum fontium signa ijs consentire videbimus.

Quintus fons continebit locos affectos qui nobis quoque manifestare possunt humores peccantes: partes enim affectæ, vel sunt aliquo modo manifestæ, vel occultæ: inter manifestas sunt membranae, glandulae, aliæ partes; Scimus. n. membranas læsas indicare bilem: quoniam apud Hippocratem, & Galenum videtur valere hæc consequentia; est pleuriticus, ergo bilis peccat, quia alij humores membranarum densitatem non peruadunt, nisi biliosi; idcirco Hippocrates 6. aphorismorum 33. habet, qui acidum eructant, non sunt pleuritici; quia, qui acidū eructant sunt pituitosi, vel melancholici, qui humores non possunt subiles poros membranae penetrare, & per consequens excitare inflammationem pleuræ.

Similiter si glandulae sint læsæ, dicimus peccare pituita: Similiter, vt plurimū læsus ventriculus, pulmo & cerebrum ostendunt dominari pituitam. Demum, si hypocondria sint longo tenoris tractu læsa, colligimus faciem melancholicam adustam redundare, ratio est, quia omnia vasa, & omnes surculi venarum hypochondriorum retinent succum melancholicum, crassum scilicet, & terre-

stem, qui tamen, si diutius moratur, adurit, & affectionem mirachialem efficit: Simili modo si splen sit læsus, vel habeat æger hæmorrhoidas innatas, suppressa illic inferimus patientem melancholico premi humore.

Si verò locus affectus ignoretur, tunc debet præcognosci per quinque locos à Galeno propositos 1. de loc. aff. cap. 5. quorum primus est per excrementa; Secundus per actiones læsas; tertius per dolorum proprietates; quartus per situm; quintus per propria accidentia, sed quia vberimè 1. lib. cap. 11. declarauimus methodum, qua affecti loci possint cognosci, nō est, vt iterum acta agamus.

Sextus fons continet iuuantia, & lædientia, quæ vel maximè possunt, quia affectus præternaturam tolluntur contrarijs, & consequentiæ contrariorum necessariò sequuntur: valet, iuuatur à calidis, & læditur à frigidis, ergo humor redundans est frigidus, & pituitosus; Simiter euacuatur pituita, & iuuatur, ergo humor peccans est pituita, & sic de alijs humoribus est dicendum: Fert faciliè ieiunium, ergo pituita abundat; dicit enim Galenus 2. de ratione vict. 32. & 2. de morb. vulg. 3. text. 28. pituitosi cibi paucitate sitim tollimus, & lassitudinem biliosis contrarium accidit; valebit ergo, ieiunio tollimus sitim, ergo erit pituitosus, non tollimus, ergo biliosus: Idem dicimus de lassitudine, tollimus ieiunio lassitudinem ergo pituita exuperat, non tollimus, ergo bilis: ad eundem modum dicimus, acetū prodest, ergo amara bilis est copiosa: nocet, ergo melancholia, si vera est sententia Galen. 3. de ratione vict. 38. quibus amara exsuperat acetum prodest, ab ipso dissoluitur, & degenerat in pituitam: nigrae verò ob acetum multiplicantur, attolluntur in sublime, quia nigra est acida; hæc igitur, & alia plura ostendunt iuuantia, & lædientia.

Caterum, si ex quolibet fonte saltem vnicum expiscabimus signum, & cū cæteris signis desumptis ab alijs fontibus copulabimus, id colligemus ex hac signorum syndrome, quod à qualibet præstantissima demonstratione ex proprijs facta colligi possit; quia signa ex necessariò antecede-

cedentibus, & necessariò consequentibus, collecta tantum possunt, quantum propria.

Qui verò alios præterea fontes proponunt, (vt facit Argenterius, qui in lib. de signis Medicis, & alibi excogitauit pro cognoscendis oculis humoribus locum vel fontem à similitudine, vel à proportionem) aberrare videntur, uel quia fontes diuersi ab ijs propositis nihil prorsus ad hanc cognitionem conferant, uel si aliquid utilitatis præstent, ad sex propositos reducantur.

Fons igitur à proportionem propositus ab Argenterio est, verbi causa, si aliqua sauires endimia in populum, & Medici nescirent, quibus humoribus danda esset endimix culpa, & propterea cadauera aperirent, viderent esse atrum succum: dicit ex hoc experimento oriri fontem à proportionem, dicendo sicut in cadauere erat ater succus: Similiter in alio homine eadem ægritudine vexato erit similis ater succus.

Primò rejicitur hic fons à proportionem quia non potest collocari in catalogo signorum necessariò antecedentium, vel necessariò consequentium, profiteamur. n. nos syndromem necessariam fieri non posse, nisi ex signis necessariò antecedentibus, vel necessariò consequentibus, quare vt topicus & contingens rejicitur: deinde si aliquid docere possit, eatenus id facit, quatenus morbum, vel locos affectos doceat; per apertionem cadaueris cognoscimus, quæ pars sit affecta, & à parte affecta colligimus, qualis sit morbus; quare fons à proportionem, si aliquid doceat, id merito aliorum fontium declaratorium præstabit.

Insuper ex apertione cadaueris in perquirendis humoribus possumus decipi, quia humores in corporibus mortuorum existentes differunt forma, & qualitate ab humoribus viuientium: corpus enim viuens vt primum fit cadauer, amittit formam, colores, & omnes humorum qualitates, quæ in viuentibus obseruabantur; quod cum ita sit, quomodo non errabunt illi, qui ex cadaueris apertione credunt sciri posse à quo humore quispiam sit uictus.

Postremò, vt clarissimè videamus, quod

Sanctorum Sanctorum Pars I.

hic fons Argenterij, qui est à proportionem non possit collocari inter signa necessariò antecedentia, vel consequentia; audias analyticam, & infallibilem rationem, an ne transitus à proportionem, vel à simili, quod in idem recidit, est analogiū eni, pircorum toties reiectus à Gal. an ne fons à proportionem, seu analogiū progressus à particulari ad particulare, an ne hoc argumentum cadit in tertia figura cum conclusione vniuersali quod est ridiculum, & monstruosum; quare, si hæc vera sint, fons à proportionem erit omninò rejiciendus, & explodendus.

Neque obijciant nos quoque sextum fontem minus necessariū proposuisse, qui est ex iuuantibus, & lædentibus.

Quia respondemus consequentias à contrarijs esse necessarias, valet enim iuat calidum, ergo affectio est frigida, non tamen valet consequentia à proportionem, vel similitudine depromptæ, sicuti in Socrate fuit ater succus inuentus, ergo inuenitur etiam in Platone, qui simili morbo laborabat, hoc enim argumentum est elenchus malæ compositionis, infertur enim in conclusione, quod humor peccans sit humor ater, quia morbus est similis ijs, quibus post mortem secūm est cadauer, & inuentus est ater succus: Possem sanè inferre ex eo, quod ob similem morbum repertus sit ater succus, esse quoque posse in hoc ægrotante atrum succum, sed nequaquam quod actus sit ater succus; quare cum in argumento transeat ab ijs, quæ possunt esse, ad ea, quæ actus sunt, incidunt in elenchum malæ compositionis.

Quomodo omnes biliosorum humorum disferentia cognosci possint per syndromem signorum communium a rebus non naturalibus desumptorum. Cap. II.

T Radita Methodo, quæ per signorum communium syndromem sufficiens, siam potest docere latentes humores penitissimasque corporis partes insidentes: par est, vt eam in perquirendis quattuor humorum generibus experiamur: itaque incipiamus à biliosis succis, tamquam ob eorum impetum, & calorem omni-

Q bus

bus manifestioribus, & euidentioribus.
Bilis communiter diuiditur in quatuor famosas differentias, flauam scilicet, vitellinam porraceam, & æruginosam; verum ex Galeni sententia lib. de atra bile c. 2. & alijs in locis septem biliosorum humorum differentię proponuntur, quarum prima est bilis pallida: Secunda est flaua: tertia vitellina: quarta porracea: quinta æruginosa: sexta cærulea, quæ dicitur isatodis: septima est rubra, quæ est serum sanguinis.

Septem hæ differentię bilis differunt tantum secundum magis & minus, quoniam ex maiori & minori calore variæ biliosorum humorum differentię confurgunt: quæ sententia colligi potest ex Galeno multis in locis, & præcipuè 2. præfag. 47. dum dicit, flauus color fit serpio torrefacto, pallidus fit ex mistione flauæ bilis in serosa humiditate, æruginosus fit seroso valde torrefacto: vnde colligitur, quod secundum maiorem, & minorem serosi humoris torrefactionem oriuntur differentię humorum biliosorum; Hinc eum differant tantum secundum magis, & minus, alia onoque à Galeno biliosorum succorum differentię multis in locis enumerantur, quia quæ differunt secundum magis, & minus sunt maximè diuisibilia, & maximam veritatem differentiarum faciunt, quæ verò specię, & quidditate inter se distinguuntur, cum specię sint sicuti numeri, diuidi, & multiplicari minimè possunt; Galenus igitur cognoscens alias plures differentias biliosorum succorum lib. 10. de simp. med. fac. cap. de fele dicit, quod bilis isatodis duplex sit, altera dicitur isatodis à colore isatidis glaucæ, altera à colore fusco brassicæ; Et primo de natura humana tex. 4. proponit dati biles, quæ nomina carent, dicitque has generari præcipuè in morbis, qui ex putredine fiunt.

Verum satius est, vt hic famosas biles, quæ à Galeno passim obseruantur, breuiter examinemus, atque exordiamur à bile pallida, quæ est omnium mitissima; de qua Galenus lib. de atra bile loco citato, & 5. in 6. de morb. vulg. tex. 13. dicit ex humiditate, & flaua bile fieri, esseque eiusdem generis, cuius est sudor, & vrinæ; hancque pallidam choleram nonnul-

li vocare serosam bilem.

Post pallidam sequitur flaua, quæ ex Galeno 10. de simp. med. fac. cap. de fele, est calidior & crassior pallida; Hinc 2. de ratione vict. in ac. tex. 37. dicit quod bilis flaua fit ex sanguine plus iusto calefacto, & 10. de simp. med. fac. cap. citato dicit, quod flaua est calidior, & crassior pallida; & primo de natura humana text. 35. quod flaua à pallida specie non differat.

Sequitur deinde vitellina, quæ vt dicit Galenus 5. in 6. de morb. vulg. tex. 13. fit ex flaua crascescente.

Deniq; sequitur æruginosa, quæ, vt dicit Galenus 2. præfag. 47. fit ex serosa bile valde torrefacta, de qua loquens Galenus 5. de loc. aff. dicit æruginosam fieri ex vitellina à calore adusta.

Denum est porracea, quæ fit ex mistura bilis æruginosæ cum humore pituitoso, vt probabimus in libro sequenti, inde sequuntur plurimæ differentię ex maiori, vel minori torrefactione dictorum succorum biliosorum, vt sunt biles cæruleæ, & illæ innominatæ specię à Galeno primo de natura humana propositæ.

Postremò in catalogo biliosorum humorum collocatur rubra bilis, quæ est ichor sanguineus genitus ex portione alimenti tenuiori quæque, ut dicit Galenus libro de atra bile, proxima est sanguini, dicitur tamen bilis, quia ob nimiam tenuitatem non concreuit, quinimmo bilis propterea ab antiquis potius nominabatur, quam sanguis. Sed sensus egimus de omnium bilium differentijs longè exactius in commentarijs nostris primæ sen.

Tempus nunc est, ut ijs præcognitis, traditam methodum in superiori capite experiamur, quia inde colligere poterimus quando in ægrotantibus peccabit bilis flaua, quando vitellina, vel æruginosa, & cæteræ enarratæ biliosorum succorum differentię; Exequamur ergo propositum, & videamus quid in primo fonte, qui est de procacitate causis, colligi possit pro comparanda hac cognitione.

An ne (ut diximus superiori) tres externæ non naturales causæ sunt, quæ dispendere possunt viscera ad generationem bilis, & caloris? quæ sunt motus vicinitas

corporis calidi, & alimentum; an ne, quæ calefaciunt hoc ordine imprimunt caloris vestigia, vt minor caliditas minorem imprimat calorem in viscera, & per consequens pallidam bilem, quæ est mitior gignat paullo maior caliditas vitellinam? & deinde, si adhuc vehementior erit, porraceam, & æruginosam, vt propterea Galenus 5. de loc. aff. dicat vitellinam fieri æruginosam à maiori calore; & 2. præfag. loco citato dicat æruginosam fieri ex seroso valde torrefacto, quare si verum sit quod à calore, vt à causa efficiente disponantur viscera ad generationem omnium biliosorum succorum, & verum sit, quod calor in animantibus solum ab ijs tribus prodeat scilicet à motu, adhæsus corporis calidi, & ab alimento calido, erit quoque verum, quod maior motio seu agitatio maiorem calorem imprimat, & maxima maximum, & adhæsus corporis moderate calidi moderatum calorem, vehementissimè calidi vehementissimum intromittat.

Denum alimenta moderate calida mittiorem calorem, & potentissimè calida potentissimum calorem faciunt, vnde cognitis ijs viscerum dispositionibus colligi poterit, an peccet in biliosis affectibus bilis flaua, an vitellina, uel æruginosa, non enim possent viscera à vehementissimò calore calefieri, & inde morbum oriri biliosum ex flaua bile.

Cum igitur motus præcipuè disponat viscera ad calorem, nostrum est videre, quot sint illæ res non naturales, quæ ratione motus calefaciunt; dicimus ergo coitum, animi passiones, vigilias, & exercitium ratione motus calefacere, & disponere viscera ad generationem bilis.

Quo ad coitum: est hæc Galeni sententia com. 5. de morb. vulg. tex. 23. concubitus corpora omnia calefacit, quare ex præcedente libidine moderata, moderatum calorem; & bilem pallidam seu flauam, nisi alia obstiterint signa, colligimus: ex immoderata, & effreni intensum calorem, bilem æruginosam, & porraceam esse factam credendum erit.

Hinc Adolescentes Melibæ, vt patet 5. in 6. de mor. vulg. tex. 23. coitus blanditijs valde accersitus, & assiduè pectus

non corrui in febrem mitem, sed in malignissimam, & caloris feracissimam, in qua æruginosa, & non flaua, vel vitellina bilis eum vexabat. Similiter Satyrus, vt dicit Hippocrates 8. in 6. de morb. vulg. 38. ob nimiam feminis ciaculationem, tali feruore ob tam grædem agitationem a coitu produntum fuit correptus, vt tabidus, vel breui euaderet: ecce igitur, quod vehementior motus magis incendit arque adurit.

Ad motum quoque reducuntur animi passiones, quare ex vehementiori animi passione maior quoque agitatio sanguinis, & spirituum fit, vnde maior calor, & deterior biliosi succi differentia suboritur: Qui igitur simpliciter in iram excurrunt moderate calefiunt, qui uero extra limites rationis exandescunt possunt ob tam concitatum motum adeo incendio flagrare, vt ad æruginosæ bilis generationem perducantur.

Merores, & mæstitiæ quoque calefaciunt, sed non, vt ira, quoniam, vt dicit Gal. primo de differentijs feb. 3. ira calefacit, tum quia incendit natium calorem, tum quia cum impetu mouet spiritus, ad differentiam tristitiæ, quæ solo motu concentrando spiritum calorem excitat, & ad differentiam perichariæ seu nimij gaudiij, quod diffundendo spiritum ad circumferentiam calefacit, omnia igitur animi pathemata ratione motus calefaciunt, & disponunt ad bilis generationem, hac lege tamen seruata, vt ex passione vehementiori, nisi alia obstant signa, malignior differentia biliosa semper confurgat.

Vigilia, quia in perenni motu detinet spiritus, auget calorem, & quo diuturnior erit, eo acutior gignetur bilis; Hinc docet experientia propter vigilias fieri rubras vrinas.

Denum est exercitium, quod, si non fuerit immoderatum, numquam æruginosam bilem colliget.

Ecce igitur, quod ex coitu, animi passionibus, vigilijs, & exercitio secundum magis, & minus à naturali statu recedentibus (nisi alia obstant signa à cæteris fontibus depronenda) nos facillè colligere possimus, an humores biliosi sint adulti, & æruginosi, & an flauis, vel vitellinis

tellini coloris; flauus enim & vitellinus color, vt ostendimus superius, non supponunt adustionem, sicuti porraceus, & æruginosus.

Post mortum alię res non naturales pertinentes ad vicinitatem seu adhaesum rei calide succedunt: & in primis ab anni tempore calidissimo, veluti ab aere estiuo prout magis, vel minus seruiore participat, viscera disponuntur ad biliosos succos magis, vel minus perusos.

Similiter à regione feruida corpora disponuntur ad morbos biliosos.

A constitutione, dum aer æstiuus non fauonius, sed potius ventis australibus perflatur, vbi à tergo montes septentrionales arcent ventos salubres.

Insuper ab hypocaustis viscera redduntur prona ad generationem adustorum humorum.

Demum à balneis, vnguentis, & medicamentis ob contactum adeo iniquę viscera premuntur calefaciendo, & comburendo vt aliquando ex ijs maximę adusta bilis generetur.

Postremo inter externarum causarum calidarum censum est alimentum calidum quod calefacere potest bisariam, per se, vel per accidens; per se dum homines in aromatis delinquant, vel in esu dulcium, quę in bilem vertuntur, dum permeare non possunt vt notat Galenus 6. de morb. vulg. comm. 5. 14. & Gal. 2. de fac. nat. 8. quod dulcia, vt mel in iuuenibus vertantur in bilem: in senibus verò in sanguinē. Vel calefaciūt valde, vel dū calices neri acissimi integros exhauriunt; per accidens dum cibus crassissimis, & viscosissimis vescuntur, qui magnas faciunt obstructions, vel dum obsonijs obruntur, & se se assiduis comessationib. tradunt, ob quos errores incidunt in tales obstructions, vt calor natiuus vel maximę exardere incipiat: verum quia iuuenes magis delinquant in victu, quam senes: idē magis egrotant: Idem dicit Gal. 2. aph. 39. quod, quia senes in victu prudentiores, propterea rarius quam iuuenes egrotare: per accidens quoq; calefaciunt edulia ingesta, & infarcta, quę sua natura frigidi sūt temperamentum, vt cerasapoma & reliqua id genus putredini obnoxia, hæc enim, dum corrumpuntur, & putrescunt, pri-

scam suam temperaturam relinquunt, & aliena calida, & acri induuntur.

Hipp. 3. de ratione victus in acutis 39. & 3. de fracturis circa finem dicit aquam potam aliquando corruptam, & verti in bilem, vnde alui fluores, unde calor iccoris insignis febriorum.

Hinc Galenus libro de const. art. med. c. 14. uidens Medicos plures errare, quia non distinguunt quę per se, ab ijs, quę per accidens calefaciunt, admonet nos ijs verbis, spectabit ad medicum ne in eum illabatur errorem, in quem, qui putant frigidam aquam in omnib. quę refrigeratione egent, conuenire, & calidam in ijs, quę calefactione; ignari ex accidente fieri sæpē, ut frigida calefaciant, calida uerò refrigerent.

Per accidens dum alimentum calefacit, quatenus adeo perexiguum est, ut ob inopiam, uel inediat calor accendatur, & accensus depopuletur humidum proprium; unde Hipp. 2. de ratione vict. tex. 30. dicit inediat accendere calorem, & bilem reddere amariorem: secundum sect. aphorismorum 22. inediat biliosis febrem asserre; & Gal. aduersus Erasistratum dicit, inediat eliquare carnes, reddere homines biliosiores, & omnia excrementa facere actiora, & maligniora; & 8. meth. c. 2. inediat microcholos interficere quare perexiguū alimentum potest per accidens biles varias facere: nos uerò ex maiori, uel minori inedia colligere possumus biles magis, uel minus adustas.

Ecce igitur, quod ex alimento per se, uel per accidens secundum magis, uel minus agente colligere possumus viscera, multum, uel parum recedere in calore à naturali statu: & modò esse disposita ad generationem flauæ, modò vitellinæ, & modò æruginosę bilis.

Præcognitis his principiis, unde calores in viceribus generantur, debemus in primis quolibet propositum fontem in qualibet occasione contemplari, & uidere, an unus alteri consentiat: quoniam, si (exempli causa) aer esset calidus, & cibus frigidus, tunc vix bilis gigni posset, nisi esset crassus, & viscidus, qui obstruendo per accidens calefaceret: propterea Galenus 2. ad Glauconem cap. 10. dicit, non solum concurrere in generatione atris, & calidi

calidi succi cibum crassum, verum etiam aerem feruidum; habet enim hæc verba : „ In Alexandria elephantico morbo plurimum corripuntur propter victus modum & regionis feruorem : At in Germania, Myſia, & apud Scythas, vbi lac, cochleas, & cætera crassissima obſonia comedunt, nunquam ferè apparuit elephanticus affectus, quia aer gelidus non permittit, ex crassis edulij fieri atrum, & calidum succum, quare non ex aere, vel ex alimento tantum, sed ex vtriusque simul certitudinem habebimus, quod genitus sit humor proportionatus causis externis non naturalibus : Si verò aeri, & alimentis motum adiungemus, maiorem adhuc cognitionem ab ijs externis colligemus.

Verum ob quos errores in sex rebus non naturalibus commisos disponantur corpora ad febres malignas, siue ad generationem bilis adustæ, & æruginosæ, res est satis difficilis; quoniam aliquando videmus hominem debilem coitu, vel alia causa non naturali abuti extra rationis limites, attamen in illo non aduri humores, non fieri æruginosos, atros, vel porraceos, & per consequens illos non disponi ad malignas febres, quæ (nisi me fallat opinio) ex maxima humorum adulatione procedunt : ex alia parte videmus hominem fortem, eumque temperaturæ optimæ ob similes errores illico disponi ad æruginosæ bilis generationem, & per consequens ad malignas febres.

Credimus igitur nos, hæc deterrimam dispositionem vialignæ febris in hominem fortem promptè intromitti à procataceticis erroribus propter duos errandi modos, quorum primus est, dum in rebus non naturalibus delinquit non in vnioco tantum genere, sed in pluribus, scilicet in cibo, & potu, venere, exercitio, & animi passionibus: exempli causa, si quis erraret in potu tantum nullo in cæteris procataceticis errore commissio, natura ab vnioco hoste tantum vexata facile posset eum evincere, & prima illa erroris vestigia corrigere, si verò à pluribus errorum generibus premeretur, sæpè calor, & malignitatis vestigia tam altas figerentur, ut, ut corrigi vix possent.

Secundum, & præcipua occasio malignarum sibi um à procataceticis orta est,

Sanctory Sanctory Pars I.

quando committuntur errores in illis rebus non naturalibus, quæ motibus contrariis premunt naturam; nihil enim magis vexat, quam illud, quod violenter agit & nihil est nobis violentius contrariis motibus eodem tempore factis: Atque tenet somnum statim à sanguinis missione esse quieti contrarium; quia phlebotomia ducit humores ad exteriora; somnus verò ad interiora, & fieri in visceribus confractionem ob motus oppositos: causæ, quæ propositis motibus torrent viscera, & ad dolosum affectum hominem perducunt, sunt, ut exemplis declaremus, velut dum quis patitur eodem tempore aerem calidissimum, & mæiores animi; oppositio, vel contrarietas consistit in hoc, quia aer feruidus ad circumferentiam, mæiores verò ad centrum pellunt spiritus, & sanguinem; unde ob motus hos contrarios non solum ardor in sanguine excitatur, verum, quia cum mæiores calefaciant pellendo ad centrum, dolosus, & malignus affectus suboritur.

Similiter aeri calidissimo, si cibus copiosissimus adiungatur, violentius aget, & dolosè, violentius, quia non solum aer calidus violenter incendit viscera, verum etiam cibus copiosissimus, dolosè, quia cibus copiosissimus non permittit, ut calor effundatur ad externas partes, sed occultetur in viscerum latebris, dolosè agat & violentem naturam opprimat.

Similiter sibi contrariantur aer æstiuus, & somnus nimius: hæc mihi videntur esse causæ, quæ disponunt ad malignissimos morbos.

Errores tamen in illis procataceticis, quæ sibi non aduersantur, non faciunt malignas febres, sicuti aer æstiuus, & coitus, quoniam ambo ad circumferentiam calorem pellunt, possunt tamen coitus nimius, & aer feruidus ardentem febreem moliri, sed non malignam, nisi error contrariæ motionis adiciatur; ratio est, quoniam aer æstiuus aperit meatus, mouetque ad cutem calores, & coitus agitando propellit ad exteriora accensos, & perustus humores: quare affectus ab ijs prodicens erit apertus, omnibus conspicuus, & nequaquam dolosus, uel malignus.

Pari modo errores, qui sunt ob aerem æstiuum, exercitium, & ob vigiliam im-

Q3 mo

moderatam facere possunt valetudinem apertam, & omnibus notam, & nequam dolosam, & malignam.

Errores tamen prodeuntes ab ijs causis pellentibus calorem ad circumferentiam coniuncti cum ijs, qui concentrant, vt sunt maiores, & mæstitiæ in tam imis, & profundis partibus collocant tanti caloris focum, vt febris, quauis sit malignissima, non cognoscatur, uel percipiat ab astantibus, quia natura non potest eam flammam dissipare, & ad externas partes pellere; hoc tamen non eueniet, si cõiungatur cum ira, uel cum pericharia, quia animi passionibus sepe aperte calefaciunt, quoniam à centro auocant calorem.

Ad eundem modum cæteræ non naturales causæ, quæ contrarijs motibus sibi aduersantur, hostilitatis arma occultant, sicuti est coitus insignis & usus ciborum copiosorum, coitus enim calefacit auocando, cibis uerò ad intus trahendo calorem.

Similiter coitus, & maiores, exercitiū nimium, & cibus copiosus; uigiliæ, & cibus copiosus; aer frigidus, & uigiliæ; ac feruidus, & nimius somnus eadem ratione sibi aduersantur; quare si in aliqua magna febre inueniamus errores non naturalium causarum præcedit uisum esse plures, eosque contrarios, scilicet aliquos mouendo ad circumferentiam, aliquos uerò ad inas, & profundas corporis partes calorem, facile poterimus colligere febrem ingentem, & dolosam feruire; etenim maligna seu dolosa hæc febris non ab expanso, sed à concentrato calore generatur.

Demum si ab extrinsecis ijs causis non consequamur cognitionem omnibus numeris absolutam, sed adhuc pendeat animus, tunc uirtute syndromes signorum desumptorum ab illis antecedentibus, & consequentibus, quæ necessario in humoris productionem conspirant, uel rem genitam consequuntur, omnem ambiguitatem euellere poterimus.

Ut biliosi succi innotescant per syndromen signorum desumptorum à dispositione patientis, & à morbis. Cap. III.

Sequitur, ut post causas procatacticas, examinemus dispositiones patientis,

facile enim in ægrotates colligi potest bilis peccans, si fuerit dispositus ad generationem biliosorum excrementorum. Signa igitur, quæ indicare poterunt hanc corporis dispositionem desumuntur ab antecedentibus, & consequentibus.

Antecedentium igitur dispositionum quinque sunt fontes seu loci, à quibus possumus depromere, an patiens sit propensus ad succos biliosos, quorum primus est expendere à quibus parentibus ille ortus sit, quoniam parentes ut plurimum generant filios sibi similes; si uerò ex parentum dispositionibus aliquid certi non habetur ad alios locos accedimus.

Adest secundus locus, qui est ab ætate, ætas enim iuuenilis, & consistentiæ est magis apta ad bilem colligendam, & gignendam, quam senectus.

Tertius locus consistit in habitu corporis, continetque sub se tres locos, quorum primus est habere corpus macilentum, & gracile; abdominis enim, & cæterarum partium gracilitas arguit bilem.

Secundus est habere uenas latas, nam Galenus libro de art. med. capit. de signis calidi hepatis dixit, uenas latas calorem ostendere, & contrarium uenas exiles.

Tertius locus desumitur à physiomicis, quia illi, qui habent frontem rotundam, habitum sortiuntur talem, ut ualde sint accommodati ad bilem colligendam; oculi nigri ex Auer. caliditatem, & bilem indicant; Galenus uerò & Arist. referunt colores oculorum ad copiam, & paucitatem humorum. Auicennas ad uiam uariè coloratam.

Quartus locus sumitur à uirtute, quia si æger sua natura est fortis optimique uiribus confirmatus, & prolabitur in ægritudinem, ut plurimum causa est bilis.

Quintus locus declarans manifestè, quando corpus est dispositum ad biliosos affectus, quique est omnium certissimus, desumitur à suppressa, & internissa aliqua biliosorum succorum euacuatione: illico enim si quis, post suppressam euacuationem cõsuetam bilis per aluum, uel per uomitum, cadit in morbum, dicimus bilem esse illius affectus causam.

A con.

A consequentibus quoque colligimus signa corporis dispositi ad bilē, & quinque desumuntur loci, scilicet ab Actionibus animalibus, Vitalibus, Naturalibus. Ab excrementis retentis, vel exeuntibus, & à qualitatibus cælibus.

Actiones verò animales ostendentes corpora accomodata ad congerendam bilē sūt nō esse somnulosos, sed vigiles.

Quinimmo per somnum loquuntur, gradiuntur, & officium vigilantii exercent: Galenus secundo de motu munitorum quarto dicit, se somno oppressum integrum ferè stadium dormiendo confecisse: neque à somno fuisse excitatum, priusquam in lapidem inpegisset: isti noctambuli dormientes omnia audent, intrepidè tecta ascendunt per trabes, & adeunt periculosa: quia imaginatrix vaporibus biliosis obruta pericula nō agnoscunt: quia nō adest obiectum sensus, sed tantum motus, vt in phreneticis qui omnia audent, ex his colligimus domiari bilem.

Similiter dicit leui data occasione siti vexari, esse mutabiles in sententia, esse ingenio celeri, ab inedia, & ieiunio adeo lædi, vt venter, caput, & totum corpus bile facile impleatur: in somnijs ignem, combusta, cades, fulgura, arina, lites, & prælia sibi offerri, & deum agile esse in motu.

Vitales verò erunt tales, vt in iram præcípites ferantur, & in venem suut furiosi, sed hac conditione, vt illud post factum sint penitentes; & postremò pulsus habeant veloces.

Naturales autem actiones, & præcipuè expultrices irritare significant biliosum hominem: hinc dicunt medici, cibum in stomacho biliosorum non esse molestum, & ratio huius est, quia bilis promptè omnia excrementa expellit, nec non etiam ventriculi pituitam abstergit, & purgat, aliaque id genus possent observari in actionibus naturalibus, quæ bilis dominium ostenderent: pauca tamen sufficiunt, quia hic non de actionibus naturalibus agimus, sed solum de methodo cognoscendi humores latentes.

Ab excrementis quoque idem sæpè colligimus, etenim si aures bilioso excre-

mento abundant, coniicimus biliosum esse naturam; si videbimus corpus carere excrementis, carereque salua, idem colligimus.

Deniq; à qualitatibus tågibilibus, si in manibus & toto corpore obseruabimus calorem mordacem, colligimus aliqua ex parte homines esse ad biliosis affectus propensos: dicimus aliqua ex parte: quia ex Gal. 2. de temp. cap. 6. ex temperatura vnius partis non colligitur temperatura totius: addit Galenus ostreorum cutis est siccissima & ostreorum corpus humidissimum.

Alia præterea sunt signa biliosorum succorum, quæ potius conueniunt biliosis affectibus præter naturam: de quib. paulo infra, quoniam hic solum, quæ ad dispositiones corporum spectant tractare ab initio pepigimus; volumus enim à quolibet horum propositorum fontium, saltem vnicum signum colligere, illudq; deinde coniungere cum alijs signis depromendis à præcatæcticis, à morbis, à symptomatibus, à loca. & à iuuantibus, & lædentibus: quia horum signorum syndrome certò demonstrabit, an peccet bilis: quomodo verò biliosorum succorum differentia cognoscatur, dicimus quod signa potentia, & minus potentia bilem magis vel minus effrenem indicent.

Expensis locis pertinentibus ad externos errores, & ad vitærum dispositiones, nunc animum ad morbos conuertimus, & deinde ad alios fontes, quippe qui si non dissentient, tam certò cognoscemus biliosos succos in penitissimis partibus residere, perinde ac propria inspectione ipsos videremus.

Morbis igitur varijs sunt, qui apertè indicabunt humores calidos latere, sicuti sunt intemperies admodum calidæ, quæ si erunt feruentes, maligniores indicabunt biles, hinc *καυροι* & ardentissime intemperies bilē non stauam, vel pallidā, quia hæc inter limites naturales continentur, sed vitellinam, vel porraceam indicabunt, dicimus prius vitellinam, quia à vitellina incipit affectio præter naturam vt dicit Galenus 2. de fac. nat. 9. si verò hæc febres acutæ erunt mali moris, colligimus bilē æruginosam altas habere radices,

ces, quia maligni, & dolosi affectus non possunt fieri sine aduisione, neque aduisione in humoribus biliosis sine æruginē, ut experimentis probauimus in libr. præcedenti cap. de coloribus.

Insuper ex uelocitate morbi, & ex periculosius conijcimus biliosos succos esse causas morborum: superius enim non solum declarauimus motum de tertio in tertium ostendere bilem, uerum etiam motus ueloces principij, uel auguenti; quandoquidem Galenus loquens de Philisco habet hæc uerba: ubi tertius, & quartus dies habent grauius symptomata, citò expectabis iudicium, ergo ex sola principij uelocitate possumus, colligere uelocitatem totius, atq; ex uelocitate totius, morbum esse acutum, & inde humorem esse tenuem, & biliosum.

A determinatis quibusdam horis, ueluti si morbus moueatur in meridie, erit bilis.

Ab obstructione uisceræ fellæ, ualet enim est icteritia, ergo peccat bilis.

Ab inflammatione membranarum, ualet est pleuritis, ergo bilis quoniam densitatem membranæ alij humores non penetrant, nisi biliosus sanguis, qui tenuis est, hæc est ratio, cur Hippocrates dixit, qui acidum eructant, non fieri pleuriticos, in ijs enim sunt crassi humores, qui tunicas, uel membranas penetrare non possunt.

Ab inflammatione sine tumore, & prædere bilem peccare colligimus; hinc ualet est herpes, in quo affectu nec tumor apparet, nec pondus per sentitur, ergo peccat bilis, eaque syncera, & non mista cum ichore sanguineo ad differentiam erysipelas, quod, ut dicit Galenus libr. de tumoribus præter naturam cap. 10.) fit non a bile syncera, sed mista cum ichore sanguineo, qui lenē aliquod pondus facit: ualet quoque est erysipelas legitimum, ergo est bilis mista cum ichore sanguineo sine tumore, & pondere; est erysipelas phlegmonodes, ergo erit bilis mista cum sanguine, facietque tumorem, & pondus; dicit enim Galenus lib. de plenitudine cap. ultimo, quod sola bilis nec tumorem, nec pondus producit, quia antequam tumorem, & sensum ponderis faceret, exulceraret, & herpetem excitaret.

Demum ualebit quoque hæc, est phrenesis ergo bilis peccat, eaque syncera, & non mista, ut placuit Galeno cum ichore sanguineo; dicit enim 3. de loc. aff. 7. quod phrenesis exquisita fit a bile syncera.

Nec tamen est obijciendum, bilem synceram erodere, & propterea non posse phrenitidem facere, quia sequeretur hoc inconueniens, quod erosio membranis cerebri, nemo phrenitide euaderet.

Occurrimus bilem synceram non habere hanc erodendi potentiam in partibus internis tum ob maximam raritatem partium per quas syncera bilis transit sine erosione, tum ob robur internarum partium. Hæcque est causa, cur allium cuti externæ applicitum erodat, comestum tamen non erodat uentriculum, sed nutrit.

Colligas ergo, quod a morbis octo scaturiant loci, qui docere nos possunt, an peccet bilis, quique data qualibet occasione occulti humoris biliosi sunt examinandi, primus est desumptus ab intemperie admodum calida, & sicca; secundus a malignitate febris: tertius a typis tertianarijs; quartus a uelocitate temporum morbi; quintus ab horis meridianis, sextus ab icteritia; septimus ab inflammatione membranarum; octauus, & postremus ab herpete: ab ijs igitur signa colligere poterimus, quæ cum alijs unita certam syndromem pro cognoscendis biliosis succis in corporis latebris existentibus facient.

Si biliosi succi præcognoscantur per syndromem signorum communium desumptorum a symptomatibus, locis affectis, & inuuantibus, & ledentibus. Cap. IV.

A Symptomatum sylua depromimus quoque uarios locos a quibus colligere possumus biliosorum humorum dominium; quot enim erunt symptomatum genera, tot erunt loci ex quibus præceptionem colligere ualebimus pro cognoscendis noxis, & peccantibus humoribus. Genera symptomatum sunt læsæ actiones animales, uitales, & naturales, deinde sunt immodicæ excreta, uel reiecta, & demum qualitates inuatae: ad quæ genera omnia symptomata, quæ animalibus contingunt,

re possunt, reducuntur: & ab ijs sæpè colligimus certa signa peccatum humorū.

Experiamur in primis, an possimus à symptomatibus rectricum facultatum cerebri cognoscere aliquam particularem differentiam biliosorum succorum scire; est enim Galeni sententia secundo in primum Epid. 17. vbi peccat bilis, ut in ardentibus febribus, & alijs plerisque affectibus humores extolli ad caput, & inde è naribus profluia sanguinis, & deliria suboriri, delirium ergo, quod est symptoma in actione animali principe deprauata ostendere poterit bilem peccare.

Audias deinde, quomodo ex varijs delirij conditionibus varias quoque differentias biliosorum succorum colligere possimus, an ne, si phreneticus habuerit exandescentiam cum studio, in eaque perseverauerit sine fletu, & sine ferina desipientia, tunc dicere poterimus cum Gal. illam bilem peccare, quæ neq; omnino aucta, vel putrida sit? si verò incipiat habere exandescentiam cum fletu, an ne dicemus tunc peccare illam atram bilem, quæ est putrida? quia fletus melancholiam, studium verò melancholiam putridam peccare indicat, si verò fletu adiungatur, ut phreneticus velit perire, tunc credi quod omnes, qui ingrediuntur cubiculum, sint hostes, tunc haud dubie peccabit atra bilis aucta, & non putrida, quia quatenus est putrida, non est ferina, & aucta, de qua ferina desipientia Galenus primo prædict. comm. 25. abundè loquitur.

Præterea, si ægrotantes sine aliqua tamen desipientia hoc tantum habeant, ut magis, quam antea, loquantur, & non labantur in alias maiores desipientis, signum est bilem peccare, verum non putridam: quia hæc parit exandescentiam cum studio, non auctam, quia hæc ferinam desipientiam inducit; peccabit ergo flaua, seu vitellina bilis: non putrida, quia maiora symptomata faceret; non aucta, quia hæc duæ species, quæ seruant colores flauos, & vitellinos, non sunt auctæ, ut ostendimus superius: moderata itaque symptomata ostendent flauam, paullo maiora vitellinam, vehementiora vero ætuginosam, vehementissimam

atras biles significabunt.

Quod verò multum loqui ostendat bilem, legi potest Galenus 3. in tertium Epid. comm. 86. vbi habet multum loqui esse phreneticorum, tacere verò melancholicorum, immo Galenus loquens ibi de vxore Dealeis, quæ aliquando multum loquebatur, aliquando perpetuò tacebat, dixit delirium illud fuisse mistum ex bile, & melancholia.

Similiter ex alijs functionibus animæ libis læsis pertinentibus ad imaginatricem facultatem aliquid in perquirendis humoribus colligere possumus, quoniã, si de somnijs loquamur, conspicua, & ignita somnia: ut primo in primū prædic. 5. humores siccos, & calidos significant, aquea uero pituitam: Similiter, si aderit uigilia morbofa, statim inferimus bilem, nisi obstitierint aliorum fontium signa, namque Gal. 1. de morb. uulg. 3. com. 23. dicit, in Cleonactide uomituum fuisse, biliosum: licet fuerint alia signa, quæ magis potuerint ostendere peccare pituita, fuit enim insomnis, non sitiuit, nec cibum abhorruit, quæ certum dominium pituitosi succi ostenderunt.

Nos uerò ex contrarijs colligemus bilem ex uigilia nimirum, siti, & inappetentia, Hinc Gal. de inappetentia loquens primo de morb. uulg. loco citato habet, a bile redundante fastidiosi, id est inappetentes & appetitu carentes; de siti uero loquens tertio in tertio Epid. 31. & 46. dicit, quod sitis, quæ sedari non potest, ostendit exurentem caliditatem, quæ necessariò à bile exurente prodibit.

De uigilia loquens Gal. 2. de loc. aff. cap. 9. citat casum pueri, qui cum liberaliter uinum antiquum bibisset uigil reliquo tempore permansit, postea febre correptus unà cum uigilijs perit delirio. Ecce quod ex uino meraco fit uigilia, ex uigilia bilis, ex bile febris, & delirium & ob delirium mors: uigilia ergo est de genere signorum ostendentium bilem.

Quare ualebit consequentia (nisi alia signa, ut sæpè diximus ab alijs fontibus collecta, ijs reluctentur) est sitis, uigilia & inappetentia, ergo bilis peccat.

Postremo sunt quoque symptomata pertinentia ad sensum tactus, quæ bilem indicabunt, ut sunt dolores mordicatiui

capitis, intestinorum & aliarum partium, suntque puncturae narium, ex quibus signis colligimus peccare bilem.

Insuper ex actionibus vitalibus bilem prædominari colligimus, sicuti dum Gal. 3. de diff. respir. cap. 10. & alibi dicit pulsus duriores bilem indicare: ratio est, quia bilis dum peccat peruat membranas, quas cæteri humores penetrare non possunt, membranae imbutæ hoc succo tenduntur, unde arteriæ ob generis sympathiam duritiæ afficiuntur, quare ex pulsu duro, tamquam ex loco proprio colligere possumus bilem.

Deinde si conuertamus mentis aciem ad naturales actiones, Ab alteratrice deprauata conijcimus corpus biliosus succis affluere: Ab expultrice irritata quoque; illudmet inferimus, vt plurimum enim biliosi humores irritant, & pungunt facultatem expultricem; Hinc à rigore febrili colligimus bilem peccare, quia rigor significat materias biliosas per partes sensu præditas expelli ad differentiam frigoris, quod ostendit pituitam, & hororis, qui ostendit melancholiam.

Nec mihi obijciant: Galenum 2. de diff. feb. 3. dicere rigorem aliquando fieri à pituita acida.

Quia respondemus, rigorem ab acida pituita fieri sine febre, & caloris consecutione; Hinc Galenus loquens de vxore Epicratis obseruauit differentiam inter rigorem biliosum, & pituitosum; dixitque in ea muliere fuisse rigorem sine caloris consecutione, quia erat crudis, & viscosis excrementis obfessa, vt solum valeant consequentia hoc modo limitata, est rigor cum caloris consecutione, ergo bilis; est rigor sine consecutione caloris, ergo pituita acida, & crudus humor.

Ab excrementis excrementis varios locos colligimus ostendentes bilem, in primis ab vrina rubra, & flammea coniecturam facimus, corpus biliosus succis scatere: Ab excrementis quoque affectuum externorum veluti si in tinea, vel simili affectione, quod egreditur, est pallidum, bilem peccare colligimus, vel si in porrigine materia surfuracea decidens sit raddida statim bilis indicatur, ad differentiam porriginis à melancholia prodeuntis, in qua summa siccitas obseruatur.

Si vero spectemus qualitates mutatas, se offert flauities in albo oculorum, vel in adnata, unde dominium bilis illico inferimus; si amaritudinem in ore egri perferant, credendum est bilem esse in ventriculo.

Præterea si ægotantes in morbi limine habeant faciem coloratiorem, quam dum sanitate fruebantur, conijcimus bilem esse in sanguine, quia Galenus & Hippocrates 2. prædict. 14. habent, quod facies coloratio febrientium, vel mineatur sanguinis profluuio è naribus, vel ab alijs partibus, vel abscessum post aures vel denum aliquam capitis inflammationem; quæ affectiones præcipue à bile prodeunt.

Denique ex tactu, si permagnum senties calorem in corporis periferia, bilem colliges, si verò in hoc signo, vel in alijs læstas, illa castigare, & roborare poteris. facta contemplationem in signis aliorum fontium, sicuti (vt exemplis illustremus) si tactu obseruemus in corporis periferia maximum esse calorem, an ne hoc signum est de illis, quæ possent nos fallere? maxima enim caliditas obseruatur quoque in pituitosis, & in hæcticis febribus, quare ut difficultas dirimatur, confugas ad primum fontem, & videas, an causa procacitæ, vt cibis, potus, aer, & aliæ præcesserint calide, quia ex ijs non febrem pituitosam, sed biliosam colligere poteris sed hæc non sufficiunt, ideo sunt consideranda signa in secundo fonte contenta, ibi enim, si videris ægrum non esse macilentum, vel antequam in ægritudine prolaberetur, aliquam bilis euacuationem fuisse supreflam, tunc firmiter colliges, calorem illum tactu perceptum non a pituita, neque a febre hæctica, sed à materia biliosa pendere.

Tandem cognito, causam antecedentem esse bilem; colliges eam esse flauam, si mitiora fuerint signa: vitellinam si validiora, eruginosam si vehementiora.

Quintus tons consistit in cognitione locorum affectuum; hæcque cognitio, vt dicit Galenus in limine librorum de loc. aff. solum ab exercitiis in dissectionibus comparatur; secundo enim singulas corporis partes optimè obseruare possumus, quæ lædantur à pituita, quæ à bile, & quæ à melancholia.

Qua-

Quare sicuti de glandulis loquētes ob-
servauimus ob substantiæ raritatē gland-
ulas esse domicilium pituitæ, & à pituita
præcipuè lædi, eadem ratione membra-
næ, cum ob suam densitatem difficile ab
humoribus crassis, & viscosis penetren-
tur, si sint lætæ, eas non à pituita, vel me-
lancholia, sed à bile, quæ ob eius tenuita-
tem habet maximam penetrandi virtutē,
lædi dicemus, hoc enim est præcipuum
fundamentum, cur Hippocrates, & Gale.
6. aphorismorum 33. dixerint pituitosos,
vel illos, qui acidum eructant, non fieri
pleuriticos.

Nos verò addimus quoque pituitosos,
& melancholicos, quatenus tales sunt,
non fieri phreneticos, quemadmodum
enim pituitosi non possunt fieri pleuriti-
ci, quia pituita nō potest peruadere pleu-
ram, eadem ratione non fient phreneti-
ci, quia pituita non penetrabit plam, vel
duram membranam cerebri, quare opti-
mis his fundamentis suffulti semper po-
terimus ab inflammatis membranarum
colligere bilem.

Præterea à locis affectis non solum col-
ligemus, quando peccat biliosum genus,
verum aliqua coniectura percipimus,
quando peccabit bilis flaua, & vitellina,
quando porracea, & æruginosa; etenim, si
ventriculus à bile lædatur, ea erit vt plu-
rimum porracea, quoniā sedes bilis por-
raceæ, vt dicit Gale. est ventriculus; si ca-
put bile lædatur, sæpè erit flaua, seu vi-
tellina, quia caput ob suam frigiditatem
æruginosam bilem non patitur, si ventri-
culus lædatur bile, sitq; animi deliquium,
febris maligna & delirium, sequitur bilē
esse æruginosam; sed quoniā hanc speci-
ficā humorū differentia coniectura tan-
tum colligimus, ideo erit opus, vt virtute
signorum aliorum fontium contingen-
tiam, & probabilitatem expurgemus.

Postremo à iuuantibus, & lædentibus
cognoscemus antecedentes, causas, quo-
niam, sicuti quando iuuant calida, &
seca dicimus humores esse frigidos, &
pituitosos; Similiter dum iuuant frigi-
da, & humida, dicimus calidos, & bi-
liosus in corpore peccare; Ex Hippocra-
te secundo de ratione vict. 33. habemus,
ieiunium biliosus nocere; valebit ergo
hæc consequentia, nocet huic ieiunium,

ergo dominatur bilis.

Similiter Galenus 6. de morb. vulg. 3.
tex. 28. dicit, quod biliosi paucitate cibi
audaugent sitim, & lassitudinem, pituito-
si vero eadem cibi paucitate tollunt si-
tim, & lassitudinem, valebit ergo hæc
consequentia, Socrates cibi paucitate in
sitim, & lassitudinem procumbit, ergo est
biliosus succis refertus.

Denique ex Gal. habemus 3. de ratio-
ne vict. 38. quibus amara bilis exuperat,
acetum prodest, ab ipso dissoluitur. & de-
generat in pituitam; valebit ergo, iuuat
acetum, ergo erit biliosa natura; posui-
mus hunc fontem distinctum ab alijs,
quamuis in alijs contineatur, quia eo vte-
mur, perinde ac esset in hac inquisitione
alter lydius calculus, imitabimur Aurifi-
ces, sicuti illi, vt aurū perfectè experian-
tur, ad ignem, sic nos ad omnes propo-
sitos fontes confugimus; sicuti illi, dum si-
ne ignis labore illicò aurum calculo prob-
bant, sic nos dimissa altiori inquisitione
virtute huius fontis probamus, an pec-
cent frigidi, vel calidi humores.

*Quomodo pituitosorum humorum diffe-
rentia cognosci possint per syndromem
signorum communium à rebus non
naturalibus desumptorum.*

Cap. V.

EAdem methodo est perquirenda syn-
drome, quæ possit nobis manifesta-
re pituitosos succos; Famosa differentia
apud Galenum 3. de loc. aff. 7. & libello
de plenitudine sunt quattuor, pituita dul-
cis, salsa, acida, & vitrea; vnde verò quæ-
libet fiat, dictū est in libro superiori cap.
de saporibus & dicitur in sequenti; Quo-
modo autem humor phlegmaticus, dum
in absconditis partibus delitescit, nul-
lumque proprium sui sensum exhibeat,
inquiratur, supra quoque docuimus, di-
ximusque sex esse fontes, vel locos com-
munes, qui nobis possunt indicare dif-
ferentias pituitosorum succorum exis-
tentium in penitissimis corporis parti-
bus.

Primus fons continebat sex res nō na-
turales refrigerates; vt igitur rectè scia-
mus, quænam sint, confugiendum est ad
Galenum lib. de causis morb. cap. 3. vbi re-

ferre omnes causas refrigerantes ad sex capita; inde enim omnia huic contemplationi conferentia colligemus: In primo cap. collocat adhæsius vel vicinitates omnium refrigerantium: in secundo ciborum, & portionum quantitatem, vel qualitatem: in tertio stipationes validas in foraminibus: in quarto rarefactiones nimias: in quinto ocium: in sexto motiones vehementes & immodicas.

Verū, quia nostrum est in hoc loco de causis externis refrigerantibus loqui, ideo ex ijs à Gal. propositis eligemus tantum quatuor capita, ad quæ omnes causæ externæ refrigerantes disponentes corpora ad pituitæ generationem, reduci possunt, suntque; vicinitas refrigerantium, ciborum & potuum quantitas, & qualitas, ocium, & motus immodicus; ex ijs igitur colligemus, quando corpora crunt magis, vel minus disposita ad varias pituitosorum succorum differentias; etenim quāto vehementiores refrigerantes causæ præcedentes, tanto magis indicabunt corpus esse dispositum ad frigidiores pituitas; frigidissimæ enim causæ externæ disponent corpus ad pituitam vitream, minus frigidæ ad acidam, adhuc minus frigidæ ad inspidam.

His positis, expedit (si velimus causas refrigerantes cognoscere) distinguere quæ refrigerant per se ab ijs, quæ per accideos; dicit enim Galenus lib. de cons. ar. med. c. 14. quod sæpè frigida per accidens calefaciant, & calida refrigerent: habetque hæc verba, „spectare ad medicum ut rectè videat, ne in eum illabatur errorem, in quem qui putant frigidam aquam in omnibus, quæ refrigeratione egent, convenire, subdit, quia sæpè frigida ex accidenti calefaciunt, & calida refrigerant.

Dicimus itaque positivè, & per se duas solum ex propositis causis refrigerare, alimentum videlicet frigidum, & adhæsum corporum frigidum: ocium verò, motum immodicum, & reliqua paulò post afferenda ex accidenti: ocium tamē suffocando, motumque immodicum resolvendo calorem refrigerare: omnia enim, quæ ex accidenti habent vim refrigerandi ad duo hæc capita solum reducuntur, ad suffocantia, & resoluentia.

Ad calorem suffocantia, præter ea, quæ

enarrata sunt, alia reducuntur, ut nimia stipatio, nimia quies, vel ocium, nimia coitus abstinentia, nimius cibus, & nimius somnus, ab ijs igitur tanquam à quinque locis indicantibus suffocationem caloris colligemus viscerum refrigerationem, & per consequens dispositionem ad generationem pituitosorum succorum.

Quòd igitur nimia stipatio ex accidenti refrigeret, declarari potest cibani exemplo, etenim in cibano, nisi esset aliquod foramen apertum, unde flamma reuiresceret, per suffocationem extinguiretur, & inde ex accidenti refrigeraretur.

Ocium quoque, vel quies ad calorem extinguentia, & suffocantia reducitur, ratio est, quoniam ex quibus principiis constamus, per illa quoque conservamur; calor per se trahit originem à motu, per motum ergo debet conservari; quare cum quies, vel ocium opponatur motui, ocium erit causa frigoris quatenus reddit partem viuentem priuatam motu, & euentatione.

Hinc quoque; nimia coitus abstinentia, quatenus tollit animantibus motum salubrem, impedit ne dissipentur crassa, & pituitosa excrementa, unde torpores, & sæpè caloris suffocationes sequuntur; quapropter Galenus 6. de loc. affect. cap. 5. dixit, coitus nimiam abstinentiam sex mala posse hominibus inferre, gravitatem nimirum capitis, cibi fastidium, febris periculum, coctionem diminutam, torporem & timorem.

Præterea impensè somniculosi per suffocationem refrigerantur, quia eorum calor ob somnum immoderatum tantum circumfunditur, & obruitur humiditate, ut rectè non possit euentari, & conservari.

Nemum alimentum nimium eo modo suffocat, quo lumen copia olei extinguuntur: ex ijs igitur causis calorem suffocantibus facile colligere poterimus, corpora impleri pituitosis succis.

Ad eundem modum præcedere debet examen illarum externarum causarum, quæ refrigerant, calorem resolvendo: resoluentia calorem sunt nimia rarefactio, alimenta calidissima, motus immodicus, adhæsius corporis calidissimi, nimius coitus, nimia vigilia, & immoderate animi passionēs, ex quibus tanquam à locis per

accidens indicantibus refrigerationes, & pituitæ generationem varias differentias pituitosorum succorum colligemus.

Rarefactio ex accidēti refrigerat, quia calor ob meatus nimium apertos nō potest detineri, quare quanto magis erunt aperti, tanto frigidior pituita fiet.

Alimenta calidissima resoluendo refrigerant, quatenus robur resoluunt, vt hinc Galen. 6. aphorismorum 28. de vino potente loquens habet hæc verba, multa, & potentia vina præcipuè ieiuno stomacho percutiunt substantiam nervosam, eius robur resoluendo.

Itidem vigilæ, & animi passiones potentissimæ, nimius coitus, quæ ad immoderatum motum referuntur, eneruant præteritum calorem, & partem relinquunt frigidam, quia resoluunt spiritus, & calorem.

Reliquum est, vt quæ per se refrigerant sint (vt diximus) alimentum frigidum, & adhærens rei frigida, sicuti est aer gelidus, aqua frigida, & cætera extrinseca, quæ adhærendo refrigerant.

Supponimus hic cum Arist. & Gal. frigus esse qualitatem positivam, & non priuativam, vt perperam sustinuit Hier. Cardanus, cuius sententia duobus experimentis clarissimis infringitur: alterum colligitur ex Gal. lib. de causis morb. c. 3. dum dicit, quod apud Istrum sub dio frigidissimo, nullo aere stante, lucerna accensa à frigiditate illa intensissima extinguitur, quod sanè non eveniret, si frigiditas esset qualitas priuatiua: omnes enim actiones prodeunt eas omnium, consensu à positivis, & non priuatiuis efficientibus: alterum experimentum asserimus nos, est, quia hyeme aliquando vidimus, copiosissimas esse collectas nives, easq; adeo velociter ab ingentissimo superueniente frigore (nullis stantibus ventis) absumi & resolui, vt tam brevi calida constitutio austrina eas absorbere non posset, quod re vera non accideret, si frigus esset solum quid priuatiuum, vt dixit Cardanus: quibus suffulci experimentis merito cum Galeno, & Aristotele locauimus frigus in catalogo causarum posituarum, & per se.

Ex traditis causis externis per se refrigerantibus colligimus duos locos indi-

cantes pituitam, alimētum nimirum frigidum, & vicinitatem, vel adhæsum frigidum corporis, dicere ergo valeamus, præcessit alimentum frigidum, vel vicinitas corporis frigidi, ergo corpus est refrigeratum, & inde facile est, vt pituita sit collecta, sicuti contigit cuidam ob vsum herbarum frigidarum & præcipuè eichoreæ incidisse in cachexiam. Refert Laertius de Heraclito, quod tedio hominum secessisset in montes, ibique vescentem oleribus hydropicum fuisse factum & inde è vinis decessisse.

Quomodo autem differentia pituitosorum humorum colligantur, à Galeno docebimus 3. aph. 12. qui volens ex procatarticiis colligere pituitæ differentias dicit, insipida pituita sit à pauca præcedente frigiditate; nos verò, vt rationi consonum, colligemus pituitam acidam, vt est frigidior, fieri à fortiori: vitream ab ingentissima præcedente frigiditate: alimenta igitur, vel corpora adhærentia si fuerint moderate frigiditatis, insipidam pituitam, si frigidiora acidam, si frigidissima, vitream, quam vocant Praxagoræ, acervabunt.

Similem quoque coniecturam colligere poterimus ab ijs, quæ per accidens refrigerant, quoniam si de valde suffocantibus veluti de maxima potionum, & ciborum ingluvie loquemur, dicemus inde viscosam, & vitream pituitam acervari: si de ijs, quæ non adeo vehementer suffocant; dicemus pituitam insipidam, vel acidam aggregari; diximus ciborum præcedentem ingluviem indicare viscerum calorem esse suffocatum, & inde genitam esse copiosam pituitam; quia copiosum cibum ventriculus, dum nō potest arctè amplecti, & vndeque atterere, & comminueri, illum vertit in rudem & imperfectam pituitam, quæ deinde in mesenterium, & iecur restagnans sanguine imperfectum facit, hic igitur sanguis, si caput, & alias partes petat, vertitur in pituitam modò insipidam, modò vitream pro vt magis, vel minus rudis extiterit chylus; sæpè enim videmus in ijs, qui nimium prolixè indulgere cibis, & potionibus à capite expelli pituitam per nares modò insipidam, modò ponticam, quæ si iugè præcipitio procumbat in pectus, in articulos,

culos, vel in alias partes pro vt varijs vitijs est imbuta, vario etiam modo percussit, & lacerat viscera, quare si pituitæ læsiones fuerint insignes pituitam vitream si moderatiores, acidam, si adhuc mitiores, inspidam peccare coniecimus.

Similiter de resoluentibus dicemus, præcessit motus immodicus, coitus, animi passionēs, & cetera, quæ resoluunt calorem, ergo pituita, verum hac lege seruata vt à diminuto & paucō calore acidā, a minimo & ferè extincto vitrea fiat; causæ enim admodum calefacientes aperiendo & rarefaciendo meatus internos, & externos per accedens partes corporis viuentis refrigerant, quia calor naturalis per expeditos meatus abiit, vnde pituita frigidior fiet, quanto causæ resoluentes fuerint potentiores.

Utsucci pituitosi innotescant per syndromem signorum desumptorum a dispositione parentis, & a morbis. Cap. VI.

EX corpore disposito ad generationem pituitosorum succorum facile colligere poterimus pituitæ dominium; signa harum dispositionum desumuntur tum ab antecedentibus tum à consequentibus: Antecedentium quinque sunt loci indicantes hanc dispositionem, quorum primum desumitur ab hereditate, filij enim orti à parentibus pituitosis, vt plurimum sunt pituitosi, hereditariæque mores animi, & corporis parentum sæpè suscipiunt, quod conseruatur experientia ab auctoritate antiquorum desumpta, apud illos enim (vt refert Plutarchus) tantus erat timor, ne filij morbos parentum reciperent, vt consueuerint plures hac sit. perstitutione natos ex parentibus tabidis præseruare, vt scilicet filij detinerent pedes in aqua, donec mortuus pater combureretur, ne forsam morbus Paternus communicaretur filiis.

Secundus locus consistit in ætate senili vt plurimum enim qui sunt annis obstiti ad pituitosos succos congerendos sunt procliuēs, quia calor ætate illa languescit, vnde alimentū non in sanguinem perfectum, sed in pituitosum succū sæpè cedit.

Tertius locus consistit in habitu corpo-

ris, continetq; sub se tres alios locos, quorum primus est habere corpus obescum, obescitas enim significat crassos, & viscosos stercos congestos esse: secundus locus est habere venas exiles, quæ (vt placuit Gal. in ar. med. vbi loquitur de temp. iecoris) ostendunt iecoris frigiditatem, & per consequens inclinationem ad cōgregandam pituitam, quæ frigida est: tertius locus est phisionomicus etenim ex Arist. qui magnam habent maxillam inferiorem, & ex Auer. qui albos oculos habent obnoxij sunt pituitosis succis.

Hæc signa, quæ petuntur à coloribus oculorum probabilia sunt: de his varijs varia dicunt: Galenus libro de arte med. 27. refert glaucum ad copiam splendorem, & situm. Auicennas, & Vesalius referunt ad vream tunicam vario modo coloratam. Empedocles dicebat glaucum indicare ignem, nigrum aquam. Aristoteles ait glaucum, seu album indicare parum aquæ, & aeris: nigrum multum aquæ: mihi tamen probatur magis Auicennæ, & Vesalii opinio.

Quartus locus sumitur à virtute debili, quia virtus robusta in ægrotate, vt plurimum supercoquit humores, debilis diminutè coquit, & inde congregat pituitosa excrementa.

Quintus locus, qui est omnium certissimus, sumitur ab intermissa aliqua constricta pituitæ euacuatione: etenim, si post suppressam euacuationem pituitæ euacuanda per vomitum, per nares, per aluum, vel per alias partes prolabimur in morbum, illic coniecimus illius morbi causam esse pituitam.

A consequentibus dispositionibus corporis quinque scaturiunt loci indicantes corpus esse propensum ad viscidos humores: scilicet ab actionibus animalibus, vitilibus, & naturalibus, ab excrementis, retentis, vel excretis, & demum à qualitatibus sensibilibus.

Actiones animales ostendentes pituitosam dispositionem sunt esse somniculosi, siti non vexari, deiectumque habere appetitum, nisi fortè pituita acida abundaret, hæc enim comedendi appetentiam excitat æquè, ac melancholia: sed quomodo hæc cognoscatur, ex alijs signis patebit.

Demum ex signis rectricum facultatum cerebri colligitur dispositio hæc pituitosa, etenim, si habeant tardum, retusumque ingenium, illorum capita sunt pituitosa: similiter, si tardè percipiunt, atque præcipuè, dum semel apprehendunt, firmantur in illo, sintque tales, vt ad alia ægrè transeant, sintque diligentissimi, vt sunt Germani, & omnes inhabitantes Regiones frigidas, qui horologia, & multa alia summa diligentia efficiunt, sunt pituitosi.

Postremò, si mores animi spectemus, inferimus, ex paucis, vel nullis moribus pituitam, dicebat enim Galenus. primo de natu. humana. comm. 39. animi aciem à bile: constantiam, & prudentiam à melancholia: stoliditatem à sanguine prodire: à pituita verò nullos mores confirmari: Quare si erunt insulsi, moribusque parentes, inferre poterimus esse pituitosos.

A vitalibus desumuntur hæc signa, vt scilicet non sint in iram proni, neque in venerem furiosi, pulsusque habeant molles, tardos, & suffocatos.

A naturalibus, vt expultrices, & alteratrices suorum munerum officia, tardè expleant, sentiantque; cibum in stomacho sæpè esse molestum: nocturque præcipuè post primum somnum in horis antelucanis cibo adeo ingrauescant perinde ac paullo ante comedisissent, & demum tales à ieiunio summam hauriant utilitatem, quod experientia quoque ostenditur, quia, quod digeritur à bilioso quatuor horarum intervallo, à pituitoso vix octo horarum, cursu concoquitur, bilis enim est humor, qui attenuat, atterit, & promptè expellit.

Ab excrementis, videmus per nates, per os, per tussim plurimis corpus scateere viscosis excrementis, saliaque scindare.

Postremò à qualitativis sensilib. in toto corpore observamus calorem miteni, colorem album, pilosque fieri cito canos, qui cum Galeno 2. de temp. c. 5. pituitam significant: Verum plura alia sunt à Galeno in ar. med. & alibi proposita, sed quia hic non est locus agendi de omnibus signis, sed solum tractandi methodum, qua penetrare possimus, quando succi pituitosi in absconditis partibus nostri corpo-

ris peccent, declarata methodo vltèrius his signis non prouehat.

Ex penis locis pertinentibus ad viscerum dispositiones: Nunc mentis aciem dirigimus ad tertium fontem, qui continet morbos, nisi enim ab alijs propositis locis morbi disscerint, certissimè succos pituitosos alioquin occultos indicabunt; Cum igitur, ex Galeno tertio de crilibus cap. 4. quatuor sint de ratione morbi, Idea v. delictet, motus, magnitudo, & mos; rationi erit consentaneum, vt hæc quatuor indicare possint humores ipsos efficientes.

Quare cum Idea morbi essentialiter de morbo prædicetur, principales loci in hoc sòte ex Ideis morborum meritò colliguntur; Hinc intemperies frigida, & humida cuiusque partis, quatenus est affectuum Idea, indicabit pituitam: similiter hydropis omnes species, quatenus sùt intemperies humida, pituitam ostendunt.

Insuper ex pondere, & tumore apostematis duo oriuntur loci, à quib. conijcere poterimus pituitam, quia sicuti ex inflammatione sine tumore, & pondere, vt superius ostendimus, de erysipellate, & herpete indicatur bilis: similiter ex pondere necessariò colligemus crassos, & viscosos humores: hinc valet consequentia est lethargus, qui est cum maximo pòdere, ergo peccat pituita, est hydrocephalea ergo frigidus, & aquosus humor; est mesenterij abscessus, ergo sanguis valdè pituitosus: hinc abscessus re vera est cum ventris pondere, & ob mesenterij situm sine villo externo & apparente tumore: hunc, que affectum, dum medicum agerem in Vngaria non semel tractauim, quia homines ibi nimium prolixè indulgentes poculentis, & esculentis in mesenterij affectum facillè prolabantur, quod Italis, & Hispanis raro contingere videmus: quinimmo fateor in Italia abscessum mesenterij raro vidisse.

Præterea à morbis glandularum illicò inferimus (nisi alij loci aduerfentur) causam esse pituitam, quibus positus, valebit, sunt struqi, ergo pituita, est bubo in glandulis inguinum vel axillarum, ergo pituita.

Præterea à motu morbi oriuntur tres loci, quorū primus est à motu totius morbi, estque; quatenus sunt cronici, vel acuti, id est

ideft tardi, aut veloces, valet enim confe-
quétia, morbus est cronicus, & tardi motus,
ergo pituita, vel melancholia peccat :
cognoscemusq; primis diebus motu toti-
us morbi fore tardum, ex morbi princi-
pio tardo, cognoscemusq; huius tarditatis
causam esse pituita, & nō melancholiam
ex signis aliorū fontium : quia hic nō per
unicum signum in re difficili est incedē-
dum, sed per signorum syndromem, quæ
sola uelere potest nos ad iteritatis apicē.

Secundus locus oritur à motu periodi-
cationis, ostensum est lib. 5. cap. 4. & 5. in-
uasionem de tertio in tertium bilem, de
quarto in quartum melancholiam, &
quoridianam ostendere pituitam.

Tertius locus desumitur à tarditate
paroxysmorum, etenim paroxysmi, si
erunt tardi motus indicabunt crassum, &
lentum succum dominari.

Cæterum, quia paroxysmi longi non
semper fiūt à lentis succis, cum dicit Ga-
lenus 2. de differ. feb. 11. longas accessio-
nes fieri uel ob multitudinem materiæ,
uel ob crassitiem, & lentorem, uel ob im-
becillitatem potentiæ, uel ob angustiam
meatum : idcirco, ut hæc ueritatem cer-
tō consequamur, due sunt viæ, quibus
inuenire possimus, quando tarditas pa-
roxysmi à melancholia, uel à pituita, uel
ab alia causa fiat. Altera consistit in ar-
gumento ex sufficienti part. enumera-
tione, percurrendo scilicet per omnia
membra diuisa, nullamq; committendo
principij petitionem, probando per signa
propria uel cōmunia bilis superius pro-
positæ non esse ob multitudinem bilis; &
deinde non esse ob crassitiem melanco-
licam, non ob imbecillitatem, neque ob
meatum angustiam, etenim his omni-
bus membris exclusis quisque inferre
poterit paroxysmum esse tardum ob len-
torem pituitæ.

Si uerò aliæ tarditatis causæ paroxys-
morum nobis se offerrent, ueluti sunt il-
læ à Galeno propositæ 3. præfag. 28. dum
dicit, longam febrem fieri ob tres causas
scilicet aut propter aliquam particulam
malè affectam, cui ægrè curatio adhibe-
tur, aut ob crudos, & crassos succos, aut
ob errorem commissum. Similiter argu-
mento ex sufficienti partium enumera-
tione procedimus, quia primo argu-

menta possumus non esse ob errorem
commissum, neque ob particulam malè
affectam, neque ob melancholiam : qui-
bus exclusis inferimus, esse ob pituitam :
eodemque modo in omni consilij angus-
tia procedemus : altera uia consistit in
recto examine syndromes signorū om-
nium humorum, etenim est omnino im-
possibile, quod syndrome signorum o-
stendentium pituitam respondeat mel-
ancholiæ, & uersa uice.

Insuper est locus ab horis nocturnis, si
moueat humores meridiem, est bilis, si ue-
speri, erit melancholia, ut in ijs, qui affi-
ciuntur lue gallica, obseruatur; si media
nocte, erit pituita; dicit enim Galenus 12.
meth. cap. 5. qui ex crudis succis laborat,
hos quotidie accessiones exercent, præci-
puèque ad uesperam, & noctu, non ma-
ne, nec usque ad meridiem : per crudos
succos Galenus intelligit crassos, & ui-
scosos, per crassos intelligit melanco-
liam, per uiscosos pituitam, crassi mouen-
tur uespere, uiscidi noctu.

Colligas ergo, quod in morbis octo
præcipue obseruentur loci ostendentes
pituitæ dominium, quorum primus est
desumptus ab Ideis, ut ab intemperie
frigida, & humida; Secundus ab inflam-
mationis pondere; Tertius à tumore in-
flammationis; Quartus à morbis glandu-
larum; Quintus à motu totius morbi;
Sextus à motu periodicationis; Septimus
à motu unius paroxysmi; Octauus ab ho-
ris nocturnis. Ex his signis optimè colli-
gere poterimus, quando morbi fiant ob
pituitam.

*De pituitosis succis præcognoscantur per syn-
dromem signorum communium desum-
ptorum à symptomatis, locis affectis, &
a iuuantibus & ledentibus. Cap. VII.*

Tandem loci, qui cōmodè nobis in-
seruiant pro cognoscendis pituitosis
succis, desumuntur à symptomatis, lo-
cis affectis, & à iuuantibus, & ledenti-
bus: symptomata sunt actiones laesæ, ex-
crementa, & qualitates mutata; actiones
uerò sunt Animales, Vitales, & Natura-
les; Ab Actionibus animalibus reëctrici-
bus, & non reëctricibus lēsis colligere po-
teri-

ferimus pituitæ redundantiam: à Rectricibus, veluti a memoria deperdita, ab ingenio repente factò obtusos, ab apoplexia, caro, comate, carotico, ab omnibus ijs morbis sepiſſimè colligemus lentos, & viscosos succos.

Verùm statim exsurgit dubitatio, quia, si exempli gratia de causa memoriæ deperdita ageretur, non valeret hæc consequentia: memoria est deperdita, ergo pituita dominatur, quia causa huius affectus non solum potest esse pituita, verùm etiam ingens aliquod externum frigus: Vel siccitas aliqua orta ab assidujs laboribus Galenus 3. de loc. affect. 5. proponit duos casus de memoria deperdita ob siccitatem ortam a nimijs laboribus. Alter est cuiusdam studiosi, qui ob laborem in studijs, & in vigilijs memoriã penè amiserat, læsa etiam ratiocinatione. Alter cuiusdam agricolæ, qui ob labores, quos vites colendo subiecerat, ac tenuè victum, memoriã amisit: dicit Galenus, quòd isti calidissimis exsiccantibus lædebantur, in adfacientibus, & humectantibus moderatè calidis iuuantur.

Similiter si de apoplexia dubitarem, non videretur bona hæc consequentia, est apoplexia, ergo pituita redundat, quia licet vt plurimum apoplexia fiat a pituita, attamen est Galeni sententia 6. aphor. 56. quòd aliquando fiat a melancholia.

Occurrimus concedendo locos a symptomatis, vel a morbis non esse posse, nisi iunctos cum alijs locis antecedentibus, & consequentibus ostendere absolutissimam illam cognitionem, quam querimus: quare, si pendeat animus, dum ex memoria deperdita, pituitæ redundantiam inferimus, facillè omnem dubietatem auferemus, si rectè viderimus locos aliorum fontium non relictari, vel non esse discordes, sed omnes in eandem veritatem conspirare.

Etenim si viderimus ante memoriã deperditam præcessisse alimenta copiosa, & frigida generantia pituitam, incipimus confirmari, quòd memoria deperdita a pituita procedat, sed quoniam res non naturales nisi corpus sit dispositum, non imprimant vestigium aliquod, ideo vt certiores redderemur, posuimus in secundo fonte varios locos, quibus melius

confirmaremur, ibi enim exquisimus locos pituitam arguentes, quos si inuicem non viderimus dissentire, certum, & exploratum iudicium faciemus: loci non dissentientes essent, dum simul videremus ægrum habere venas exiles, esse ortum a parentibus pituitosis, & interceptam esse consuetam pituitæ euacuationem, eam cognitionem ab hac concordia locorum colligemus, quæ scientiæ demonstrationi æquiparari poterit.

Simili modo de causa apoplexiæ est dicendum, quia quamvis vt plurimum pituita crassa, & copiosa tollat actiones rectrices animales: nihilominus hoc aliquando a melancholia, a copioso sanguine, obstruente carotides: præterea ait Gal. 9. met. 10. quòd aliquando nimia euacuatio apoplexiã efficiat, ea ratione, quia aqua inter cutè refrigerando iccoris temperaturâ, & ab alijs causis potest prodire, Idcirco tot locos proposuimus, quorū sufficerent ad tollendam omnem ambiguitatem: etenim si apoplexia fieret a melancholia, esset necessarium, vt loci primi, & secundi fontis illud manifestarent.

Si de primo fonte loquamur, dicimus locum desumptum a cibo crasso iunctum cum loco desumpto ab aere feruentissimo arguere posse illam melancholiam, quæ est sæx adusta: Gal. enim 2. ad Glau. c. 10. ex alia causa noluit elephantiam melancholiam, quæ est sæx adusta, prodire, quam ex cibo crasso, & aere feruentissimo.

Mox expensis locis causarum externalium, examen fieri potest in secundo fonte, ostendendo habitum non esse melancholicum, ægrum non esse lienosum, non fuisse antea passum biliosos morbos, qui forsitan in melancholiam degenerauerint, non fuisse suppressas hæmorrhoidas, parentisque non fuisse melancholicos, quibus conditionibus seclusis, inferri certa scientia poterit, illam apoplexiã non prodire a melancholia, sed potius a pituita: verum, si in animo vigeret scrupulus, & adhuc videretur non eminere omnem claritudinem, cum apoplexia a sanguine, a lumbicis, & ab alijs causis fieri possit: tunc confugere expedit ad locos, a quibus pituitæ dominium colligemus, quia ibi statim inueniemus, an procacitècæ frigida

die, & humiditate præcellerint, an consuetudine euacuatio pituitæ sit suppressa, an ætas senilis sit, & demum confirmabimur per locos a iuuantibus, & lædentibus desumptos: si enim a calidis & siccis, à ieiunio eger leuamentis sentiat, statim iudicabimus apoplexiæ causam esse pituitam.

Præterea sunt alia plura symptomata pertinentia ad actiones animales, quæ, si erunt tradita methodo expurgata, certo indicabunt pituitam, valere enim videntur consequentia, est coma, ergo pituita peccat, est conuulsio, ergo senti & crassi succi, vt placuit Gal. 5. sect. aph. 70. est paralytis, stupor, ergo pituita. & quavis stupor à melancholia aliquando possit fieri, omnem euellens dubietatem, si expenderis locos pertinentes ad melancholiam, & pituitæ offensionem. Ad eundem modum ex tremore, vt plurimum inferimus pituitam, & perbellè præcognoscemus tradita methodo, quando à melancholia procedit; Insuper, si viderimus ægrotantem affligi dolore grauissimo, inferemus pituitam ipsum vexare; similiter, si quis fuerit obsessus colicis doloribus, vt plurimum iudicabimus pituitosum succum acidum, vel vitreum esse doloris auctorem; verum, quia aliquando colica passio à bile prassina, vel à melancholia fieri potest, ingenij acumen in his symptomatibus pro viribus est exacuendum, quod fieri cribrando omnes locos declarantes melancholias, & biles.

Verum pro maiori declaratione proponamus casum colicum, sit patiens temperamenti pituitosi, qui sit vsus nimio coitu, isque paulo ante animi passionibus turbulentissimis sit implicatus, & cœcus, atque illius naturæ fuerit, vt obieuium non leuam, sed lassitudinem semper maiorem acquireret, fueritque prolixè admodum vsus aqua frigida & esculentis calidis, & paulo ante biliosis affectibus fuerit inuolutus: deinde huic accidat colica passio, accidatque suis nimia; quid diceres de causa efficiēte? quomodo te in peruestiganda gereres, nisi proposita methodo incederes? an necdum diximus patientem esse temperamenti pituitosi, inde quoque dicemus esse valde dispositum ad congerendam pituitam? & si inuenerimus aliquod signum consequens pituitæ

dominium, colligemus necessariò egrum illa passione contorqueri ob pituitam? similiter, si inuenerimus indulsisse potioni frigida, an ne inferre poterimus pituitam acidam? & ubi signa antecessoria, vel consequentia fuissent valdiora, vitream? rursum, si inuenerimus egrum perpeßum fuisse animi passiones insignes, vsuque esse coitu, & obsonijs calidissimis, an ne inferimus pituitosis succis succos calidos, & biliolos confarctos esse, qui potuerint facere truciores colicam passionem? verum omnino confirmabimur, si viderimus signa consequentia biliosa scire, veluti egrum febre, & siti insigni vexari, vel confugiendo ad postremum fontem, qui est de iuantibus, & lædētibus ob ieiunium scilicet, seu inediam, lassitudinem, & dolorem truciores fieri.

Cæterum, si vis quoque; altius penetrare, qua bile æger hic vexetur, flaua, vitellina, porracea, vel æruginosa, hac via exquirere debes, dicenlo non esse flauam, quia hæc bilis est mista cum pituita, quæ mixtura in ventre, vel intestinis facit porraceam, est enim Galeni vulgata sententia, porraceam fieri in ventriculo ex mixtura bilis & pituitæ: cōprehensa hæc peccante causa, deinde præfagies summam astantium admirationem fore, vt paulo post per alvum vel per vomitum ab ægrotante excernatur porracea bilis; præfagiesq; si temporis longioris tractu hæc bilis à calore præter naturam aduratur fore, vt excernatur per alvum æruginosa bilis, si sanus fieri debeat; quo diutius enim moratur bilis in ægrotantibus, eo deterior fit.

Ab animalibus actionibus læsis, vt à somnijs nimium, glaci colligitur pituita: audias Galenum primo de morbo vulg. com. 3. tex. 1. si aliquis in somnijs videat umbres, niues, & grandinem, signum est abundare frigidum humorem, si incendium flauam bilem, si somniat te esse in ardido loco putredinem humorum; si cristas gallorum rufas videat, signum est abundare sanguinem.

Demum colligimus differentias pituitosorum succorum per signa tradita a Galeno libro de plenitudine cap. 11. ubi dicitur

cit somnolentos indicare dulcem pituitam, famelicos acidæ redundantiam: Siculoſos ſaliæ, & appetitus amiſſionem crudæ pituitæ dominium indicare.

A vitalibus actionibus locis quamplurima ſcaturient ſymptomata, quæ arguere poſſunt craſſos, & frigidos humores, veluti erat illud ſymptoma Antipatri medici, qui, vt reſert Galen. 4. de loc. affect. vltimo, habebat magnam pulſus inæqualitatem, & difficultatem reſpirandi, ex hoc ſymptomate optima ratione Galen. colligere poterat in tenuis arterijs eſſe factam anguſtiam ab humoribus craſſis, vel à tuberculo in vaſis ſpiritalibus oborto: verum ab vtra ex illis cauſis fieret illa anguſtia in Antipatro, & qua via illa-cognoſci poſſet, mihi videtur, quòd ex propoſitis fontibus eam commodè aſſequi potuiſſemus, exempli cauſa, ſi à nobis obſeruatum eſſet Antipatrum medicum ſolium non fuiſſe in errores illos externos, qui pituitam augent, prolabi, vel non habuiſſe conditiones diſponentes corpus ad pituiſoſos laqueos, nec demum vlla conſpirare ſigna, quæ conſequuntur pituitæ redundantiam: ex his cum Galeno potuiſſemus firmiter tenere in Antipatro anguſtiam à tuberculo, & nequaquam ab humoribus craſſis ortam fuiſſe; quando enim ob duas tantum cauſas oriri poteſt affectus, & altera illarum excludatur, ſequitur neceſſariò, vt cauſa non excluſa ſit illa, quam quærimus, & quæ eſſe aſſectum.

Sed conuertamus eundem ſtylum in naturalia ſymptomata: in prius ſemper colligimus ab alteratrice diminuta pituitam redundare: per diminutam non intelligimus impeditam, ſed imbecillẽ, & quæ ab Ariſtotele 4. meteororum dicitur *μολυσται*, & quæ opponitur optimæ elixationi; ait enim Philoſophus, *μολυσται δὲ ἀπὸ τῆς αἵματος ἰσχυρίας*; ex hac enim alteratricis facultatis imbecillitate generatur pituita, quæ eſt ſemiſanguis, generaturq; ille ſuccus, quem vocat Ariſt. *αἷμα*; deſt crudum, & immaturum, ad differentiam illius ſucci incocti, qui dicitur *αἷμα*, qui (vt placuit Philoſopho) prædicatur de diminutè cocto, & de ſupercocto; quando igitur erit hoc modo imbecillis alteratrix facultas, facile colligemus

pituitæ redundantiam, quia alimenta in ijs prius in pituitam, quàm in ſanguinem abeunt.

Ab expultrice quoq; diminuta colligimus pituitam; munus enim propptè expellendi excrementa demandatum eſt biliſis ſucci: ſæpè tamen occurrit, vt iſci iſti ſcorſum conſiderati non ſint æternæ veritatis, quoniam aliquândo accidere ſolet, vt expultrix ſit irritata non à bile, ſed à pituita acidâ, vt docet Galen. in caſu vxoris Epicratis, quæ mulier paſſa erat rigorem ſine caloris conſecutione; rigor enim fit ab expultrice irritata; valet ergo apud Galen. hæc conſequentia, rigor ſuperuenit ſine febre, & caloris conſecutione, ergo pituita acidâ eſt illa, quæ pungit partes corporis ſentientes, nullus eſt alijs frigidus, crudus, & pituiſoſus humor, qui ſine caloris conſecutione habeat vim irritandi expultricem, niſi acidus; falſa verò, ſi pungat, id facit cū caloris conſecutione; rigor verò à bile factus diſſert à rigore procedente ab acidâ pituita, quia ſi bilis pungat partes ſentientes, neceſſariò corpus ferueſcat oportet, quod non cuenit, ſi pituita acidâ vellicet partem ſenſu donatam.

Deniq; à nutritione diminuta, vel ablata, vt eſt atrophia, ſæpè colligimus pituitam mucofam; dicit Galen. 2. de ſecl. natur. 9. mucus ſanguinem nutrire impedit; verum, quia atrophia poteſt fieri ab intemperie in habitu, percurramus (vt diximus ſuperius) per propoſitos fontes, vt auferatur ambiguitas; tot loci enim ea de cauſa proponuntur, vt in qualibet conſilij anguſtia eorū plures ſimul coniungamus; iuncti enim neceſſariò indicabunt, quinam ſint humores peccantes.

Ab exeuntibus coniicimus pituitam redundare, vt ab vrina alba cum multo ſedimento inſectus ſtatim pituitam peccare; à vomitu albo, & viſcoſo illicò colligimus corpora pituiſoſis ſucciſ grauari, ex albis vteri profluuijs pituiſoſum ſucum altas habere radices, cognouiſimus; an verò hæc pituita in vterum procumbens, vel in alias partes à ſtomacho, à capite, à toto, vel ab vteri acetabuli originem primariam trahat, colligi poterit ex locis pro cognoscendis partibus affectis propoſitis in libris ſuperioribus.

Præterea ab exeuntibus cutaneis albis,

viscosis, veluti dum corpus maioribus diffuit, non decipiemur, si inferemus, tunc pituitam dominari; hinc si in tinea, vel simili affectione cutanea videmus; exiens esse viscidum, dicemus cum Alexandro capite de tinea, pituitam illius affectionis esse causam, si verò sudor erit saluus, dicemus cum Aueroe prima canticę tract. 2. tex. 338. pituitam falsam dominari, si dulcis, sanguinem, si acerbus, & auusterus erit sudor, melancholiam.

Nec Mercurialis lib. 3. de excrementis cap. 1. rectè obijcit Aueroi, sudorem scilicet sua natura saluum esse, quia nos dicemus, Aueroem intellexisse de insolita sudoris falsedine. Insuper, si sputum erit album, crassum & rorundum; valebit dicere, ergo est assata pituita, de qua re loquens Galenus 2. prognost. cap. 46 habet, quod quando hoc sputum appareat, sit signum lethale.

Demum dum egreditur ab oculis serosa humiditas, vt in epiphora euenire solet, aquosam pituitam colligimus; an verò sit mista bilioso succo, vel falso, vel ponticę melancholię, eas (vt hoc exploremus) seruabimus normas, quas superius docuimus in perquirenda collica passione: per hypohesim; si quis haberet epiphoram, isque multo ante victitasset lacte, & alijs esculentis calidis, & crassis, & calidā inhabitasset regionem, an ex eis procacitatis suspicari incipiemus, serosam humiditatem effluentem ex oculis mistam esse melancholico humori? an ne, si in ipso explorabimus aliquam conditionem disponentem corpora ad melancholicos succos, eo certiores reddemur.

Demum si in terrio fonte, qui est de morbis, innuenerimus ægrum esse lienosum, vel alium affectum melancholicum pati, nunquid nō certissimi essent serosam humiditatem facientem epiphoram mistam esse ichoribus melancholicis: videns ergo quo pacto per fontes propostus sit facile inuenire in quolibet affectu præternaturam quamlibet speciem humorum peccantium.

Postremò sunt qualitates mutare, colligimus enim ex albo colore; ex externo frigore, & ex plurimis alijs superius citatis pituitę dominium.

A partibus affectis colligimus quinque

locos ostendentes pituitę redūdantiam; suntque glandulę, cerebrum, ventriculus, pulmo, & articuli: hinc si viderimus glādulas esse affectas, dicemus statim inquinamentum esse pituitosum: idcirco, si tactu cognouerimus esse imundas glandulas circa inguina, guttur, axillas, vel collum, quę vocantur *axillares*, vel circa alias partes illic dicere poterimus corpus affluere pituitosis excrementis: Solers enim, & alma natura instituit adenas, vel glandulas internas, & externas, vt excrementosa pituita redundantis essent domicilia: dum generu sunt glandulę; internę, & externę, externę sunt omnibus conspicuę, & manifestę, & nulla methodo ad sint referre excrementis, egent, vt perquirantur: internę sunt explorandę methodo, quam tradidimus pro cognoscendis locis affectis internis.

Inter internas glandulas, quę possunt repleri, in primis adest glandula capitis, quę iacet sub calloso corpore, quę assimilatur pinę, quę veteri consuetudine dicta est conation: estque alia ibidem cuneali osse circumsepta, in quam (vt dicit Galenus) restagnant vniuersa excrementa cerebri pituitosa, quę deinde per os, & per nares percollantur: ex harum igitur glandularum affectionibus colligenus pituitam redundare.

Adhęc plurimę sunt glandulę in mesenterio, quę imbibuntur crassis, & viscosis succis, quas glādulas re vera si affectas esse cognouerimus, non solum pituitam, illius affectionis causā esse posse, iudicare poterimus: verum etiam melancholiā pituitam, ratione proprietatis glandularum, quę hac forte effecta sunt, vt sint propria receptacula pituitosorum succorum: melancholiam, quia quęlibet glandula mesenterij circumdat aliquem venę portę tumulum, à quo exprimi potest in glandulas crassus, & melancholicus sanguineus ichor, quinimo si copiosus in glandulas pancreas vocatas exprimitur, fieri potest passio hypocondriaca.

Quo pacto verò ex latis ijs glandulis colligitur pituita, vel melancholia, per syndromem aliorum locorum, rem adeo certam reddere poterimus, vt nihil sit quod amplius dubitemus.

Præterea perisique alijs in locis sunt gland-

glandulæ, quarum affectiones ostendunt pituitam, vcluti vbi flecimus genua, in colo vesicæ, in duodeno intestino, in omento, in quo pancreas habent suam sedem, & demum vbi cumque venas vel arteria aliqua bipartitur, solers natura in diuisionis centro glandulam amplectentem ambos furculos locauit, ne ramuli frangerentur.

Postremò cum mamillæ, & testes sint in glandularum catalogo collocatæ, ex ijs læsus vt plurimum pituitosum succum redundare colligimus.

Ceterum non solum ex glandulis læsis incipimus suspicari pituitam abundare, verum etiam ex alijs præcipuis corporis partibus affectis, habemus enim ex Hipp. lib. 6. de glandulis, caput esse pituitæ metropolim, quare facillè contingere potest, vt in qualibet læsione capitis concurrant quoque pituitosi succi, quinimmo egri tudines, quæ conueniunt propriæ, & per se capiti, necessariò à pituita pendere debent, non à bile, vel à melancholico succo per se, quia non suat à capite, sed à subiectis visceribus mittuntur, ergo per accedens & per consensum, & non primo ledetur caput ab ijs succis: per se tamen à pituita, quia in capite pituita fieri potest.

Eadem ratione dicimus pituitam colligi posse per se, & semper à læso ventriculo, quia eius munus est quoque pituitam generare, & non bilem, vel melancholiã, vt valeat consequentia, læsum est caput, & ventriculus per se primo, ergo pituita est læsionis causa, quæ methodo vero sit incedendum, vt cognoscamus, quando pars aliqua corporis sit læsa primo, & per se, declarauimus in 2. lib. cap. 3.

His adiungimus pulmonem, tamquam pituitæ receptaculum, quia excrementa pituitosa cerebri iugi præcipitio procumbunt primo in glandulam ossis cunealis, deinde in os, & per alia saramina in foramen tracheæ præcipiant, & tandem in pulmone colliguuntur, sepius enim accidit, vel læsiones pulmonis oriantur à pituitosis excrementis.

Adhas denique articulos læsos, quia vt plurimum valet, articuli sunt malè affecti, ergo pituita; hinc quæ pituitam augent, attritu de catenatis sunt maximè iuuentia; non admittimus tamen Fernelij

sententiam, quod podagra fiat solù à pituita, & nunquam à cæteris humoribus; nec contra Fernelium disputamus, tum quia hic non est locus de hac re verba faciendi, tum quia de hoc egerunt plurimi præstantissimi auctores, inter quos est percelebris Emilius Campilongius vir dignitate, scientia, ingenio, & innumeralibus virtutibus exornatus: Satis erit nobis colligere, quinque esse præcipuos locos à partibus affectis desumptos, qui nobis ostendere possunt pituitæ redudantiam, suntque glandulæ, cerebrum, ventriculus, pulmo, & articuli: verum, quia sæpè loci seorsum expensi probabiles sunt, concludimus probabilitatem peroprimè expurgari per syndromem signorum ex alijs fontibus collectorum.

A iuuantibus & lædentibus quinque hauriuntur loci, qui saltem lectorem illud excitabunt in pituitosis succis cognoscendis: primus est examinare, an pituitæ euacuatio iuuat, quoniam si iuuat, nemo audebit dicere, patientem non abundare pituitosis succis.

Secundus locus illud idem demonstrans, est iuuari à calidis, & siccis, valebunt ergo consequentia, iuuatur ab euacuatione, pituita, & à calidis, & siccis intus, vel foris administratis, ergo est pituitosus; similiter læditur à frigidis, ergo est frigidus, & phlegmaticus.

Tertius locus desumitur à ieiunio, si enim ieiunium facillè ferit sunt pituitosi Gal. auctore 2. de ratione vict. tex. 32. similiter dum tollitur ieiunio lassitudo, & sitis, indicatur pituita: est Galen. auctoritas 6. de morb. vulg. comm. 3. tex. 28. si ieiunium tollat lassitudinem, & sitim hæc mines abundare pituitosis succis.

Quartus locus est à somno desumptus, nam si somnus tollat sitim, valet, ergo pituitosus sanguis abidat; ratio huius consequentia diuinitus à Galeno 6. de morb. vulg. comm. 4. tex. 23. ijs uerbis traditur, somnus tollit sitim, quia in somno sanguis humectat partes internas, quas petit; quare, si sanguis esset biliosus, calidus nimis & siccus partes internas, & os ventriculi non humectaret, sed exsiccaret, & sitim augeret.

Quintus locus à febre colligitur, dum iuuat, valebit semper consequentia, iuuat

febris, ergo pituita, est Galen. auctoritas 6. aph. 44. nouimus febrem illis tantum morbis conferre, qui ex frigidityte sunt sola, uel cum humoribus crudis, & flauo. sis spiritibus: similiter 4. aph. 57. Hippocrates dicit febrem soluere spasmus, & tetanum, quæ ægrotudo à frigidis humoribus fit: videas ergo quam solidos hic postremus fons contineat locos, qui nobis indicare, detegere, & aperire possunt humores pituitosos altè repositos, & tenebrarum velo obductos, quiq; (si cæteri fontes non dissenserint) poterunt demonstrationem scientiam parere.

Quomodo omnes melancholicorum succorum differentie cognosci possunt per syndromem signorum communium a rebus non naturalibus desumptorum.
Cap. VIII.

Eadem via est perquirenda locorum syndromæ, quæ nobis possit manifestare melancholicos humores: tres sunt melancholicorum succorum differentie, ut colligitur ex Gal. 3. de loc. aff. c. 7. & pleriq; alijs in locis, alia est veluti fex sanguinis fecib. vini haud absimilis non adusta: alia est bilis flaua supramodum assata, alia est melancholia, quæ est fex sanguinis adusta, quæ ex Gal. 4. aph. 23. est fulgida, seu splendida. Hæ differentie quomodo fiant aded est manifestu, ut non sit, quod de generatione horum humoru loquar: omnes sciunt faciem melancholicam à cibo crassiori prodire, atram bilem (ut dicit Galen.) à bile flaua superassata: similiter faciem melancholicâ adustam ab efficiente calidissimo interno, uel externo.

Nostrium est, ut in hoc libri vestibulo traditam methodum iterum experiamur, quia inde facile colligere poterimus, quando in ægrotantibus peccabit melancholia, quæ est fex sanguinis non adusta, quando atræ bilis, quæ fit ex flaua superassata, & quando adusta fex melancholica: exequamur ergo propositum, & confugiamus primò ad procatarcticas causas, quæ disponunt viscera ad generationem melancholicorum succorum.

Procatarcticæ causæ disponentes viscera ad melancholiam duum generum, sunt, calidæ scilicet, & frigidæ: quia due

melancholiciæ species sunt calidæ, & vna frigida: calidæ sunt atra bilis facta à flaua superassata, & fex sanguinis adusta, melancholia verò, quæ sua natura est frigida, ut dicit Galen. lib. de trem. & palp. c. 7. est naturalis fex sanguinis, quæ copia tantum peccare solet: etenim homo sine hac (ut dicit Galen. lib. 3. de usu par. cap. 4.) nullo modo viuere potest.

Calidæ procatarcticæ melancholiam augentes, de quibus vberimè Galen. egit lib. de atra bile, c. 6. omnes, quotquot sunt, referri possunt ad tria suprema capita; ad motum scilicet, ad vicinitatem corporum calidorum, & ad cibum, & potum calidum: Ad motum (ut diximus superius) referuntur vigiliæ, coitus, exercitia, & omnes animi passiones; dicimus omnes animi passiones, quia Galenus 1. de differ. febr. cap. 3. vult non solum iram, verum etiam maiores, qui sunt affectus contrarij, uim habere calefaciendi, & exurendi humores, donec melancholici fiant: famosa enim est historia ab Hippocr. relata de Muliere tetrica, quæ ob nimios animi maiores auxit humores adustos, & melancholicos: modus verò, quo maiestria adurant humores, traditur à Galeno 4. de caus. puls. c. 4. & 1. de hum. c. 1. ubi dicit, maiestriam calefacere, quia contrahit calorem ad internas partes, quo contracto, intensius exurere sanguinem, & spiritum.

Frigidæ verò causæ, quæ augent melancholiam, sunt, vicinitas corporum frigidorum, alimentum frigidum, motus immodicus, & nimia quies, ad quam referuntur nimius somnus, & nimia coitus abstinentia: dicit Galen. 6. de loc. aff. cap. 5. nimiam coitus abstinentiam inducere, torporem, & diminuerè coctiones, & homines melancholicos reddere, & per consequens refrigerare: quare, si viderimus ægrotantem melancholicum, & ignorauerimus, an melancholia sit calida, uel frigida, & sicca, ex præcognitis ijs procatarcticis colligimus locos, qui nobis hoc ostendere poterint.

Dum Galen. dicit, abstinentiam coitus reddere homines melancholicos, intellexit de melancholia, quæ sua natura est frigida, & sicca, & quæ est fex sanguinis; dum enim semen continetur, abgetur san-

sanguis, & per consequens sex ipsius.

Hi loci enarrati consistunt in hoc examine, ut videamus, an præcesserint causæ procatarctica calidæ, vel frigida, quoniā si anteuerint calidæ, dicemus melancholiam esse adustam: si frigida, colligemus egrotantem facie melancholica non adusta abundare, quæ melancholiæ species (ut colligitur ex Galeno libro de inæquali temp. cap. 5. 2. de temperamentis cap. ult. 3. de loc. aff. 7. & 2. præfag. 47.) est frigida & sicca: Tanti erit horum locorum examen, ut in affectibus melancholicis, si quis illo non vtatur, facile ignorare poterit melancholiæ differentias, & per consequens præposterè curare ægrotos, quia melancholia, quæ est sex sanguinis indicat calefacientia, cæteræ verò calidæ, & adustæ indicabunt refrigerantia.

Loci verò valde viles pro cognoscendis specificis melancholiæ differentijs, tres ex hoc primo fonte colligi possunt, quorum primus desumitur ab aere calido & feruente, etenim, si affectibus melancholicis anteuerit aer æstuosus, igneque penne emicans, inde certò colligemus melancholiam non posse esse frigidam, & siccam, sed calidam & adustam; an verò sit, quæ ex flaua superassata, vel quæ ex facie adusta fiat, hoc facto examine cognoscetur, scilicet si cū aere feruido, vel alia extrinseca causa calida anteuerit vsus crassorum ciborum, necessariò colligemus melancholiam illam esse faciem adustam, si verò calida procatarctica anteuerint sine usu crassorum esculentorum, dicemus atram ortam ex flaua superassata redundare.

Hinc oritur secundus locus in hoc fonte, qui est à cibo, & potu crasso desumptus: est Galeni 3. de loc. aff. 7. cibum crassum, ut est caro bubula, aprina, limaces, brassica, lens gignere melancholiam, quæ est sex sanguinis: similiter subdit Galen. loco citato vinum nigrum, & crassum aptissimum esse ad gigenendā melancholiam: à cibo igitur & potu crasso faciem melancholicam colligemus, cognoscemus tamen faciem non esse adustam: ex hoc præcognito vsu ciborum, & quando cauta externæ calidæ non anteuerint, adustā verò, si cum cibo crasso præcesserint quocunque procatarctica calida, sive est aer æ-

stuosus, exercitium inmoderatum, & vsus pharmacorum calidorum; est enim Auicennæ opinio, quod sepius homines fieri possint melancholici ob vsum pharmacorum calidorum.

Duos locos colligemus ex Galeno 2. ad Glau. cap. 10. dum affert causam, cur multi in Alexandria patiantur Elephanticum affectum; in Germania, Mysia, & Seythia ferè nunquam hunc affectum apparuisse; dicit, quamuis æquè, qui incolunt Germaniam, Mysiam, & Alexandriam comedant cibos crassissimos, attamen ob aeris frigiditatem in Germania, & Mysia hos melancholicos non fieri: colligere ergo possumus duo requiri ad generationem facis adustæ, primum cibos, vel potiones crassas: Secundum intensum aeris calorem; omnis sane calor externus potest adurere humores, aerem, tamen, quia perpetuò corpus ingreditur, & quamlibet partem penetrat citius, & valentius calefacere: quibus positis (nisi alia obstituerint signa, quæ ex alijs fontibus possunt deprimi) quique ex Galeni admonitu scire poterit, quando redundauerit sex non adusta, & quando adusta, & quando atra illa, quæ ex flaua superassata dependet.

Tertius locus desumitur à mæstitia sine causa, valet mæstus est sine causa, ergo melancholia redundat: verū, quæ melancholia sit ex illis tribus, non apparet: adiadas igitur distinctionem; si mæstitia anteuerit morbo, dicas esse adustam, ratio potissima desumitur à Galeno 1. de diff. feb. cap. 3. vbi concludit mæstitias; vel metores ratione motus aliquando eo usque spiritus agitare, quouque extrahit, & deinde incalescant humores, & melancholici adusti fiant: si verò mæstitia secuta fuerit melancholicum affectum, præcesserintque edulia crassa, dicemus multam faciem non adustam peccare, quia non anteuit causa ætrens, & calefaciens, valet enim consequentia, non præcesserunt causæ efficientes calidæ, ergo humor peccans non erit calidus.

Hinc non semel Galenus dixit humorem melancholicum gignere mæstitiam, & mæstitiam melancholiam facere, quia mæstitia modò præcedit, modò sequitur melancholicos succos, si præcedat fiet adu-

fla, quia, vt dicit Gal. 4. de causis puls. 4. & alii, in omni mæstia contrahitur calor ad internas partes, & tēporis spacio exurit: si non præcedat: sed sequatur morbos melancholicos, non illico adusta erit: si denique non præcesserint vsus crassorum alimentorum, sed solum procacitæ exurentes, atram bilem ex flaua ortam redundare iudicabimus.

Quartus locus desumitur ab autumno, valet, morbus est autumnalis, & longus, ergo melancholia adusta peccat: ratio verò, cur in autumno solum adusta melancholia peccet, & nequaquam sæx naturalis, desumitur tum a præcedente æstatis calore, qui exurit faciem sanguinis, vel flauam bilem, tum à natura autumnii, in quo facillimum est, ut adurantur humores, mane enim tunc frigus inualefcit & interim prohibetur trāspiratio humorum, qui sunt exusti ob præcedentē æstatem, in meridie uerò calor perfcitur ferre æstius, vnde ob has causas, & has mutationes de contrario in contrarium vni co die facta, uel maxime inceduntur humores, & melancholici adusti sunt.

Ceterum, quæ differentia melancholiæ adustæ in autumno dominetur an scilicet sæx adusta, vel atra ex flaua superaffata orta, facile, si fiet examen superius propositum, cognosci poterit, quia, si præcesserit vsus ciborum crassorum, ob quos Gal. quoque putabat in Alexandria sequere ælephanticum, erit sæx adusta: si uerò præcesserint signa abundantissimæ bilis, erit atra ex flaua orta, quia omnes tenaces humores biliosos, si recandescant, exuruntur, & in aliam melancholiæ speciem nō possunt conuerti, nisi in hanc exedentem, & furiosam melancholiam ex bile flaua combusta enatam.

¶ Si melancholici succi innotescant per syndromem signorum desumptorum a dispositione patientis, & a morbis. Cap. IX.

Sequitur, vt proponamus locos indicantes corporis dispositionem ad succos melancholicos cumulandos: dū enim cognoscemus patientem esse valde obnoxium passionibus melancholicis, promptē virtute syndromis signorum sciemus

quando actu succi melancholici vexant illum; & quia (vt diximus) melancholiæ sunt duum generum, frigida scilicet, & adusta.

Propterea duæ dispositiones sunt aduertendæ: qui enim sunt dispositi atq; bili furiosæ & exedenti, sunt valde dissimiles ab ijs, qui proni & obnoxij sunt facibus melancholicis: quorum aliqui erunt antecedentes, aliqui uerò consequentes, antecedentes quinque sunt, quorum primus est perquirere à quibus parentibus ortus sit patiens, quoniam parentes sepiissime gignunt filios sibi similes: si parentes igitur fuerint soliti atra bile furiosæ, vel melancholia illa terrestri, & frigida sæpe vexari (nisi alia obstituerint signa) incipimus suspicari patientes suos æmulari parentes.

Si uerò ex hoc loco aliquid certi non collegerimus, adest scūdus locus, qui est ab ætate, sed, quia melancholiæ sunt frigida, vel feruentes & sic excluditur ætas puerilis, & adolescentiæ, ut inepta pro congerendis succis melancholicis, tum, quia pueri, & adolescentes sunt humidi, & per consequens contrarij omnib. melancholicis succis, tum, quia tanto ardore opprimi non possunt, ut in atram furiosam facile incident; dicimus ergo ætatem iuuenilem, consistentiæ & senilem esse obnoxiam affectibus melancholicis, iuuenilem, & consistentiæ præcipue atræ bili, inue nilem, dum ingentissimo calore exuruntur: consistentiæ ob rationem traditam à Gal. 3. præfag. comm. 43. ubi dicit, sicuti autumnus æstate frigidior non sinit diffilari exustos humores in æstate feruesfactos, sed in atram bilem eos conuertit: sic in ætate magis declinante exusti humores florentis ætatis ob trāspirationem minus apertam in atram bilem cōuertuntur, quare, si iuuetis sua natura calidas non fuerit atra bile uexata, in ætate consistentiæ certò uexabitur, se nilem uero dicimus præcipue esse dispositam ad congerendam melancholiam frigidam & siccam, diximus præcipue, quia inueniri quoque possunt iuuenes, & qui in ætate sunt constituti, qui si copiosum habeant sanguinem, necessariò plurimam faciem melancholicam frigidam, & siccam fortiantur oportet.

Tertius locus consistit in habitu corporis, contineturque sub se duos locos, quorum primus est habere venas latas, dicit enim Galenus 3. de loc. aff. 7. quibus latae sunt venae aptissimi sunt, ut humor melancholicus in ipsis cumdetur: Secundus locus est videre, an corpus sit macilentum, vel gracile: Galenus 1. de hum. dicit, graciles, nigriores, hirsutius, quique latas venas habent esse aptissimos ad gignendum humorem melancholicum.

Quo si impleatur lien, non colligit alium humorem melancholicum, sed relinquatur in sanguine, unde corpus, cum illo non nutriatur, cōtabescit: hinc Hipp. lib. de carnibus: Et Plato in Timæo dicit, dum floret lien, corpus contabescit & è contra, dum floret corpus, lien tabescit, vel flucescit.

Ratio vero, cur omnes melancholici sint macilenti, est, quia omnis melancholia convenit in hac qualitate, ut siccus humor sit, hinc, qui in furiosam bilem inclinant, & qui abundant facie melancholica, ut plurimum sunt macilenti.

Nec obijciant, quod, qui habent multam faciem melancholicam, plurimum quoque habeant sanguinem, & qui plurimum habet sanguinem, non possint esse graciles, Gal. est sententia 3. de morb. vulg. 3. tex. 70. quod sēper ubi sanguis multus est ibi necessarium sit multa faex, & viceversa ubi .i. est multa faex, ibi multus sanguis sit.

Respondemus non esse negandum in multo sanguine necessario esse multam faciem, negamus tamen quod habentes multum sanguinem non possint esse graciles: faveat nobis Galenus, 6. de morb. vulg. com. 3. tex. 29. ubi dicit, inueniri graciles, qui sanguine abundant, habetque hæc verba: aliqui graciles habent multum sanguinis, & aliqui crassi pancum, itaque non valet, est gracilis, & emaciatus, ergo non potest habere multum sanguinis, & versa vice, quia, ut dicit Galenus loco hoc citato: extenuatio corporis non sēper ab inanitione proficiscitur, cum aliquando ex repletionē fiat: hinc Gal. loquens de muliere emaciata dixit ei fuisse detractum multum sanguinis maxima cum utilitate, nisi .n. plurimo sanguine mulier esset referta, non potuisset pati tantam sanguinis euacuationem: patet ergo melancholicos calidos & feruentes & illos, qui plurima abun-

dant facie melancholica frigida, ut plurimum esse graciles, & macilentos.

Quartus locus est phsyonomicus, in quo plura signa ab auctoritate phyllophorum desumpta collocantur, quippe quæ creduntur aliquid posse in succis melancholicis indicandis; ex phsyonomia Aristotelis colligitur, aures paruas versus faciem & melancholiam indicare, habeturque concauos, & macros oculos, & maxillam faciem ex Galeno indicare melancholiani 2. de temperamenti ultimo dicit pilosos esse melancholicos, si ætas declinet, si verò floret, non esse tales.

Præterea 30. sect. probl. 1. legitur, curim duram, & venas tumidas, & varicosas indicare dominium melancholici: apud Auiennam lib. 3. sen. 14. tract. 1. cap. 3. legitur, longitudinem digitorum ostendere iecoris magnitudinem, quæ est causa caloris, & Polyæmiæ, unde omnes melancholici habent initium: à calore oriuntur melancholici adusta: à polyæmia faex melancholica non adusta, idem quoque colligitur lib. 1. sen. 2. doct. 3. ca. 1. ubi dicit breuitatem digitorum ostendere iecoris paruitatem, longitudinem magnitudinem & per consequens caliditatem, & copiam sanguinis; locus iste phsyonomicus non seorsum expensus, sed iunctus cum alijs pariet exactam certitudinem dominantium humorum.

Quintus, qui est omnium certissimus desumitur ab intermissa, & suppressa euacuatione consueta melancholici, quæ per hæmorrhoidas, vel menses, vel per alias partes euacuabatur; valet enim consequentia, suppressa est euacuatio consueta humoris melancholici, ergo corpus non solum est dispositum ad augendam melancholiam, sed actu multa melancholia repletum est.

A consequentibus quoque colligimus signa corporis dispositi ad melancholiam, & quinque observantur loci, qui desumuntur ab Actionibus Animalibus, Vitalibus, Naturalibus, ab excrementis retentis, vel exantibus, & à qualitatibus sensibilibus: Ab Actionibus animalibus retractoribus alteratis colligemus melancholiam, quæ est faex sanguinis, ex eo quod ægri sint cogitabundi, taciturni, non furiosi; Galenus de vxore Dealcis loquens dixit, quod tacere erat signum melancholici.

cholicorum succorum: præterea ijs sunt tristes, morosi, ingeniosi, astuti tamen & cauti, constantes, & signi in sententia; Est Galeni 1. de natura humana comm. 19. quod sicuti acies animi à bile, ita constantia, & firmitas à melancholico succo prodit. A somnijs alteratis, quia omnis melancholia excitat nigra, & terrea spectra, & imagines.

Præterea Albertus Magnus lib. 1. de animi. tex. 2. de melancholia frigida loquens dicit, quod melancholici graues, & terribiles imagines patiuntur propter sanguinis melancholici frigiditatem, & horrore, quia imagines receptæ in horrido sunt horribiles; denique ob alteratam imaginatricem ab obscuris & tenebrosis phantasmatibus semper timent aliquis non timendum, & sæpe in vnica firmantur insania: horum sunt, qui putant habere in ventre magnum lumbricum: aliqui, si audiant medicum loquentem de aliquo morbo, illico illo vexari credunt: si verò melancholia est adusta, tunc præterea excitantur symptomata seuiora, quæ inferius declarabuntur.

Quo ad vitales actiones, istæ illico alterantur ab alteratis functionibus animalibus; horribiles enim imagines incutiunt metum, & terrorem cordi, vnde ex timoris excessu exsiccantur humores, & melancholici fiunt: deinde ex timore, nascitur insignis quædam auaritia, ob timorem enim perpetuo machinantur, quomodo possint effugere omnia mala quæ ipsis offeruntur.

Hinc Aristot. 7. ethicorum cap. 14. videns melancholicos semper timere, refert proprium esse melancholicorum, medellam semper postulare, & semper versari cum Medicis: Demum, qui melancholia hæc terrestri sunt reiecti habent pulsus valde tardos, & raros, quod atræ bili non conuenit.

Ab actionibus naturalibus varia scaturiant signa, videmus illos præter naturam esse famelicos, & promptius digerere cibos; causa depromitur à Galeno 5. de viū par. cap. 4. vbi dicit, melancholiam naturalem vi sua astrictoria tenere cibos in ventriculo, donec sint percocti, atque ob eius aciditatem citius chylum fermentare.

Præterea in ijs intempestiua fames excitatur, quia per quartam portæ venam, quæ coronæ in morem amplexitur ventriculi orificium, transmittitur hic terrestri succus debito copiosior, qui sua frigiditate, & acetositate contrahit in rigas orificium, & intempestiuam famem excitat; ex fame ergo intempestiua colligimus abundare humorem melancholicum terrestrem; promptè digestio fit, quia hic, & alter venæ portæ surculus in ventriculi cavitatem euomit quotidie copiosissimam melancholiam, quæ vt copiosa efficacius astringit, & melius digerit: vt valde acida promptius arerit, & comminuit; valebit ergo consequentia, alteratrix promptè suum explet officium, & obseruatur intempestiua fames, ergo humor melancholicus, & terrestris abundat.

Hic obiter notare possumus contra nullus, qui dicit alteratricem ventriculi à calore, & non ab alijs causis fieri potentem, videntur errare, quia melancholia, quæ est bonæ coctionis auctor, est frigida: deinde experientia confirmatur, quia videmus pilces sua natura frigidiores hominibus integros cancris cōminuere, & digerere, quod nullus homo posset.

Ab exultatione diuinita colligitur melancholia, redditur enim tarda, & segnis ob virtutem astrictoriam humoris.

Ab excrementis quoque melancholice abundantiam desumimus; de melancholicis enim loquens Galenus lib. de plenit. c. 11. & 3. de loc. aff. ex sententia Diocletis dicit hypocondriacos & melancholicos esse saliuæ abundantes, & a potu abstinentes, causa verò abundantie saliuæ, & abstinentie potus colligi potest ex Gal. 2. Arist. & Hipp. ex Gal. in 6. epid. 38. vbi dicit sanguinem melancholicorum esse ferosum, quare, si sanguis est ferosus, facile fiet, vt saliuæ sint abundantes, & a potu abstinentes.

Aristot. in problematibus de melancholia loquens dicit, humorem melancholicum delectari ferositate, & 2. de par. animal. 4. dicit, corpora sanguinem diuturnum habentia esse timidiore; quare & melancholica, quia timor præter rationem semper arguit melancholicos succos.

Hippo. lib. de genitura melancholiam vocat

vocat aquam : lib. de internis afflicti remedia pro lienosis esse diuretica 2. epid. 2. 27. citat casum Bionis habentis splenem elatū & dnrū, qui liberatur, quia multum minxit.

Causa autem, cur melancholia magis quam pituita sit referta serositate, est virtus astringentia melancholice, quæ prohibet, ne secum subito defluat, & evacuatur : ostendimus cum Galeno 5. de viū part. 4. melancholiam tenere cibos diutius in ventriculo ob vim suam astringendi; argui ergo hoc modo potest, si cibos diutius detinet, quanto magis proprium ichorem? si verò melancholia hæc naturalis, & frigida incipiat calefieri ab aliquo calore præter naturam, sicut si quartana febris præmeretur melancholicus, tunc febrilis calor magis potest impellendis ichoribus, quam astringentia melancholia in cogendo, & retinendo serosam humiditatem.

Hinc quartanarij, & omnes qui melancholia calefacta, vel adusta sunt referunt, tam copiosis sudoribus inter dormiendum madefiunt, ut ter, quaterve in nocte usque quaque sudore circumfundantur, petinde ac in balneo immergerentur, ob eandem rationem copiosum lotium in melancholicis mouetur; valebit ergo consequentia, maximi sudores, & urinae debito copiosiores excreantur, ergo terrestris melancholia incipit fieri calida, & adusta.

Ex alijs quoque exeuntibus melancholice differentias colligemus, veluti à sanguine hæmorrhoidali etenim, si egrediat sanguis ater sine morfu, & puncturis, colliges abundare melancholiam naturalem: si verò erit mordacitius, inferes adustam faciem melancholicam exire.

Ab excretis per alium, si nigrae faeces sine morfu excreantur, colliges melancholiam naturalem, si cum morfu atram bilem.

A ructibus, si erunt acidi sine nidore, & ponticate melancholiam naturalem copia peccantem, si erunt fumosi, & nidorosi colliges atram bilem.

Denum sunt retentia excrementa, quæ indicabunt melancholicos succos, veluti quando suppressæ sunt hæmorrhoides, tunc enim inferre poteris has consequen-

tias, nuper sunt suppressæ hæmorrhoides, ergo melancholia naturalis, quæ est inter sanguinis, peccat, quia surculi facientes hæmorrhoidas prodeunt quoque a porta vena, quæ est sedes huius melancholice tam diu suppressæ sunt, ergo peccat melancholia naturalis adusta, est enim impossibile, ut diutius retentus humor frigidus in corpore similis coheruerit: oportet enim ut in loco calido calefiat, & adnrat, est Galeni sententia 2. de differentijs febrium capite 5. nullum humorem permanere in vivente corpore, sicut erat prius: si verò erunt suppressæ hæmorrhoides internæ, & illæ præcipue, quæ circa intestinum rectum sunt, quæ omnes ferè à surculis caue venæ prodeunt (si alia signa non oblietint) non colligemus faciem sanguinis abundare, sed atram bilem factam a flava superaffata, & combusta, quæ potius domicilium in cauis venis habet.

A qualitibus sensibilibus externis colligimus hæc signa, si erunt actus frigidi, faciesque sit colore plumbeo, & nigro, ut dicit Galenus, lib. de atra bile, cap. 6. inferre tunc poterimus, dominari melancholiam terrestrem: si verò erunt actus calidi cum eodem colore, atram bilem.

Visis locis pertinentibus ad externos errores, & ad viscerū dispositiones: nunc ad locos, qui à morbis desumuntur expediat trāsire, quippe qui, nisi fuerint discordes ab alijs, certò indicabunt melancholicorum succorum differentias: In primis desumuntur loci à morborum ideis, in primisque se offerunt ideæ in mala compositione, in quibus observantur quinque loci præcipui quorum primus desumitur à tumore splenis: secundus à varicibus: tertius à tumore hæmorrhoidum: quartus à mola, quæ est morbus in numero: quintus est à scabie, lepra, & similibus eutancis morbis.

Si de primo loquamur, valebit consequentia, splen intumescit, vel durus sit, ergo peccat sanguis, & nequaquam atra, quæ oritur à flava adusta; facialis enim melancholia copia peccat attollere potest in maiorem molem licuis lecum; quod non faciet atra bilis: cognoscemus verò esse fecem adustā, si antiqua fuerit illa durities, quia humores quoque frigidi diutius detent in aliqua corporis parte.

et necessariò exsiccantur, calefiunt, & tandem aduruntur: valebit ergo, nuper intumuit lien, ergo fæx sanguinis non adusta peccat, iam diu est quod intumuit, ergo fæx peccat adusta.

Secundus locus defumptus a morbis in dicantibus melancholicum sunt varices, hæ enim sunt venæ plus æquo intumescences, obseruanturque in temporibus, testibus, in guine, ventre, in mamillis, & præcipuè in cruribus: ostendunt humorem melancholicum fæcalem; dicit enim Galenus, 2. ad Glauc. melancholicum sanguinem sæpè ad varices, & hæmorrhoidas decumbere: valet consequentia, sunt varices, ergo humor melancholicus, quia ex omnium consensu varices sunt a melancholia. Hipp. lib. de aere aquis & locis dicit, si varices spontè nascantur significare breuem vitam; si alijs morbis succedant liberant ab alijs morbis.

An verò humor melancholicus indicatus a varicibus redundet in corpore, vel tantum in aliquo uiscere, uel sit solum in loco uaricoso, id cognosci debet communium signorum melancholicorum syndromæ, quæ amplectitur signa ostendentia morbos, symptomata, locos affectos, & alios propositos fontes.

Inde enim docemur, quando poterunt varices tunc secari, quia si uiderimus a uisceribus ad varices melancholicum, succum actu decumbere, corpusque redundare melancholia, tunc nullo modo varices erunt secandæ, quia Galenus, lib. de atra bile, capite 4. profert hanc sententiã, periclitantur uaricosi, ne, si varices feces, fiant melcholici: quando uerò sint secandæ, nos docet Auicennas lib. 3. fen. 2. capite de uaricibus ubi habet hæc sententiã.

Si a uisceribus non detrudantur melancholia ad varices, sanguisque mundus sit, possunt incidi sine timore; si uerò detrudatur, sanguisque sit impurus, non sunt secandæ; quia homines sicut melancholici, & in deteriores affectus corrumpunt.

Errant ergo uel maximè infani Empirici, qui indiscriminatim sine ulla distinctione omnibus varices secant, ut non sit mirum, si in melancholiam, si in cachexiam, & hydropem uaricosi ab ijs tractati sæpè prolabantur.

Quomodo autem ex uaricibus cogno-

sci possint differentiæ succorum melancholicorum, confugiendum est in primis ad causas procatarticas; quia, ut experientia patet, modò sunt ex nimio exercitio, modò ex nimio ocio: quæ post nimium exercitium sunt arguunt melancholiam adustam: quæ uerò post ociosam uitam melacholiam fæcalem terrestrem: quod fiant a nimio exercitio, est Auicennæ loco. citato dicentis, eursores fieri uaricosos: quod fiant quoque ab ocio, & a nimia desidia, est Iuuen. Poeta sat. 6. dū dicit, uaricosus fit Aruspex ex diuturna statione.

Tertius locus defumitur a tumore hæmorrhoidum, sicque argumentamur: nuper intumescere cœperunt, & causæ calidæ externæ non præcesserunt, ergo melancholia non adusta peccat, similiter, multo ante intumuerunt, & calida procatartica præcesserunt, ergo atra adusta redundat.

Quartus locus à generatione molæ defumptus: valet enim iudice Aristot. 4. de generatione animalium) mola sit, ergo corpus crassa, & non adusta melancholia abundat, quia si esset adusta excitaret dolores, & exulceraret.

Non ramen valet viceuersa: est crassa melancholia & non adusta; ergo timendum in omni muliere de mola: quia ex Gal. 14. de usu part. 7. dicit sine femine viri non fieri molas. Dicat quicquid uult Plutarchus quod à muliere sine femine viri fieri possit: nimium certè errat, quia sequeretur, quod in virginibus mola aliquando fieret.

Errat quoque Mercurialis, dum dicit molas fieri à sanguine fluente, qui cogitur à calore, quasi quod in mola efficienda non sit necessarius humanus coitus.

Quintus locus indicans melancholiã, defumitur ab affectibus cutaneis, ut à lepra, elefantico affectu, & scabie: Galenus lib. de tum. præter naturam dicit, lepram, elephanticum, & scabiem a melancholia fieri: Auicennas, lib. 4. fen. 3. cap. de lepra dicit, si melancholia spargatur in roto, & non putrefit, lepram, si uerò putrefit, scabrem facere.

A morbis ab intemperie duo consurgunt loci, alter ab intemperie frigida, & aliquando congelante: alter ab intemperie calidissima, & siccissima: ab intemperie

rie frigidissima, & congelante colligimus humorem frigidum, & siccissimum, qui solet efficere catocum, qui re vera non fit ab atra, nec a face adusta, quia cathochi causa debet esse congelans, erit ergo fæx melancholica frigidissima, & siccissima orta a simili intemperie. verum quia catocus citò fit, & citò desinit, indicabitur, vaporem frigidum, & sicum ortum ab hac melacholia esse immediatam causam illius affectus: Valebit enim consequentia, est catocus, ergo in corpore abundat melacholia frigida, & sicca.

Si verò intemperies frigida, & sicca generans melancholiam auferatur, fæx tamé melancholica longo temporis spatio in aliqua corporis parte relinquatur, necessarium quoque est, vt adatur, deinde morbi fiant calidi: hinc si diutius retineatur fæx melancholica in Porta, necessarium est, vt adatur, & sic adusta, si stomachum petat, gignat picam, si verò mesenterium, vel omentum diutius occupet, hyppocondriacam passionem efficiat.

Hic non possum omittere, quin reijciam sententiã nonnullorum dicentium, picam, & hyppocondriacam passionem ab atra illa melacholia, quæ a flaua combusta fitenasci, quia clarissimè patet in anarome, venas vestientes stomachum, & mesenterium, vel omentum a porta venis, quæ est tertiostris melacholice domicilium, nasci, quare non fiet ab atra illa exedente, quia hæc ibi non habet suam sedem: præterea hyppocondriaca passio fit ex stomacho frigido, & hepate calido: atra a materia frigida fieri non potest.

Ab intemperie calidissima, & siccissima diutius affligente atram bilem furiosã dominari posse colligimus: reddimur nos certi, si mæstitie sine causa vexare incipiant: Hinc post febres ardentes, post confusiones aeris calidissimas, post diuturnos labores, & maiores atram bilem adustam redundare videmus.

Denique a latis viceribus indicatur melacholia, valet enim lata sunt vlcera, ergo melacholia, verum non frigida, & terrestris, sed adusta, quia continuum et rodere pertinet ad adustam, cognoscemus eam esse atram ortam ex bile combusta, si quotidie magis exedat: si verò læ-

sa conseruabuntur, & in deterius non prolabentur, erit melacholia, quæ est fæx sanguinis diluta.

Amplius cum motus morbi pertineat ad essentiam morbi, vt docet Galenus 3. de crisi bus, cap. 4. motus quoque pariet locos offendentes humores peccantes; Verum quia motus est vniuersalis, vel particularis, ab vtroque colligimus locos indicantes melancholiam: Ab vniuersa li, dum videbimus principium alicuius morbi esse valde tardium: a particulari duos locos colligimus, alter est a typis, valet. n. consequentia, morbus mouetur de quarto in quartum, ergo peccat melacholia: alter est a motu morbi in determinatis quibusdam horis, valet mouetur vespere, ergo melacholia peccat: sed quia de motu morbi, lib. 5. cap. 4. diffusè egimus, non est, vt hic eadem repetamus.

Colligamus itaque a morbis vndecim nasci locos indicantes melancholiam, quorum primus est tumor splenis: secundus varices: tertius tumor hemorrhoidum: quartus generatio mollæ: quintus morbi cutanei quales sunt lepra, elephanticus, & scabies: sextus intemperies frigidissima: septimus intemperies feruentissima, dum diutius vexant patientes: octauus lata vlcera: nonus motus tardus morbi: decimus typus quartanarius: vndecimus motus morbi in horis vespertinis.

Et Melancholici succi præcognoscantur per syndromen signorum communium, desumptorum à symptomatis, locis affectis, & iunantibus, & cadentibus.
Cap. X.

A Symptomatum serie colligi quæ possint loci melacholiam indicantes: quot erunt genera symptomatum, tot erunt loci valentes indicare melancholicos succos: genera symptomatum sunt læsæ actiones animales, vitales, naturales, exercetæ & retenta præter naturam & demum qualitates mutatæ.

Ab actionibus restrictis animalibus ab imaginatrice scilicet deprauata in primis colliguntur nonnulla symptomata, ostendentia melancholiam in communi, deinde tres obseruantur loci indicantes determinata succorum melancholicorum differentias.

Symptomata, quæ sunt communia cuiuslibet succo melancholico, pertinent ad imaginatricem lefam, tradunturque à Gal. 3. de loc. aff. 7. ubi dicit, omnes melancholici timent non timenda, & mærent non mærenda, vitam damnant, & odio habent homines; isti dum audiunt melancholicos de aliquo morbo loquentes, subito illo morbo vexari putant: creduntque ob varios internos timores quæ sunt prorsus impossibilia: fertur fuisse melancholicum credentem se in ventre gladium transigentem percussisse alium, (referente Galeno loco citato credentem se esse gallum, alium verò testem esse factum).

Verum, quia hæc sunt symptomata communia, à quibus nullum remedium haurire possumus, est necessarium, ut illa perquiramus symptomata, & locos específicos, qui ultimis differentias succorum melancholicorum nos possint docere: Specifica igitur symptomata ab imaginatrice desumpta varia sunt; alia enim ostendunt atram bilem ortam ex flaua superassata, alia faciem sanguinis.

Quæ verò atram bilem ostendunt habent iunctam mæsticiam cum audacia & furore, isti enim audaces melancholici semper potius mærent, quam timent: de ijs loquens Hipp. lib. de morb. vitg. dicit, melancholicos aliquando se strangulare, & in puteis demergere, vel alio modo sibi mortem consciscere; videtur igitur valere consequentia, mæstitia est sine causa cum audacia, & furore, ergo peccat atra bilis orta ex flaua superassata.

Similiter, Galenus de hac melancholia loquens 6. aph. 53. dixit, hanc cognosci ex studio, & temeritate: otitit ergo locus cognoscendi atram bilem à mæstitia sine causa cum audacia & furore, vel temeritate iuncta, ex quo loco semper & necessario atram bilem colligimus.

Symptomata verò ab imaginatrice desumpta ostendentia faciem melancholicam adustam potius consistunt in timore, quàm in mæstitia, quia magis potest phantasma tenebricosum eleuatum ab hac facie adusta nigerrima in timorem incutiendo, quam possit eius calor in furorem, & audaciam promouendo.

De ijs, qui sunt vexati hac melancholia terrestri adusta, plurimam referuntur Gal.

3. de loc. aff. 7. refert fuisse melancholicum qui timeret, ne Atlas, qui mundum sustinere dicitur grauatus sub tanto onere ipsum à se excuteret, atque ipse cum illo collideretur, ac nos quoque cum ipso periremus; ibidem pergens Galenus concludit, hanc melancholiam potius in timore, quam in mæstitia consistere; valebit ergo consequentia, timor est sine causa, sine audacia, ergo peccat melancholia terrestris.

Amplius Galenus declaratans libello de plenitudine ca. 11. signa, quæ consequuntur acidam, & terrestrem melancholiam, habet hæc verba, isti sunt morosi, timidi, sine siti, saliuæ abundantes, & famelici, cur autem non sitiant, & abundant saliuæ superius declarauimus: ex ijs duo loci pro cognitione terrestris melancholiæ colligi possunt, alter à summo timore, & formidine sine audacia qui ostendit faciem sanguinis adustam, & non melancholiam naturalem copia peccantem, summum enim timor & summa formido fit à phantasma nigerrimo, & tale non potest fieri sine adustione; quare sequitur quod ex summa formidine sine audacia, & temeritate colligatur locus indicans faciem sanguinis adustam, alter locus à saliuæ abundantia, & sitis, catentia cum timore sine causa colligitur, qui indicat melancholiam, quæ est fax sanguinis non adusta.

Verum, quia melancholici ob imaginatricem deprauatam modo sunt cum risu modo cum fletu, modo cum studio, & temeritate, modo multum loquuntur, modo præter rationem tacent ex Galeno, & Hippo. unde hæc fiant, est videndum: Hippo. & Galenus 6. aph. 53. dicunt, quod desipientiæ cum risu sunt securiores, quia arguunt copiam sanguinis, qui est succorum omnium suauissimus: sed re vera non à sanguine fiunt, sed à facie sanguinis, dicit tamen à sanguine, quia, ut plurimum ubi est multa fax, sanguis quoque est copiosus; ostendimus superius valere consequentiam, sanguinis maxima est copia, ergo eius fax quoque copia peccat.

Quare videntur errare credentes melancholiam cum risu à sanguine prodire: à sanguine sanè nulla prodit mæstitia, & melancholia: concedi tamen potest, melancholiam cum risu indicare posse copio-

piofum sanguinem, quia vbi est fax copiofa, fupponitur fanguinem multum efle, non propterea dici poteft à fanguine produci.

Addit Galenus, quod defipientie temerariæ funt omnium periculofiffimæ, quia funt ab atra bile, quæ vero funt cum ftudio fine temeritate medio modo fe habent, quia non ab atra bile, fed à fæce adufla funt; videntur igitur valere hæc confequentiæ, eft defipientia cum rifu, ergo fax fanguinis dominatur, eft cum fletu, qualis erat in uxore Dealcis, ergo fax adufla, non atra bilis furiofa; quia furor uel audacia non admittit fletum.

Fax tamen adufla faciens fletum, uel eft ualde adufla, uel putrida facta, quia fax melancholica moderatè adufla non putrida tantà mæftitiam parere non poteft, ut fletum inducat; eft defipientia cum ftudio, temeritate, & audacia, uolunt percutere, uel mordent proprias carnes, ergo atra bilis dominatur, ex ijs quoque colligimus eodem locos indicantes differentias fuctorum melancholicorum, quia à rifu indicatur fax fanguinis non adufla, à fletu fax fanguinis adufla, uel putrida: ab audacia, & temeritate atra bilis excedens & furiofa.

Denique ex nimio, & non naturali fientio, quod pertinet quoque ad functiones animales, colligimus locum offendentem melancholiæ redundantiam; Galenus enim declarans libris de morb. uulg. Hiftoriam uxoris Dealcis habet, præter rationem tacere efle fignum melancholicorum & multum loqui phreneticorum.

Videndum eft, quæ melancholiæ fpecies indicetur à nimio ægrorum fientio, dicimus itaque multum tacere non arguere atram bilem, quia eius proprium eft furere, adurere, pungere, irritare, mouere linguam, & omnia corporis inftrumenta, arguet ergo fæcem fanguinis fua natura frigida, cuius vapor non folum poteft fientium inducere, verum etiam catochos, qui reddunt homines fimiles lapidæ ftatuæ: qui uero multum loquuntur funt biliofi, phrenesis enim eft eryfipelas, fi uero poft multam locutionem fiant melancholici, illa melancholia erit atra bilis orta ex flaua fuperaflata, quæ phrenesim faciebat: ualebunt ergo confe-

quentiæ, fientium eft nimium, & non naturale, ergo melancholia fæcalis frigida, & congelata peccat, poft multam locutionem funt facti melancholici, ergo dominatur atra bilis orta a flaua combufta.

Veri, quia hæc fymptomata fepè mifeentur: uidemus enim melancholicos temerarios, & audaces aliquando eadem die ridere, & flere, multum loqui, & nimium tacere, dicimus efle miflos quoque humores melancholicos: namque poteft cum fæce fanguinis miferi atra bilis, & poteft fex fecundum aliquam partem aduri, & fecundum aliam conferuari inter fuos terminos.

Quo ad vitales functiones læfas attinet, inter cætera fymptomata eft palpitatio cordis, quod eft fummi momenti, præcipuè fi follibus utrum affimiletur, confellim .n. vitam aufert: uerum, quia fymptomata à melancholia prodeuntia modò funt à fæce adufla, modò ab atra bile, non negamus aliquando palpitationem fieri à fanguine feruente, fed mixto cum atra bile, ut docet Gal. 4. de loc. aff. exemplo illius iuuenis, qui fanguinis euacuatione fuit ab ea liberatus: tunc ut ambiguitas expurgeretur, expedit locos aliorum fontium adire, vbi multa inueniemus veritatis testimonia: afferatur exemplum, fit æger palpitatione affectus, qui antea craffiffimis cibis fuerit pafus, qualis funt lentescæus, braffica, & alia id genus, ibi in primo fonte propofitus eft locus à cibo craffo, qui melancholiam fæcalem indicat.

Præterea fi æger in regione, uel aere calido uixerit, locus à corporis calidi uicinitate iunctus cum cibo craffo indicat (ut probauimus) fæcem fanguinis aduflam.

Similiter, fi in fecundo fonte locum melancholiam aduflam indicantem inuenies, ueluti, quod hæmorrhoides fuerint fuppreffa, uel fplen ante fuerit fubtimidus, eo magis confirmaberis in fententia, quod fcilicet melancholia fæcalis redundet.

Denique locos his propofitis refpondentes inuenies in tertio & quarto fonte, ueluti quod eger hypocondriaca paffione uexaretur, uel fatis ulceribus præcipuè circa partes infernas premeretur, quis non affirmaret palpitatione à fæce melancholica adufla pendere? Ecce igitur, quod in palpi-

tatione perquirenda, & in qualibet consilij angustia nos virtute locorum propolitorum penetrare possumus omnes peccantes humores in qualibet corporis penitissima parte existentes.

Idem obseruari potest in palpitatione arteriæ umbelici, & ventris. Hipp. in coacis & in fine prorrheticorum dicit palpitationem umbelici & ventris insaniam excitare: quare nos eodem examine distinguemus differentias melancholicorum succorum, hoc fine, ut quomodo sit medendum dignoscamus.

Quo ad læsas functiones naturales, est locus desumptus à diminuta, vel ablata facultate expultrice, quare, si viderimus expultricem tolli, facile inde (si alij quoque loci non obstituerint) colligemus melancholiam terrestrem non adustam redundare; est enim Galeni 4. de vfu par. 5. melancholiam naturalem vim adstri&toriam sortiri, quod non conueniet melancholiz adustæ, vel atræ bili ortæ ex flaua superafflata, quia hæc suo ardore uellicant partes, & expultrices irritant ad expellendas fæces: neq; conueniet biliosis, vel pituitosis humoribus; non biliosis, quia irritant: non pituitosis, quia laxant, & non cohibent.

Ab immodicè retentis excrementis veluri, quando supprimuntur hæmorrhoides, vel mensium purgationes, statim inferre possumus melancholiam permisceri cum sanguine, & deinde aduri, quia omnes humores præter naturam retenti temporis spacio aduruntur: Hinc puerperia, si retineantur, necessariò arguunt fæcem melancholicam adustam, dicit enim Galenus in historia mulieris morantis apud frigidam aquam, sæctum attrahere meliorem, & puriorem sanguinem, & deteriorem relinquere: dum tractat quoque historiam mulieris Cyzici, dicit melancholiam ortam à puerperij retentis fuisse causam delirij, & omnium malorum ab adusta melancholia prodeuntium.

Habemus quoq; ex Galeno lib. de atra bile c. 4. quod melancholia adusta permixta cum sanguine, si febrem faciat, carbonem molitur, si uerò sine sanguine sit, & faciat tumorem atrum, tumor in cancrum degenerat, si uerò mixta cum sanguine ad cutem pellatur, elephanticus af-

fectus generatur: ualebimus ergo ex ijs sic inferre, est elephas, ergo fex sanguinis adusta peccat, mixtaque est cum sanguine est carbo, & febris, ergo melancholia crassa adusta est mixta cum sanguine; est cancer, ergo redundat fex melancholica adusta sola sine mixtione sanguinis.

Ab exeuntib. quia Galenus loquens de fæce adusta, & de atra bile, lib. de atra bile c. 3. dicit, non concrefcere, nec mûscam, vel aliud animal eas degustare uelle, terramque fermentare.

Quo ad qualitates mutatas, ictericia nigra, colores nigri, plumbei insoliti ostendent melancholiam: Sapores excrementorum per vomitum exeuntium acerbipungentes & mordicantes linguam fæcem adustam ostendunt: Galenus lib. de atra bile cap. 3. docet nos per sapores, & colores cognoscere omnes melancholias, dicitque primò fæcem sanguinis non adustam esse acerbam, habere acorem; esse aceto acerrimo similem: subdit, melancholiam factam à flaua superafflata esse hæc perniciosiorem, quatenus flaua bilis est efficacior, quam sit sanguinis subsidientia: hæc enim exdit, & plura excitat symptomata, de quibus superius egimus: melancholia uerò naturalis, ut habetur loco citato, nec intensam mordicationem, nec acorem, vel odorem sædum habet.

Denique Galenus notat errorem multorum non cognoscentium discrimen inter euacuationem nigrorum, & atræ bilis, multi enim dum vident, nigra euomi, vel per aluiuin deijci putant esse adustas melancholias, putantque egrum ad lethalem affectum disponi, quod erratum Galenus animaduertit, habetque ferè hæc verba: Ego à Pelope præceptore meo percepi, & inde obseruauitoto vitæ meæ tempore humorem puræ atræ bilis cum ægri pernicie excerni, nigrorum uerò euacuationem non rarò salutariter fieri, quia atræ bilis excretio supponit sanguinem esse exsiccatum, indicatque vitam non posse cõsistere; excretio uerò nigrorum humorù sine morsu, sine acore, qui nullam potentiam excedendi habent, est potius salutaris: Ex coloribus ergo, & saporibus possumus colligere melancholiz differentias, de quibus luculentius in quinto libro agimus.

Quintus fons continet locos affectos, qui arguunt melancholias: Primus locus erit hypocondrium sinistrum longo temporis cursu offensum: ostendimus superius, splenem læsum arguere melancholiam facilem.

Notandum aliquando in splene aduri fecem sanguinis: deinde eleuantur à splene vapores putridi, qui feriunt partes laxas, ut gingiuas, & aures, ut notat Hipp. lib. de internis affect. Nullus tamen est consensus ratione vasorum inter aures, & gingiuas. Quare valde errant illi, qui ut sanent lienolos, faciunt circa aures quamdam sectionem, quæ est vana, & contra veram medendi methodum.

Secundus sunt hæmorrhoides, in quas natura tanquam in cloacam fecem sanguinis superfluum propellit; valet, læsio est circa hæmorrhoides, ergo melancholias.

Tertius, omnes partes varicosæ ostendunt melancholiam dominari.

Quartus continebit internas partes corporis minus conspicuas, quæ irrigantur furculis venarum prodeuntibus à porta: omnes enim istæ partes, dum afficiuntur præter naturam, ut plurimum melancholicis succis premuntur, quia porta vena est sedes melancholiz, partesque istæ sunt ventriculus, intestina, splen, omentum, hæmorrhoides, vesica fellea, & cæteræ partes inferioris ventris.

Ventriculus, quia eius orificium coronæ in morem vena à porta iuxta splenem germinans amplectitur, & continuo melancholicum sanguinem in ipsum exprimit, ut aliquando picca, seu *parasilas*, vel similia symptomata excitentur: habemus enim hæc verba 4. de visu par. cap. 15. sanguis elaborationem splenis effugiens à natura transmittitur ad ventriculum; quare cum perpetua sit hæc transmissio, non possumus, nisi putare, quod ut plurimum affectus, qui excitantur in stomacho, sint melancholici. Accedit, quod vena porta scandit ventriculi fundum versus dorsum; quare cum sit referta humore melancholico, ventriculus redditur quoque subiectus infortunio melancholicorum affectuum; ibi enim ichor melancholicus per diaphanissimum potest egredi, & dolorem exasperativum excitare: ibi quoque potest porta adeo impleri, ut

comprimat ventriculi fundum, & angustum reddat, unde sexcenta symptomata sequantur.

Audias erratum cuiusdam Empirici, erat patiens sentiens circa internam dorsum partem insignem dolorem exasperativum, & præcipue post assumptum cibum: empiricus accersitus nullum aliud remedium excogitare potuit, quam dorso inunctiones, & fomentationes applicare, quod sine aliqua utilitate factum fuit.

Qui eum sanavit, sibi ante oculos proposuit locorum affectorum signa desumpta à Gal. 1. de loc. aff. 5. quæ sunt actiones læsæ, eorum situs, doloris proprietates, propria accidentia, & excrementa: quibus rectè expensis,prehendit, ventriculum fuisse læsum, quia actio ventriculi erat impedita; augebatur enim dolor post cibum; situs similiter ostendebat, ventriculi fundum esse læsum; uergit enim versus dorsum; erant quoque propria accidentia, quia vomitu aliquando premebatur, & tandem dolor exasperativus melancholiam offendere debebat, quæ cum necessariò prodeant à vena porta, & vena porta circa ventriculi fundum versus dorsum collocata sit, erat rationi consonum, ut dolor dorsi exasperativus ab humore melancholico prodiret; Rationalis medicus statim aperuit hæmorrhoides, & copiosum permisit sanguinem defluere, sanguine euacuato, uenæque porta depleta, dolor ille occupans internam dorsum partem, & cetera symptomata eadem die fuerunt sublata.

Splen, omentum, intestina omnia sunt furculis à porta prodeuntibus irrigata: quare ab his partibus læsis desumpti poterunt loci melancholiam offendentes: à vesica fellea, quia eius collum duplici venarum germine à porta originem trahente est indutum, eiusque vesicula eadem venarum sobole irrigatur, ut sanguine melancholico nutriatur, & hæc est causa, cur vesica fellea sæpe vexetur.

Præterea ramuli emergunt à vesica fellea plures, quorum aliquot associantur furculis venæ causæ in hepate existentibus: sed non uniuntur per anastomasm: aliquot tamen coniunguntur cum ramis portarum, sed per anastomasm: per quos ramos ab hepate mittitur melancholicus

succus in vesiculam: Hinc arbitror quod lapilli, qui aliquando inveniuntur in vesicula à melancholia, quæ sua natura est terrestris, facti sint: idcirco iam verò sæpè fieri, quia venula eius cernicis ob melancholiam capam tumescit, & timide claudat orificium: tunc non curabitur arquatus rhabarbaro, scolopendria, assaro, hæc enim converterent terrestris sanguinem in syrthum: curabitur tamen reuellendo sanguinem melancholicum, & terrestrem per hæmorrhoidas, quæ reuulsio erit omnibus numeris absoluta, quia fiet per vasa communia, secundum rectitudinem, per distansissima, & traheretur humor ad originem.

Quintus locus desumitur à læsæ glandulæ omenti, quæ vocantur pancreætæ, hæc enim venulis à porta prodeuntibus sunt intertextæ, suntque refertæ sanguine melancholico, quippe quibus aduratur, turbatur totum ventrem infernum excitatque flatus, qui implent omentum, & nullis remedijs possunt auferri, nisi causa fouens adultæ onis tollatur, suntque propterea irridendi empiricis, dum flatus illos demere credunt calefacientibus, augent enim magis affectus radicem.

Galenus 14. meth. cap. 15. loquens de vitijs articularibus dicit, quod calida, ut semen rutæ siluestris cum corymbis, centaurea, polium, petroselinum, & sal viperinum adeo exsiccent, & extenuent, vt si interperies ægri sit sicca sanguis excoquatür, & propter horum vsum nonnullos perire: è contra obesos vitijs articularibus his liberari.

Ibidem proponit casum cuiusdam iuuenis quadraginta annorum (dignum est admiratione quod hominem quadraginta annorum vocauerit iuuenem) obesi, qui sale theriacali, & theriaca ipsa, & alijs extenuantibus fuerit curatus. Hinc nos in melancholicis, quorum hepar igne penè emicet, vitæ debemus calida extenuantia, & exsiccantia.

A iuuantibus & lenientibus colligimus quatuor locos, qui ostendere poterunt melancholicos succos, quorum primus est examinare, an melancholice euacuatio inueniatur.

Secundus est, dum videbimus iuari ab humidis alterantibus, omnes enim melancholici conueniunt in siccitates ob-

seruandum est, quod melancholia, vt sæpe non adusta, non tollitur refrigerantibus, melancholia verò, vt sæpe adusta, & attrabilis maxime refrigerantibus mitescent, valebunt ergo consequenter, iuuatur æger ab euacuatione humoris melancholici, & ab humidis alterantibus, ergo est melancholicus: similiter læditur ob retentionem melancholicorum succorum, ergo melancholicus.

Tertius locus erit à ieiunio, melancholici enim non possunt ieiunium ferre, ad sunt tamen nonnulli, qui acida assuunt pituita, quippe eadem fame sæpè vexantur, tunc per alia signa erit excutiendus nodus, sat est in præsentia, quod vt plurimum vera sit hæc consequentia, fame nimis, & non naturalis afficitur, ergo melancholicus succus peccat.

Quartus locus, ab aceti vsu colligere possumus melancholice dominium, dicit enim Hippoc. & Galen. 3. de ratione vict. 38. quod atra bilis ab aceto dissoluitur, degeneratque in pituitam, nigra verò bilis, quæ est melancholia, fermentatur, attollitur, & multiplicatur, quia nigra acetum parit: addit Gal. in comm. melancholicis acetum esse aduersissimum: si viderimus ergo acetum aliquem lædere, merito ex lęione aceti colligemus melancholiam; quilibet locus propositus docere poterit, si verò erit coniunctus cum aliquo, pariet tunc demonstrationem infallibilem in cognoscendis humoribus, præter naturam.

Quintus & postremus, si loquamur de atra bile adusta, dulcia nocent, dicebat Galenus 2. de naturalibus facultatibus cap. 8. omnia dulcia in ijs, qui calida, & adusta natura sunt, in bilem converteri; dulcia enim, vt mel solum in his, qui naturam frigidam habent, ut dicit Galenus 2. de facultatibus naturalibus c. 8. vertuntur in sanguinem: quare si in melancholicis hominibus viderimus dulcia nocere, iudicabimus melancholias adustas dominari.

Quomodo status præcognosci possint per syndromem signorum communem in rebus non naturalibus, & in dispositione corporis desumptorum. Cap. XI.

IN numero causarum, quæ aliquando occultè lædunt corpora, sunt quatuor

que flatus: in hoc libro agere decreui de ijs, quæ nullam sui propriam, & apertam notam præbent coarctando analytico artificio superius declarato omne, quod delitescit, quodve septum est obscurissimo fallo.

Nec obijciant, me ab incæpto munere defletere, quia flatus illic ab omnibus cognoscitur, coarct. n. vbi, vbi nescit stare loco, exitum quærit, & est vestigio se prodit, propterea delitescere haud sanè diu potest, verum non solum ob eius mobilitatem, & inconstantiam, dum vagatur per omnes partes totum vellicando, ab omnibus cognoscitur, sed etiam persentitur, dum cum manifesto murmure foris erumpit.

Cui respondemus, aliquando flatus in corpore delitescere, quia non modo in ventriculo, & intestinis, vbi sentitur, coire solet, verum etiam in qualibet densa parte, & quod admiratione est dignum, in ossibus: Hinc Auic. lib. 1. fen. 2. c. 9. vbi de ventositate agit, dicit, non solum ossa flatibus corripit, verum etiam aliquando à flatibus frangi: Galenus 14. meth. cap. 7. dicit aliquando sub periostijs colliguntur flatus & tales fiunt inflationes, vt à tenuissima inflatione membrana durissima facta rumpantur ossa. Præterea ex Hipp. 7. aphor. 55. possunt fieri abscessus in ipsis ossibus: hæc igitur causa modi methodum pro inueniendis flatibus proponendam esse duximus.

Sed, quia naturæ flatus perfectè doceri non possunt, nisi causæ, & modus generationis eorum declararetur, ideo de ijs prius agendum: causæ igitur generantes flatus continentur in breuissima hac definitione, quæ à Galeno 9. de comp. ined. per loca. c. 9. traditur, flatus ab humore crasso, & viscido, & à moderato calore fiunt: in quib. verbis causa materialis & efficiens proponuntur: dum dicit à crasso, & viscido humore proponit causam materiale, quis à melancholia, vt crassa; à pituita, vt viscida eleuantur flatus, dum vero dicit à moderato calore, explicat causam efficientem.

Causa efficiens ipsius flatus non potest esse calor insignis, nec calor omnino diminutus, vel suffocatus: non insignis quia resolveret materiam flatuum in spiritus

insensibiles, & per vias fallentes sensus nostros eos dissiparet: non omnino diminutus, & extinctus, quia vbi nullus est calor, nullus quoque fit vapor, vel flatus, hinc Galenus 3. de symptomatum causis 2. dicit, flatulentias fieri in ventriculo, dum non admodum frigidus est, quia si valde perfrigeretur, nullus inde gignitur flatus ecce, quod causa efficiens flatus est calor moderatus, & non omnino diminutus, vel extinctus.

Modus generationis flatuum his verbis declaratur ab Anicenna libro 3. fen. 14. tract. 2. cap. 7. dum retinentur vapores inspissantur, & conuertuntur in flatus, vapores igitur, vt fiant flatus, retinentur, quia ob calorem diminutum non possunt ita attenuari, vt per insensibilem euacuationem absumentur, retenti adeo inspissantur, vt in crassos, & flatuosos spiritus conuertantur: hinc Galenus 2. ad Glauca. 6. dicit, quod flatuosus spiritus, & crassus comparatur aeri austro, qui discenti non potest, nisi à magno calore; magni enim caloris munus est, vapores crassos promptè attenuare & adeo expedire vias vt insensibiliter, & sine murmure flatus exeat.

Verum nonnulla prius occurrunt solvenda dubia, antequam ulterius prosequamur, quia multa sunt, quæ in igne spirant flatus cum murmure, vt castaneæ, poma; similiter, si hæc à fortissimo & caloris feracissimo homine comedantur, flatus gignuntur; ergo causa efficiens nullo modo erit calor diminutus.

Secunda, non videtur, quod causa materialis adæquata flatuum sint cibi crassi, & viscidos, quia obseruatur in multis, quo esculenta pauciora, ut ova, caro vitulina, & iuncula parvorum pullosum in flatus plurimos conuertantur.

Prius dubitationi nonnulli sic occurrunt: calorem intelligi diminutum dupliciter, vel quia absolutè, & per se fit talis, vel respectu obiecti: hæc posita distinctione dicunt, ignem, vel quævis aliq. ventriculi calorem respectu obiecti siue edulij difficiillimæ coctionis, ut sūt castaneæ, poma, & alia id genus, dici diminutum.

Quæ responsio improbat, quoniam, dum dicunt, ignem respectu obiecti esse diminuti caloris, nimis improprie lo-

quantur, omnes enim fateri debent, ignē absolute, & respectiue esse summi caloris, de finitur ignis, quod si agens omnium potentissimus in calefaciendo; quare non dabitur vnquam obiectum, cuius respectu ignis possit dici diminuti caloris.

Melius igitur respondebimus, si dixerimus, aliam esse causam generationis, aliam expulsionis flatuum: dum obieiebant, causam efficientem flatus aliquando esse ignem, vel calorem intēsum ventriculi, dicimus hanc esse causam expulsionis, & non generationis flatuum; hinc intēse calida, quæ flatus expellunt, vocantur à medicis carminatiua, quæ non gignunt flatus, sed genitos, & inclusos expellunt: dum enim crescunt in arboribus fructus sua natura frigidi, quales sunt poma, castaneæ, & similes, in his plurimi halitus, & vapores crassi fiunt, qui insensibiliter ob eorum diminutum calorem non euacuantur, sed adeo inspissentur, vt degenerent in flatus; quando verò iniiciuntur ignitis carbonibus, vel maiorem calorem experiuntur, cum magno murmure eorum flatus, qui anrea erant inclusi, erumpunt, & à nobis perferuntur: nulla itaque erit instauria, quia experimentum pomorum, vel castanearum indicat virtutem expultricem, & non generatricem flatuum.

Secundæ dubitationi potius adaptari potest responsio, quod scilicet oua, & iuscula in quibusdam respectu diminuti caloris sunt obiecta crassa, & viscida; & ratio est, quia vapores eleuari à tenui cibo in ijs ita non possunt ob caloris paupertatem discuti, & attenuari, vt per insensibilem transpirationem egrediantur, ideo est necessarium, vt inspissentur, & per consequens conuertantur in flatus: dicimus quoque, calorem fortiorem dici diminutum respectu obiecti intelligendo de flatu qui fit, & non de illo, qui est inclusus, & inspissatus, qui debet omnino erumpere, sit in igne, vel in corpore ingentissimo calore prædito.

Itaque par est, vt methodum in hoc libri initio propositam experiamur, quia, inde cognoscemus, quando flatus erunt redundantes: Quo ad proætarcticas causas, si de flatibus, qui fiunt, & non de ijs qui sunt inclusi in esculentis loquamur,

aliæ non sunt, nisi, quæ generant pituitam viscidam, & melancholiam, & quæ calorem diminutum, & moderatum reddunt.

Quæ verò calorem diminutum reddunt, erunt illæ causæ externæ, quæ suffocando, vel resoluendo calorem diminunt: quæ suffocant est cibus quatenus est crassus, & viscosus, vt sunt boleti, vel quatenus est nimius.

Quæ resoluunt calorem, inter cetera declarata in capite de pituita, est nimius coitus, à quo omnes sciunt fieri dolores colicos scelestissimos.

Verum, quia pituita, vt viscida, & melancholia, vt crassa sunt flatuum semina, ab horum humorum causis externis colligimus quatuor locos, qui poterunt indicare flatuum redundantiam, vt Primus desumatur à procaractricis gignentibus pituitam viscidam: Secundus à gignentibus melancholiam crassam, & retrestem: Tertius ab esculentis, in quibus actu inclusi sunt vapores inspissati, vel flatus, quod idem est: Quartus à nimio coitu.

Quo ad secundum fontem, vbi de dispositis corporibus ad flatus congerendos agitur, omnia loca antecedentia, & consequentia conspirantia in generationem melancholiæ crassæ, & pituitæ viscidæ obseruantur.

Primus locus sumitur ab hereditate, parentum, parentes enim toto vite suæ tempore flatibus obnoxij filios sibi similes gignunt.

Secundus ab ætate senili, in qua congregantur humores crassi, & viscidati diminutum declinantis ætatis calorem.

Tertius a debilitate, valet enim, sunt debiles, ergo ad flatuosos affectus sunt dispositi, sunt flatus, ergo debiles, prætermisitis tamen flatibus, qui non fiunt, sed sunt inclusi, hos enim in fornace ardenti egredi cum strepitu obseruamus; quod vero debilitas flatum facere possit in ventre, & in alijs partibus a ventre remotis.

Audite Galeaum 2. de composit. med. per loca cap. 10. tanta esse potest ventris debilitas, & caloris inopia, vt ex cibus, & potibus flatus ventosi eleuentur, qui corporis dolores efficiant, ecce ergo, quod ob ventris debilitatem non solum flatus in ventre aggregantur, verum etiam caput a

Ventre remotum illis impletur: neque mirandum est; à ventre mitti flatus in caput, quia Galenus 3. de sympt. caulis 2. habet, aliquando ab intestino recto flatus, & acres succos moueri vsq; ad ventriculū, & ad caput, habetque hæc verba, nam & clysteris aliquid nonnullis in ventrem subijt, ita vt vomerent; quare, si aliquid clysteris euomi possit, eo magis flatus ascendunt superius; subdit deinde Galen. acer quoq; succus, & crepitus, qui ad sedem aliquando fuerat violenter retentus in foro, rursum est fursū ductus, & ventrem, & caput impleuit: ecce igitur, quod flatus in intestino recto existentes caput implere possunt, quod negabat in quodam medicorum cætu amicus.

Quartus locus sumitur ab habitu gracili; obesi enim rarè flatibus premuntur, quoniam hypocondria pinguis conseruant calorem natium, qui flatus resoluit attenuando vapores, prohibendoque ne inspissentur, & in flatus degenerent.

Quintus sumitur ab intermissa expulsionē flatuum consueta; qui enim soliti sunt per infernas, vel supernas partes flatus pellere, si supprimantur ab aliqua causa suffocantes, vel resolvente calorem, interdeterimus morbos, eosque seuerissimos prolabantur: vidimus in Vngaria non semel insanos quosdam ægros, qui dum magno dolore colico premerentur, ad potum aquæ frigidissimæ confugerent, dolore tunc liberabantur; sed post diem, in seuiorem colicam passionem, vel in paralysem incidebant: supprimebant flatus, quia stupefaciendo sensum vires expultricem, & alteratricem tollebant, deinde cum parum reuulsisset alteratrix, flatibus crassissimis incipiebat caput impleri, & apoplexia, vel saltem paralytis excubatur.

Quæ consequuntur disposita corpora, ad flatus gignendos plurima sunt: plurimi quoque sunt inter sanitatis limites, qui perenni flatuum stridore premuntur.

Primus locus oritur ab alteratrice naturaliter diminuta, valet diminutè coquit cibum, ergo flatus emulat. Verum, quia retentrix diminuta, & expultrix irritata sunt in causa, vt alteratrix, quamuis naturaliter fortis sit, suum officium

explere non possit, sed diminutè coquat, & inde flatus accret: propterea duo loci oriuntur, alter erit ab expultrice irritata, alter à retentrice diminuta, quoties igitur quis diminutè retinebit chylum, irritatamque habuerit expultricem, perpetuis flatibus vexabitur.

Deinde ab excrementis tres loci consurgunt, duo ab vrina, quorum primus est, dum suspensa (vt dicit Galen. 2. de compos. med. sec. lot. & alibi) sursum tendunt, quod signum nunquam fermè decipit, flatus enim, qui nihil aliud est, quam vaporosus spiritus inspissatus, debet naturaliter sursum ferri; quoties igitur videbimur suspensa superficiem supernam petere (si alia non obsterint signa) iudicare optimè poterimus, illius rei causam esse flatus.

Secundus locus à lotio depromptus, est vrinæ spuma, quæ vel obseruatur, dum in vrinæ superficie diutius moratur, vel discleuantur spumosa granula, vel paruulæ bullæ ab imo matellæ ad superficiem supernam, quæ experientia obseruatur in ijs, qui vitibus fracti sunt, & præcipue in vtero generentibus, in quibus renes, & vasa omnia ad vrinam, & vterum pertinentia debilia existunt.

Tertius locus sumitur ab alui excrementis, quæ sunt spumosa, & cum plurimis flatibus emittuntur.

Deinum qualitates tangibiles, quæ obseruabantur in ijs, qui erant dispositi ad gignendam pituitam viscidam, & melancholiam crassam & terrestrem, eadem erunt hic obseruandæ, quia flatuum semina sunt humores pituitosi viscidi, & melancholia crassa & terrestris.

Deinum ex Auicenna sumitur locus, qui est à tactu, etenim lib. 1. sen. 2. cap. 9. dicit, per tactū nos cognoscere partē flatibus repletam, quādo cedit pressioni digitorum: Colligas ergo septem dari locos indicantes flatus desumptos à dispositione corporis: primus est ab alteratrice diminuta; Secundus ab expultrice deprauata. Tertius à retentrice diminuta. Quartus à suspensis quæ sunt in vrina sursum tendentibus. Quintus ab vrinæ spuma, seu bullis sursum tendentibus. Sextus ab excrementis spumosis. Septimus dum pars tumida cedit pressioni.

Vi status innotescant per syndromem signorum desumptorum a morbis, symptomatis, locis affectis, & à iuuantibus, & lædentibus. Cap. XII.

Syndrome perfectissima esse non potest, nisi ex quolibet fonte vnicum saltem locum, qui ab alijs non dissentiat, colligamus: Propositi sunt loci externarum causarum, & dispositionum viscerum indicantes status, reliquum est, ut à morbis, symptomatis, locis affectis, & à iuuantibus, & lædentibus apertiores colligamus, ut in hac solertia locis vel maxime abundemus.

A morbis duo præcipui oriuntur, alter à tensio tumore sine pondere, & gravitate.

Alter à celeri motu tensionis; motus enim libro 3. de Crisibus 4. pertinet ad morborum essentiam; valebit ergo consequentia de primo loco loquendo, tensio ab ægtis perferentur sine gravitate & pondere, ergo status dominantur: hinc a tympanitico non sentitur gravitas, ut ab ascitico: similiter, dum status occupant penem, & priapillum constituunt, tensionem sine pondere efficiunt.

Si de secundo loquamur, iusserimus status à celeri motu tensionis: etenim, si citò fiant tensiones, hæc & citò desinant, ab alijs causis pendere non possunt, quam à flatibus: & licet erysipellata legitima citò fiant, & citò desinant, arguere tamen status non possunt: quia non efficiunt tensionem, & tumorem.

Ab intemperie, & soluta unitate loci indicantes status, qui sint viles, non colliguntur: non ab intemperie calida, quia hæc discutit: non à frigida, quia Galenus 12. methodi cap. 8. nos docet crassa, & glutinosa excrementa flatum solum facere, dum calefiunt, habetque hæc verba: crassa, & glutinosa excrementa gignunt „ flatum, dum calefiunt; quare intemperies „ frigida, & humida ex se nullomodo flatum gignere possunt; quatenus enim intemperies frigida impedit, ne crassa & glutinosa excrementa calefiant, prohibet generationem flatum: quinimmo frigidiorum visus status gentios pauco temporis spacio magno tamen cum ægotan-

tium detrimento suppressit.

Audias ut malè agunt in Vngaria nonnulli vecordes, qui patiuntur colicum dolorem ob flatum retentos: aquam frigidam copiosè hauriunt, & statim liberantur, sed paulò post in fecestissimam colicam, & tandem in paralyfim incidunt. A soluta verò unitate locus indicans status colligi non potest, quia status ulcera & solutas unitates moliri haud possunt.

A symptomatibus oriuntur decem loci, quorum primus sumitur à celeri motu symptomatum sine periodicatione, venientium; omnes enim humores status quibusdam diebus homines vexant, quare, si viderimus symptomata cito adoriri, & cito desinere, iudicabimus à flatibus effici.

Hinc dicemus immediatam causam cataleptis esse flatum, vel vaporem crassam, quia cito fit, & cito desinit; status enim in hoc affectu cleuatur à melicholico succo, qui sua frigiditate nervos destinatos morui densat, & congelat, perinde ac homines ob capitis Medusæ conspectum in lapides conuerterentur, cito tamen reuiuiscunt; solet enim quatuor, & pluribus vicibus eodem die hoc symptoma reuerti.

Incubus quoque affectus, quo patientes, dum dormiunt, se strangulari credunt, est symptoma, quod fit à flatu crasso, vel viscido semiobstruente nervos inseruientes thoraci; quia parum durat.

Similiter symptoma, quod saltus dicitur, Italicè ganso, à flatu fit, cito enim fit, & cito discutitur, etenim, si manus calida parti saltu laceratæ adiungatur, illico tollitur: recipiatur igitur rãquã expetentiæ notissimè, quod symptomata omnia, que oriuntur à flatu cito fiât, & cito desinant.

Nec obijciant, epilepsiam aliquando cito fieri, & cito desinere, arguere tamen humores, & non status; quia negari potest, epilepsiam ab humoribus immediatè fieri; pro hac sententia est Auerroes, qui firmiter tenet epilepsiam fieri à flatuosis spiritibus, & quamvis Auicenna ubi agit de hoc affectu, dicat, fieri ab humoribus, non potuit tamen omittere, quod si diceret, pituitam faciètem epilepsiam putrorum esse statulentam, & quamvis Gal. 3. de loc. aff. 7. dicat ab humoribus, & non à fla-

à flatibus fieri, d'cere possumus, humores esse causas mediatas, auras flatulentas verò immediatas: sed quicquid sit de hac re, nos non defendimus, quemlibet locum feorsum consideratum indicare ex necessitate causam efficiëntem, sed dicimus locorum syndromem summam in docendo efficiaciam habere.

Secundus locus est à doloribus extensivis sine gravitate, & pondere desumptus, hic colligitur ab Avicenna li. 1. fen. 2. cap. 9. ubi vult, dolores extensivos sine pondere ventositatem significare: tales dolores extensivi sine pondere sepe observantur in colo intestino, de quibus Gal. 12. methodi cap. 8. habet, tunc excitari dolores extensivos colicam facientes, quando inter spacia tunicarum intestinorum includuntur humores efficiētes colicam; latus enim ibi vi sua extensiva scelestissimos dolores sine aliquo pondere effucere possunt.

Tertius locus flatum indicans sumitur à symptomate huc, & illud errate: si viderimus dolores diuagari, & modò vnam partem, modò aliam ambulando lacera-re, flatum prædominari iudicabimus, valebit enim symptoma diuagatur sine loco dimaffectorum pondere, & cito dimouetur, ergo vapor, uel flatus, quod in idem recidit, peccat; etenim vapor omnis uel est subtilis, & sic per insensibilem, transpiratum sine læsione resoluitur, uel est inspissatus, & hic est (ut ostendimus superius) flatus.

Quartus locus desumitur à læsis actionibus vitalibus inter quas præcipuè est palpitatio: Quæ re uera sit dum cor dilatatur, quia impletur; neq; uerum est quod implicatur, quia dilatetur. Aristoteles pace sua non nouit causas motus cordis, dum lib. de respiratione dixit sanguinis ebullitionem facere diastolem: aerem uerò inspiratum facere systolē. Similiter errant qui tenens à natura fieri systolem, & ab anima diastolem: ueritas uerò confirmata à Gale. & ratione ipsa est, quod necessitas euentandi calorem faciat diastolem, necessitas uerò euacuandi fulgines efficiat systolem: quare implentur arteriæ & uentriculi cordis aere, quia dilatantur, & non uiceuersa ut fit in palpitatione sine solibus utrius in qua cor di-

latatur quia impletur à flatibus: Galenus enim 6. de loc. aff. dicit flatus efficere palpitationes.

Quintus ab actionibus naturalibus, ut ab alteratrice, uel ab expultrice diminuta necessario clydones & inflationes ventris sunt; ab alijs uerò actionibus naturalibus læsis quomodo flatulentia colligantur in secundo fonte declarauimus.

Sextus ab exeuntibus, quæ cum mania festo crepitu, & spuma excernuntur.

Septimus à retentis flatibus, quia Galenus libro de plenitudine dicit, quod intercepti flatus summos dolores excitant: tertio de sympt. causis 2. dicit Gale. cum flatus nō excernantur per os, neq; per sedē, sit symptoma, quod empuematosis, i. inflatio ventris dicitur, quod symptomata oriuntur ab expultrice diminuta, uel ablata.

Amplius tres loci admodum utiles observantur ab Avicenna lib. 1. fen. 2. cap. 9. quorum primus colligitur à motu membrorum, ex saltu enim, uel palpitatione partium cognoscimus flatus redundare: mulieres persæpè flatibus refertæ putant vtero gerere, dicuntque manifestas fetus motiones pati, easque sub manibus proprijs factum se mouentem sentire, attractæ post 8. menses vice fetus flatus pariūt.

Secundus à sono colligitur, ex vetricis. n. rugitibus flatus noscuntur: hinc tympanitum ab ascite per ventris sonum distinguimus: hinc aurium sibilus sunt campanæ specimen præferens indicat ibi flatus dominari, necessariò enim infernus est sibilus aurium, tympanitis, suntque rugitus ventris, ergo flatus.

Tertius à tactu desumitur, si locus affectus cedat pressioni, & illico redeat, erutus: patet experientia in uelicis flatibus extensis, quas si digitis comprimantur, illico redeunt: Galenus 14. methodi cap. 7. tradit differentiam inter œdômæ, & tumorem factum à flatibus, dicitque: tumores flatulētos digitis pressos non retinere vestigium, sed sonitum veluti tympanum reddere, œdema uerò vestigium retinere.

Quantum attinet ad quintum fontem, dicimus, quod omnes partes in quibus naturaliter pituita, uel melancholia suam sedem, & domicilium habent, si affectæ sint, possint inflare flatus, etenim pituita viscida, uel melancholia terrestris diu-

tius in illis partibus detenta, si calor sit debilis, in flatu resoluendi possit, si fortis, in auram subtiliorem abeat, & per fallentem sensum nostrum transpiratum exhalat: partes uero nostri corporis, quæ præcipue flatibus uexantur, sunt illæ, quæ obnoxie sunt pituitosis, uel melancholicis affectibus, quas declarauimus in capite de pituita, & melancholia: à Galieno in partes, quæ præcipue à fratribus uexantur, 24. method. cap. 7. referuntur, dicitque inflationes aliquando colligi sub cute, aliquando sub periostijs, & sub membranis, quæ musculos, uel uiscera includunt: aliquando in intestinis, uentriculo, in medio spacio horum, & Peritonei.

Præterea, si partes affectæ ignorantur, confugimus ad quinque illos uniuersales locos pro cognoscendis affectibus partibus propósitos à Gale. 1. de loc. aff. 3. quæ sunt excrementa, proprietates dolorum propria accidentia, situs, & actio læsa.

Ab excretis per aluum cum spuma, & sonitu ex Hipp. colligimus caput esse læsum; sonus acutus indicat flatum esse in loco angusto; sonus uero, qui imitatur bombos in loco amplo: hinc Galen. 3. de sympt. causis cap. 2. de flatibus in intestino, rum loquens dicit, si spiritus flatuosus acutus, & tenuis sonet, defertur per uacuum, & prorsus angustum intestinum; subdit flatum si sonum edat exiguum in tenuibus uolvitur intestinis, si nec prorsus acutus, nec tenuis, indicatur iciumum flatibus, premi, si uero adhuc minus sonori sint, signum est ad alia tenuia intestina deicendere, quæ sunt latiora, flatu uero, qui bombos imitatur, sunt in crassissimis intestinis, quando excrementorum tuu uacua.

A dolorum proprietate, diximus ex Auicenna, quod ubi sunt dolores extensui sine grauitate, ibi sunt partes, quæ excruciantur flatibus.

A proprijs accidentibus, qualia sunt, quæ cito desinunt, ut saltus, uel palpitatio partis.

A situ accidentium producentium à flatu, qui colligitur ex illis tribus signis ab Auicenna propósitos, scilicet ex motu membrorum, ex sonitu, & ex tactu, dum partes cedunt pressioni, & redeunt.

Demum ab actione læta illius partis; ualeat enim consequentia, flatu sunt in ventre, ergo uenter diu iuyum habet actio-

nem, & uersa vice. Per hos locos cognoscere possumus partes corporis flatibus laceratas: quibus præcognitis, cognoscemus, quando causa efficiens affectionis erit flatu.

Postremo est sextus fons, qui est de iuuantibus, & ledentibus, in quo collocatur duo loci, primus consistit in hoc examine, ut uideamus, an euacuatio, uel expulsio flatuum maxime iuuat, & an retentio noceat: quia si euacuatio agrum subleuauerit, & retentio affectum auxerit, colligemus flatum in culpam illius aegritudinis transire.

Secundus, si iuuantia sint calida & sicca, nocentia uero frigida, & humida eo magis confirmabimur, flatum in corpore redundare: Calida & sicca, quæ flatum discutunt, inter cetera à Gale. 12. method. cap. 8. probantur allium, & anisum, dicit allium coctum esse ex illorum ciborum generatione, qui & flatum discutunt, & minimam si cum inferunt: septimo de simp. med. de cimino dicit, inter omnia discutientia inspissatos & nebulosos flatus cimini ualere dissipare, & eodem li. cap. de nigella dicit, nigellam summam præstare opem in elidendis flatibus: Similiter ruta, ut dicit 8. de simp. med. mirabilem uirtutem in flatibus discutendis habet.

Præterea, si iuuat cucurbita à Galeno propósita 12. method. c. 8. quæ cum magna flamma sit administrata, spiritum flatuosum tam excellenter tollit, ut simile quid incantamenti efficiat, dicimus propriam causam aegritudinis esse flatum.

Ledentia, & flatum cumulatia, uel sunt, quæ habent inclusum flatum, quæ non solum ubi est diminutus calor, sed in ardentissima fornace edent crepitus, ut poma, castaneæ, fæculi, cassia, & alia id genus: uel sunt frigida & crassa, quæ actu non habent inclusum flatum, sed ex illis fit, ut sunt pitæces, lac, caseus, quorum uapores inter cœcoquendum ob uires uiscerum collasas, & fractas adeo crassescunt, ut amplius per angustissimos meatus insensibiles non possint exire, sed sic inspissati in flatu degenerent.

Si igitur uiderimus, flatum illico gigni, non ab ijs, quæ inclusum habent flatum, quia quilibet fortissimus, & robustissimus ex ijs pati potest, sed ab illis crassis propósitos terculis, quæ flatu solum ob diminutum calorem efficiunt, tunc colligere

gere poterimus in illo corpore redundare flatus: duo ergo præcipui loci erunt in hoc fonte ostendentes flatus: alter dum æger subleuabitur a flatuum euacuatione, & intendetur affectus flatuum retentione: alter, ut rectè sciatur, quæ alteratia iuuent, & quæ noceant.

De Polyæmia, seu de sanguinia vbertate per signorum communium syndromen perquirenda. Cap. XIII.

DE sanguine hic non esset agendum, quoniam in peccantium humorum censum venire non videtur; quia, si alteretur, & supra modum calefiat, ex Galeno 3. de symp. & 2. de diff. feb. 9. & 2. de crisi. 12. & ex Auicenna lib. 1. doct. 4. c. 1 pars tenuior sit bilis, crassior verò melancholia, de quibus humoribus egimus superius: Verum, quia sua vbertate aliquando ita venas distendit, ut eas frangat, & inde homines ducat ad hæmorrhagias adeo præcipientes, & periculosas, ut cachexias, & mortes adferat: proinde erit necessarium, ut methodum proponamus, quæ nos posset docere, quando in corpore sit polyæmia; quæque desumi poterit à procatarcticis, à dispositione patientis, à morbis, à symptomatibus, à locis affectis, & à iuuantibus, & ledentibus: vtilissimus erit discursus non solum pro comparanda hac methodo, verum quia cognita polyæmia, sciemus quoque, quando erit administranda phlebotomia.

In causis procatarcticis sex obseruatur præcipui loci indicantes polyæmiam, quorum primus desumitur ab ære calido, & humido, sed temperatissimo: Secundus a cibo, & potu simili: Tertius, a somno: Quartus a balneo: Quintus a letitia: Sextus ab exercitio consueto prætermisso: Quo ad primum est ær calidus, & humidus temperatus sanguinem augens, qui inuenitur tempore veris, vel, ut putant medici, in regione, seu climate omnium temperatissimo; ærem veris dicit Galen. 1. de humor. com. 1. & alijs in locis, sanguinem augere estatis bilem, autumnii melancholiam, & hyemis pituitam: ratio autem, cur ær veris sit accommodatus polyæmiæ, est, quia sanguis, ut dicit Gal. 2. de natur. fac. c. 9. & alibi, copiosus sit à

moderato, seu mediocri calore, & ralis caloris moderantia inueniri non potest in alijs anni temporibus, nisi in vere, vel ut aiunt, in regione, vel climate omnium temperatissimo; ibi enim dicunt, calorem ad æqualitatem peruenire.

Verum, sicuti apud omnes philosophos & medicos res est certa, quod ær veris temporibus omnibus sit temperatior, non tamen consentiunt de climate, quodnam scilicet sit omnium temperatissimum; hoc igitur breuibus est videndum, prius ramen quid sit clima, & quor sint, dicamus; Clima significat spaciū duobus parallelis clausum, quo dici longitudo ad dimidiam horam variatur; climata septem sunt. Sub primo, quod vocatur Dianæ roes, qui transit per Meroen Insulam, continentur plura loca, .i. Insulæ Fortunatæ, pars Arabiæ, Nubi populi, Goa famosissima ciuitas, Insula S. Thomæ, & plurimæ aliæ Prouinciæ. Sub secundo, quod dicitur Diasyenes, sunt Getuli, Fretum Persici sinus, Regni Chinæ maior pars. Sub tertio, quod vocatur Diaalexandria, quia transit per Alexandriam, est Ægyptus, Persia. Sub quarto, quod dicitur Diarhodos, quia transit per Rhodum, est Cyprum, Creta, tota Sicilia, & Coos Hippocratis patria. Sub quinto, quod appellatur Diaromes, quia per Romam transit, est Byzantium, Hispania, & media Italiæ pars: sub sexto, quod dicitur Diapontos, quia transit per Pontum mare, est Lombardia, Veneriæ, Fecaria, Vngaria, & Galliæ magna pars. Sub septimo, quod Diaboryesthenes vocatur, est Germania superior, Polonia, & plura alia: qui verò distinctius scire vult, sub quo climate sunt omnes Prouinciæ, adeat Geographiam Ptolomæi.

Magnum est dissidium inter medicos, sub quo climate inueniatur ær temperatissimus, vel saltem habitatio ceteris omnibus temperatior, & accommodatior: Auicenna lib. 1. scñ 3. cap. 1. & prima primi doct. 2. summa 1. cap. 1. tenet, quod sub æquatione diei, ubi incipit primum clima, nisi montes, vel maria impediunt, sit locus habitationis omnium temperatissimus, quia rectitudo solis super capita minus ibi malum operatur, & minus mutatur ærem, quàm solis propinquitas apud

timorem, inter animi tarditatem, & precipitum, misericordiam, & inuidiam: illoq; sit alacer, amicum amans, humanus, & prudens: addit & qui probe concoquit in ventre, in venis, & in toto ambitu corporis, habetq; naturales, & animales virtutes inculpatas, sitq; sensuum, facultatibus, & moribus optimis præditus viuio sit colore, & ad perspiratum excrementorum bene comparatus, sitque medius inter somnolentum, & peragilem, inter nigrum, & album, pilosque habeat, dum puer est, magis rufos, quam nigros. Quis dicet tales solum inueniri sub æquinoctiali, vel in tertio, quarto, quinto, vel sexto climate? cum possint inueniri in quolibet climate temperamentum cum propolis signis.

Tantum potuit hæc veritas, vt per celebres medicos, & philosophos, qui de hac disputarunt, veritate coacti in bonam opinionem inciderint, quæ erat, quod proprium, & patrium clima, vt omnibus magis accommodatum, sit temperatissimum omnium: Hinc Hipp. Galen. & Auicenn. laudant quartum clima, sub quo vixerant; quartum enim per Gnidum, & Conon, vt dicit Galen. 3. aphorism. 14. transit: Auerroes Cordubensis, cuius patria est in Hispania, quintum: Manardus Ferrariensis, suum sextum alijs anteposuit: Albertus Magnus Germanus Ratisbonæ natus dicit, esse credendum septimum (quod suum erat) esse temperatius, quia homines sub illo sunt pulchriores, & proceræ stature.

Hinc Galenus, quamuis defenderit quartum esse temperatius, non tamen potuit omittere, quin diceret loco citato, quod omnes regiones respectu proprio habitatum sunt temperate, illis exceptis, quæ sunt frigidissima, & calidissima, vel remotæ à mari.

Excludit hæc frigidissima regiones remotæ à mari, non quia vaporibus, sed quia frigore, & quia remotæ à mari.

parari posse temperatissimum Arabo, vel Abyssino; sola enim propria habitatio à primordijs constitutionis acquisita est animantibus accommodata, & temperata; alienæ verò sunt incommode, & ferè omnes intemperatæ: si elephantes in Italiam ducantur, ob climatis diuersitatem virtutem generandi amittunt, viuere tamen diutius possunt: si verò in Germaniam, & regiones frigidiores ducantur, non solum facultatem gignendi amittunt, verum quæcitissime moriuntur, nisi in calidis locis conferuntur. Similiter animalia regionis frigida, vt Sabelini & alia id genus, si in Italiam ferantur (vt experientia probatum est) viuunt, speciem tamen propagare non possunt; si verò in Africam ferantur, virtutem generandi, & simul vitam quæcitissime amittunt.

Itaq; vanum erit inquirere, quod clima absolute melius sit; quia in quolibet climate inuenitur temperamentum, quo temperatus esse non potest: quilibet enim homo temperatus in proprio climate erit intemperatus in alienis, & quilibet intemperatus in proprio inueniet clima respectu illius magis temperatum: itaq; valde conuenit, vt inquiretur quod clima conueniat frigidis, quod calidis, quodve siccis, vel humidis: habet igitur Galen. 3. aphor. 14. ubi aer est siccus, humida naturæ sentient utilitatem; natura verò sicca in aere sicco ob constitutionem, vel ob climata incidunt in febres, & lipitudines, & aliquando in atra biles, quia portio humida in bile absorbitur, & exsiccatur: similiter natura frigida in frigidissimo aere congelatur, calida contemperatur; quare non est inquirendum, quod clima absolute sit temperatius, sed quod sit magis accommodatum humidis, quod siccis, quod calidis, & quod frigidis temperaturis: dicendum igitur est, quod ipsi, qui natura calidissimi sunt, primum clima sit valde contrarium, & inimicum: septimum verò amicum: frigidissimis secundum est contrarium; primum verò est accommodatum.

Line Delphicum Oraculum (vt refert Ptol.) dedit responsum euidam huic, & frigida affectione correpto, vt in quā Regionem calidam se transferret, vt ibi habitum frigidum ad tempe-

ratum reduceret, vnde promptius sanguinem, & non pituitam amplius auget. Ex aere igitur veris, & climate temperaturis accommodat, quod erit facile, vt inueniatur, colligimus polyæmiā.

A cibo, & potu colligimus sanguinem à cibo, quia 3. de alim. fac. Galen. dicit, panem, volatilia, vt perdes, & quæ facilis digestionis sunt, conuertuntur in sanguinem: A potu 3. de alim. fac. cap. 4. habet viuorum omnium rubra, & crassa sanguini generando esse accommodatissima, vt quæ minima egent mutatione, vt sanguis fiat; verum, sicuti omnia climata possunt esse temperata, & imtemperata respectu diuersorum; Similiter alimenta respectu diuersarum naturarum possunt conuerti in sanguinem, & in malos humores.

Doctrina hæc colligitur à Galeno 2. de naturalibus fac. cap. 8. vbi dicit, quod mel in naturis calidis vertatur in bilem, quia calidum enim sit, ubi calido adiungitur, mediocritatem temperamēti facile amittit, & sanguinem generare non potest: subdit mel in frigidis naturis, & senibus vertitur in sanguinem: hæc igitur ratione coacti de omnibus cibis poterimus cognoscere an polyæmiā fecerint.

Si viderimus hominem calidi temperamēti comedisse mel, & alia id genus calidi nutrimenti, & facilis digestionis, dicemus bilem, & non sanguinem in illo esse acervatam: si frigidus, dicemus potius sanguinem esse accumulatum: Idem de cæteris omnibus cibis erit dicendum.

Ex cibo ergo, & potu locus oritur indicans polyæmiā, qui consistit in hoc, ut examinemus quibus temperaturis conueniant alimenta gignentia sanguinem, quia inueniemus in frigidis alimenta calida sanguinem augere, & frigida in calidis, & humida in siccis, & moderata in moderatis.

A somno moderato sanguinem augeri colligimus, de qua re auxilias Galenum 12. meth. c. 3. somnus moderatus cruditatem leuat. Subdit deinde somnus concoquit, vigilæ digerunt; causa vero, cur somnus concoquat, & vigilæ digerant, traditur à Galeno 4. in 6. de morb. vulg. tex. 14. ijs verbis, in somno calor ad internas partes repocatur, & melior co-

ctio fit: Hinc Galenus 4. de tuend. san. c. 4. semper sibi consentiens habet somnum & quietem semicoctos humores optimè coquere & perficere: His positis quisque ex somno moderato non intercepto colligere poterit polyæmiā.

Ab usu balnei aquæ dulcis ob duplicem rationem idem colligitur: prima est, quia inducit somnum: ostendimus superius somnum semisanguinem perficere, & cruditates tollere: Gal. verò 3. de loc. aff. 5. reddit rationem, cur balneum soporiferum sit, dicitque balneum, eo quod caput madescat, soporiferum esse; multæ enim sunt lotiones ex aqua dulci, & papauere paratæ, quibus si aluantur capita, illico somnus inducatur. Secunda est, quia balnea dulcis aquæ calefaciunt, & humectant, & trahunt sanguinem ad nutriendas partes, quæ dum bene nutritæ sunt statim conspirant in copiosi sanguinis productionem.

À lætitia moderata augetur sanguis, quia sicuti balneum diffundendo efficit meliorem nutritionem, & auget vires alteratricis facultatis, & ad eundem modum lætitia idem præstat; hinc Gale. de lætitia loquens lib. de hum. com. 2. tex. 31. dicit, nam cogitare, & videre quæ iucunda sūt, animum lætitia peritundit, natuumque calorem dilatatum igitur ob lætitiā natius calor dilatatur necessariò secum fert sanguinem ad rectè nutriendas partes, quia natui caloris domicilium, vt sæpè dicit Gal. est sanguis, & necessariò calor cum sanguine mouetur.

Præterea 4. de causis puls. cap. 3. habet, quod lætis diffunditur per vniuersum corpus calor, vnde meritò sit maior pulsus, ex hac igitur dilatatione caloris moderatur internum incendium viscerum vnde melior coctio, & ad omnes corporis partes fertur pabulum, unde melior nutritio: ex meliori igitur coctione, & nutritione necessariò copiosus, & optimus sanguis gignitur: diximus moderatam lætitiā augere sanguinem, quia nimia lætitia destruit, & dissoluit vires facultatum alteratricū, & minuit sanguinem: Galenus 12. methodi cap. 5. dicit, ob vehementem timorem, & excessum lætitiæ al' quos perisse homines: timorem subitum, & vehementem vocat Galenus ec-

plexin: uoluptatem maximam perichariam, idest quasi excessum gaudij.

Legitur perichariz occasione D'onysum Tyrannum, & Sophoclem accepto trag. ex victoriæ nuncio præ nimio gaudio statim perisse: similiter Romana mulier prius intelligit filiū in Canario prælio esse occisum, deinde cum post tot lacrimas cum videat sanum redire donū præ nimia lætitia moritur: Ab exercitio consueto omisso colligimus statim auctū esse sanguinem: locus hic à Gal. obseruatur primo de hum. 1. ut valeat consequentia, omisit exercitium consuetum, ergo magis, quam antea, sanguine abundat.

Et ex dispositione corporum, ex morbis, symptomatib. loc. aff. & inuantibus, & ledentibus polyæmia cognoscitur. Cap. XIV.

LOci indicantes corpora esse disposita ad polyæmiam sunt antecedentes vel consequentes: antecedentium primus oritur à sanguineis parentibus, qui ob copiam sæpè fuerint soliti in hæmorrhagias erumpere: si uerò ex hoc loco aliquid certi non colligatur, est secundus locus ab ætate florida desumptus: iuuenes enim & qui ætate consistentiæ gaudent, ut plurimum sanguine abundant.

Tertius locus consistit in habitu corporis, continetque sub se tres locos, quorum primus est esse carnosum, ut erant Athletæ, sed non pinguem: quia pinguedo ex frigidityte & non ex sanguine nascitur; dicit enim clarè Galenus 2. de temp. cap. 4. quod adeps ex habitus frigidityte gignitur, corpulentia siue carnis abundantia ex sanguinis copia: præterea Galenus 1. de hum. c. 1. dicit ex corporis grauitate, & segnitie ad motum sanguinis ubertatem colligi: & quamuis Galen. 6. de morb. vulg. com. 3. tex. 29. dicat inueniri emaciatis cum plurimo sanguine, & crassos cum paucis, dicatque ijs uerbis se copiosum sanguinem detraxisse emaciatæ mulieri: mulieri emaciatæ, cui suppresserant menses primo die sanguinis sexquilibrium detraxi; postridie uerò eius dei iterum libram, tertia die unciam.

Occurimus emaciatis abundare posse sanguine seroso, uel alio modo uitiatos, &

non synceros; de quo nos loquimur, dum uero refert, crassos inueniri cum paucis sanguine, nos per crassos intelligimus pingues, & non perfectum habitum carnosum, qui re uera supponit semper sanguinis synceri abundantiam.

Secundus locus est uenas habere elatas & eminentes, ut colligitur ex Gal. 1. de hum. 1. & 6. de morb. vulg. tex. 29. dum de muliere emaciata, cui sanguinem multum detraxit loquitur, ibi habet hæc non possunt sanæ uenæ esse angustæ, & flaccidæ, & sanguinem copiosum continere.

Tertius locus est physiognomionis, etenim sūt admodum hirsuti, ratio est, quia copia sanguinis indicat copiosam esse fecem melancholicam, quæ est causa propria pilorum; Præterea ex Arist. sanguinei habent magnam frontem, & aures erectas: ex Hipp. & Gal. 4. de ratione uict. in ac. tex. 26. sanguinei habent constantiam seu immobilitatem oculorum.

Quartus locus desumitur à uirtute corporis, nisi enim facultates animales fortitudine donatæ sint, sanguinem augere non valent: Quintus locus, qui est omnium certissimus, colligitur ex coëcta sanguinis euacuatione intermissa per nares, hæmorrhoides, & per alias partes: ex hoc enim fonte, & ex aliquorum saltem syndrome non erat difficile sanguinis ueritatem cognoscere.

A consequentibus, scilicet ab actionibus animalibus, vitalibus, naturalibus, ab exeuntibus, & retentis, & à qualitatibus tactilibus colligimus, quando corpus est dispositum ad polyæmiam; Quoad facultates animales principes attinet, ut est discursus, memoria, & imaginatrix dicimus esse retusas, & hebetes: sanguineos enim uocat Galenus 2. de hum. text. 30. & 1. de nat. hum. tex. 39. stolidos: utque stolidi ex Gal. auctoritate dicuntur esse ad risum profusi, incontinentes, & imprudentes: A risu indicatur sanguis, ut docet Auer. & Auicenna in canticis; Hipp. 6. aph. 53. & Galenus in comm. desipientiæ cuius risu sunt tutiores, quia à sanguine sunt.

Sed exurgit dubitatio, quia in desipientia Sileni obseruabatur risus factus à bile adusta & saturata. Similiter Galenus 6. Epid. in fin. tertij dicit, affectus sanguineos

neis esse tutissimos: affectus tamen Sileni fuit ualde lethalis.

Respondetur, quod risus Sileni non erat ab animo, sed a conuulsione, seu a remore diaphragmatis: quo casu risus contineri non potest. De quo risu habemus historiam de Pŷchone, qui in obsidione cuiusdam ciuitatis accepit uulnus in pectore a lancea, & paulo post sibi risum fuisse excitatum ob ferream cuspidem in septo relictam. Hanc historiam uidetur citari Aristoteles 3. de par. animalium cap. 10. Risus ergo ex sententia Aristotelis fit in diaphragmate ob titillationem ab illa parte excitatam: si uero titillatio est præter naturam, continuato risu moriuntur. Valerius Maximus de Philomone lib. 9. refert uidendo asinum comedentem sicum adeo fuisse risum in ipso concitatum, ut conuulsione facta in septo statim obierit. Idem dicunt de Chrysipo.

An uero risus sedes reuera sit septicum uel Lien, ut putabat Democritus referente Alexandro 1. problem. 136. uel cerebrum ut Plinius arbitrabatur: hic non est locus pro hac disputatione, quia in hoc loco per risum intelligimus naturalem & moderatum ab animo pendentem, & non de omni risu.

Quo ad actionem imaginatricem, dicit Galenus 1. de humoribus comm. 1. & alibi, quod somniant sanguinem egredi, uel ab alto cadere, & rubra uidere: non potest enim sanguinis redundantia in uenis contineri: quin ad cerebrum mittantur sanguinei uapores, & spectra sanguinea offerantur. Quo ad morricem facultatem attinet, obseruamus sanguineos difficiliter montes ascendere, ratio est, quia cum uena tumida, & onusta sanguine comprimens diaphragma necessario reddat inspirationem frequentem, & laboriosam.

Ab actionibus uitalibus locus a pulsu desumitur, dicit Galen. 2. de causis pul. 2. quod sanguinis copia facit illam pulsus inæqualitatem, quæ facillime sedatur sanguinis missione; ualebit ergo consequentia, post sanguinis euacuationem illico, tollitur pulsus inæqualitas, ergo polyæmia erat in corpore.

Ab æruptia, id est a pulsu ablatione, alij non discrepantibus signis, potest indicari polyæmia; Galenus enim lib. de

causis morborum 3. dixit arterias aliquando adeo impleri sanguine, ut nullum in ipsis supersit spatium, & inde cum aer per inspirationem in arterijs non recipiatur, calor & pulsus extinguantur unde mors, nisi statim sanguis copiosissimè mittatur.

A naturalibus, quia apertissimi sunt ad coctionem, sicuti enim biliosi ad attractionem, & expulsionem; & melancholici ad retentionem; sic sanguinei in concoquendo ceteris omnibus præstant. A nutritione idem colligitur, dicit enim Alexander Aphrodisæus 2. probl. 10. sanguineos bene alii, dicitque sanguinem primo loco alere; secundo loco pituitam; ualebit ergo perfectè alitur, ergo sanguinis optimi est abundantia.

Ab excrementibus, quia faciunt excrementa sanguinolenta & concreta: Gal. enim lib. de atra bile cap. 2. dicit, quod nullus humor concreuit, nisi sanguis & lotia rubra; etenim dum sani quoque sunt, rubrum reddunt lotium, rubra sputa, & feces sanguineo colore sæpe respersas.

Amplius duo oriuntur loci a semine, & lacte copioso; quia Galenus 16. de usu par. cap. 10. dicit, quod sanguinei omnes lac, & semen copiosum faciunt, ualebit ergo, lac copiosum gigniunt, uel semen, ergo polyæmia.

Similiter ex densitate & soliditate carnis colligi potest polyæmia; sicuti mollis & flaccida pituita; habemus enim ex Hip. pocrate lib. de principijs, quod caro cordis fiat dura a calido, sicut laxitas a frigido; densitas significat concoctionem, quia alimentum copiosum assimilatur, implet & densatur: aliter alimentum est copiosum, ergo polyæmia; Hinc iuuenes fortes habent carnes duras ob calorem & bonam coctionem, unde polyæmia.

A qualitatibus tactilibus, quia, si habeant oculorum uenas rubentes, & linguam plus debito rubram, sanguinis habent abundantiam, ualebit ergo oculi & lingua naturaliter rubet, ergo sanguinis ubertas; Galenus 1. de hum. com. 1. dicit, si corpus uergat ad rubrum colorem, si sanguis est polyæmicus, hæc sunt uerba; si corpus se ipso albidius sit factum, neque ulla sit perturbatio, pituitam abundare plerumque indicatur, cum uero sit pallidus,

dius, aut magis flauum, bilem; si ad rubicundius vergat, quam naturæ status ferat, sanguinem; si ad nigrum, atram bilem: Ex ijs anteceditibus, & consequentibus locis polyæmia colligi poterit.

A morborum generibus omnibus idē colligitur: ab interperis scilicet calida, qualis est febris synochus sine putredine, quæ triduo soluitur, quæ est homotona, idest semper manens in eodem vigore vsq; in finem, vel acmastica, quæ scilicet semper augetur, vel paracmastica, idest semper decrescens, sanguis colligitur; valer enim est synochus, ergo sanguinis redundantia: A mala compositione, vt à tumore rubro cuiuslibet partis corporis, & præcipuè oculorum, in quorum venulis sanguis redundans faciliè procumbere, & restagnare solet: locus iste à tumore rubro est Galen. 14. method. cap. 9. A soluta vnitate, vt sunt venarum rupturæ, non ob casum factæ, vel iram cum clamore, vel ob aliam causam extrinsecam, sed plenitudinem.

Symptomata sanguineos morbos insequentia sunt actiones læsæ, excrementa, & retenta, & qualitates tactiles præternaturam, suntque illa ferè symptomata declarata in locis pertinentibus ad secundam fontem, veluti rubra somniare, pulsus habere inæquales, & alia superius posita: In sanguineis tamen ægrotantibus hæc symptomata adhuc sunt vehementiora: Etenim risus, sanguinis fluxus per hæmorrhoidas, per os, per nares, sanguinisq; suppressio, suggillatio, color ruber corporis, & aliquando sine morfu in his ægrotantibus modum excedunt: Præterea debent quoque obseruari symptomata, quæ insequuntur polyæmiam ab Hippocrate, & Galeno 4. de ratione vict. tex. 26. relata: dicit enim ibi Galenus, manuum porrectiones, dentium stridores, & maxillarium contractiones à sanguinis nimia abundantia lædente neruorum originem prouenire: additque sanguinis multitudinem inducere corporem, & inde oculorum constantiam, & immobilitatem: Ex ijs ab Hipp. & Galeno propositis symptomatibus insequentibus sanguinis vbertatem duo oritur loci, alter à vitata motione, scilicet à stidore dentium, à maxillarium contra-

ctione, & à manuum porrectione; alter à torpore, & ab oculorum constantia, & immobilitate.

Si verò varia signorum genera ægrotanti contingerent, vt partim indicarent sanguinis multitudinē, & partim vitium aliorum humorum, tunc esse dicendum cum polyæmia peccare quoque alios humores, exempli causa, vt aliquis carnosus, habetque linguam plus debito rubram, oculos suggillatos cum lippitudine sine morfu, ex ijs polyæmiam colligemus, verum si patiens habuerit adiunctam tertianam, dicens, cum vbertate sanguinis mistam esse bilem; denique, si huic superueniet symptoma melancholicum, conijciemus sanguinis portionem esse permutatam in succum crassum. Ex methodis propositis non solum simplices humores, sed mixtos quoque colligemus: quomodo autem mixturæ fiant, in lib. sequenti declarabitur.

A locis affectis idem colligitur, partes affectæ, quæ sepe sanguinem peccare ostendunt, iuratur, & veng. Iecur, quia est sanguinis auctor, dicebat Galen. 4. de vsu par. cap. 14. in iecore sanguinem fieri, & benè coqui, quia multi in eo sunt sinus, veng, quia sunt sanguinis domicilia, valebit ergo vt plurimum iecur afficitur, ergo in sanguine morbus est; morbus a venis dependet, ergo sanguineus, si vero in consequentijs aderit scrupulus, virtute signorum aliorum fontium faciliè illum tolles.

A iuuantibus & lædentibus colligimus duos locos indicantes sanguinis vbertatem, quorum primus est dum iuuat sanguinis missio, quod signum, quamuis indigeat, vt alijs roboretur signis, ex Gal. tamen 4. de tuend. san. 4. sepe valet consequentia, iuuat sanguinis euacuatio, ergo polyæmia.

Secundus locus sumitur ab illa cibi paucitate, quæ tollit lassitudinem, & sitim, est Gal. 6. de morb. vulg. 3. tex. 28. sanguineos scilicet, & pituitosos cibi paucitate tollere sitim, & lassitudinem.

Postremus hic fons continetur virtute in quinque superioribus qui soli necessariò concurrunt, ratio necessitatis illorum ex eo pendet, quia vt aliquid fiat duo necessariò semper præcedunt, exter-

na scilicet coctiones, & subiectum dispositum, alioquin nihil noui in hoc mortali, & caduco statu emergeret: hinc Philosophus pro rerum caducarum principijs posuit causas efficientes externas, & priuationem, quæ aliud non significat, quam corpus dispositum, estq; principium, tum quia sine ipsa nihil fieret, tum, ut euitaret illam vanitatem Anaxagoræ dicentis, quodlibet fieri ex quolibet: positis igitur causis efficiētibus, & corporibus dispositis necessariò formæ, seu morborum ideæ fiunt, & deinde eorum symptomata, quæ morbos sequuntur, ut umbra corpus.

At deniq; oportet, ut humores in aliquo loco, uel aliqua corporis parte sint: Quæ cum ita sint, necessariò quinque fontes oriri debent: ut primus sit ab externis causis efficientibus ortus: Secundus à dispositione corporum: Tertius à morborum ideis: Quartus à morborum symptomatis: Quintus à locis affectis: Postremus, qui est à iuuantibus, & laedentibus in alijs reuera contineatur fontibus, ut alibi

ostendimus: illo tamen utimur, ut aliquando faciliè, & sine longo discursu peccantes, & occultos humores cognoscere possimus.

Ex traditis patet, quomodo per signorum conuinium syndromem artificiosam potuimus cognoscere omnes peccantes humores in corporis latetibus absconditos: ostendimus prius modum, quo septem biliosorum succorum differentia, scilicet pallida, flaua, uitellina, porracea, isatidis, æruginosa, & rubra, cognoscantur: deinde modum cognoscendi quatuor pituitosorum succorum differentias, quæ sunt pituita acida, salsa, uitrea, & dulcis: exinde quomodo tres melancholici, scilicet sæx sanguinis, eadem adusta, & attabilis cognoscantur: Demum egimus de cognoscendo statu, & de polyæmia: quorum omnium cognitio adeo medicinæ conferre potest, ut credam sine exacta hac notitia, esse impossibile, ut ægritudines cognoscamus, & ægrotantibus suppetias afferamus.

FINIS SEXTI LIBRI.





SANCTORII SANCTORII

Olin.

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIVM

In Humorum peccantium per sapores, & odores perquirendis.

LIBER SEPTIMVS.

*Ostenditur, quomodo omnes peccantes
humores misceantur. Cap. I.*



N præcedenti libro ostendimus quomodo virtute syndromes signorum communium possint perquiri humores in imis corporis partibus existentes.

In præsentia sequitur, ut statim agamus quomodo misceantur, & qua via humorum mixturæ cognoscantur. Omnes humorum peccantium mixturæ (ut à communissima diuisione exordiamur) uel sunt intrinsecus factæ, uel ex humoribus à varijs partibus missis: Intrinsecis factæ ab Auicenna dicuntur, quando (exempli causa) peccaret bilis flaua, accideretq; ut

eius portio à calore præter naturam fieret æruginosa, eaq; cum flaua misceretur; si uero accideret, ut æruginosa ab alio loco mitteretur, & flauæ bili adiungeretur, mixtura ab humoribus aliunde missis uocaretur.

Auicennas lib. 1. fen. 1. cap. de humoribus, dicit, nullam esse humoris speciem, quæ aliquando mixturarum utrumq; genus non experiatur: nullus sanè est patiens malis humoribus vexatus, qui mala aliqua humorum miscella non grauetur, quoniam nemo ab unico solo humore peccante, qui non alteretur, & transmutetur, uexari potest.

Est Galeni sententia 2. de diff. feb. 5. humores non posse eodem modo manere, sicuti erant prius; quia in perpetua alteratione versantur, & semper inuicem misceantur: est quoque corporum uiuentium natura, quæ idem persuaadet, quia iners, & otiosa manere non potest.

Sanctorij Sanctorij Pars I.

T

Illoq

tius in illis partibus detenta, si calor sit debilis, in flatu resolu possit, si fortis, in auram subtiliorem abeat, & per fallētem sensum nostrum transpiratum exhalet: partes uero nestri corporis, quę precipuē flatibus uexantur, sunt illę, quę obnoxie sunt pituitosis, uel melancholicis affectibus, quas declarauimus in capite de pituita, & melancholia: à Galatamen partes, quę precipuē à fratribus uexantur, 24. method. cap. 7. referuntur, dicitque inflationes aliquādo colligi sub cute, aliquando sub periostijs, & sub membranis, quę musculos, uel uiscera includunt: aliquando in intestinis, uentriculo, in medio spacio horum, & Peritonei.

Præterea, si partes affectę ignorantur, confugimus ad quinque illos uniuersales locos pro cognoscendis affectis partibus propósitos à Gale. 1. de loc. aff. 3. quę sint excrementa, proprietates, & dolorum propria accidentia, situs, & actio læsa.

Ab excretis per aluum cum spuma, & sonitu ex Hipp. colligimus caput esse læsum; sonus acutus indicat flatum esse in loco angusto; sonus uero, qui imitatur bombos in loco amplo hinc Galen. 3. de sympt. causis cap. 2. de flatibus intestinorum loquens dicit, si spiritus flatuosus acutus, & tenuis sonet, defertur per uacuum, & prorsus angustum intestinum; subdit flatu si sonum edat exiguum in tenuibus uoluit intestinis, si nec prorsus acutus, nec tenuis, indicatur icium flatibus premi, si uero adhuc minus sonori sint, signum est ad alia tenuia intestina descendere, quę sunt latiora, flatu uero, qui bōbos imitatur, sunt in crassissimis intestinis, quādo excrementorū sunt uacua.

A dolorum proprietate, diximus ex Auicenna, quod ubi sunt dolores extensui sine grauitate, ibi sunt partes, quę excruciantur flatibus.

A proprijs accidētibus, qualia sunt, quę cito desināt, ut saltus, uel palpitatio partis.

A situ accidentium producentium à flatu, qui colligitur ex illis tribus signis ab Auicenna propósitos, scilicet ex motu membrorum, ex sonitu, & ex tactu, dum partes cedunt pressioni, & redeunt.

Demū ab actione læta illius partis, ualeat enim consequētia, flatu sunt in uentre, ergo uenter diuiniatum habet actio-

nem, & uersa vice. Per hos locos cognoscere possimus partes corporis flatibus laceratas: quibus præcognitis, cognoscemus, quando causa efficiens affectionis erit flatu.

Postremo est sextus fons, qui est de iuuantibus, & ledentibus, in quo collocatur duo loci, primus consistit in hoc examine, ut uideamus, an euacuatio, uel expulsio flatuū maximē iuuat, & an retentio nocet: quia si euacuatio agrū subleuauerit, & retentio affectum auerit, colligemus flatum in culpam illius ægitudinis transire.

Secundus, si inuantia sint calida & sicca, nocentia uero frigida, & humida eodem magis confirmabimur, flatu in corpore redundare: Calida & sicca, quę flatu discutunt, inter cetera à Gale. 12. methodi cap. 8. probantur allium, & anisum, dicit allium coctū esse ex illorum ciborum generatione, qui & flatum discutunt, & uinam sitim inferūt: septimo de simp. med. de cimino dicit, inter omnia discutientia inspissatos & nebulosos flatu cimini ualēt dissipare, & eodē li. cap. de nigella dicit, nigellam summam præstare opem in elidendis flatibus: Similiter rutæ, ut dicit 8. de simp. med. mirabilem uirtutem in flatibus discutiendis habet.

Præterea, si iuuat cōcurbita à Galeno propósitos 12. methodi c. 8. quę cum magna flamma sit administrata, spiritū flatuosum tam excellenter tollit, ut simile quid incantamenti efficiat, dicimus propriam causam ægitudinis esse flatum.

Ledētia, & flatu cumulatia, uel sunt, quę habent inclusum flatum, quę nō solum ubi est diminutus calor, sed in ardentissima fornace edent crepitus, ut poma, castaneę, fascoli, calsia, & alia id genus: uel sunt frigida & crassa, quę actu nō habent inclusū flatu, sed ex illis fit, ut sunt pitę, lac, caseus, quorū uapores inter cōcoquēdum ob uires uiscerū collisas, & fractas adeo crassescūt, ut amplius per angustissimos meatus insēbiles nō possint exire, sed sic inspissati in flatu degenerent.

Si igitur uiderimus, flatū illico gigni, non ab ijs, quę inclusum habent flatum, quia quilibet fortissimus, & robustissimus ex ijs pati potest, sed ab illis crassis propósitos terculis, quę flatu solum ob diminutum calorem efficiunt, tunc colligere

gere poterimus in illo corpore redundare flatus: duo ergo præcipui loci erunt in hoc fonte ostendentes flatus: alter dum æger subleuabitur à flatuum euacuatione, & intendetur affectus flatuum retentione: alter, ut rectè sciatur, quæ alteratâ iuuent, & quæ noceant.

De Polyæmia, seu de sanguinis vbertate per signorum communium syndromen perquirenda. Cap. XIII.

DE sanguine hic non esset agendum, quoniam in peccatum humorum censum venire non videtur; quia, si alteretur, & supra modum calefiat, ex Galeno 3. de sympt. & 2. de diff. feb. 9. & 2. de crisib. 12. & ex Auicenna lib. 1. doct. 4. c. 1 pars tenuior sit bilis, crassior verò melancholia, de quibus humoribus egimus superius: Verum, quia sua vbertate aliquando ita venas distendit, ut eas frangat, & inde homines ducat ad hæmorrhagias adeo præcipites, & periculosas, ut cachexias, & mortes adferat: proinde erit necessarium, ut methodum proponamus, quæ nos posset docere, quando in corpore sit polyæmia; quæq; desumi poterit à procatarticis, à dispositione patientis, à morbis, à symptomatibus, à locis affectis, & à iuuantibus, & ledentibus: vtilissimus erit discursus non solum pro comparanda hac methodo, verum quia cognita polyæmia, sciemus quoq; quando erit admiuistranda phlebotomia.

In causis procatarticis sex obseruamus præcipui loci indicantes polyæmiam, quorum primus desumitur ab aere calido, & humido, sed temperatissimo: Secundus a cibo, & potu simili: Tertius, a somno: Quartus a balneo: Quintus a letitia: Sextus ab exercitio consueto prætermisso: Quo ad primum est aer calidus, & humidus temperatus sanguinem augens, qui inuenitur tempore veris; uel, ut putant medici, in regione, seu climate omnium temperatissimo; aerem veris dicit Galen. 1. de humor. com. 1. & alijs in locis, sanguinem augere estatis bilem, autumnii melancholiam, & hyemis pituitam: ratio autem, cur aer veris sit accommodatus polyæmiæ, est, quia sanguis, ut dicit Gal. 2. de natural. fac. 6. 9. & alibi, copiosus sit à

moderato, seu mediocri calore, & talis caloris moderantia inueniri non potest in alijs anni temporibus, nisi in vere, vel ut aiunt, in regione, uel climate omnium temperatissimo; ibi enim dicunt, calorem ad æqualitatem peruenire.

Verum, sicuti apud omnes philosophos & medicos res est certa, quod aer veris temporibus omnibus sit temperatior, non tamen consentiunt de climate, quodnam scilicet sit omnium temperatissimum; hoc igitur breuibus est videndum, prius tamen quid sit clima, & quor sint, dicamus; Clima significat spacium duobus parallelis clausum, quo diei longitudo ad dimidiam horam variatur; climata septem sunt. Sub primo, quod vocatur Diame- roes, qui transit per Meronem Insulam, continentur plura loca, .i. Insulæ Fortunatæ, pars Arabiæ, Nubi populi, Goa famosissima ciuitas, Insulæ S. Thomæ, & plurimæ aliæ Prouinciæ. Sub secundo, quod dicitur Diasyenes, sunt Getuli, Fretum Persici sinus, Regni Chinæ maior pars. Sub tertio, quod vocatur Dialexandria, quia transit per Alexandriam, est Ægyptus, Persia. Sub quarto, quod dicitur Diarhodos, quia transit per Rhodum, est Cyprum, Creta, tota Sicilia, & Coos Hippocratis patria. Sub quinto, quod appellatur Diaromes, quia per Romam transit, est Byzantium, Hispania, & media Italiæ pars: sub sexto, quod dicitur Diapontos, quia transit per Pontum mare, est Lombardia, Veneriæ, Fertaria, Vngaria, & Galliæ magna pars. Sub septimo, quod Diaboryesthenes vocatur, est Germania superior, Polonia, & plura alia: qui verò distinctius scire vult, sub quo climate sunt omnes Prouinciæ, adeat Geographiam Ptolomæi.

Magnum est dissidium inter medicos, sub quo climate inueniatur aer temperatissimus, vel saltem habitatio ceteris omnibus temperatior, & accommodatior: Auicennas lib. 1. fen 3. cap. 1. & prima primi doct. 2. summa 1. cap. 1. tenet, quod sub æquatione diei, ubi incipit primum clima, nisi montes, uel maria impediunt, sit locus habitationis omnium temperatissimus, quia rectitudo solis super capita minus ibi malum operatur, & minus mutatur aerem, quam solis propinquitas apud

nos, & apud eos qui sunt in maiori latitudine: subdit Auic. & dicit, quod post illos, qui morantur sub æquinoctiali magis temperati sint qui in quarto morantur climate, quia non aduruntur propter moram solis, ut in secundo, & tertio; neq; congelantur, sicuti contingit his, qui in extremitate quinti climatis habitant.

Neq; Arist. ob stare potest Auic. quamuis 2. mete. summa 2. c. 2. dicat, sub æquatore locum esse inhabitabilem propter radiorum solis rectitudinem, quia experientia hæcenus docuit Aristotelis opinionem falsam esse; iam dudum enim reperta fuerunt Insulæ, & Prouinciæ plurimæ sub æquatore habentes aerem temperatum, & terram secundissimam, inter quas est Insula Sancti Thomæ, Abissia, & alię innumerabiles Prouinciæ.

Præterea est auctoritas Ptolomæi, qui fuit tempore Antonini Imperatoris anno post aduentum Saluatoris 140. qui arbitrat sub linea æquinoctiali esse regiones temperatissimas, & habitabiles, & in Geographia sub primo climate multas collocat prouincias temperatæ habitationis, ut mirandum sit quomodo Auic. qui fuit post Ptolomeum aliquot centennis annis, nesciret, an montes, vel maria impedirent habitationem primi climatis, cum plurimę Prouincię, & Regna à Ptolomæo sub illo descripta sint.

Auerroes quoque 2. colligit cap. vltimo qui tempore Auicennę fuit in verba Arist. iurans, negat, sub primo climate esse locum habitationis, putat enim quintum clima, sub quo ille erat, esse omnium temperatissimum. Gal. 2. de tuenda sanit. cap. 7. tenet quartum clima sub quo erat sua patria.

Manardus Ferrariensis 7. Epist. notatum sextum clima sub quo ille erat cæteris omnibus anteponebat.

Albertus Magnus, cuius patria est Raribona, quę inter sextum, & septimum collocatur lib. de nat. loc. dist. 1. cap. 11. dicit, sextum & septimum esse temperatissima quia homines illorū climatum sunt pulcherrimi, corporumque procerum, pulchre staturę, & venusti coloris: omnes ergo suam patriam laudare videmus.

Vera tamen opinio (ni fallor) est quod omnia climata præter frigidissima, & re-

mota à mari possint vocari temperatissima ratio est, quia hic consideramus climata per relationem ad hominē, cuius temperamenti æqualitas refertur ad instictiam, & non ad pondus æquale elementorū, quod non datur, nec dari potest, quia, ut optimē dicit Arist. 1. cæli tex. 12. & alibi, omnia multa mouentur à prædominante, ergo clima dicitur temperatum facta collatione cum mislo æquali ad iusticiam, quod potest inueniri in omni climate, quare quando agemus de homine temperatissimo, intelligemus esse talem facta collatione non cum hominibus aliorum climatum, sed cum temperatis proprii climatis; similiter cum dicimus, volam manū esse partem temperatissimam, intelligimus respectu illius hominis, & non absolute, quia cutis manū hominis temperati primi climatis respectu temperati septimi, est intemperatissima.

Præterea, si per intemperatissimum intelligeremus absolute, & non per relationem ad proprium clima sequeretur quod temperatissimus in omni climate esset intemperatissimus, quod nullo modo esse potest, quinimmo vir temperatissimus primi, sub septimo intemperatissimam vitam ageret.

Amplius, si per intemperatissimum intelligeremus absolute, & non respectu proprii climatis, sequeretur, quod qui in primo nimio ardore viscerum torretur, quique sanus ibi viuere non potest, dici quoque posset temperatissimus respectu septimi, sub quo deo eius incendium ob insignem frigus adeo misceceret, ut temperatissimum habitum sibi compararet: patet itaque climata dici temperata, vel intemperata respectu aliquarum temperaturarum, & non absolute, ac in omni climate inueniri posse homines adeo temperatos ut illis temperatiores non dentur & denique omnia climata vocari posse æquē temperata.

Hæc opinio non videtur à principiis Galeni dissentire, quia primo de temperamentis primo dicit, quod ille est maximē temperatus, qui habet habitum medium inter extrema, ut inter gracilitatem, & crassitudinem, duritiem & molitiem, calorem & frigorem. Addit & qui animum medium habet inter audaciam &

timorem, inter animi tarditatem, & precipitium, misericordiam, & inuidiam: illeque sit alacer, amicorum amans, humanus, & prudens: addit & qui probe conoquit in ventre, in venis, & in toto ambitu corporis, habetque naturales, & animales virtutes inculparas, sitque sensuum, facultatibus, & moribus optimis præditus viuido sit colore, & ad perspirationem excrementorum bene comparatus, sitque mediis inter somnolentum, & pervigilem, inter nigrum, & album, pilosque habeat, dum puer est, magis rufos, quam nigros. Quis dicet tales solum inueniri sub æquinoctialibus, vel in tertio, quarto, quinto, vel sexto climate? cum possint inueniri in quolibet climate temperamentum cum populosius ignis.

Tantum potuit hæc veritas, ut per celebres medici, & philosophi, qui de hac re disputarunt, veritate coacti in bonam opinionem inciderint, quæ erat, quod proprium, & patrium clima, ut omnibus magis accommodatum, sit temperatissimum omnium: Hinc Hipp. Galen. & Auicenn. laudant quartum clima, sub quo vixent, quartum enim per Gnidum, & Conon, ut dicit Galen. 3. aphorism. 14. transit: Auerroes Cordubensis, cuius patria est in Hispania, quintum: Manardus Ferrariensis, suum sextum alijs anteposuit: Albertus Magnus Germanus Ratisbonæ natus dicit, esse credendum septimum (quod suum erat) esse temperatius, quia homines sub illo sunt pulchriores, & proceræ stature.

Hinc Galenus, quamuis defenderit quartum esse temperatius, non tamen potuit omittere, quin diceret loco citato, quod omnes regiones respectu propriorum habitatorum sint temperatius, illis exceptis, quæ sint frigidissima, & calidissima, vel remotæ à mari.

Excluduntur frigidissima regiones remotæ à mari, & non proxima, quia vapores calidi ventis maritimis contemperantur: fertur ab omnibus Londinum Angliæ Metropolim, quamvis eius altitudo sit grad. 52. non excellere in frigore ætheri Venetum.

Concludimus ergo in quolibet climate inueniri posse temperatissimum, & simulque temperatissimum Germanum equi-

parari posse temperatissimum Arabo, vel Abyssiuo; sola enim propria habitatio à primordijs constitutionis acquisita est animantibus accommodata, & temperata; alienæ verò sunt incommode, & ferè omnes intemperatæ: si elephantes in Italiam ducantur, ob climatis diuersitatem virtutem generandi amittunt, viuere tamen diutius possunt: si verò in Germaniam, & regiones frigidiores ducantur, non solum facultatem gignendi amittunt, verum quamceticissime moriuntur, nisi in calidis locis conseruentur. Similiter animalia regionis frigidæ, ut Sabelini & alia id genus, si in Italiam ferantur (ut experientia probatum est) viuunt, speciem tamen propagare non possunt; si verò in Africam ferantur, virtutem generandi, & simul vitam quamceticissime amittunt.

Itaque vanum erit inquirere, quod clima absolute melius sit; quia in quolibet climate inuenitur temperamentum, quo temperatius esse non potest: quilibet enim homo temperatus in proprio climate erit intemperatus in alienis, & quilibet intemperatus in proprio inueniet clima respectu illius magis temperatum: itaque valde conuenit, ut inquiratur quod clima conueniat frigidis, quod calidis, quodve siccis, vel humidis: habet igitur Galen. 3. aphor. 14. ubi aer est siccus, humide naturæ sentient utilitatem: natura verò sicca in aere secco ob constitutionem, vel ob climata incidunt in febres, & lituidines, & aliquando in atra biles, quia portio humida in bile absorbitur, & exsiccat: similiter natura frigida in frigidissimo aere congelatur, calida contemperatur; quare non est inquirendum, quod clima absolute sit temperatius, sed quod sit magis accommodatum humidis, quod siccis, quod calidis, & quod frigidis temperaturis: dicendum igitur est, quod ipsi, qui natura calidissimi sunt, primum clima sit valde contrarium, & inimicum: septimum verò amicum: frigidissimis septimum est contrarium; primum verò est accommodatum.

Hinc Delphicum Oraculum (ut refert Herodot.) dedit responsum cuidam Lybida, & frigida affectione correpto, ut in Libyam Regionem calidam se transferret, ut ibi habitum frigidum ad tempe-

ratum reduceret, vnde promptius sanguinem, & non pituitam amplius auget. Ex aere igitur veris, & climate temperaturis accommodat, quod erit facile, vt inueniatur, colligimus polyæmiā.

A cibo, & potu colligimus sanguinem à cibo, quia 3. de alim. fac. Galen. dicit, panem, volatilia, vt perdes, & quæ facilis digestionis sunt, conuertuntur in sanguinem: A potu 3. de alim. fac. cap. 4. habet viorum omnium rubra, & crassa sanguini generando esse accommodatissima, vt quæ minima egeant mutatione, vt sanguis fiat; verum, sicuti omnia climata possunt esse temperata, & intemperata respectu diuersorum; Similiter alimenta respectu diuersarum naturarum possunt conuerti in sanguinem, & in malos humores.

Doctrina hæc colligitur à Galeno 2. de naturalibus fac. cap. 8. vbi dicit, quod mel in naturis calidis vertatur in bilem, quia calidum ciui sit, ubi calido adiungitur, mediocritatem temperamēti facile amittit, & sanguinem generare non potest: subdit mel in frigidis naturis, & senibus vertitur in sanguinem: hæc igitur ratione coacti de omnibus cibis poterimus cognoscere an polyæmiā fecerint.

Si viderimus hominem calidi temperamēti comeditse mel, & alia id genus calidi nutrimenti, & facilis digestionis, dicemus bilem, & non sanguinem in illo esse acervatam: si frigidis dicemus potius sanguinem esse acciunulatum: Idem de cæteris omnibus cibis erit dicendum.

Ex cibo ergo, & potu locus oritur indicans polyæmiā, qui consistit in hoc, ut examinemus quibus temperaturis conueniant alimenta gignentia sanguinem, quia inueniemus in frigidis alimenta calida sanguinem augere, & frigida in calidis, & humida in siccis, & moderata in moderatis.

A sonno moderato sanguinem augeri colligimus, de qua re audias Galenum 12. meth. c. 3. somnus moderatus cruditatem leuat; Subdit deinde somnus concoquit, vigilæ digerunt, causa vero, cur somnus concoquat, & vigilæ digerant, traditur a Galeno 4. in 6. de morb. vnl. g. tex. 14. ijs verbis, in sonno calor ad internas partes remouatur, & melior co-

ctio fit: Hinc Galenus 4. de tuend. san. c. 4. semper sibi consentiens habet somnum & quierem semicoctos humores optimè coquere & perficere: His positis quicquid ex sonno moderato non intercepto colligere poterit polyæmiā.

Ab vñu balnei aque dulcis ob duplicem rationem idem colligitur: prima est, quia inducit somnum: ostendimus superius somnum semisanguinem perficere, & cruditates tollere: Gal. verò 3. de loc. aff. 5. reddit rationem, cur balneum soporiferum sit, dicitque balneum, eo quod caput madesfaciat, soporiferum esse, multæ enim sunt loriones ex aqua dulci, & papauere parata, quibus abluantur capita, illico somnus inducatur. Secunda est, quia balnea dulcis aquæ calefaciunt, & humectant, & trahunt sanguinem ad nutriendas partes, quæ dum bene nutritæ sunt statim conspirant in copiosi sanguinis productionem.

A læticia moderata augetur sanguis, quia sicuti balneum diffundendo efficit meliorem nutritionem, & auget vires alteratricis facultatis, ad eundem modum læticia idem prestat; hinc Gale. de læticia loquens lib. de hum. com. 2. tex. 31. dicit, nam cogitare, & videre quæ iucunda sūt, animum læticia perfründit, natiuumque calorem dilatat: dum igitur ad læticiam natiuus calor dilaturatur necessariò secum fert sanguinem ad rectè nutriendas partes, quia natiui caloris domicilium, vt sæpè dicit Gal. est sanguis, & necessariò calor cum sanguine mouetur.

Præterea 4. de causis puls. cap. 3. habet, quod letis diffunditur per vniuersum corpus calor, vnde meritò fit maior pulsus, ex hac igitur dilatatione caloris moderatur internum incendium viscerum vnde melior coctio, & ad omnes corporis partes fertur pabulum, unde melior nutritio: ex meliori igitur coctione, & nutritione necessarii copiosus, & optimus sanguis gignitur: diximus moderatam læticiam augere sanguinem, quia nimia læticia destruit, & dissoluit vires facultatum alteratricū, & minuit sanguinem: Galenus 12. methodi cap. 5. dicit, ob uehementem timorem, & excessum lætitiæ aliquos perisse homines: timorem subitam, & uehementem uocat Galenus ec-

plexin: voluptatem maximam perichariam, id est quasi excessum gaudij.

Legitur perichariz occasione Dionysium Tyrannum, & Sophoclem accepto tragice victoriæ nuncio præ nimio gaudio statim perisse: similiter Romana mulier prius intelligit filium in Canario prælio esse occisum, deinde cum post tot lachrimas eum videat sanum redire domum præ nimia lætitia moritur: Ab exercitio consueto omisso colligimus statim auctum esse sanguinem: locus hic à Gal. observatur primo de hum. 1. ut valeat consequentia, omisit exercitium consuetum, ergo magis, quam antea, sanguine abundat.

Vix dispositio corporum, ex morbis, symptomatib. loc. aff. & inuantibus, & ludentibus polyæmia cognoscitur. Cap. XIV.

LOci indicantes corpora esse disposita ad polyæmiam sunt antecedentes vel consequentes antecedentium primus oritur à sanguineis parentibus, qui ob copiam sæpè fuerint soliti in hæmorrhagias erumpere: si uerò ex hoc loco aliquid certi non colligatur, est secundus locus ab ætate florida desumptus; iuuenes enim & qui ætate consistentiz gaudent, ut plurimum sanguine abundant.

Tertius locus consistit in habitu corporis, continetque sub se tres locos, quorum primus est esse carnosum, ut erant Athletæ, sed non pinguem: quia pinguedo ex frigidityte & non ex sanguine nascitur, dicit enim clarè Galenus 2. de temp. cap. 4. quod adeps ex habitu frigidityte gignitur, corpulentia siue carnis abundantia ex sanguinis copia: præterea Galenus 1. de hum. c. 1. dicit ex corporis grauitate, & segnitie ad motum sanguinis ubertatem colligi: & quamvis Galen. 6. de morb. vulg. com. 3. tex. 29. dicat inueniri emaciatis cum plurimo sanguine, & crassos cum paucio, dicatque ijs verbis se copiosum sanguinem detraxisse emaciatæ mulieris: mulieri emaciatæ, cui suppressi erant menses primo die sanguini sexquilibrium detraxi; postridie uerò eius d. ei iterum libram, tertia die unciam.

Occurimus emaciatis abundare posse sanguine seroso, uel alio modo uitriato, &

non syncero; de quo nos loquimur, dum uerò refert, crassos inueniri cum paucio san guine, nos per crassos intelligimus pingues, & non perfectum habuimus carnosum, qui re uera supponit semper sanguinis synceri abundantiam.

Secundus locus est uenas habere elatas & eminentes, ut colligitur ex Gal. 1. de hum. 1. & 6. de morb. vulg. tex. 29. dum de muliere emaciata, cui sanguinem multum detraxit loquitur, ibi habet hæc non possunt sanè uenæ esse angustæ, & flaccidæ, & sanguinem copiosum continere.

Tertius locus est physionomicus, etenim sūt admodum hirsuti, ratio est, quia copia sanguinis indicat copiosam esse faciem melancholicam, quæ est causa propria pilorum; Præterea ex Arist. sanguinei habent magnam frontem, & aures erectas: ex Hipp. & Gal. 4. de ratione uict. in ac. tex. 26. sanguinei habent constantiam seu immobilitatem oculorum.

Quartus locus desumitur à uirtute corporis, nisi enim facultates animales fortitudine donatæ sint, sanguinem augere non valent: Quintus locus, qui est omnium certissimus, colligitur ex cōsuetu sanguinis euacuatione intermissa per narces, hæmorrhoides, & per alias partes: ex hoc enim fonte, & ex aliquorum saltem syndrome non erat difficile sanguinis uertatem cognoscere.

A consequentibus, scilicet ab actionibus animalibus, vitalibus, naturalibus, ab exeuntibus, & retentis, & à qualitatibus tactilibus colligimus, quando corpus est dispositum ad polyæmiam; Quoad facultates animales principes attinet, ut est discursus, memoria, & imaginatrix dicimus esse retusas, & hebetes: sanguineos enim uocat Galenus 2. de hum. text. 30. & 1. de nat. huma. tex. 39. stolidos: utque stolidi ex Gal. auctoritate dicuntur esse ad risum profusi, incontinentes, & imprudentes: A risu indicatur sanguis, ut docet Auer. & Auic. in cantica; Hipp. 6. aph. 53. & Galenus in comm. desipientiz eum risu sunt tutiores, quia à sanguine sunt.

Sed exurgit dubitatio, quia in desipientia Sileni obseruabatur risus factus à bile adusta & faturata. Similiter Galenus 6. Epid. in fine tertij dicit, affectus sanguineos

neos esse tutissimos: affectus tamen Sileni fuit ualde lethalis.

Respondetur, quod risus Sileni non erat ab animo, sed à conuulsione, seu a remore diaphragmatis: quo casu risus contineri non potest. De quo risu habemus historiam de Pythone, qui in obsidione cuiusdam ciuitatis accepit uulnus in pectore à lancea, & paulò post sibi risum fuisse excitatum ob ferream cuspidem in septo relictam. Hanc historiam uidetur citari Aristoteles 3. de par. animalium cap. 10. Risus ergo ex sententia Aristotelis fit in diaphragmate ob titillationem ab illa parte excitatam: si uero titillatio est præter naturam, continuato risu moriuntur. Valerius Maximus de Philimone lib. 9. refert uidendo asinum comedentem ficum adeo fuisse risum in ipso concitatum, ut conuulsione facta in septo statim obierit. Idem dicunt de Chrysipto.

An uero risus sedes re uera sit septum uel Lien, ut putabat Democritus referente Alexandro 1. problem. 136. uel cerebrum ut Plinius arbitrabatur: hic non est locus pro hac disputatione, quia in hoc loco per risum intelligimus naturalem & moderatum ab animo pendentem, & non de omni risu.

Quo ad actionem imaginatricem, dicit Galenus 1. de humoribus comm. 1. & alibi, quod somniant sanguinem egredi, uel ab alto cadere, & rubra uidere: non potest enim sanguinis redundantia in uenis contineri: quin ad cerebrum mittantur sanguinei uapores, & spectra sanguinea offerantur: Quo ad motricem facultatem attinet, obseruamus sanguineos difficilè montes ascendere, ratio est, quia cava uena tumida, & onusta sanguine còprimens diaphragma necessariò reddat inspiratione frequentem, & laboriosam.

Ab actionibus uitalibus locus a pulsu desumitur, dicit Galen. 2. de causis pul. 2. quod sanguinis copia facit illam pulsus inæqualitatem, quæ facillimè sedatur sanguinis missione; ualebit ergo consequentia, post sanguinis euacuationem illicò, tollitur pulsus inæqualitas, ergo polyæmia erat in corpore.

Ab æruptis, id est a pulsus ablatione, alijs non discrepantibus signis, potest indicari polyæmia; Galenus enim lib. de

causis morborum 3. dixit arterias aliquando adeo impleri sanguine, ut nullum in ipsis super sit spatium, & inde cum act per inspirationem in arterijs non recipiatur, calor & pulsus extinguantur unde mors, nisi statim sanguis copiosissimè mittatur.

A naturalibus, quia aptissimi sunt ad coctionem, sicuti enim bilijs ad attractionem, & expulsionem; & melancholici ad retentionem; sic sanguinei in còcoquendo ceteris omnibus præstant; A nutritione idem colligitur, dicit enim Alexander Aphrodisæus 2. probl. 10. sanguineos benè alii, dicitque sanguinem primo loco alere; secundo loco puitam; ualebit ergo perfectè alitur, ergo sanguinis optimi est abundantia.

Ab excrementis, quia faciunt extremèta sanguinolenta & concreta: Gal. enim lib. de atra bile cap. 2. dicit, quod nullus humor concretè, nisi sanguis & lotia rubra; etenim dum sani quoque sunt, rubrum reddunt lotium, rubra sputa, & feces sanguineo colore sæpè repleta.

Amplius duo oriuntur loca semine, & lacte copioso; quia Galenus 16. de viu par. cap. 10. dicit, quod sanguinei omnes lac, & semen copiosum faciunt, ualebit ergo, lac copiosum gignitur, uel semen, ergo polyæmia.

Similiter ex densitate & soliditate carnis colligi potest polyæmia; sicuti mollis & flaccida pituita; habemus enim ex Hip. pocrate lib. de principijs, quod caro cordis fiat dura a calido; sicut laxitas a frigido; densitas significat concoctionem, quia alimentum copiosum assimilatur, implet & densat; aliter alimentum est copiosum, ergo polyæmia; Hinc iuuenes fortes habent carnes duras ob calorem & bonam coctionem, unde polyæmia.

A qualitatibus tactilibus, quia, si habeant oculorum uenas rubentes, & linguam plus debito rubram, sanguinis habent abundantiam, ualebit ergo oculi & lingua naturaliter rubet, ergo sanguinis ubertas; Galenus 1. de hum. com. 1. dicit, si corpus uergat ad rubrum colorem, si ignum est polyæmia; hæc sunt uerba, si corpus se ipso albidius sit factum, neque ulla sit perturbatio, pituitam abundare plerumque indicatur, cum uero sit palidus,

dius, aut magis flauum, bilem; si ad rubicundius vergat, quam naturæ status ferat, sanguinem; si ad nigrum, atram bilem: Ex ijs anteceditibus, & consequentibus locis polyæmia colligi poterit.

A morborum generibus omnibus idē colligitur: ab intemperie scilicet calida, qualis est febris synochus sine putredine, quæ triduo soluitur, quæ est homotonia, idest semper manens in eodem vigore, vsq; in finem, vel acmastica, quæ scilicet semper augetur, vel paracmastica, idest semper decrescens, sanguis colligitur; valet enim est synochus, ergo sanguinis redundantia: A mala compositione, vt à tumore rubro cuiuslibet partis corporis, & præcipuè oculorum, in quorum venulas sanguis redundans faciliè procumbere, & restagnare solet: locus iste à tumore rubro est Galen. 14. method. cap. 9. A soluta vnitæte, vt sunt venarum rupturæ, non ob casum factæ, vel iram cum clamore, vel ob aliam causam extrinsecam, sed plenitudinem.

Symptomata sanguineos morbos insequentia sunt actiones lætæ, excrementa, & retenta, & qualitates tactiles præternaturam, suntque illa ferè symptomata declarata in locis pertinentibus ad secundum fontem, veluti rubra sombiare, pulsus habere inæquales, & alia superius proposita: In sanguineis tamen ægrotantibus hæc symptomata adhuc sunt vehementiora: Etenim risus, sanguinis fluxus per hæmorrhoidas, per os, per nares, sanguinisq; suppressio, suggillatio, color rubeus corporis, & aliquando sine morfu in his ægrotantibus modum excedunt: Præterea debent quoque obseruari symptomata, quæ insequuntur polyæmiam ab Hippocrate, & Galeno 4. de ratione vict. tex. 26. relata: dicit enim ibi Galenus, manuum porrectiones, dentium stridores, & maxillarum contractiones à sanguinis nimia abundantia lædente neruorum originem provenire: additque sanguinis multitudinem inducere torporem, & inde oculorum constantiam, & immobilitatem: Ex ijs ab Hipp. & Galeno propositis symptomatibus insequentibus sanguinis vbertatem duo oriuntur loci, alter à vitata motione, scilicet à stidore dentium, à maxillarum contra-

ctione, & à manuum porrectione; alter à torpore, & ab oculorum constantia, & immobilitate.

Si verò varia signorum genera ægrotanti contingerent, vt partim indicarent sanguinis multitudinē, & partim vitium aliorum humorum, tunc esse dicendum cum polyæmia peccare quoque alios humores, exempli causa, sit aliquis carnosus, habeatque linguam plus debito rubram, oculos suggillatos cum lippitudine sine morfu, ex ijs polyæmiam colligimus, verum si patiens habuerit adiunctam tertianam, dicemus, cum vbertate sanguinis mistam esse bilem; denique, si huic superueniet symptoma melancholicum, conijciemus sanguinis portioneem esse permutatam in succum crassum: Ex methodis propositis non solum simplices humores, sed mistos quoque colligimus: quomodo autem mixturæ fiant, in lib. sequenti declarabitur.

A locis affectis idem colligitur, partes affectæ, quæ sæpè sanguinem peccare ostendunt, sunt iecur, & vena. Iecur, quia est sanguinis auctor, dicebat Galen. 4. de usu par. cap. 14. in iecore sanguinem fieri, & bene coqui, quia multi in eo sunt sinus, vena, quia sunt sanguinis domicilia, valebit ergo vt plurimum iecur afficitur, ergo in sanguine morbus est; morbus a venis dependet, ergo sanguineus, si vero in consequentibus aderit scrupulus, virtute signorum aliorum fontium faciliè illud tolles.

A iuuantibus & lædentibus colligimus duos locos indicantes sanguinis vbertatem, quorum primus est dum iuuat sanguinis missio, quod signum, quamuis indigeat, vt alijs roboretur signis, ex Gal. tamen 4. de tuend. san. 4. sæpè valet consequentia, iuuat sanguinis euacuatio, ergo polyæmia.

Secundus locus sumitur ab illa cibi paucitate, quæ tollit lassitudinem, & sitim, est Gal. 6. de morb. vulg. 3. tex. 28. sanguineos scilicet, & pituitosos cibi paucitate tollere sitim, & lassitudinem.

Postremus hic fons continetur virtute in quinque superioribus qui soli necessariò concurrunt, ratio necessitatis illorum ex eo pendet, quia vt aliquid fiat duo necessariò semper præcedunt, exter-

na scilicet coctiones, & subiectum dispositum, alioquin nihil noui in hoc mortali, & caduco statu emergeret: hinc Philosophus pro rerum caducarum principiis posuit causas efficientes externas, & priuationem, quæ aliud non significat, quam corpus dispositum, estq; principium, tum quia sine ipsa nihil fieret, tum, ut euitaret illam vanitatem Anaxagoræ dicentis, quodlibet fieri ex quolibet: positis igitur causis efficientibus, & corporibus dispositis necessariò formæ, seu morborum ideæ fiunt, & deinde eorum symptomatica, quæ morbos sequuntur, ut umbra corpus.

At deniq; oportet, ut humores in aliquo loco, uel aliqua corporis parte sint: Quæ cum ita sint, necessariò quinque fontes oriri debent: ut primus sit ab externis causis efficientibus ortus: Secundus à dispositione corporum: Tertius à morborum ideis: Quartus à morborum symptomatis: Quintus à locis affectis: Postremus, qui est à iuuantibus, & lædentibus in alijs reuera contineatur fontibus, ut alibi

ostendimus: illo tamen utemur, ut aliquando faciliè, & sine longo discursu peccantes, & occultos humores cognoscere possimus.

Ex traditis patet, quomodo per signorum communium syndromem artificiosam potuimus cognoscere omnes peccantes humores in corporis latebris absconditos: ostendimus prius modum, quo septem biliosorum succorum differentia, scilicet pallida, flaua, uirellina, porracea, isatidis, æruginosa, & rubra, cognoscantur: deinde modum cognoscendi quatuor pituitosorum succorum differentias, quæ sunt pituita acida, falsa, uirella, & dulcis: exinde quomodo tres melancholice, scilicet sæx sanguinis, eadem adusta, & atrabilis cognoscantur: Demum egimus de cognoscendo flatu, & de polyæmia: quorum omniū cognitio adeo medicinæ conferre potest, ut credam sine exacta hac notitia, esse impossibile, ut ægritudines cognoscamus, & ægrotantibus suppetias afferamus.

FINIS SEXTI LIBRI.





SANCTORII SANCTORII

Olin.

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIVM

In Humorum peccantium per sapores, & odores perquirendis.

LIBER SEPTIMVS.

*Ostenditur, quomodo omnes peccantes
humores misceantur. Cap. I.*



In præcedenti libro ostendimus quomodo virtute syndromes signorum communium possint perquiri humores in iis corporis partibus existentes.

In præsentia sequitur, ut statim agamus quomodo misceantur, & qua via humorum mixturæ cognoscantur. Omnes humorum peccantium mixturæ (ut à communissima diuisione exordiamur) uel sunt intrinsecus factæ, uel ex humoribus à varijs partibus missis: Intrinsecis factæ ab Auicenna dicuntur, quando (exempli causa) peccaret bilis flaua, accideretq; ut

Sanctory Sanctory Pars I.

eius portio à calore præter naturam fieret æruginosa, eaq; cum flaua misceretur; si verò accideret, ut æruginosa ab alio loco mitteretur, & flauæ bili adiungeretur, mixtura ab humoribus aliunde missis uocaretur.

Auicennas lib. 1. fen. 1. cap. de humoribus dicit, nullam esse humoris speciem, quæ aliquando mixturarum utrumq; genus non experiatur: nullus sanè est patiens malis humoribus vexatus, qui mala aliqua humorum miscella non grauetur, quoniam nemo ab unico solo humore peccante, qui non alteretur, & transmutetur, uexari potest.

Est Galeni sententia 2. de diff. feb. 5. humores non posse eodem modo manere, sicut erant prius; quia in perpetua alteratione versantur, & semper inuicem miscentur: est quoque corporum viuientium natura, quæ idem persuadet, quia inertes, & otiosa manere non possunt.

T

Uaq

Hinc, si bilis flaua in morbi limine exuperat, antequam eger ad augmentū, vel statum perueniat, tam varijs modis alteratur, vt in varias humorum prauorum differentias sæpe mutetur; modo enim fit porracea, modò æruginosa, modò atra, & denique ex varijs transmutationibus variaz quoque mixturæ fiunt, quæ diuersis modis humanum corpus opprimunt.

Tyrones medici, dum ineunt consilia pro ægotantium salute non insipientes has humorum perpetuas vicissitudines, & mixturas in hunc errorem vt plurimum probabunt stantur in morbi principio, humorem peccantem exempli causa esse bilem, creduntque eandem humoris speciem perseuerare vsque in finem; perinde ac bilis esset inalterabilis, & intransmutabilis; nec vident humores ob morbi insultus multoties mutari, & permisceri: Nec vident in omni ægotante esse quotidie obseruandas, & præcognoscendas varias humorum mutationes: bilis enim, quæ externo die erat flaua, hodie fieri potest æruginosa; et as deinde posse misceri cum pituita, & in porraceam degenerare.

Ex qua posita humorum vicissitudine variaz orluntur indicationes, & varia remedia quotidie proponantur oportet, quæ enim indicantur à bile flaua, non conueniunt æruginosæ, nec vice versa. Similiter indicationes, quæ hauriuntur ab æruginosa facta in eadem massa erunt omnino diuersæ ab ijs, quæ indicantur ab æruginosa aliunde missa.

Sapores indicantes humorum mixturas sunt salus, dulcis, acidus, & ponticus: Colores verò præcipui sunt albus, flauus, vitellinus, porraceus, & niger: ostendimus in 1. lib. salum saporē salum pituitam indicare; verum, quia salbedo in pituita fit, uel quia miscetur cum salso sero, uel quia ob putredinem, uel moram, uel ob aliam causam calidam salsa fit, ideo, quomodo hæc fiant, erit explicandum.

Similiter, cum obseruetur ponticus sapor in pituita vitrea, expedit, ut exploremus an per se, uel per accedens talis sit, quod est, an à magno frigore, uel ab humore aliunde transmissio ponticum, æquirit saporem solet sæpè numero exigua melancholici ichoris portio, pe-

rinde ac oleum sulphuris vitream pituitam ponticitate inficere.

Idem sapor dulcis, qui in salua obseruatur, fit, uel quia cum pituita miscetur ichor sanguineus, quæ mixtura facta est ab humore aliunde ueniente, uel quia pituita reddita sit semisanguis: hæc vocatur mixtura intus facta; Postremò acidus sapor fit in pituita, ut dicit Auicenna lib. 1. cap. de humoribus uel ob mixturam melancholiz forinsecus missæ, uel ob causam, quæ est in pituita; etenim si dulcis sit, & contingat, ut ebulliat, dicit Auicennas, acidam fieri.

Similiter colores modò per se tates, modò per mixturam fiunt: si alba fuerint excrementa, protinus dicemus esse alba uel ob mixturam pituitæ, uel ob debilitatē uentriculi, uel hepatis: Nisi distinctè has affectuum ideas præcognoscamus, neque indicationes haurire, neque manus medicas miseris egrotis porrigere poterimus.

Flauus calor modò, ut dicit Galen. lib. de atra bile, oritur à mixtura tenuis humoris, modò 2. præfag. 47. flauus fit à pallido sero torrefacto.

Vitellina bilis eandem difficultatē nobis adfert, quia Auicennas credidit factā esse à mixtura flauæ bilis cum crasso phlegmate: Galenus uerò negat in hac bile esse mixturam, quia putat a calore, igneo, tenue & aquosum flauæ absumi, & inde colorem intendi, & vitellinum fieri.

Postremo est porracea bilis, de qua sunt qui dicunt, talem fieri ob mixturam flauæ cum pituita; sunt quoque alij, qui dicunt vitellinam & non flauam cum pituita, ut porracea fiat, permisceri; Denique sunt qui defendunt porraceam esse mixturam pituitæ cum æruginosa bile.

Quæ circa, cum omnia sint controuersa, sunt, quæ obscura, & difficultatibus obstructa, non est mirum, si in omni re difficili omnes opiniones, quas fingere potest humanus intellectus, in mediū afferantur: Idcirco nisi in tanta opinionum uarietate distinguamus analyticiis initijs, propria à cõmunib. nulla nobis relinquetur uia, qua ueritatem consequi possimus.

Præterea plurima sunt affectuum præter naturam exempla, in quibus obseruantur humorum mixturæ. Galenus lib. de tumoribus præternaturam cap. 10. dicit cau-

sam

flam erysipelatis externi esse bilem flauam mistam cum ichore sanguineo; valebit ergo est erysipellas externum ergo mixtura bilis flaua cum ichore sanguineo ægrum vexat.

In Historia vxoris Dealcis, quæ in delirio plorabat, & ridebat, Galenus collegit sanguini bilioso melancholiam esse commistam: lib. de comate cap. 3. & 1. prædict. comm. 33. legimus, coma vigil à mixtura bilis cum pituita pendere, vt perpetuò valeat sequentia, est coma vigil. ergo mixtura ex bile, & pituita accepta referenda causa est: tale quippiam in aurium tinnitum, quia aquæ currentium sonum imitatur, dicimus, esse pituitam aquosam, cum flatu: In lethargo exquisito omnes consentiunt esse pituitam mistam cum sanguine: idem in alijs obseruatur affectibus: quia nullus est morbus, qui ab aliqua mixtura non alatur, & foueatur.

Quiniammo, dum sanam vitam agimus, nullus est humor ita simplex, & syncerus, qui non sit ab aliquo contaminatus, & non sit factus impurus: Si elementa, quæ mundum hunc inferiorem complent, impura, & inuicem permixta esse credimus, quāto magis erit credendum, in ægrotantibus humores à causis non naturalibus, & violentis esse permixtos, & contaminatos. Quæ cum ita sint, valde conuenit, vt de saporibus, & coloribus indicantibus mixturas humorum altius repetamus, vt tandem mixturis cognitis, sciamus indicationes haurire, & morbis suppetias afferre.

Quomodo cognoscitur, quando falsedo in pituita sit per mixturam minus saltam, & quando per mixturam humoris aliunde venientis. Cap. II.

Cum falsus sapor præcipuè indicet humorum mixturas, præstat prius perquirere, cur insipidi humores sūt falsi: variæ sunt opiniones, Galenus 2. de diff. feb. c. 8. dicit, falsedinem pituitæ fieri aut propter putredinē, aut propter falsas & serios humiditatis missionē: Auicēnas lib. 1. fen. 1. doct. 4. cap. 1. dicit, pituitam fieri falsam vel ob missionem bilis adustæ, vel ob putredinem, vel ob moram.

Plurimi Galeni sectatores, cum videāt

Auicēnam discedere à Galeni sententia dum diceret, falsedinem fieri ob missionem bilis adustæ, Galenus vero ob falsæ, & serios humiditatis miscellam, conatur sententiam Auicēnæ experimentis reijcere; dicunt enim, nunquam esse visum, quod ex missione amari cum insipido humore confurgat falsus sapor: verum quomodo restē habeat, & an sit inter Galenum, & Auicēnam dissidium, inferius ostendemus.

In primis se offert, vt videamus, an propolite causæ falsedinis sint propriæ & adæquatæ: sumpro hoc initio ab Aristotele, & à Galeno non semel supposito, quod scilicet causa propria, & adæquata vnius effectus vnica sit, eaque nō sit partialis, vel remota: Dum igitur dicunt, causam falsedinis esse putredinem, vel moram, videtur afferre causas partiales, & non adæquatas: dum vero dicunt, falsam, & seriosam humiditatem efficere falsedinem in pituita, petere videtur principium, quoniam quaeritur, cur seriosa humiditas falsa sit.

Inuenienda est igitur causa falsedinis, vt falsedo est, quæ vnica debet esse, & vnico debet adæquato conuenire subiecto, & non pluribus: quia inuenta illicd quoque sciatur, cur falsi fiant humores.

Hæc doctrina est Aristotele. 2. priorum cap. 35. vbi ostendit exemplo fortitudinis Leonis, nos scire solum per cōuertibilia, & adæquata; similiter 2. post. circa finem dicit, passionem querendam cognosci, dum subiectum, cui primo conuenit, & eius passionis causata adæquata inuenitur: Hinc Phylosophus, quem non amulari conamur, in tota sua phylosophia prima subiecta passionum semper perquirat, vt demonstratiua scientias constituat: hinc 4. metap. attribuit enti in communi, vt primo subiecto: & adæquato communissimas proprietates: quæ constituunt diuinam phylosophiam, eaque deinde perquirat: Ad eundem modum primo cæli acturus de motu locali quinque simplicium corporum, statim tex. 5. præcognosci cui subiecto adæquate conueniat localiter moueri, dicitque conuenire magnitudini naturali sumptæ in maxima latitudine: similiter in tota sua phylosophia vult omnia pēdere ab vnica

causa, & vnus causa, quatenus vna, vnicum esse effectum, & vnus effectus, quatenus vnus, vnicam esse causam, & vnicū subiectum: Quam altissimam sapientiam sequens quoque Gale. admirabili mendi methodum composuit, quæ consistit in hoc præcepto fundamento, quod scilicet vnum, vt vnum conueniat vni, pendeat ab vno, & indicetur ab vno.

Supposita itaque hac Arist. & Gal. philosophia dicimus, putredinem, vel mistionem falsi ichoris, vel mora non esse veras causas falsædinis, quia, cum sint plures, nulla erit adæquata, sed quælibet erit partialis: millies enim morantur, vel putrescunt humores, attamen non semper falsi fiunt: esset igitur illa inueniēda causa, qua putredo facit falsædinem in pituita, qua mora sine putredine, vel qua bilis adulta sine putredine, & mora falsædinem efficit.

Dicimus itaque cum Arist. & Gal. falsædinem fieri, quando in humoribus pars dulcis, & insipida virtute caloris separatur, & pars terrestris, quæ remanet, aduritur, & permiscetur cum humoribus aquosis: Hæc opinio est Aristotelis, Galeni & cæterorum Antiquorum philosophorum: Aristot. 2. probl. tertio 4. probl. de cimetis, & 5. trichism. quinto, quia ibi dicit, falsædinem lachrymarum, vrinx, & sudoris fieri, quia transit dulce, & concoctum in alimentum: pars verò terrea calefacta, perinde ac calx, & cinis, reddit humores falsos. Galeni, quia quinto simp. med. fac. 26. dicit, quod salsum est calidum terrestre 2. de facult. naturalibus cap. 8. habet hæc verba, quis non ignorat, eorum, quæ immodicè coquantur, singula fieri primo quidē saliora, postea vero amariora: ratio est, quia à calore assumitur pars dulcissima, quæ est magis aerea, quod verò salsum est, melius deinde sentitur; subdit postea fieri amariora; quia calor faciēs amarum est magis adurens, amarum quidem, & salsum ex Aristotele, & Galeno secundum magis & minus differunt.

Hinc quoque Galenus 3. aph. 12. dicit, sicuti acida pituita fit à forti frigiditate, sic pituita falsa fit à caliditate replente ca. put: Causa igitur falsædinis ex sententia Galeni & Aristotelis est calor resolvens

tenue, & insipidum, & simul adurēs portiones terrestres; Antiquorum, colligitur enim ex libello de historiæ philosophica Gal. adscripto, quod Anaximander dicat, mare esse salsum, quia igne consumpta sit pars, quæ erat dulcis; Anaxagoras verò dicat esse salsum, quia pars pinguis in vapores sit resoluta; ibique refertur, Platonicos dixisse aquam dulcem esse factam, ex aere frigoris opera, ecce, quod omnes antiqui putarunt aquam fieri dulcem ob partes pingues, & aereas, salsum verò esse factam, quando à calore pars dulcis aerea, & pinguis in vapores abiit.

Cæterum, quia falsædo non solum fit, dum resoluitur insipidum, verum etiam dum pars terrestris calefit, & aliquantum aduritur; ideo Empedocles, & Antipho, vt loco citato refertur, dixerunt salsum aquam esse sudorem corporum æstuantium; patet itaq; ex omnium consensu falsædinem fieri à caliditate adurente terreum, & resolvente humidum dulce, pingue, & aereum, quod reuera insipidum est.

Verum, quia caliditas resolvens humidum insipidum, & adurens terreum non solum potest nasci à putredine, à bile adusta, & à mora humorum, vt dictum est, sed vt placuit Gal. libro de causis morb. 2. à stipatione, alimento, à calidiorum corporum adhæsu, à putredine, & à motu.

Vanum erit arbitrari falsædinem solū fieri à putredine, à mora, & mitione adustæ bilis, erit igitur causa adæquata, falsædinis calor quatenus talis est, vt possit resolvere dulce, & adurare terreum, illudque permiscere cum aquoso humore; hæc colligitur ab Aristotele, Galeno, & antiquis philosophis; hæcque est causa vniuersalis, & conuertibilis, quoniam posita hac causa, quæ resoluit dulce insipidum, & adurat terreum, necessarii fiet sal, positoque sale esse necessarium, eandem causam præcessisse.

Præterea idē confirmatur à posteriori siue à proprietatibus falsi saporis traditis à Galeno 5. simp. med. fac. cap. 26. dicit enim falsi saporis proprietates sunt constringere, & constringendo seu condensando seruare, & desiccare; nisi in sale essent portiones terrestres, sal non constringeret, nisi esset resolutum dulce insipidum,

pidum, sal non conseruaret, sed corrumpere; humidum enim dulce, & insipidum proprium est excitare ebullitionem, & putredinem, nisi hoc dulce insipidum esset resolutum à calido, sal potius refrigeraret, quam calefaceret, quia terra sua natura est frigida, & sicca, nisi partes terrestres adustæ essent permixtæ cum aquoso humore, sal nullam penetrandi facultatem haberet.

Denique idem confirmatur lucidissimo aquæ maris exemplo, mare enim dulcissima aqua fluminum semper renouatur, nihilominus eadem falsedine ob solis radios exurtes perpetuè gaudet, nisi reuera sal de nouo fieret, ab hoc externo, & immutabili efficiente, vt sunt radij solares, qui dulciores partes aquæ resoluunt, & portiones terrestres adurunt, hæcenus eius falsedo esset absumpta.

Verum magna exurgit dubitatio, quia si radij suo calore falsedinem maris efficerent sequeretur, quod etiam lacus radijs solis expositi essent salsi.

Respondemus, quod lacus non ita appetitur, neque tot motib; in proprio alioque agitantur & perfecte miscentur cum terra, vt mare: quamuis vero inueniantur lacus maxime expositi radijs solarib; & maxime agitati, & turbidi: attamen quia agitatio non est perpetua, vt in mari, partes terrestres permixtæ illi non petunt fundum, & radij eas adurere, & per consequens salias reddere pauco temporis cursu non possunt: motus, quibus perpetuè agitur mare, duodecim sunt omnino diuersi: in lacubus vero tot non sunt.

Primus aquæ maris motus est fluxus & refluxus: secundus est motus litoris: hi duo motus sunt perpetui, & solum conueniunt mari, & nequaquam cæteris aquis dulcib; tertius est motus ad centrum; quartus motus augmenti & decrementi: quintus est motus ventorum: sextus est motus alterationis, quæ fit à radijs solarib; radij enim tantum possunt, vt ipsi pluuie fontes, & flumina in mare continuo transfunderent, totam aquam maris paucorum dierum cursu absumerent.

Septimus est motus ad proprium locum: aqua enim si esset in centro alicuius

deret ad suum locum. Octauus est motus vertiginis: nonus est motus à septentrione ad meridiem qui obseruatur ab Aris. 2. meteor. & ab experientia. Decimus est motus eleuationis aquæ à radijs solaribus. Vndecimus est motus ab ortu in occasum, qui in oceano obseruatur. Duodecimus est motus generationis; sed de his motibus fusius in comm. primæ sent. Auicennæ ubi agimus de aqua.

Ex superius dictis occurrit dubitatio, quia diximus superius, causas falsedinis à Galeno, & Auicenna traditas esse partiales, & non veras, & adæquatas.

Respondemus Galenum & Auicennam non attulisse causam adæquatam falsedinis: sed modos, quibus pituita falsa fit; inspexerunt enim ad duos modos, quo pituita fieri potest falsa.

Primus modus, quo fit pituita falsa, est, dum falsedo in pituita dulci ingeneratur ob calorem; hæc causa calida generans falsedinem potest esse putredo, mora, & quælibet causa, quæ potest insipidum resolvere, & adurere terreum, quod est in pituita; alias quoque plures causas falsedinis Galenus potuisset asserere, si omnis falsedinis particulares causas voluisset proponere.

Secundus modus generationis falsedinis est, dum salsi, & serosi humores transmittuntur in caput, vel alias, partes, & nascuntur cum pituita dulci, quam saliam efficiunt; ecce quod Galenus proposuit pro causa falsedinis pituitæ putredinem, & salios ichores, vt duos modos gignendi pituitam saliam declaratur.

Adhuc enim reliquitur locus querendi quæ de causa serosi humores fiant salsi: quare quando Galenus de vera causa falsedinis loquitur, non dixit serosos, & salios ichores, vel putredinem esse causas falsedinis; sed dixit calorem resoluentem insipidum, & adurentem partes terrestres esse veram falsedinis causam.

Dum Galenus 2. de fac. naturalibus ca. 8. querit, cur quæ immodicè coquantur fiant salia, non dixit putredinem, vel salios ichores illam falsedinem efficere; sed calorem igneum resoluentem insipidum, & adurentem terrenas portiones. Similiter Auicennas respiciens ad misturam intus factam dicit putredinem, &

moram falsam pituitam efficere, quatenus resoluunt insipidum pituitæ, & terream adurunt, non tamen negaret falsam posse fieri à nimio insolatus, ab alimentis calidissimis, & similibus causis calidis: respiciens verò ad pituità falsam, quæ fit ab humore aliunde misso, dicit bile adustam mistam cum pituita, efficere falsam pituitam; non tamen negasset, pituitam posse fieri falsam à serosis falsis ichoribus, & ab alijs causis calefacientibus, & causâ ueram, & adæquatam esse calorem resoluentem dulcem, & adurentem terream.

Quod cum ita sit, errant qui aduersus Auicennam inuehunt, dicentes ex adusta bile falsum fieri nō posse, quia nunquam est uisum ex missione amari cum insipido falsum nasci. Argumentum non sequitur, quia dum miscemus amarum cum insipido, non possumus naturam imitari, quia nostræ missiones sunt iuxta positiones; natura sola per ueram missionem operatur; hinc natura miscendo, & transmutando ex eadem materia diuersos colores, & sapores illico componit: niger potus; & cibus, dum à natura conuertitur in chylum, fit albus; dum verò peruenit ad hepatis, fit ruber, missus in testes fit albus, in mamillas fit lac; idem de saporibus, quoniam dum cibus amarus, uel falsus conuertitur in chylum, fit dulcis; simili modo accidere potest, ut ex missione amari cum insipido fiat à natura falsus sapor.

Demum; quod ex amaro misso cum insipido falsus fiat sapor, Aristot. & Galenus non uidentur dissentire; Arist. enim lib. de sensu, & sens. dicit, falsum esse eiusdem speciei cum amaro: Galenus 1. simp. med. fac. cap. 36. dicit, falsum, & amarum differre solum secundum magis, & minus; utriusque enim saporis causa est calor resoluens insipidum, & utriusque materia est terrestris; amarus tamen sapor, ut placuit Galeno 2. præfag. 47. maiorem indicat calorem; habet enim hæc uerba; Si torrefiat serum, bilis amara fit; si verò tantum aduratur, fit falsedo.

Postremo Alber. Magn. de minerabil. c. 1. dicit, quod omnia amara falsum quidpiam obtinent; itaque patet, ex amaro cum insipido misso fieri posse, ut optime dixit Auicenna, falsum saporem; patetque

nullum esse inter Auicennam, & Galen. diffidium; sed pari artificio de causis falsedinis ambos locutos esse.

Ex traditis non erit difficile, methodū colligere, quæ doceat, quando pituita fiat falsa ab humore aliunde misso, & quando ab humore in eodem loco existente transmutato; Dicimus ergo, tunc catarrhum cognosci in capite fieri falsum ab humore ab alijs partibus misso, quando in corpore erit abundantia biliosorum succorum, uel falsæ, & serosæ humiditatis; alij enim humores non possunt misceri cum pituita insipida, qui falsedinem possint efficere: cognoscetur deinde corpus biliosum, uel falsis succi redundare ex syndrome signorum communium indicantium hos humores tradita c. 2. & 3. sexti libri.

Amplius cognoscemus, falsum esse redditum catarrhum ob falsedinem in ipsa pituita ingeneratam, quando causæ ualde calefacientes caput præcesserint, & hæc sunt illæ quinque propositiones à Gal. lib. de caus. morb. c. 2. quarum prima est nimius motus multos noui, ob uehementes corporis motiones esse catarrho falso correptos: secunda est obstructio meatuum, capitis à frigore facta: sæpenumerò accidit, ut sub dio frigidissimo adeo externi meatus capitis claudantur, ut derentus calor transpirabilis resoluat insipidum pituitæ, adurat terrestres portiones: easque misceat, & catarrhum falsum promoueat. Tercius est usus alimentorum calidorum.

Quarta est adhesio corporum calidorum ut sunt hypocausta, uel nimius insolatus.

Quinta est putredo; pituita enim, dum moratur in capite aliquando putrescit, & falsedinem acquirit; ad hæc quinque capita omnes causæ, quæ habent vim calefaciendi, & gignendi falsedinem reducuntur.

Neque obijciant, quod ijs sit addendum ieiunium, ut Galen. 4. de simp. med. fac. cap. 16. his uerbis docet, qui plurimum sustinuerunt ieiunium, ijs salina falsa redditur, qui uero plurimum, non falsa modo, sed amara.

Respondimus enim huic obiectioni in 6. lib. ubi ostendimus ieiunia, uigilia, maciores, & alia referti ad motum, & alias non dari causas calefacientes, & falsedinem

nem inducētes, præter quinque illas propositas à Galeno lib. de causis morb. c. 2.

His cognitis facillè erit indicationes, & auxilia pro ægrotantium salute inquirere: nam si bilis, vel serosa, & salsa humiditas redundauerit, prius causas generātes arcebinus & deinde genitos succos leniētib; vel cathartici euellimus: si caput redditum fuerit calidū ob nimium motum, ob vigilias, ob alimēta calida, ob adluzum, vel ob ieiunium, tunc ad communem indicationem mentis aciem prius dirigemus, quæ est interna viscera ab ijs calefacta refrigerare: deinde ad indicationes magis particulares confugiemus; per hypothēsim, si ob meatuum constipationem pituita putrescat, & putredo falsedinem efficiat, tunc alius non dabitur curandi modus, quā per remedia, quæ reluctantur putredini.

Quæ verò, & quot sint specifica remedia putredini aduersantia confugimus ad Gal. qui 11. meth. cap. 13. hæc quattuor proponit, euacuare, semiputrida coquere, ventilare, & refrigerare: Simili modo ab alijs specificis causis falsedinis erunt specificæ indicationes colligendæ, de quibus egimus in alijs libris: quibus omnib; præcognitis, facile inde erit, vt materiæ auxiliorum facillissimi successus ægrotantibus adiungantur.

Qua via noscatur, quando humores sunt dulces ob misturam intus factam, & quando ob misturam humoris dulcis a launde venientis. Cap. III.

Acturi de sapore dulci: opus est vt prius declaremus quid sub nomine dulcis intelligatur: Sapor vel dicitur dulcis, dum omni qualitate caret, & est insipidus; vel dum habet manifestam dulcedinem: hic agi debet de hoc dulci manifesto: quoniam insipidus in humorum misturis non peruenit, neq; est cognoscibilis: etenim, si miscetur cum salso, peruenit salus: si cum bile amarus; si cum pituita acida, acidus: si cum pontica, ponticus: dulcis verò manifestus, quamuis sit alijs humoribus commixtus, eodem modo se manifestat, quo cæteri sapores: sicut enim ponticus peruenit in atra bile, & pituita vitrea; acetosus in melancholia

quæ est sæx sanguinis, & pituita acida: falsus in pituita falsa, in vrinis, & sudoribus: similiter dulcis manifestus, & naturalis, vt dicit Galenus 4. de simp. med. fac. cap. 16. in sanguine, & aliquando in pituita peruenit.

Auic. quoque lib. 3. fen. 13. tract. 5. cap. 8. dicit in pituita inueniri dulcedinem, quia chylus antequam vertatur in sanguinem, sit pituita dulcis.

Cum igitur dulcis, & moderatus sapor pluribus conueniat humoribus, nunc est videndum cui per se, & cui per participationem conueniat: dum enim duo diuersa eadem sunt prædita qualitate, est necessarium, vt qualitas uni per se, & alteri per accidens conueniat: hinc Auic. lib. 2. fen. 1. doct. quarta cap. 1. dixit, humores dulcedine præditos modò esse tales per essentiam, & modò per rei extrinsecam admissionem.

Galenus de hoc dulci manifesto, & naturali loquens lib. de atra bile cap. 2. patet declarat, qui humores sunt per essentiam, & qui per participationem dulces, dicit enim, quod sanguis per se dulcis est, pituita vero interdum per participationem, quo pacto verò pituita reddatur dulcis per participationem, colligitur quoq; ex Gal. 2. de fac. naturalib; vbi dicit pituitam fieri dulcem, quia cum ea miscetur ichor sanguineus, qui dulcis est.

Ceterum, quia sapor dulcis manifestus in humoribus est diuum generum, alter suavis, qui est similis saporis lactis, butyri, vel pinguedinis, qui habet virtutem oppillatinam: alter nauseosus, qui est similis saporis glycyrrhizæ, estq; tam penetrans dulcedinis, vt omnia salsa, & amara huic saporis associata dulcissima sentiantur: præstat, ut de hoc nauseoso dulci illico videamus, ad quib; causis oriatur, Auic. lib. 4. fen. 1. tract. 2. c. 47. rectè dicit, hanc dulcedinem fieri aliquando à putredine phlegmatis.

Nec Auicennæ obijci potest, quod pituita à putredine reddatur falsa, vt in capite superiori ostensum est, & non dulcis: quia pro Auicenna respondetur, pituitam acidam, vel ponticam sua frigiditate adeo obtundere, & moderare, quemlibet intensum calorem, ut à putredine, vel ab alia causa calefaciente fiat

dulcis, & non falsa; omnia enim dulcia à calore moderato fiunt.

Neque est mirandum, frigidiorē pituitam fieri dulcem ab intento calore, quia Galenus 4. simp. med. fac. ca. 11. probat clarissimis experimentis, quod omnia acerbata, & quæ natura frigida sunt, ut poma, pyra immatura, castaneæ, & alia id genus si ignitis carbonibus iniiciantur, antequam comburantur dulcissima; combusta vero amara reddantur: acerb. sapor adeo distat ab amaro, & falso, ut à calore igneo prius fiat dulce: natura enim non transit ab extremo ad extremum, nisi per medium; mel quia est calidum, silico ab igne redditur amarum.

Quocirca, si acerbata, antequam ab igne reddantur amara, fiant semper dulcia, sequitur necessarium, quod omnis causa calida, quæ potest pituitam acidam reddere salisam, possit quoque eam prius dulcem facere; non erit igitur solum putredo, ut dicit Auicennas, causa immoderate dulcedinis, verum etiam omnes causæ calidæ, quæ possunt falsedinem effingere, de quibus in capite superiori actum est; quatenus enim insipidum resoluunt, & adurunt partes terrestres, falsedinem, quatenus imminutum coquunt, & ad medium, & item calorem transferunt, dulcedinem efficiunt.

Galenus 4. de simp. med. fac. c. 9. habet, quod omnia dulcia sint miti calore prædita, subditque, quod sint sicuti aqua calida, cuius contactus voluptati est; antequam igitur aliquid aduratur, necessarium (si frigidum sit) ad illud teporem, cuius contactus voluptati nobis est, veniat oportet.

Calor, qui pariet dulcedinem moderatam, similem saccharo, & iuculo carniū, non oritur à putredine, vel ab aliqua causa extranea, & violenta, sed à calore miti, & simili calori nostro ingenito, qui vero pariet dulcedinem immoderatam similem glycyrrhizæ, & saccharo est adiectissus, & violentus, ut in acerbis fructibus, qui ignea virtute dulces fiunt.

Ex his colligimus, quod sapor dulcis varias humorum mixturas indicare possit, quia à plurimis causis oritur; modò enim chylus (si de suavi, & moderata dulcedine loquamur, acquirit dulcedinem ob perfectam alterationem primæ co-

ctionis, modo ob dulces ichores sanguineos à venis extra missos; si de immoderate, quæ in acida, & acerbata pituita nascitur, dicimus modò hanc fieri, dum cum hac pituita miscentur humores putrescentes aliunde venientes, modò, dum ipsam pituita putrescit, quæ est mixtura intus facta.

Quod verò diximus de putredine, quatenus est causa calida non solum colligans, sed adurens de omni causa calefaciente dici debet; quoties igitur corpus abundauerit pituita acerbata, vel acida, præcesseritque calor aliquis peditens à motu putredine, alimentis, vicinitate calidorum, vel à conspatione, ex sufficiente enumeratione harum causarum colligemus, unde peditens immoderata dulcedo.

Signa differentiarum colligemus hoc modo, si aliquis in ore persenserit moderatam dulcedinem sine ullo superveniente symptomate, nullaque existente polyæmia, causa erit chylus copiosus, & optimè coctus, quod in sanis hominibus aliquando contingit: si verò in ore persenserit immoderatam dulcedinem præsentem polyæmia, tunc dicemus, pituitam esse dulcem ob ichores sanguineos commixtos, quomodo verò cognosci poterit, quando in corpore sit polyæmia, tradidimus signa in calce superioris libri.

Sanguis dum effundit ichorem dulcem non peccat qualitate, sed quantitate, quia dum qualitate peccat, illico amittit naturalem suam dulcedinem, docet enim Galenus 2. de fac. natura lib. cap. 8. sanguinis dulcedinem ob calorem exuperantem in amarum succum, ob nimium frigus in acidum converti.

Similiter si de immoderata dulcedine loquamur, sunt enumerandæ omnes causæ calefacientes, quæ præcesserunt, & methodo tradita in 6. lib. cap. 1. & 2. propria, & immediata causa tam nauseosæ dulcedinis est illicet summa diligentia adveniendi, quia adeo affligit, & vires alteratricum facultatum dissolvit, ut homines, nisi citò liberentur, ad atrophiam perducantur.

Memini, me semel vidisse hunc casum in Nicohutio medico, qui tam immoderatam dulcedinem perpetuò in ore sentiebat, ut nihil inveniretur adeo amarum quod

quod statim in ore ipsius nō dulcesceret, & adeo cepit eius robur languescere, quod ē viuis procul dubio decessisset, nisi ego illi præsto fuisset: putauī à viscerum calore, & à putredine pituitæ, qua corpus erat refertum, tam nauseosam dulcedinem nasci, neque aliud inueniri, quod magis reluctaretur calori, & putredini, oleo calchantino, quo vsus in tanta consilij angustia summa cum admiratione omnium medicorum, qui non potuerunt ei aliquid opus afferre, paucorum dierum cursu sanissima afflictione liberatus fuit.

Ex superius dictis exoritur dubitatio, quia diximus dulcia oppillare, quæ sententia est quodque recepta ab omnibus, vsus enim dulcium inflat, & meatus claudit, attamen Gal. 3. simp. med. fac. cap. 26. dicit, quod dulcia rarefaciunt, & abstergunt: Auicennas tract. de syrupo acetoso cap. 2. dicit, quod natura dulcis non est oppillare, sed abstergere.

Aliqui respondent, quod dulcia moderata, vt sunt pinguis, oppillent, nō tamen immoderata, ut saccharum, mel, & similia, quia hæc habent virtutē absterguant; verum hæc responsio non facit ad rem, quoniam dubitatio est de manifesta, & immoderata dulcedine, quæ in fructibus, in melle, & similibus inuenitur.

Respondet itaque Auicennas huic difficultati lib. 1. fen. 3. doct. 2. cap. 7. dulcia omnia oppillare, quia rapiuntur a natura ante concoctionem, quare quamuis abstergant: contingit, vt hæc quoque dulcia immoderata per accidens inslent, & oppillent.

Qua via noscatur, quando humores siant acidi per se, & quando ob mulsionem acidi humoris aliunde venientis. Cap. IV.

An tequā proponatur modus, quo ex acido sapore pronptē cognoscere possimus varias humorum mulsionas, præstat videre, an acida qualitas indicet frigidum, vel calidum temperamentum, & quomodo fiat.

Galenus 1. de simp. med. fac. c. 19. proponit tam facile & euidentis experimentum, quod in aceto potest refrigerandi prædominetur, vt nihil eo facilius cla-

riuiq; proponi possit, illudque ijs verbis explicat: Nos, ut experitemur aceti potentiam illiniuius tibias multis in locis thapsia, ubi post quatuor, uel quinque horas inflammari cæpissent, huic parti ego aceto, alij rosaceo inunxerunt, alij alia, atq; alia, quæ aut acrimoniam hebetaret, aut refrigerare creduntur, applicarunt: eorum omnium comperimus acetum in refrigerando esse efficacissimum: ex quibus uerbis facili colligitur, acetum habere euidentissimam refrigerandi uirtutē: Libro de marcore cap. 8. in febris, & affectib. calidissimis laudat acetum cum lactuca admisso pauco aquæ, quod non laudaret, nisi refrigeraret.

Libro quarto de simp. med. fac. cap. 12. landat opinionem Arist. dicentis, acetum esse frigidum per se, ibique docet ad hypochondria ardentia (succum omphacij) esse præstantiorem aceto, quia acetum habet uolentiam frigiditatem, hæc sunt Galeni uerba, etenim ad hypochondria ardentia præstantior est succus omphacij, quam ipsum acetum, quod nec uolentiam, ac ferientem habeat frigiditatem, nec eam admistam mordaci caliditati: ex quibus uerbis tria obiter obseruantur; primum quod acetum inflammatis partibus prosit: secundum, quod febricitantibus possit cœdē cocta lactuca eum aceto admisto aquæ pauco: tertium quod in ardoribus magis conueniat succus omphacij, quam acetum.

Quomodo autem fiat acetosus sapor Galenus 4. simp. cap. 15. ijs ferē uerbis declarat; aciditas fit à calido mutante, & à frigido uincente, ut ructus acidi ostendunt, qui sunt solum, ubi cibi semicocti sunt.

Itaque, vt fiat acidus sapor, requiritur vis calefaciendi, quæ moueat tantum, & vis refrigerandi, quæ vincat, & superet; hinc Galenus 2. de temp. cap. 6. dicit, acidus ructus indicare imbecillum calorem, & talem, vt moueat, sed non vincat: hinc quoque fit, quod 3. de symp. causis eap. 1. dicit, quod acidæ corruptellæ ex cibis frigidioribus siant: & 1. de loc. aff. eap. 4. habet, si cibi in midorem transierint, causa efficiens est calida, si accescant, frigida.

Præterea 4. de simp. med. cap. 12. dicit, si uinum refrigeretur, accescit, refrigeratur.

tur a calore resolvente partem calidam, sed nō vincente, quia fieret amarum; hinc, si vinum coquatur igne, non acescit, sed potius amarescit, quia ignis semper vincit; potest tamen vinum, si in tepido loco conservetur, vt dicit Galenus lib. de antidotis cap. 3. promptē acescere, quia à tepore ambientis commouetur, sed non vincitur.

Experientia quoque docet, aciditatem fieri à frigiditate vincente, & à caliditate tantum mouente, quia videmus dulcia, dum vincuntur à caliditate, semper amarescere, & dum vincuntur à frigiditate, acescere.

Succi herbarum, qui conseruantur in officinis, nisi vasa oleo obturentur, primo à calore tepido ambientis commouentur, deinde ebulliunt, facta ebullitione eorum calor resoluitur, quo resolutio frigescent, & per consequens acescant oportet.

Causa vero, cur succi herbarum ebulliant, & acescant; non est solum caliditas externa, verum etiam humiditates extraneae, & frigida, quae sunt in succis à viridibus herbis expressis; patet quoque, quia in officinis ab igne succi condensantur, vt resolutis externis humiditatibus conseruentur, ne acescant tantum potest paulillum externae humiditatis, vt dum rudis Pharmacopola non permittit, serapia bullire ad consumptionem succorum, acida fiant; quia saccharum suo calore promptē excitat succos ad ebullitionem.

Duo itaque requiruntur, vt aliquid acescat, calidum mouens, & frigidum vincentis; si frigiditas esset nimia, & nullus esset calor, nunquam fieret acidus sapor: haec omnia colliguntur à Gal. 4. de simp. med. fac. cap. 18. ibi enim dicit, nisi calor muret, non fit acidus sapor, hinc dicit hyeme ob frigus lac, pristinam, & reliqua difficilius acescere, quam aestate; similiter crassa, & frigida nunquam fiunt amara, sed acetosa; quia frigiditas, & non caliditas in ipsis dominatur: quarto enim de simp. med. fac. cap. 17. dicit, lac nunquam amarum efficitur, sed acetosum, quia caliditas exigua à frigore lactis facile vincitur.

An vero acidus sapor indicet humiditatem, vel siccitatem, an tenuitatem, vel

crassitatem, standum est Gal. qui de acido loquens sibi ante oculos proponit acetum, de quo 8. de simp. med. fac. cap. de aceto dicit, acetum est magis frigidum, quam calidum, estque tenuium partium, & siccum in tertio gradu.

Politis ijs facile erit videre, quibus humoribus per se conueniat acidus sapor: acida enim est melancholia naturalis, pituita acida, & aliquandò pituita vitrea.

Quod per se nō conueniat pituitosis humoribus, patet: quoniam de ratione pituitae est, vt per se humida sit: acida vero cum sint ex Galeno sicca, pituita per se acida esse non poterit: conueniet ergo per se melancholiae naturalique sua natura est frigida, & sicca, vt ostendimus in libro superiori cap. de melancholia.

Verum occurrit dubitatio, quia non videtur, quod aciditas per se conueniat melancholiae naturali, quoniam omnia acida (vt dicit Galeus locis citatis) sunt tenuium partium, melancholia vero est crassarum.

Occurritus melancholia habere ichorem copiosissimum, qui est acidus, & acidum dici tenuissimarum partium, quia acidi siccitas, & crassa pars terrestris in copiosissimo ichore est parua, quae si esset à sero separata, esset quoque crassissima.

Quod vero copiosissimum sit melancholiae serum, colligitur ex Galeno, Aristotele, & Hippocrate: ex Gal. lib. de plenitudine cap. 10. vbi dicit, melancholicos esse saluare abundantes, & à potu abstinentes; copia enim ferrosi humoris melancholiae naturalis sitim demulcet; & abundantem reddit saluam; in 6. epid. 37. dicit, sanguinem melancholicorum esse serosum: Ex Arist. in problematibus de melancholia loquente, qui dicit, humorem melancholicum delectari serositate: secundo de paranimia cap. 4. vult, quod timidi, & per consequens melancholici habeant sanguinem dilutum: Ex Hipp. 4. de morbis, vbi dicit, lienem esse aquae locum, vt omnes ferme consentiant melancholia affluere ichorosis, & tenuissimis humoribus, qui sparsam & diffusam habent crassam, & terrestrem portionē 2. in 2. Epid. 27. citat casum Boni habentis splen elatum, qui liberatur, quia

quia multum minxit. Cum igitur probatum sit, aciditatem pituitosis humoribus per accidens conuenire, nunc est videndum, quomodo per accidens conueniat: Dicimus aciditatem conuenire posse per accidens pituitæ tribus modis.

Primo quia pituita est dulcis, & sua natura frigida; talia verò omnia promptè accescunt, quia dulcia habent caliditatem mouentem, & frigiditatem vincentem.

Secundo acidum fit, quando ichor sanguinis sua natura dulcis cum pituita miscetur.

Tertio accescit, quando ichor acidus melancholiæ in ventriculum mittitur, & cum pituita misceatur.

Ceterum duo occurrunt dubitationes, prima non uidetur, quod aciditas, quæ est melancholiæ naturalis proprietas, possit alijs humoribus per accidens conuenire: rerum proprietates, & definitiones alijs nec per se, nec per accidens conueniunt: hinibitas non conueniet alijs speciebus per se, neque per accidens.

Hinc dubitationi responderetur, quod aliquando rerum proprietates sunt communicabiles, quia eorū subiecta alijs communicantur, sic ichor melancholiæ, quia communicatur pituitæ, eam acidam reddet; equus non commiscetur alijs speciebus, & propterea eius proprietas, neque per se, neque per accidens alijs conueniet.

Secunda dub. admissio quod pituita per accidens fiat acidum, scilicet ob ichorem melancholiæ, & ichorem sanguineum, nihilominus uidetur, quod pituita dulcis, quæ est semisanguis, quæque fit acidum per simplicem ebullitionem, sit per se talis, & non per accidens.

Respondemus aciditatem factam post ebullitionem dulcis pituitæ pendere a terreo & sicco humore, qui est melancholicus, quique ob leuem ebullitionem resoluentem calidum, & humidum in pituita generatur: hancque pituitam participare melancholico succo, qui in ipsa post ebullitionem nascitur.

Hinc Galenus lib. de plenitudine cap. 10. loquens de pituita acidum dixit, ab ipsa reddi homines famelicos: nisi enim esset sicca, & frigida, & per consequens melancholica, quod in idem recidit famem non excitaret.

Hinc nunquam potui omnino Auicennam arguere, quando dixit, quod pituita possit conuerteri in melancholiam, dissentio tamen ab Auicenna, quia dixit melancholiam ortā à pituita esse quartū genus.

Mihi vero cum Galeno tria genera succorum melancholicorum videntur sufficere, quia melancholia sparsa in acida pituita eadem est cum sacali, eademque sunt proprietates, hæc sententia auctoritate, & experientia roboratur, dicit enim Galenus 3. de loc. aff. cap. 7. experientia patere post pituitosas febres fieri quartanas.

Neque argumenta Manardi lib. 9. epist. 2. & Valesij lib. controuersiarum, quod omnino ex pituita non possit fieri melancholia, aliquid roboris habent.

Primum argumentum Manardi tale est quæ extremè distant non possunt in se se inuicem transire, nisi per medias commutationes, at pituita est huiusmodi, ergo non potest conuerteri in melancholiam.

Occurrimus huic, pituitam, ut pituitam, in melancholiam non conuerteri, sed in ipsa, quatenus est mixta ex quatuor elementis esse aliquas terreas portiones, quæ post ebullitionem, & euaporationem dulcis substantiæ manifestantur.

Secundum argumentum contra Auicennam est huiusmodi: pituita non est visio apta, quia, si coniiciatur in ignem, non vritur, ergo non potest conuerteri in melancholiam.

Hoc argumentum mihi videtur esse vanissimum, quoniam neque bilis adusta vomitu reiecta si ignitis carbonibus iniiciatur est visio apta: omnes enim humores corporis viuētis ignē extinguerēt.

Quæ nam igitur sit illa succorum substantia, qua abeunte, illic sed succi, vel vina accescunt, ex sufficenti enumeratione partium componentium succos colligitur: omnes succi antequam accescant habent quatuor partes proportionales respondentes quatuor elementis, sic in massa sanguinea est melancholia, quæ tertia pituita quæ aquea; sanguis, qui aeris & bilis, quæ igni responderet: similiter vinum ex Galeno 2. de fac. naturalibus c. 9. & 4. de simp. med. habet quatuor partes quatuor elementis, & quatuor humoribus nostri corporis respondentes, quarum prima est

est fæx: Secunda flos, qui supernatat: tertia est vini substantia: quarta est aqua vitæ: Idem in succis herbarum est fæx, flos, substantia, & aqua vitæ, quemadmodum sciunt distillatores.

Vt igitur perfectè sciamus, quomodo vinum, & cæteri succi acefcant, videre oportet, quæ nam ex quatuor vini partibus mutetur, aut resoluitur: Dicimus itaque fæcem, & substantiam vini, vel succorum in ijs, quæ acefcunt inueniri, & nequaquam abire, quia hæ partes non possunt ebullitionis calore in spiritum resolui, sequitur ergo, vt abeat flos, vel aqua vitæ: non flos quia in aceto, & succis acidis inuenitur, relinquitur ergo, vt vinum, vel succi acefcant: quia aqua vitæ in vaporosas auras ob ebullitionem resoluitur.

Præterea signum demonstratiuū, quod ostendit, omnes succos illico abeunte aqua vitæ acefcere est; quia distillatores ab aceto, vel succis acidis nihil aquæ vitæ colligunt. Hac posita veritate colligimus acetum esse frigidum, quia exiit aqua ardens, quæ igni respondebat: acetum habere aliquam acrimoniam, quia nihil acefcit sine ebullitione à calore extraneo excitata: esse tenuiū partium, & valde penetrare, quia vini lentior à calore ebullitionis diffecatur; astringere, quia est siccum: esse siccum, quia in ijs, quæ acefcunt, abit humiditas vitalis.

Dur enim sunt humiditates in mistis perfectis, altera, quæ est vitalis, aquæ vitæ similis, & quæ propriam temperaturam succorum conseruat, qua abeunte acefcunt, & exsiccantur; altera est oleaginosa, qua mistum est mistum, quæ igne, vel putredine, vt dicit Aristoteles, dissoluitur; unde oritur vappa, quæ sepe in vino, & aquis putridis obseruatur, videtur enim in ijs tale quadam oleaginosa, & albescens supernatare.

Ex ijs facîle cognoscere poterimus, quādo acidus sapor indicabit misturam intrinsecus factam, & quando misturam, quæ fiet ab humore extrinsecus adueniente: pituita erit acidus, quia in corpore redundet copiosius melancholia: ichor, tunc euacuando melancholiam è medio aufertur nimiam aciditatem pituitæ.

Cognoscemus vero corpus affluere

succis melancholicis ex signis melancholice traditis in lib. superiori: si erit acidus, quia dulcis ichor sanguinis commiscetur pituitæ, & inde ob ebullitionem accescat, tunc sanguine è cubito extracto acetositas tollitur.

Sidemum ob errores in victu, vel ob nimium frigus calor ventris adeo reddatur imbecillus, vt non valeat in chylum perfectum conuertere cibum; & inde à calore extraneo exciteur ebullitio, & acetositas; tunc, nisi vehemens frigus impresserit malū aliquod vestigiū in viscera, acetositas optima cura adhibita in sex rebus non naturalibus tolli poterit.

Quomodo cognoscitur, quando ponticus sapor indicat humorum misturam intrinsecus factam, & quando misturam ab humore aliunde veniente. Cap. V.

Pontici saporis nomine intelligi debet austerus sapor, quia Galenus 2. de loc. affectis cap. 8. dicit, austerum esse grana mali punice, mala cotonea, vias immaturas, & plura alia esui apta quæ pontica sunt: similiter lib. de atten. vict. ratione vias immaturas vocat ponticas: Cæterum unde fiat sapor austerus est videndum: Galen. 1. de simp. med. facit 37. dicit, austerum fieri ex acerbo, hosque sapores esse adstringentes, & non differre specie, sed solum secundum magis, & minus: acerbum enim magis, austerum minus adstringit, acerbæ sunt pyra siluestria, myrta, & mespila immatura, quæ inepta sunt esui, austeræ vero (vt diximus) aptæ.

Quomodo autem austerus siue ponticus sapor ex acerbo fiat: audiamus Galenum, qui 4. de simp. med. facit cap. 8. distinctè hoc docet: habetque serè hæc verba, „acerbum est terremum & frigidum, & tripliciter exoluitur aut incalescens, aut humescens, aut vtrumque: si acerbum solum incalescit, fit dulce, vt castaneæ: si vero humescit, & non incalescit, idque fit crassum partium, fit austerum: si tenuiū, fit acidus sapor: si vero incalescit, & humescit, qualitatē admodum dulcem acquirit.

Deinde Galenus refert, quæ semper acetæ, & quæ semper austera seruantur, & quæ dulcedinem acquirunt, dicit, quæ semper manet acerba sunt fructus ilicis, sagi, corni, arbuti; quæ austera, sunt vitæ amari-

amineæ, tum fructus, tum vinum acerba, quæ dulcia sunt, sunt myrti fructus, pyri siluestris, ac roboris; hi enim fructus, & alij similes, dum inalescunt, & humescunt, dulces sunt.

Ex ijs colligimus austera fieri, dum acerba humescunt; mala granata, antequam maturescant, dicuntur acerba: dum humescunt, & aliquantulum inalescunt, austera seu pontica dicuntur; Itaque vt fiat austrum, necessarium est, vt acerbum humescat: hinc Galenus 1. de simp. med. c. 37. dicit, de ratione austeri vera est, vt adstringat; verum, quia maioris est humiditatis particeps, quam acerbum, austera magis in profundo, acerba magis in superficie adstringent.

Supponatur, saporem ponticum, siue austrum non solum inueniri in pituita vitrea, sicuti docet Auicennas dum dicit, pituitam vitream ob ponticitatem magnos excitare; cruciatus; verum etiam in sæce melancholica, vt ex Gal. colligitur dicit enim 4. de simp. med. 8. ponticum esse terrenum, & crassiarum partium, quod præcipuè melancholiæ conuenit; nunc, par est, vt videamus, an ponticus sapor conueniat per se pituitæ vitreæ, vel melancholiæ; quod per se vitree pituitæ conueniat non videtur, tum quia de ratione pituitæ est, vt sit humida, & non terrea; tum quia pituita vitrea inodò est acida, & modò pontica, si propriè, & per se esset pontica, esset semper talis.

Similiter non videtur, quòd sapor austerus conueniat per se sæci melancholicæ naturali, quia hæc est (vt ostensum est superius) per se acida; vnum enim inquantum vnum vocem solum habet proprietatem per se, & non plures.

Præterea austerus sapor ex Galeno indicat mistum esse crassarum partium, & non tenuium; non semel ostendimus naturalem sæcem melancholicam auctoritate Galeni, Aristotelis & Hippocratis adeo abundare ichoribus, adeoque dilutam esse, vt acida, & non austera sit.

Neq; cōueniet atræ bili exedenti: quia hæc est succissima, & calidissima, de ratione austeri, vt colligitur ex Galeno loco citato, duæ sunt præcipuè proprietates, quarum altera est, vt sit terrenum cum humiditate coniunctum; altera vt sit crassa-

rum, & non tenuium partium: relinquatur ergo vt austerus siue ponticus sapor (vt tenet quoque Argentarius) prodeat per se à sæce melancholica naturali, quæ non sit diluta, sed aliquantulum reddita crassior, & terrestrior, habeatque solum tantum humiditatis, qua eius siccitas, & vis adstrictoria possit in profundum penetrare.

Quo pacto vero accidat, vt melancholia naturalis minus diluta reddatur, & fiat acerba, plurimæ possunt esse causæ: modò enim exsiccatur ob vsû pharmacorum ichores purgantium, modò ob potus abstinentiâ, modò ob nimium exercitiû, ob balnea, ut de ijs hic nō sit locus agendi.

Occurrit tamen ex dictis dubitatio, quia non videtur, quòd sæx melancholica sit crassarum partium.

Respondemus crassitiem melancholiæ naturalis adeo esse dilutam, sparsamque in copiosissima serositate, sicuti ostensum est, ut acida, & non austera sentiantur.

Ex ijs quid indicet sapor ponticus faciliè cognoscemus: etenim, si in ore persenserimus saporem similem omphaciorum statim inferemus id effici, uel à pituita vitrea, uel à sæce melancholica non admodum diluta, uel ab austeris cibis: has causas distinctè cognoscemus, virtute methodorum traditarum in §. 6. pro cognoscendis differentiis melancholicorum, & pituitosorum succorum; si enim inuenimus corpus melancholia redundare, non decipiemus, si ex pontico sapore conijcimus sæcem melancholicam debito crassiorem redundare; si pituita, vitream dominari; si corpus, neque pituita, neque melancholia affluere, indicabimus causam acceptam austeri saporis referendam esse austeris cibis.

Verû, quia methodi cognoscendorum pituitosorum, & melancholicorum humorum tradite sunt in lib. superiori, ex quibus faciliè cognoscere poterimus, quid in corpore dominabitur pituita vitrea, uel sæx melancholica; ideo hic de hac re merito finem faciemus.

Ostenditur vitellinum colorem esse simplicem, & non mixtum. Cap. VI.

Quemadmodum saporis sæpè indicant varias humorum mixturas, sic colo-

colorum plurimi; Hic in primis se offert considerandum, an vitellinus color misturam aliquam indicet; res enim est controuersa, & diffensionis plena; quoniam Auicennas libere, & aperto Marte videtur in certamen Galenum vocare, dum dicit lib. 1. fen. 1. cap. de humoribus, vitellinam bilem esse misturam ex flaua cholera, & crasso phlegmate.

Galenus vero 2. de fac. naturalibus c. vitimo, & lib. de atra bile aliter sentit, dicens, vitellinam fieri ex flaua à calore igneo crassifaceta, hacque verborum serie utitur; fit flaua ob tenacem humorem sed, si discussa fuerit, redditur vitellis ouorum crudorum similis.

Auer. 3. coll. cap. 3. Galeni sententiam sequitur; Expedit hunc nodum pro vitibus excutere, quia sententiarum varietas alterat, & mutat curationem, quoniam si vitellina bilis fieret ex flaua, & crasso phlegmate, ut placuit Auicennae, sequeretur, quod flaua esset calidior vitellina, & quod vitellina indicaret esse incidendum, & detergendum, & aliquomodo ob pituitam mistam calefaciendum, quod reluctaretur experientiae, & Galeno.

Ne igitur de hac re tanti momenti ieiunet, & exiliter agatur, sunt argumenta pro opinione Auicennae adducta, proponenda.

Primum argumentum hoc est: si bilis vitellina esset crassifaceta à calore præternaturam, non esset lutei coloris, sed potius vergeret ad nigredinem; calor enim, quo maior est, maiorem nigrorem inducit.

Quod argumentum nullius sit roboris, duo afferri possunt argumenta ab experientis decepta: alterum est, dum videmus ouorum vitella ab igne assari & condensari luteo eorum colore non abeunte; alterum, dum pharimacopeus preparat iulapium ignitis carbonibus, nigrorem nullum acquirit: quare sic argumentari poterimus, si calor igneus oui lutea condensat nulla facta caloris mutatione, quanto magis calor naturalis igneo mitior poterit condensare flauam bilem resolendo peniorem partes sine mutatione coloris.

Amplius ratio fauet Galeno, quomodo, si vitellina esset ex flaua bile, & crasso phlegmate mista, sequeretur quod flaua esset intensioris coloris vitellina, quod est omnino falsum.

In eundem scopulum prolabitur Auicennas, dum dicit, flauam choleram esse misturam bilis cum aquosa pituita, quod est falsum, quia copiosa humiditas flauae bilis non est pituita, sed proprium serum bilis, quod specie differt a pituita, & a sero aliorum humorum; est Galeni 6. epid. 2. tex. 38. in omnibus humoribus inueniri proprium serum specie, & natura diuersum ab alijs humoribus: Valesius 1. lib. sitarum controuersiarum, & plurimi alij de hac re diffusè egerunt, ideo nobis occasionem plenius loquendi de hac re sustulerunt.

Quorum humorum misturam indicet porraceus color? Cap. VII.

Compaginembilis cum pituita viridem, & porraceam colorem ad vitium aliquando imitatur; videtur in scholis communiter esse receptum, vnica videtur esse Medicorum vox, quod porracea, siue prassina cholera misturam ex bile & pituita portendat.

Ceterum quæ nam sit hæc species bilis, quæ mista cum pituita porraceam efficiat, variè distrahuntur Auctores; aliqui enim dicunt porraceam fieri ex pituita & bile flaua; aliqui ex pituita, & vitellina; aliqui demum ex pituita & æruginosâ bile.

Qui dicunt ex albo, & flauo, aut vitellino viridem, & porraceam bilem enasci, adeo cæcutiunt, ut me pudeat in re tam aperta eos reijcere: Philosophorum nemino negabit, viridem colorem magis flauo, & vitellino accedere ad nigrum: omnesque medios colores fieri ex albo, & nigro: Aristoteles libello de coloribus (si Aristotelis est) cap. 2. & Auer. lib. de sens. & sensib. tenent colorem album, & nigrum esse elementa mediorum; quare si porracea fiet ex omnium consensu ex pituita, quæ alba est, & ex bile; est necessarium, ut hæc species bilis sit opacior, & obsecrator porracea bile, pituita enim, quæ alba est colorem semper remittet: si miscetur pituita cum flaua, pallida enasci debet iustura; similiter cum vitellina, erit remissioris coloris: si cum viridi colore pituita miscetur, viridis quoque colore remittetur: quare, si ex pituita & bile fiet porracea, esset bilis omnibus alijs obscu.

jeunior, hæcque est porracea, quæ est bilioforum obscurissima, quæq; si vterius torrefiat, dicit Galenus 2. prognost. 47. atram fieri exedentem, quæ ad melancholicos succos pertinet.

Puto ego bilem viridem siue sit porracea, vel æruginosa, fieri ex bile flaua & cærulea. Non negamus tamen cum his bilib. permisceri pituitam. Quod verò color viridis fiat ex flauo & cæruleo: colore sciunt Pictores, deinde infinita sunt experimenta. Si n. acceperimus vitrum flauum & cæruleo adiugamus, statim resultabit color viridis pulcherrimus: parimodo si miscatur terra cærulea cum auripigmento semper resultabit, viridis inde quoq; colligimus viridem bilem seu porraceam, & æruginosam quæ similiter viridis est, fieri ex flaua bile & cærulea.

Neq; credendum cum Arist. & Auerr. locis citatis fieri ex albo & nigro omnes colores medij: dantur enim colores medij qui sunt per participationem extremorum & dantur medij per negationem extremorum: color flauus viridis puniceus cæruleus, isti omnes sunt medij per negationem extremorum: quia isti ex albo & nigro non fiunt: nemo pictorum hæcenus inuentus est qui ex albo & nigro sciret componere rubrum flauum viride vel cæruleum: Quomodo verò fiant colores albi & nigri: & quomodo fiant colores medij per participationem extremorum, & quomodo fiant illi qui sunt per negationem extremorum satis superque egimus in 1. Fen. quæst. 83. & in arte parua.

Verum, cum de loco generationis porraceæ dubitetur, hocq; maximè conferat hic contemplationi, aliquid de hac re dicatur: Quidam enim putant solum in ventriculo generari: Alij vero in venis etiam. Qui dicunt solum in ventriculo gigni, putant id à Gal. colligi posse libello de atra bile, vbi dicit, in ventriculo porraceam gigni: errare videntur isti, quia, quamuis in ventriculo gignatur, nihil tamen prohibet, quin gigni possit in alijs partib. hinc Gal. 2. prælagiorum 39. dicit, porraceam aliquando in venis gigni posse: arbitror ego non solum in ventriculo, & in venis generari posse, verum etiam in omnibus corporis partibus, vbi colligi potest æruginosa bilis: patet experientia, quia vide-

mus aliquando per os, per nares viridem mukum transcolari; per pudenda, vt in ijs qui patiuntur gonorrhæam, quorum indusia porraceo colore inficiuntur: similiter in sanguine è secto cubito extracto ichor viridis sæpè observatur: proinde ratione, auctoritate, & experientia coacti dicimus, porraceam in ventriculo sæpè fieri, & aliquando in venis, & omnib. locis, vbi misceri potest flaua cum cærulea.

Posito, quod porracea fieri possit in plurimis partib. corporis, & quod modò fiat ab æruginosa ab alijs partibus missa, modò ab adusta bile flaua, redditurque æruginosa quando erat cæruleæ bili commissa, variaz conſurgunt indicationes; etenim si ab alijs partib. mittitur, debet pars mittens, & generans hunc malum succum, methodis de locis affectis cognoscendis traditis non vno in loco superiorib. libris inueniri & inuenta corrigi debetque reuelli non à parte in qua residet, sed à partib. mittentibus: si vero porracea fiat à bile flaua, quæ non erat æruginosa ante mixturam, sed solum post factam compaginem, aliæ ab illis longe faciliores hauriuntur indicationes, ex hac enim mixtura intus facta non suboritur sæuum onus vel trucis symptomata exaltantur, quæ vires deiciant, quæ viscera premant, & corpus feriant, quia non supponit viscus aliquod tam prauè esse affectum, vt mittat, & gignat hoc æruginosum virus.

Quo pacto autem cognoscatur, quando viscus aliquod æruginosam bilem gignat, & mittat in alias partes, facile ex methodis traditis superius pernoscemus, ex primo enim lib. & tertio specifica idea affectus, quæ æruginem efficiat, colligi poterit; hæc est calidissima visceris alicuius intemperies. Ex secundo semper colligemus, vbi sit protopathia, & per consequens quæ sit pars mandans, & fonens; ex sexto sex locos colligemus indolentes specificam bilioforum suctorum differentiam, vt nihil in hoc loco dici possit de hoc humore, de parte mittente & fonte, quod non sit in alijs libris pro virilibus explicatum.

Quod albus humorum color indices modo calidos, modo frigidos, & mistos humores. Cap. VIII.

Album humorum colorem, quamvis plurimi putent pituitosum, & frigidum humorem tantummodo indicare, reperio tamen albedinem in humoribus indicare modò calidos, modò frigidos, modò mistos humores, & aliquando debilitatem viscerum; Quod albedo pituitam significet, Auicennas lib. 1. fen. 2. doct. 3. c. 7. dicit superfluum albedinem significare pituitam; Galenus verò 2. de temperamentis cap. 5. dicit, sicuti pilus niger fit ex torrefacto humore, sic albus ex pituita nascitur.

Quod verò aliquando albedo significet adustus humores, est Auicennas, & experientia: Auicennas lib. 1. fen. 1. cap. de humoribus ipsi verbis vtitur, superfluous color in humido corpore in primis nigredinem efficit, deinde denudat ipsum nigredinem & albedinem facit; subdit propterea ligna in carbonem, & deinde in cinerem verti, redditi; rationem; calor in humido efficit nigredinem, in secco albedinem; frigiditas in humido albedinem, & in secco nigredinem operatur; experientia; sunt albæ aphthæ, quæ indicant adustus dominari humores, sunt quoque alia maligna vlcera calida.

Quod vero ob viscerum debilitatem albi humores reddantur, patet in leiophlegmaticis, vel in hypochondriacis, vel simili cachexia correptis, quare, nisi certa aliqua methodo incedatur in cognoscendis humoribus, res confusa, & difficultatibus obstructa relinquetur.

Sed, quia in hoc loco per colores perquirimus mixturas, cognitis modis, quibus albi fiant humores, propositum aggrediamur; Quantum attinet ad pallorem sanguinis à cachexia factum, dicimus, hanc colorem indicare mixturam ex sanguine, & pituita aquosa, quæ dici potest intrinsecus facta; quia chylus rudis ortus ab imbecillo ventriculo restagnans per mesenterij spiracula in hepar vircibus ferè perditum non potest totus conuerti in sanguinem, sed tantum aliqua pars, unde ex hac sanguinis parte, & pituita a-

quosa fit hæc pallida mixtura.

Causa palloris est aquosus humor, qui non potuit adeo à calore incrassari, vt in sanguinem perfectum conuerteretur: est philosophi 4. meteororum, optimam coctionem fieri incrassando, quod tenue est.

Simili modo dicimus in albo fluxu alui in tenui sanie, in alba vrinam, in liquido catarrho esse aliquas partes coctas, & aliquas crudas; habeat enim viuens, pro vt quis volet, fractum robur, aliquid concoquit; hinc sanguis ferofus hydropicorum non omnino inutilis est, quia in ipso oportet, vt fit aliquid coctum, unde alantur, & viuunt.

Hinc errant, qui incidunt in opinionem euacuandi totam aquam illorum per aluum, vel paracentesim, erum enim illud à maiori virtute facili conuerteretur in sanguinem; ideo non est in alium per se, sed quatenus auctum suffocat vires: est Gal. commento septimo de morbis vulgar. tex. 12. esse perforandum ventrem hydropicorum, dum ratione aucti tumoris vires consternuntur.

Præterea alb. color turbidus indicabit mixturam ortam ab humore aliunde veniente; sicuti contingit, dum alba pituita commiscetur humori melancholico: hic color in excrementis imitatur colorem luti, sepeque obseruatur, quia natura perpetuò in ventriculum melancholiam euomit causa retinendi chylum; deindeque cum facib. subducitur: si igitur niger humor commiscetur pituitæ, quæ sua natura candidus est, medius efficietur color, qui lutum imitatur.

Posunt denique alij humores commisceri pituitæ, qui eius albedinem remittant; qui autem esse possint ex methodis cognoscendorum humorum traditis in sexto libro facili cognoscemus.

Ijs positis, quisque indicationes sciet haurire; quia si alb. turbidus color prodierit à mixtura intus facta, vel erit virium debilitas, vel putredo, vt de pure, & catarrho liquido dictum est: tunc vlcera debilia erunt corroboranda, & putredo arcenda auxilijs non semel propositis. Si prodierit ab humoribus aliunde missis, dictum est superius non semel, quomodo sit auxiliandum.

*Ostenditur ex peccantibus humoribus iam
traditis fieri mixturas possibiles*
80084. Cap. IX.

EX hac natura saporum, & colorum
hactenus explicata illæ humorum
natures, quæ sensibiles sunt manifestæ, colligi
possunt: Quomodo verò pernoscantur
quæ sint in penitissimis corporis partibus in
quas neque lingua, vel oculi penetrare
possunt, tradite sunt in 6. libr. methodi,
quæ possunt docere omnes prædominan-
tes humores, & per consequens quamlibet
eorum miscellam: Nunquam enim
prædominabitur pituitæ species aliqua,
vel sola, vel alijs humoribus commista,
quæ ex illorum signorum syndrome non
cognoscatur.

In postremo huius libri capite omnes
mixturas, quæ fieri possunt in qualibet
corporis parte, colligemus, easque adnu-
merabimus: aliæ constant duobus hu-
moribus, quæ vocari possunt combina-
tiones, veluti quando esset commista bilis
flava pituitæ; aliæque tribus, sicuti dum
bili & pituitæ adiungeretur melancholia;
aliæque demum quatuor, sicuti dum il-
lis tribus adiungeretur ichor sanguinis,
vel alterius humoris: mixturæ vero, quæ
ex quinque, & alijs componentibus fieri
possunt, ut cognitioni nostræ minus aptæ,
omitti possunt.

Has mixturas nullo modo adnumerare
poterimus, nisi, quot sint simplicia compo-
nentia, quæ in contentis collocantur,
prius dicamus: Imitabimur Aristotelem,
qui volens colligere possibiles combina-
tiones primarum qualitatuum enumeravit
omnes combinationes; quas intellectu
humani fingere poterat, & inde ex
illis colligit possibiles: primo enim dixit
qualitates primas esse quatuor, nempe
caliditatem, frigiditatem, & siccitatem, &
humiditatem: deinde numeravit omnes
combinationes, vel mixturas, quæ ex ijs
fieri, & imaginari possunt; dixitque vel
misceri calidum siccum, vel calidum humi-
dum, vel calidum frigidum, vel frigidum sic-
cum, vel frigidum humidum, vel humidum
siccum; colligitque deinde philosophus ex
ijs omnibus quatuor possibiles, quæ
quatuor elementis conveniunt, & duas

reiecit impossibiles, quæ sunt calidum
cum frigido, & humidum cum sicco; si-
militer.

Sic nos si velimus querere omnes mi-
xturas, quæ in humoribus siue in conten-
tis fieri possint, prius simplicia compo-
nentia numerabimus; possibilesque collige-
mus, & impossibiles omitemus.

Dicimus itaque ex Galeno lib. de atra-
bile cap. 2. & alibi, septem esse species bi-
liosorum succorum, scilicet pallidam, fla-
uam, vitellinam, portaceam, rubram, cæ-
ruleam, & æruginosam: omitti hic posset
portacea, quia non est simplex, sed mista
ex bile flava & cærulea: verum, quia sic
mista posset quoque, alijs humoribus com-
misceri, in hoc numero contentorum
præter naturam eam collocabimus; deinde
ex Galeno, & communi medicorum
consensu quattuor sunt famose pitui-
tæ, acida, salia, vitrea, & dulcis; hic
non dispuro, an sint veræ species per con-
stitutivas differentias factæ, quia in hoc
loco, non est mihi in animo ab ipsis philo-
sophiæ, & medicinæ primordiis hoc
in discrimen renocare, sed quæ à Gale-
no sunt proposita, & communiter acce-
pta præ accipere, & inde ulterius philo-
sophari.

Tres (ut ostendimus) sunt melancholia,
sæx sanguinis naturalis, sæx adusta,
& atra bilis.

Denique est sanguis, qui copia, & va-
rijs modis peccare potest: Amplius ex
Galeno, & Hippocrate 6. epid. 2. comm.
37. dicimus ichores esse æquales numero
humoribus; dicit enim Gal. quolibet hu-
morem habere ichorem proprium, qui
naturam, & virtutem ab alijs ichoribus
separatam sortitur.

Quod ita re vera sit, patet, quia ex va-
rijs ichoribus varij quoque morbi sunt,
obseruamus enim porriginem factam
ab ichore bilis esse omnino diuersam ab
illa, quæ ab ichore melancholiæ, vel ab
ichore sanguinis proficiscitur: Galenus
lib. de tum. præter naturam cap. 10. dicit,
causam erysipelatis esse bilem flauam
ichori sanguineo mistam, bilis enim sine
ichore sanguinis non efficit erysipelas,
sed aliud morbi genus, ut ostendimus in
6. lib. colligimus itaque quindecim esse
humores, & totidem ichores, num: rum-
que

que horum succorum quatenus possunt ledere, nulla adhuc in ipsis concepta putredine, peruenire ad triginā.

Quod vero bilis porracea, æruginosa, & atræ bilis offecere possint sine putredine, patet experientia; videmus enim sæpissimè, æruginosa euomi & atras bilis per infernas partes aliquando excerni nulla existente febre; valet apud me consuetudo, non est febris, ergo humor peccans non putrescit; si vero humores, & ichores citati adorianur corpora viuētia quatenus putridi, erunt quoque omnino diuersi.

Vetum, quia putredines inter se natura, & specie differunt, humores quoque putridi pro diuersitate specierū, vel graduum putredinis erunt omnino diuersi, putredines enim quæ apertè humanum genus inuadunt, & quæ sub benigniori aspectu inimicum virus occultant, natura & gradibus inter se differunt.

Hic recipimus cōmunem sententiam, quod quatuor sint differentiæ, vel gradus putredinis, quorum primus obseruatur in apertis febribus continuis, vel intermittentibus. Secundus in malignis & dolosis mitioribus, tertius in malignis seuiſsimis: in his febribus sub benignissima facie aliquorum dierum cursu scelestissima absconditur putredo, quæ necessestario virium ruinam, & vt plurimum mortem adfert: quartus in pestilentibus.

Ex his colligi possunt centum, & quinquaginta humores præter naturam; hoc modo ratio inuēda est: in primis sunt 15. humores, & quindecim ichores considerati, dum nulla putredine polluti lædunt: totidem sunt, dum illorum quilibet putrescit primo putredinis gradu, sicut igitur omnes hæcenus sexaginta; addantur ijs, dum quisque putrescere potest secundo, tertio, vel quarto gradu putredinis erunt omnes centum, & quinquaginta inter se reuera valde differētes.

Bilis putrida in primo gradu efficit febrem salutarem: in secundo malignam, curabilem in tertio malignam ferè incurabilem: in quarto pestilentem.

Sequuntur septem species flatuum, quippe qui cuilibet humori peccanti cōmisceri possunt: quatuor, qui eleuantur à quatuor piuitosis succis; alius enim est

flatus ortus à dulci pituita, alius ab acida, alius à salia, & à vitrea; alius, qui truncem colicam facere solet: duæ flatuum species à melancholia consurgunt, aliter à melancholia quæ est sex sanguinis, & alter à sece adusta: ab illa enim quæ exedit vt à causa materiali, de qua loquimur, non oritur flatus: Septima flatus species oritur à cibo & potu.

Neque obijciant, quod humores non commisceantur flatibus: quia fac'le occurrere possumus, plures enim morbi ex humoribus flatibus misti sunt: tinnitus, qui imitatur sonum aquæ currentis, indicat pituitam aquosam esse commistam flatibus: colica passio sæpè fit ex mistura porraceæ bilis & flatus, vel ex vitrea pituita & flatibus.

Præterea in numero contentorū præter naturam sunt lubrici, & eorū vapores, qui sæpè epilepsiā gignunt: sunt spermata præter naturam retenta, quorū spiritus præfocationes vteri, cordis palpitationem, & alios affectus mouere possunt: est lues gallica, & eius vapor, qui, vt quoti die videmus, per vniuersæ corporis partes suum dispensat virus, omnibusque humoribus potest commisceri: Demū est sanies, & eius vapor, à quibus febris, & innumerabiles affectus præter naturā fieri possunt: si igitur has quindecim causas præter naturam alijs propositis addas, causæ erunt centū & sexaginta quinque.

Ex quo numero contentorum præter naturam præcognito possumus quoque perfectè scire, quot misturæ ex duobus, quot ex tribus, & quot ex quatuor humoribus omnifariam mistis fieri possint.

Imitatur (vt dictum est) Aristor. quia sicut ille ex quatuor qualitatibus sex cōbinationes colligit, scilicet quatuor possibiles, & duas impossibiles; Similiter nos ex 165. prius colligemus omnes misturas, & deinde impossibiles rejiciemus.

Modus scilicet colligendi ex quolibet dato numero omnes misturas fit per additionem omnium numerorum propositorum postremis exceptis: si enim numeramus misturas ex duobus, quas vocat cōbinationes, summouemus ab additione postremum numerum tantum, si misturas ex tribus, duos postremos numeros, si ex quatuor, tres: Exempli causa, si

Ex Gal.6.epid.2.tex. } Ichores putridi 37.dicere quemlibet in primo gradu	Ichores ma- li moris	Ichores pesti- lentes	Ichores peste af- fecti
humorē habere suū ichorem			
ichor sanguinis 16	46	76	106
ichor pallid.bilis 17	47	77	107
ichor flauæ 18	48	78	108
ichor vitellinæ 19	49	79	109
ichor rubræ 20	50	80	110
ichor cæruleæ 21	51	81	111
ichor porraceæ 22	52	82	112
ichor æruginosæ 23	53	83	113
ichor pit.dulcis 24	54	84	114
acidæ 25	55	85	115
falsæ 26	56	86	116
vitreæ 27	57	87	117
ichor mel.natur. 28	58	88	118
facis adustæ 29	59	89	119
atræ bilis 30	60	90	120

Si igitur ex ijs centum & sexaginta quinque vis scire quot misturæ ex duobus fieri possint, fac horum numerorum additionem, dempto postremo numero, videbis summam peruenire ad

13530

Si vis misturas ex quatuor, demas duos postremos numeros idest 165. & 164. ex additione aliquorum orietur.

13336

Si ex quatuor demas tres postremos erit summa

13206

Verum sicuti Aristoteles ex omnibus cōbinationibus reiecit impossibiles, sic nos illius imitatione reieciimus omnes illas, quas proposuimus fieri ex ichore cum proprio humore, quia illæ re vera non possunt dici misturæ: hæ omnes quindecim sunt; verum quia ter additæ sunt, scilicet in misturis ex duobus, ex tribus & ex quatuor, erunt à summa remouendæ 45. præterea, vt impossibiles reieciimus misturas vaporum cum suis mineris, vt esset vapor saniei cum sanie, vapor luis gallicæ cum lue ipsa, vapor lumbricorum cum lumbricis, & spermatis cum spermate, quæ erunt quatuor, sed, cum ter positi sint, erunt 12. omnes itaque impossibiles erunt 57. quæ, si auferantur, possibiles erunt 40042.

Verum, quia misturæ possent in quolibet proposito efficiente fieri duum generum, scilicet intrinsecus, & extrinsecus, vt ostensum est, totidem numerabuntur.

Omnes igitur misturæ, quæ in animalibus fieri possunt, quæque methodis traditis in sexto libro perquiri possunt sunt num. 80084.

40022. intus

40042. foris

Ex traditis in hoc libello patet, quomodo virtute colorum, & saporum peruenire possimus ad humorum peccantium misturas; patet quin etiam, quomodo misturæ in viscerum latebris existentes, quæ per colorem, & saporem non habentur, pernoscantur, & demum quot misturæ fieri possint in viuētibz ex duobus humoribus, ex tribus, & ex quatuor: vltcrius quoque virtute eiusdem methodi possemus penetrare; verum, quia id confusorem pareret, rationabiliter desistimus.



SANCTORII SANCTORII

Olim

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIUM

Reconditarum qualitatum in primis initijs perquirendis.

LIBER OCTAVVS.

Quid intelligant Auctores per qualitates manifestas: & cur aliqui introduxerunt qualitates occultas seu substantias operantes. Cap. I.



Postquam actum est in præcedentibus de methodis, quibus vniuersæ peccantium humorum mixturæ possunt cognosciri in tribus sequentibus Libris agendum relinquatur de illo impetu, quo causæ istæ præter naturam in nostrâ solent irruere corpora. Cæterum cum sit in scholis valde receptum, quod causæ efficientes intrudere possint corpora videntia solum his quattuor modis, tota substantia, quantitate, qualitate, vel motu de ijs, ratiô suorum, agemus.

Acturi in hoc libello de ijs, quæ tota substantia operantur, in hoc vestibulo prius explicabimus quid intelligant Auctores per qualitates manifestas, & quid

per occultas, & secundum totam substantiam operantes.

Quoad manifestas qualitates attinet, est communis opinio, quod harum primarum, ad quas cæteræ omnes, quæ sub orbe Lunæ continentur, referuntur, & quarum merito omnes aliæ operantur, sint hæc quatuor, caliditas, humiditas, frigiditas, & siccitas. Secundarum, quæ primas sequuntur, sint præsertim illæ quindecim à Galeno 1. de vîu part. 9. & 1. de facult. naturalibus cap. 6. enumeratæ, durities, molities, lentor, friabilitas, raritas, densitas, asperitas, lenitas, grauitas, leuitas, crassitudo, tenuitas, odores, colores, & sapores: alibi ponuntur alia, vt glabrities, liyspiditas, crispitudo pilorum, rectitudo, stabilitas, defluxum, obtusa, & acuta qualitas, quælibet ex ijs continet varias qualitarum secundarum species, & gradus: multi enim sunt gradus, seu species, rari, & densi, asperi, & lenis, & cæteræ.

V 3 rura;

rum: multæ sunt species saporû colorum, & odorum: alio enim pacto sapor operatur, vt acer, alio vt amarus, vt falsus & vt acetosus, de quibus saporibus, & humorum coloribus in 5. & 7. lib. actum est.

Tertiæ qualitates, quæ secundas immediatè sequuntur, sunt detergere, incidere, aperire, asfringere, laxare, & alia id genus, quæ similiter referuntur ad quattuor primas, tamquam ad prima initia cæterarum omnium qualitarum, quæ in hoc mundo elementalî sunt.

Qui verò addunt qualitates totius substantiæ, quas alio nomine vocant occultas, inter quos est Fernerius, Argætenus, & alij plures Medici, eas non putant referri posse ad primas, vel ad alias manifestas: quin immo, quamvis aliqua ex manifestis lateat, & nõ rectè ab humano intellectu cognoscatur, adhuc eâ dũmodo ad quattuor primas, vel secundas aliquomodo, referti possit vocabunt manifestâ.

Ratio vero cur ab illis qualitas, quæ à primis non pendet, vocetur occulta, est, quia putât, hæc esse substantiam operantem, quæ sua natura est occulta, & incognoscibilis, dicuntque substantiam non opificio calidi, frigidi, humidî, vel sicci, sed primo, per se, & immediatè nullo interposito influentio illam agendi, seu operandi potentiam sortiri, & has qualitates occultas dici totius, & solius substantiæ: totius, quia tota simul substantia, eũ ex se sit indiuisibilis, operatur: solius, quia non merito aliarum qualitarum accidentalium, sed sola, & per se edit potentiam operandi: eaque in eadem categoria collocât, in qua est substantia, quia immediatè putant ab ipsa nasci: & potentias esse substantias operantes: easque demum esse occultas, quia nullarum qualitatũ auxilio, quæ sensibus sint subiectæ, manifestari possunt, ea enim ratione, qua substantia sensibus, & intellectui est occulta, eadem has qualitates occultas, & reconditas dici putant.

Morborũ innouatores conâtur probare experiẽtia, quoddãur qualitates occultas à substantia emanâtes, quæq; nulla cõmunionẽ habeât eũ calido, frigido, humido, & sicco, & alijs has primas insequẽtibus.

Solent in primis asserre Herculeum lapidem, dicuntque, ferri attractionem

non fieri à primis qualitatibus, quia nunquam experientia viũm fuit calida, vel frigida attrahere ferrum: nou à secundis; quia nemo vnquam vidit, rarũ, densum, graue, leue, tenue, crassum, durũ, vel molle ferrũ attrahere: Insunt ergo, nõ a manifestis magnetis qualitatibus, sed à propria lapidibus substantia hanc operandi virtutem per se, & immediatè prodire.

Simili modo dicunt, electrum qualitate occulta allicere passẽam, marinum leporem pulmonem: cantharides vesicam non alias partes exulcerare: etenim, si manifestis exederet qualitatib. magis igitur quod propinquius, & mollius est abtaderent. Paruulum piscem Echenidem nauim turgidis velis volentem firmare. Torpedinem manus piscatoris toris more afficere: Rhabarbarum bilem: agaricum pituitam: elleborum melancholiam, cæteraque cathartica non quæ omnes humores, vt quædam medicorum secta tenebat: Sed vt dicit Gal. cum Hipp. lib. de atra bile determinatos succos subducere: Theriacam venenum euincere: quaiactũ dũrum, & immane gallicum superare: pestẽ posse hominẽ sanum, & potentissimæ virtutis illico, & ictu oculi opprimere: saluam humanã ex Gal. lib. de inæqua intemperie cap. 6. viperam & scorpionem: vix credunt inueniri posse homines adeo stupidos, qui putent admicandas has operationes fieri à caliditate, frigiditate, siccitate, vel humiditate, & à cæteris consequentibus qualitatibus.

His experimẽtis, & pluribus alijs commoti putant, esse aliud principium, & aliam occultam causam non subiectam sensibus, vnde prodeat hæc operandi virtutes, creduntque hanc esse substantiam, quæ immediatè hos pariat effectus. Non autem acturi de initijs harum reconditarum qualitarum disputabimus primo an sint in genere substantiæ, ostendemusque non esse substantias, vt putant Ferr. elius, & Argenterius: deinde proponemus genus generalissimum, & subalternas differentias harum qualitarum.

Verum, quia hæc, quæ agunt tota substantia in arte medica, sub duplicem cadunt consideratõnem, vel recõditẽ, sicuti dum napellus occidit, & cantharides vesicam excidunt: vel dicuntur tota substantia

ria aliquid peccare, dum maximus fit recessus, & precipue in humioribus, dum secundum totam substantiam transmutati illud post suarum formarum interitum naturam subeunt puris, vel alterius putrilaginis. De utroque substantia vitio agemus: conabimur tamen in primis de reconditis qualitatibus agere, easque, & opinionem Ferneli conuellere; deinde de genere, & differentiis ipsarum, ut de re magis controneretur, & postremò de ijs, quæ transmutantur secundum totam substantiam, examen faciemus.

Qua via Morborum innouatores possint conuinci. Cap. II.

Auctores sunt ferè innumerabiles, qui de qualitatibus oculis disputant: pauci tamen disputationis cardinem consequi videntur: aliqui enim solum perquirunt, an ex Galeni, vel Aristotelis sententia admitti debeant, & nil vterius quærun: aliqui n̄sinus phylosophorum auctoritatibus additi liberè dicunt, non solum qualitates reconditas, quæ immediate prodeunt a substantia, dari posse; verum etiam in ijs qualitatibus morbos formæ constitui, & quartum morborum genus fingi valde distinctum ab interpetre, mala compositione, & soluta unitate, inter istos est Fernelius, & Argenterius.

Postremò peripateticorum plurimi alius erigentes spiritum; dum de animæ potentijs loquuntur, determinant potentias ad substantiam & non ad qualitatem pertinere, putantque non solum aliquas dari qualitates reconditas immediate a substantia venientes, ut ait Fernelius; verum cōtra Diuum Thomam subtilissimis argumentis conantur ostendere, omnem agēdi potentiam, omnemque virtutem seu qualitatem operatricem nullo alio interposito medio instrumento immediate inmediate causæ a substantia, tamquā a causā efficiēte est perpetuò prodire.

Fernelius itaque, & ceteri morborum innouatores, cum non desistant ab horum phylosophorum vestigijs, altiore facili sequuntur scholam quam aliqui fortasse putant; proinde volentes nos in hoc libro precipue has reconditas qualitates,

& per consequens morbos formæ demoliri, opus erit cum altioribus argumentis illud certare; quia illis solum euersis atque elisis, morborum innouatores commodè conuinci poterunt; & qualitates, quas vocant occultas, in cathegoriam qualitatis, & non substantiæ transferre.

Alia re vera non est via, quæ Fernelius vel hoc nouum morbi genus nunquam à Galeno excogitatum expeditius rejici possit, quam statim, & alioribus principijs à philosophis desumptis probare, quod substantia non habeat hanc immediatam operationem agendi, quia hac addepta veritate, ruent qualitates occultæ, vel totius substantiæ cum formatum morbis.

Quamuis apud Theologos, & philosophos subtilissimis argumentis acta sit questio, an potentia differant à fundamento, vel an tota virtus operatrix a substantia immediate pendeat, vel, quod in idem recidit, an dentur qualitates occultæ, quæ sint substantiæ operantes: non propterea de hac re hic agendo, quis obijcere poterit, in alienas menses nos potuisse saltem, quia nisi discutimus propositum nodum non possumus aduersus Fernelium vnum verbum mouere.

Ratio est, quia in hoc solo cardine tota de reconditis qualitatibus difficultas consistit, quippe est, an potentia operatrices debeant collocari in cathegoria substantiæ, vel qualitatis; quia si fuerint collocandæ in substantia, vno & eodem modo depromemus indicationes, si in qualitate alio longe diuerso; quia qualitas indicat cōtrarium, substantia verò cū nihil sit cōtrarium, nihil indicaret, & nihil ei aduersaretur: si lues gallica, quæ est recondita qualitas esset substantialis, vel immediate a substantia dependens, ei non aduersabitur lignum: eadem ratione neque rabiei aquæ potio, nec venenis Theriaca, neque vllum contrarium aliorum prædicamentorum reluctari poterit occultis qualitatibus.

Dux itaque rationes potissimæ colliguntur, quibus ostenditur, qualitates occultas non esse substantias operantes: altera est, quia contrarietas positiua vnius generis non potest aduersari contrarietati alterius: altera, quia substantia ina-

natura est impassibilis, caretq; contrarijs positiuis.

Sed quoniam pro comparanda abditarum qualitarum cognitione non satis est rejicere aliorum opiniones, & probare, quod à substantiâ immediatè non procedant; & quod Galenus, & Aristotel. eas illo modo non admisserint, & demum concludere, quod sint potentiæ de genere qualitaris, nisi vterius animi aciem dirigamus inquirendo videlicet quænam sint harum potentialium occultarum differentiæ genericæ, vnde habeant suum principium, quæ sint differentiæ specificæ, & quod nam sit supremum genus, quod in aliud resolui nequit, ad quod omnes differentiæ abditarum qualitarum apertè referti possint.

Hæc omnia, nisi summa industria declarantur, non video, quomodo infinita effectuum naturalium reconditorum phenomena saluari possint: quomodo præcauere possimus, quin sine hac distincta cognitione, vel sæpius in errores prolabamur: quomodo infinitis non decipiamur à Plinio, Alberto Magno, Dioscoride, & ab alijs, qui ita faciles fuerunt in conferendis virtutibus reconditis tantæ multitudini rerum, quæ sæpè sunt illarum virtutum expertes; vt hinc Galenus loquens de istis, qui tam multa referunt ad qualitates occultas, dicat quod nihil sciâr quinimmo apertè 3. de præf. cap. 5. contra Erasistratum habet, qui nihil docet ad alterum de duobus confugiunt, ad qualitates occultas, vel ad nomina ignota.

Potiora argumenta ab altiori schola desumpta quæ ostendere videntur, quod omnes potentis agendi sint in substantiæ categoria. Cap. III.

Non possumus morborum innouatores, nec qualitates totius substantiæ explodere, nisi altius à primis principijs repetamus illud tam à Theologis, & philisophis peripareticis quæsitum non vno in loco excusum, præcipueque 2. de anima vbi disputant, vtrum animæ potentiæ essentialitèr differant ab animæ substantiâ, quod in idem recitat, an potentiæ idem sint cum fundamento, & numquid in eodem collocentur predicamento.

Cum igitur hæc physica quæstio (vt ostendimus) adeo conferat medicis, vt sine eius decisione scire nō possimus, quænam sint occultæ qualitates, exordiar à priorib. aduersariorum argumentis, quæ latini veteres, & recentiores plurimi sequuntur, quibus nituntur ostendere, animæ potentias non differre ab eius substantiâ, cæterasq; virtutes, seu potentias operatrices immediatè à substantiâ prodire, & in substantiæ genere collocari; quorum philosophorum argumenta non solum supponunt aliquas dari qualitates totius substantiæ, sed omnes potentias operandi esse reconditas & occultas, & ad substantiam pertinere.

Deinde expendam sententiam Dñi Thomæ, quem sequuntur Aegidius, Io. Gandauensis, & alij: Thomas enim fortissimis rationibus probat in prima parte summa quæst. 77. art. primo, & in 1. sent. dist. 3. quæst. 4. art. 2. potentias operatrices non esse substantias, sed essentialitèr differre à substantiâ, & in diuerso esse predicamento, quod idem est, ac si dicerent qualitates, quæ à nobis vocantur reconditæ, non pertinere ad substantiam, sed ad predicamentum qualitatis, quod est illud quod probare intendimus.

Primum igitur argumentum aduersariorum est desumptum ab Arist. 9. metaph. & sic ostendit, potentias esse formas substantiales, & non qualitates accidentales: dicit philosophus, dum actiuam definit potentiam, actiuam potentiam esse principium transmutandi aliud, vt aliud addunt sed forma est principium transmutandi aliud vt aliud, ergo forma est potentia operandi & non qualitas accidentalis; ex quo argumento innouatores morborum facile inferre poterunt, ergo virtus operatrix esse potest ipsamet substantia, vel dari possunt reconditæ, & totius substantiæ qualitates, & harum qualitarum morbi nunquam à Galeno excogitati.

Secundum argumentum est, sicuti passiva potentia est essentia materiæ primæ sic actiua erit essentia formæ, ergo eandem erit essentia potentiæ, & formæ, ergo tota virtus operandi erit in forma, ab ipsa fluet immediatè, & in eodem genere erit; quinimo agendi potentia non poterit essentialitèr à forma differre; nullum igitur

aut dicunt fore inconueniens, si in qualitatibus substantialibus collocetur nomen morborum genus, distinctumque ab illis tribus à Galeno propòsitis, quæ ad qualitatem pertinent.

Tertium argumentum est ad impossibile, taleque est; si anima, vel forma que libet facit operationem per medias potètiâs, & nō immediatè, audias quid sequitur, ergo necesse erit, vt forma agens prius agat in ipsas potètiâs, per alias potètiâs, quia tū dicis, nullas operationes facere, nisi per medias potètiâs, ergo antequā agat in potètiâs, requirit alias potètiâs, & illæ alias, & sic viq̃ ad infinitū.

Quartum argumentum, si potètiâ, vt aiunt aduersarij, per emanationem fluat à fundamēto, vt vmbra à corpore, sequitur, quod in aliquo genere causæ fluant: non formæ, cum forma nō sit vnde motus: non materiæ, cum ipsa sit in potentia, & non in actu, nihil enim fluit ab eo, quod non est actu: non à fine, quia finis est quid posterius, ergo ab efficiente, ergo substantia, vt efficiens aliquid immediatè producere poterit: nō erit igitur illa propòitio vniuersaliter vera, quod substantia nil immediatè, & per se primo operetur; quinimmo inferunt, si semel potest, semper poterit, quia à nullo potest impediri, nullū enim posterius potest esse impedimento suo priori: Substantia ex Aristotele 7. metaph. est prior ratione tempore, & natura accidentibus.

Quintū argumentū desūmitur ab Aristotele 2. de anima tex. 9. quod est tale, si animal esset oculus, potentia visua esset forma eius, ergo potentia est idem, quod anima, ergo potètiâ nō differt a substantia.

Ex his colligimus, non solum esse aliquas qualitates occultas, quæ sint totius substantiæ, & sint in eodem genere cum substantia, & harum qualitarum morbos proprios dari, vt finit. Fernellius, verum etiam nullam esse operandi, vel patiendi facultatem, nullamque potètiâ, vel virtutem, quæ non pendeat immediatè à forma, quæ non sit forma ipsa, & quæ non sit in eodem, non modo genere generalissimo, sed in eadem specie specialissima prorsus eadem natura, forma, essentia, & quidditate.

Hæc sunt potiora argumenta ab alio-

ri schola desumpta, quæ Argenterij, & Fernerij sententiæ fauere possunt, alia tamen plura à Gregorio Atiminenſi, & ab alijs possent deponi, sed quoniam cetera sunt infirmiora, non erit, vt ipsam in medium afferamus.

Argumenta potissima quibus ostendi potest, potètiâs omnes genere differre à substantia. Cap. IV.

ANtequam argumenta in contrarium allata soluantur, potiora, & firmitiora sunt proponenda, quibus probare possumus, omnes potètiâs agēdī differre à substantia, vel ab earū fundamēto natura, essentia, & prædicamento.

Primum argumentū pro nostra opinione desūmitur ab Aristotele ad quem, tamquam ad summum iudicem, omnes, qui de hac re disputant, debent iudicium deferre, estque, quia potètiâ operandi collocantur ab Aristotele in prædicamento qualitatis, quod genus differt natura, & essentia à substantia.

Nec valet, dum obijciunt, Aristotelem loquentem de speciebus qualitatis in 5. Meta. & 7. phylcorum non enumerasse potètiâs, & impotètiâs, ideo magis esse adhibendam fidem ijs, quæ tradantur in physica & Metaphysica, quam logicæ, vbi solum crassa Minerua adolescentes admodum rudes docet: obiectio nulla est, quoniam doceat quis, prout vult ruditer, & crassissimo modo, nunquam debet falsa docere; potest esse diminutus, verum si, dum crassa Minerua loquitur, esset superfluous, & simul falsa doceret, ille non in sapientum, sed in insanorum hominum cathalogo esset collocandus, quia adolescentes ab illo non discerent, sed de discerent, & longè rudiores euaderent.

Amplius respondemus, quod prædicamenta in logica longiori disculsi, & maiori artificio sunt ab Aristotele explicata, quam in metaphysica, ratio optima si benecti potest, quia in metaphysica declarantur solum quædam prædicamentorum nomina, & nil vltius de illis; in prædicamentis vero de speciebus, & proprietatibus prædicamentorum exactius, & plenius agitur.

Secundum argumentum ab Aristotele de-

le desumptum ostendens, quod potentiae differant à substantia; legitur 3. p. 1. tex. 15. vnde colligi potest, potentias non esse substantias, & per consequens non dari has qualitates reconditas inmediate à substantia prodeuntes: nec quartum morborum genus à Fernelio excogitatum.

Verba Aristotelis sunt: posse valere, & posse ægrotare alterum est, namque; egrotare quidem, & valere idem esset: subiectum autem, & id quod valet, atque ægrotat siue humiditas, siue sanguis, vnum & idem est: quoniam autem non est idem, (quemadmodum neque color idem, & visibile) possibilis, quatenus possibile, actus manifestum quod motus est, &c. Ex quibus verbis clarissime patet, potentias differre essentialiter à fundamento, quia posse valere, & posse ægrotare alterum est; homo enim potest valere, & potest egrotare, & hæc potentie cum differant inter se, differunt quoque essentialiter ab homine, nisi quidem differrent, idem esset posse ægrotare, & posse valere.

Satis vulgata est hæc propositio, quæ alicui tertio sunt eadem, inter se sunt eadem: si igitur substantia esset idem quod suæ potentie, ipsæ quoque potentie inter se essent eadem.

Similiter, si animæ facultates essent anima ipsa, potentia visiva esset idem cum motiva, olfactiva, & reliquis omnibus, si quis amitteret vnicam, amitteret animam, & omnes alias, quod est apertissime absurdum; cæcus nec ablatam, nec diminutam audiendi, vel generandi potentiam habet. quinimo sæpè accidit, vt destruat potentia aliqua audiendi, vel videndi nulla facta læsione in ipsa substantia.

Respondent aduersarij huic argumento, potentias istas videri varias atque diuersas, non quod multæ sint potentie essentialiter distinctæ, sed quia eadem substantia varias relationes, & varios respectus habeat.

Quæ responsio à primis logicis initijs adeo deflectit, vt pudeat me eam rejicere, quoniam sciunt rudes adulescentes, de ratione relationum requiri duo correlatiua actu simul esse, & altero destructo cessare relationem; patre enim destructo non dicitur amplius filius: quod cum ita sit, quæ relatio erit inter potetias & sub-

stantiam, si destructa potentia remaneat substantia? an ne destrui potest potentia videndi matente illa substantia?

Nec dicant, illam esse relationem rationis, quia nos videmus has potentias inter se esse adeo distinctas, vt potentia audiendi, vel videndi habeat esse absolutum, distinctum instrumeto, loco, & operatione; & vtramque sine altera consistere posse; quare potentie non in substantia, vel relationis, sed in qualitatibus prædicamento in secunda specie, vt nos docet philosophus, collocabuntur.

Quod probatum est de animæ potentijs, inferri potest de omnibus; quia rationes, quibus probatur, potentias animæ essentialiter differre ab anima, sunt vniuersales, & secundum quod ipsum, quæ non convenient animæ tantum, sed cuiuslibet substantiæ respectu suarum potentiæ, & cuiuslibet qualitatibus reconditis, quæ aliquam operandi potentiam sortiuntur.

Tertium argumentum, quod non dantur qualitates totius substantiæ, & quartum morborum genus in ipsis collocatum est, quia substantiæ, vt substantia ex Arist. nullum est contrarium positium, & viceversa, substantia alijs non aduersatur: quo pacto itaque morbi formæ, vel reconditarum qualitatum collocati in prædicamento substantiæ poterunt per contraria curari, & alterari? si substantiæ nihil sit contrarium? si substantia, vt substantia, nec substantiæ, nec qualitatibus reconditis? quo pacto guaiacum lignum aduersabitur morbo gallico? allium magneticum venenum naturæ humanæ? Theriacia venenis? quo pacto cicuta necabit homines, & nutriet sturnos? doronici occident canes, & hominibus auxiliantur, & sic de alijs si dicant substantias inuicem: sibi aduersarij ferunt Aristotelem dicentem, substantiæ nihil posse aduersari, substantiamque æquæ omnes substantias respicere.

Similiter, dum dicunt venenum vel pestem aduersari non solum substantiæ, verum etiã temperaturæ, multipliciter vacillant, primo quia vnum vni solum est contrarium: secundò contrarium vnius generis nunquam aduersabitur ipsi, quæ sunt ab alio genere: prædicamenta ex Aristotelis sententia cum eorum proprietatibus sunt impermiscibilia: nigrum

opponitur albo, quod est in eodem genere, nunquam tamē magno, vel paruo aduerfabitur, quia genere discrepant.

Quare veneni substantia, pestis substantia, luis gallica substantia neque temperaturæ, neque substantiæ hominis poterunt reluctari: non temperaturæ, quia, quæ sunt in unico prædicamento non reluctantur ijs, quæ sunt in altero, quia sunt impermiscibilia; non substantiæ, quia substantiæ nihil est contrarium: quibus positis sequitur necessarium, quod qualitates occultæ non sint substantiæ.

Postremum argumentū est ad impossibile, sequeretur enim quod vnum ut vnum in duobus aduerteretur, quia lues gallica substantificæ ex illorum opinione reluctatur homini, & guaiaco: venenū homini, & Theriacæ, & sic de alijs, quod est absurdum, quia substantia est simplicissima, & ut substantia, vnicum habet esse.

Quod vero vnum contrarium non habeat plura contraria, ostendit demonstrationes Arist. 1. de cælo propositæ, quæ hoc unico principio suffulcæ probant, cælestia corpora esse quintam essentiam: quare posito, quod substantiæ nihil sit contrarium, quod vnum contrarium vni tantum aduerteretur, quod contrarium vnius prædicamenti non contrarietur contrariis alterius, & quod prædicamenta sint impermiscibilia, sequetur, quod nullo modo dentur hæ qualitates reconditæ, quæ tota substantia reluctantur alijs; neque dentur morbi formæ, qui similiter sua substantia opprimere possint humanum genus; neque demum dentur qualitates occultæ, quæ collocentur in prædicamento substantiæ, & sint substantiæ operantes.

Quod cum ita rationes demonstratiuæ nobis persuadeant, dicimus quod qualitates, quæ in scholis vocantur occultæ, debeant collocari in prædicamento qualitatis sub secunda specie, & per consequens quartum morborum genus, ad quod Fernelius morbos formæ reduxit, esse chimericum, quia omnes læsæ potentiæ ad tria genera commodè referantur, scilicet ad intemperiem, malam compositionem, & solutam unitatem.

Soluntur argumenta in contrarium adducta. Cap. V.

Cognito genere proximo, in quo tamquam in propria sede additæ qualitates collocari debent: Nunc antequam de differentijs earum agamus, prius aduersariorum argumenta conuellete conabimur, quæ ostendere videntur, omnes potentias, & omnes additas virtutes in substantiæ genere esse reponendas.

Erat primum argumentum ex 9. metaphysices desumptum, vbi definit potentiam esse principium transmutandi aliud ut aliud, quod non potest convenire (ut aiunt) nisi formæ & substantiæ.

Respondemus, Aristotelem per potentiam transmutandi ibi intelligere agentem potentem transmutare, in quo non solum est substantia, verum etiam cætera prædicamenta; potentia enim non potest transmutare, nisi sit quantæ habeat relationem, nisi sit annexa substantiæ, nisi sit in loco, nisi agat, & agendo repatiatur, & aliquando id efficiat: nos vero hic consideramus non agentem potentem transmutare, quod est concretum ex omnibus naturis genericis, sed quodnam sit genus proprium, in quo debeant collocari potentia & virtutes operatrices separatæ ab alijs generibus.

Ad secundum argumentum, quod erat sicuti potentia passiva est essentia materiæ, sic actiua erit essentia formæ.

Respondemus argumentum petere in principio; quia videtur supponere potentiam esse materiæ primæ essentiam, quod erat prius probandum; negari optimè potest, quod potentia sit materiæ primæ essentia; quia, si esset essentia, æ materia prædicaretur in primo modo dicendi per se, quod aduersatur logicis præcipuis fundamentis, quia in primo modo actus tantum ponuntur, quod quid est enim actus est, prædicata primi modi 1. post. 1. 9. insunt subiectis *in re tantum*, quare potentia non habebit locum in primo modo, sed in secundo, in quo sunt potentia & aptitudines omnes subiectorum.

Neque iterum obijciant, Aristotelem in libris de anima, vocasse animæ potentiam, quia iterum negamus, potentia esse ani-

ſæ animæ eſſentiam; dum enim Ariſtoteles vocauit animam potentiam, eam cōſiderauit vt principium operationis, cum hac ſcilicet aptitudine ad operandum, quæ potentia, vel aptitudo pertinet ad ſecundum modum dicendi per ſe.

Similiter philoſophus in libris de cœlo ſemel vocauit grauitatem, & leuitatem elementorum foras, quia ibi elementa conſiderauit cum relatione ad motum, ratio ſanè ſpecifica, cur elementa localiter moueantur, eſt grauitas, & leuitas: conſiderando igitur elementa vt apta moueri, grauitas, & leuitas erunt elementorum formæ, quæ prædicantur in ſecundo modo dicendi per ſe: conſiderando animam cum relatione ad operationes dicitur potentia.

His cōmuni rationibus dicimus, potentiam reſpectu materiæ eſſe in ſecundo modo, & non in primo, & potentiam paſſiuam non eſſe eſſentiam materiæ, nec actiuam formæ, ſed proprietates ſecundi modi dicendi per ſe.

Ad tertium argumentum dicimus, quod non nobis, ſed Dino Thomæ aduerſatur, qui dicebat, potentias eſſe cauſas medias, quod negari poteſt, quoniā potentie naturales ſunt ſubiecti aptitudines, à quib. immediatè ſunt operationes; aptitudines enim licet inhæreant ſubſtantijs, attamen de ſubſtantijs non prædicantur, niſi in ſecundo modo, vt diximus; & per conſequens neque ſunt ſubſtantiæ, neque immediatè prodeunt à ſubſtantijs; quoniam omnia, quæ immediatione cauſæ prodeunt à ſubſtantijs, prædicantur de ſubſtantijs in primo modo, & ſunt in categoria ſubſtantiæ, vt animal rationale prædicatur de homine, & rationale eſt actus, & non aptitudo: riſibile mediatè, quia inter hominem & riſibile mediat rationale; hinc eſt, quod aptitudines, & potentie ſunt in accidentium: actus verò in ſubſtantiæ prædicamento.

Amplius infra cum Ariſtotele probabimus, potentias, vel aptitudines immediatè pendere non à ſubſtantijs, ſed à quarta, & tertia ſpecie qualitatis, ſcilicet à figura, à paſſione, & paſſibili qualitate.

Ratio eſt, quia poſſe agere requirit talem figuram, talem ſitum, & talem numerum, quæ conditiones non pertinent

ad ſubſtantiā; niſi enim in horologio eſſet talis orbiculorum vel rotarum ſitus numerus, & figura, quamuis ſubſtantiæ eſſet aurea, niſi ad vſum magis, quam alia ſubſtantiā conferret: ſimiliter ſi ſaltatoris pedes luxentur, muteturque ſitus, & figura, vel temperatura partium, quamuis ſubſtantiæ nil deſiceret, haereretque animam ad ſaltandam natam, ſaltare non poſſet.

Ecece igitur, quod aptitudines non pendunt à ſubſtantijs, ſed à numero, ſitu, figura; & ab alijs accidentibus ſubiecti.

Quibus poſitis, patet argumentū, dum dicunt ſubſtantiā agere prius in potentia, eſſe nullius roboris, quia poſſe agere non à ſubſtantijs venit, ſed à ſimilarium, & diſſimilarium proportionem & harmonia, quæ immediatè conſiſtit in tertia, & quarta ſpecie qualitatis, iu temperatura ſcilicet, & figura partium, omnia. n. attributa, quæ immediatè immediatione cauſæ continentur ab aliquo, ſunt in eodem genere cum illo, à quo ſunt, ſicut riſibilitas eſt in eodem genere cum aptitudine ad riſendum, potentie in eodem genere cum figura, & paſſibilibus qualitatibus: Hinc logici optimè dicunt ſecunda ſpeciem qualitatis aliquādo fieri à tertia, & aliquādo à quarta qualitatis ſpecie; patet igitur potentias immediatè conſiſtū in partium harmonia, & nequaquam in ſubſtantijs.

Quoad quartum argumentum reſpondemus, potentias non pendere immediatè à forma, vel à ſubſtantijs, neque vt ab efficiente per tranſmutationem, neque ab efficiente per emanationem: nō vt ab efficiente per tranſmutationem, quia quæ pendunt ab hoc efficiente, pendunt cum conatu, & reſiſtentia; proprietates trahendi ferrum pōet à magnete ſine conatu, & reſiſtentia; neque potentie operandi pendunt à forma, & ſubſtantijs, vt ab efficiente per emanationem, vt Iacobus Zabarella deſendit, quia ſaltem eſſet verum, quod ſemper eadem manente ſubſtantijs, eadem quoque eſſet potentia, quod reſiſtatur experientie.

Poſſem hic plura exempla afferre, quæ oſtenderent potentias non inſequi ſubſtantiā, vel emanare, per ſe à ſubſtantijs, ſed à proportionem & harmonia partium,

scilicet ab earum figura, situ, & meatibus: sed aliquot hic proponantur pro veritatis declaratione: inferius plura afferemus.

Primum, quis diceret crystallos, vel adamantis perspicuum insequi eorum substantiam? quis non videt adamantem, vel crystallum in pollinem redactum amplius non splendescere, eadem profus manente substantia? quis non videt fractum crystallum in pollinemque redactum non esse perspicuum ob figuram, situm minimiarum partium mutatum.

Secundum, cantores canendi potentiam non à substantia, sed ab optima constitutione pectoris, scutiformis, & tracheæ tam colligunt, signum, quod res ita sit, est, quia tollitur canendi potentia, si larynx obstruatur à dilabente catarrho, eadem semper manente substantia.

Similiter perfectè sanus dicitur ille, qui habet bonam constitutionem partium tam similium, quam dissimilium, quæ constitutio pertinet ad tertiam, & quartam speciem qualitatis; itidem dicimus de morbois hominibus; habent enim hanc impotentiam; quia vel carent proportionem, & harmonia qualitatum; vel situs, numerus, meatus, & figuræ partium malè constitutæ sunt; patet ergo, potentias non pendere immediatè à substantia, neque ut ab efficiente per transmutationem, neque ut ab efficiente per emanationem.

Ad ultimum argumentum, si animal esset oculus, potentia visiva esset forma eius.

Respondemus, quod Aristoteles considerat animam, ut est principium operationum corporis animati; hinc definit animam, quod sit principium, quo vivimus, sentimus, intelligimus, & movemur, quare sicuti alia est natura hominis, ut homo est, alia ut pater, ut quantus, sic alia est natura animæ consideratæ in se, & sine relatione ad operationes, & alia cum relatione ad operationes, quarum illa est principium.

Eundem quoque stylum servat philosophus in libris de celo, ubi dicit, gravitatē & levitatem esse formas elementorum, & 2. de par. animal. c. 1. dū dicit, gravitatem & levitatem esse formas elementorum, & ratio est, quia in libris de celo consideravit elementa, ut sunt principia recti motus, secundum quam considerationē gra-

uitas, & levitas dici possunt formæ elementorum: in 2. vero de par. animal. consideravit elementa, ut substantiæ, ideo vocavit gravitates, & levitates, qualitates, & non substantias, vel formas.

Ob eandem rationem ab Alexandro Aphro. & ab Aristotele caliditas, frigiditas, siccitas, & humiditas vocantur aliquando formæ elementorum, quando scilicet considerantur elementa, ut principia generationis; generatio enim ab ijs qualitatibus habet ortum: quando vero elementa non cum relatione ad generationem, sed absolute considerantur, ut in metaphysica, tunc quatuor citatæ qualitates dicuntur ab Aristotele, accidentalis locus Arist. est 3. lib. Meta. tex. 17. ubi dicit, caliditates frigiditates, humiditates, & siccitates non substantias elementorum esse, sed qualitates: sic nos non recedentes à vestigijs philosophi dicimus, si oculus esset animal totum, potentia visiva esset anima, expendendo scilicet animam, non absolute, sed prout est principium videndi: quænam vero sit natura animæ absolute considerata, omnino latet; quia remota consideratione animæ cū relatione ad operationes, & quantum est principium operationum, est omnino occulta nobis & incognoscibilis.

Galeni auctoritatibus, rationibus, & experimentis ostenditur, qualitates occultas non à substantia, sed à multis manifestis prodire. Cap. VI.

Plurimi sunt, qui putant, Galenum arbitrari, qualitates, quas appellant occultas & reconditas, immediatè pendere à substantia, esseque in eodem prædicamento cum substantia, quoniam non vno in loco vident à Gal. distingui qualitates occultas, & totius substantiæ à qualitatibus manifestis: quorum hominum opinio in Galeno nullo modo defendi potest; auctoritates, & rationes, quæ nos movent feriatim sunt proponendæ.

Prima hæc est, qualitates, quæ habent contrarium, non sunt substantiæ, atque qualitates, quæ vocantur reconditæ à Galeno habent contrarium, ergo qualitates reconditæ non erunt substantiæ; maior est Aristotelis dicentis, substantiæ non con-

uenire contrarium: minor vero, quod qualitates reconditæ habeant contrariū. Galeni auctoritate, & deinde experimētis comprobabitur; sententia est Galeni 12. methodi, & alibi, quod quædam contraria sunt substantijs totis, quædam ipsis qualitatibus: Ecce igitur, quod reconditis qualitatibus conuenit contrarium; quare nisi dicamus, Galenum vsque adeo fuisse rudem, vt tunc oblitū fuerit, an substantiæ conueniat contrarietas, non poterimus vilo modo ipsum defendere.

Secunda Galeni auctoritas est lib. de constar. med. cap. 8. & 4. de simpl. med. c. 35. vbi dicit, fieri has qualitates reconditas siue occultas ex infinitis alterationibus elementorum: addamus nos, sed sic est, quod omnia quæ sunt ex alteratione elementorum non sunt substantiæ, sed temperamenta, & qualitates, ergo occulte qualitates erunt illæ, quæ ex misturis innumerabilium qualitatum fiunt.

Tertia est 2. de loc. affectis cap. 8. vbi declarat, vnde fiat proprietas ineffabilis, quæ est qualitas occulta, dicit, quod ab infinitis alterationibus facta est. Hinc habet hæc verba: vbi verò multæ qualitates circa vnā essentiam apparent, ibi & proprietatem fieri contingit: dicit quod in gustu præcipue obseruari possit, cum amaritudinem, dulcorem, austeritatem, & acrimoniam in vna essentia apparere contigerit: proprietas, quæ angusta ex ijs oritur, si vnico nomine ipsam explicare tenaueris, ineffabilis est: de hac 1. ad Glauconem, & 3. methodi cap. 7. loquens Galenus dixit, quod si ad unguem has occultas qualitates cognosceret se parem Esculapio crederet.

Quarta, dicit quod ex hac occulta qualitate indicationes non colligantur, quia cum fiat ab innumerabilibus alterationibus, non est cognoscibilis, docet tamen nos inuenire per experientiam remedia contraria, quibus depellere possimus qualitates, quæ vocantur totius substantiæ: quinimmo à Gal. factum est caput de medicamentis pro experientiam inuenientis pro debellandis, quæ occultæ, & tota substantia agunt; proinde cum ex Galeno pateat qualitates reconditas habere contrarium, illico patebit, omnes has qualitates occultas esse in prædicamento

qualitatis, neque dari fictitium illud morborum formæ genus.

Quinta est 3. de temp. cap. 4. vbi declarat quid intelligat per vniuersam substantiam, h. scilicet verbis, sanè naturam, cum dico vniuersam substantiam, & temperiem quæ ex primis elementis constituitur, significo, calido, frigido, humido, & sicco: ecce ergo, quod per vniuersam substantiam intelligit temperaturam, sed non (vt quidam credunt) genericam, sed specificam, & post multas alterationes redditam incognoscibilem, & (vt dicit ille) ineffabilem.

Hinc theiaca habet illam qualitatem aduersus venena acquisitam ob misturā, & varietatem qualitatum omnium simplicium, quæ ingrediuntur antidotum secundum aliquam determinatam dosim.

Obseruatur quoque in plerisque alijs rebus, quod ex alteratione, & mistura multarum qualitatum oritur aliqua noua, quæ occulta dicitur.

Tinctores & pictores ex colorum mixtura nouos faciunt: Figuli, dum componunt viridem colorem similes smaragdo, si ad unguem non seruant hanc proportionem, nunquam smaragdi colorem possunt imitari, sumant plumbi libras quinquaginta, terræ, quæ specula conficiantur, libras sexdecim cum dimidia, & æris libras duas cum vncia; ex hac compositione in hac dosi, & proportionem ad unguem obseruata oritur viridis ille color.

Noui Figulum scientem simplicia pro huius coloris compositione, sed non dosim, qui, licet milles ea permiscuerit, nunquam tamen potuit imitari, & diuinare ex qua proportionem exurgeret ille color, nisi postquam fuit ab illo dosim edoctus.

Similiter de magnete, & de alijs occultis cum Galeno dicendum, quod ex centum alijs qualitatibus alteratis determinatus gradus fiat incognoscibilis, qui dicitur qualitas recondita: hæc igitur sunt qualitates occultæ, quæ ex aliorum multorum alteratione fiunt: Qui verò a liter sentiunt, certent cum Galeni locis superius citatis: Nos interim sustinebimus, qualitates reconditas esse accidentia pertinentia ad prædicamentum qualitatis, easque tolli posse contrarijs.

Quæ sint reconditarum qualitarum differentie, & à quo subiecto communissimum prodeant. Cap. VII.

Acturus in hoc capite de genericis, & specificis reconditarum qualitarum differentiis, ad quas commodè, & rationabiliter omnes qualitates occultæ, tãquam ad propriam sedem reuocari possunt, præstat iterum altioribus initijs confirmare, quod qualitates occultæ nullo modo sint in cathedra substantiæ, ut Fernellius, & ceteri morborum innouatores credidere: hæc erat prima ratio contra Fernellium: substantiæ nil aduersatur, sed sic est, quod quælibet occulta qualitas habet contrarium, ergo non est substantia.

Secunda ratio, quæ subiecti potest hæc est: quod definitur per subiecta propria, non potest esse substantia, at qualitates occultæ non possunt definiti nisi per subiecta propria, quia sunt potentiæ, & aptitudines subiectorum, ergo qualitates occultæ non sunt substantiæ: minor patet, quia omnes potentiæ sunt in secundo modo dicendi per se, dicimus enim risibilem a tem esse potentiam, seu aptitudinem hominis ad ridendum, & potentiam trahendi ferrum esse magnetis aptitudinem, duosque modos dicendi per se esse omnino distinctos, separatos, & impermiscibiles, in primoque collocari formas & quidditates, quæ sunt actus, quæque sunt in eodem genere cum subiecto: in secundo aptitudines, & omnes potentias operatrices manifestas, vel occultas, sicuti igitur primus modus non est secundus, sed distinguitur ab illo genere, & natura, sic aptitudines seu potentiæ operatrices non erunt formæ, vel substantiæ, sed natura, & genere à substantia distabunt.

Per dicta principia Aristoteles potuit nos eleuare ad hanc cognitionem, quod qualitates occultæ sint accidentiæ, & non substantiæ, sintque potentiæ de prædicamento qualitatis, habeant contrarium, suscipiant magis & minus, & similes, vel dissimiles dicantur; Supponatur ergo, potentias omnes occultas, siue manifestas esse in cathedra qualitatis: & de potentiæ genere non amplius loquatur.

Posito, quod potentiæ sint aptitudines subiectorum; potentiæ cognitio aliunde hauriri non poterit, quàm à conditionibus propriorum subiectorum: auctor doctrinæ huius est Aristoteles, fundamentumque huiusmodi est adeo certum, ut si quis in ipso vacillaret, à peripatetica doctrina, & ab omni philosophia discederet, & ego cum illo medius fidius non disputarem.

Propria subiecta potentiæ adinueniri non possunt, nisi prius diuidamus communissimum subiectum, cui omnia accidentia inhererent, in suas differentias donec radicem omnium passionum, & potentiæ inueniamus.

Subiectum communissimum est substantia ut corporea, quæ sola subsistit alijs est tamquam basis omnium accidentium & ab eius differentiis omnia subiecta passionum oriuntur: à substantia igitur ut corporea erunt colligenda subiecta propria, quæ poterunt definire qualitates, si voluerimus ex primis fontibus cognitionem haurire.

Nec obijciat aliquis, quod incidam in sententiam Scoti dicentis, potentias definiti per substantias, quia quod dicitur de potentijs, intelligitur quoque de omnibus accidentibus, quod scilicet per subiecta declaratur & non alio modo; iam ostendimus superius, quod passiones declarate vel definite per propria subiecta distent genere a subiectis.

Quo pacto vero substantia corporea diuidatur in differentias, quarum ratione nos scire possimus, quomodo passiones omnes à substantia corporea pendeant, adire debemus Aristotelem, qui & phys. tex. 35. nos docet, densitatem, & raritatem corporeæ substantiæ esse omnium passionum principia: hæc est verborum series, amplius omnium passionum principium est densitas & raritas etenim graue, leue, durum, calidum, & frigidum densitates videntur esse, & raritates quadam recce, quod qualitates omnes tam primæ, quam secundæ, scilicet calidum frigidum, humidum, & siccum, durum, molle, lentum, friabile, asperum, leue, crassum, reue, & alie innumerabiles eiusdem ordinis a substantia corporea pendent, eaque quatenus est magis, vel

minus rara, vel densa est subiectum, & principium materiale omnium passionum.

Quod Aristoteles 8. physicorum citato loquatur ex propria, & non antiquorum sententia, ut plurimi putant, pace ex præcedentibus, & subsequentibus verbis.

In quibus probat ratione efficacissima rarum & densum esse passionum principia. Præterea 8. phys. 77. dici densari & rarefieri esse motum secundum locum, & 7. phys. tex. 10. dicere videtur, omnem motum secundum locum esse congregationem & disgregationem; quare cum motus localis sit origo passionum, rarum quoque & densum erit passionum origo. Plato quoque 10. de legibus vult præter magnum & paruum: rarum & densum esse ante calidum, frigidum & alias qualitates.

Quo pacto vero apparens contradictio in Aristotele saluari possit, quod scilicet rarum, & densum sint principia calidi, & frigidi, & possint quoque esse secundæ qualitates, in sequenti capite erit sermo.

Interim accipiatur ab Aristotele hoc fundamentum, quod rarum & densum sint principia omnium passionum, quod alijs quoque philosophiæ principijs consentire videtur.

Alio modo ex Aristotele motus diurnus sub orbe Lunæ non generat ignem, nisi prius rarefaciendam materiam.

Ecce, quod rarum calido prius est, quinimmo Scaliger, Zabarella, & plurimi peripatetici tenent sub polis igneam spheram non dari, quia ob motus tarditatem aer non potest rarefieri, & inde ignem gigni, tenentque propterea elementum ignis non sphericam, sed ovatam figuram habere.

Amplius ex positione Aristotelis superius allata, quod à corpore substantiæ raritate, & densitate fiat calidum, & frigidum, durum, & molle, ulterius subiectum communissimum omnium passionum diuidemus, quod scilicet alia sit substantia corporea similis, alia vero dissimilis.

Hinc philosophus semper sibi consentiens in prædicamentis dixit, proprium omnium qualitarum esse, quod subiecta earum dicantur similia, vel dissimilia;

voluit philosophus subiectum potentiarum naturalium non solum esse simile verum etiam dissimile, quod quoque alijs altioribus Aristotelis, & Galeni inijs comprobatur.

Aristotelis, quia est famosa peripateticorum sententia, quod aliquæ potentia oriuntur à tertia specie qualitatis, scilicet à passione, & passibili qualitate, aliquæ vero à quarta, scilicet à figura: à tertia, quia omnes potentia similia, corporum pendere videntur à vario conceptu, & symetria calidi, frigidi, humidi, & siccis, & à ceteris consequentibus passionibus, quæ in tertia specie qualitatis collocantur; licet ijs omnibus antecellant raritates, & densitates, quæ si Aristoteli credendum sit, sunt principia omnium passionum; nam pro ut similes partes vario modo figurantur ob mutationem situs, & meatus partium, variæ conuergunt potentia refrigerandi, vel calefaciendi.

A quarta specie qualitatis: quia omnes potentia, vel impotentia dissimilium à figura vario modo disposita pendet: partium situs, meatus, numerus, & magnitudo ad figuram pertinent, & sub figura continentur omnes: Ex Gale. quia sicut pars similis ob temperaturam qualitatum primarum conseruat potentias, & ob intemperaturam eam amittit, sic pars dissimilis conseruat potentias ob rectam compositionem, quæ compositio dicitur de situ, numero, magnitudine, & meatu. Temperatura ergo, & figura erunt proximæ origines passionum, & potentiarum omnium: magis remotæ causæ erunt raritates, & densitates.

Verum, quia temperatura, figura, raritates, & densitates sunt accidentia, & accedens ex Arist. 4. metaph. tex. 14. non est accidens accidens, sed eius cui primo inheret, neque ex Arist. 8. metaph. tex. 13. accidentia habent materiam ex qua, sed solum in qua, quæ est subiectum cui inheret. Idcirco ulterius est dirigenda animi acies, ut perquiramus communissimum subiectum, cui raritates, & densitates conueniant; ab accidente enim ad accidens, uel ab effectu ad effectum nullus datur progressus scientificus, & demonstratiuus.

Quinimmo alia de causa ab Alexan. Aphro-

Aphro. mathematica non vocatur philosophia, nisi quia demonstrat prædicta accidentalibus de subiectis accidentalibus.

Neque alia de causa in scholis reprehenditur. Temistius, dum proposuit dari quandam demonstrationis speciem ab effectu ad effectum, nisi quia ab accidente ad accidens nullus vnquam datur processus demonstratiuus, ex primis enim subiectis omnis cognitio exacta debet procedere, & non ex mediatis, & accidentalibus passionibus: Itaque quamuis dicat Aristoteles, rarum & densum esse principia omnium passionum, attamen cum raritas, & densitas inexistant alijs; earum primum subiectum, quod in aliud resolui nequit, perquiri potest.

Aristoteles in proprijs locis scilicet in categoria qualitatibus omnia profundius considerans dicit rarum, & densum pertinere ad situm, definit enim rarum, & densum per ea quæ prædicamento situs continentur: hoc modo: rarum est cuius partes ab inuicem distant: densum, cuius partes sunt propinquæ: ecce igitur, quod situs partium faciet raritatem, & densitatem, passiones, & omnes potentias, quæ sequuntur: situique erit genus generalissimum, quod in aliud resolui nequit.

Verum, quia situs est quid ab alio dependens, & accidentale, vnde prodeat est videndum: Aristoteles 8. phy. considerat vniformitatem, & diffinitatem rerum referre videtur primò vniformitatem, & conuenientiam omnium rerum naturæ, constantiam in causam vniformem idest in vnum & simplicissimum motorem, qui est actus purissimum, deinde diffinitatem, & varietatem eorum, quæ sub cælo, & in cælo continentur refert non ad motorem: sed ad primum corpus, quod octo differentijs positionis scilicet intus, forinsecus, ante, retro, dextrorsum, & sinistrorsum, seorsum, & deorsum tot ac tanta reñi discrimina facit: substantia igitur quatenus corporea, octo ijs differentijs positionis faciet tam varium situm: à situ oriuntur raritas, & densitas; à raritate, & densitate calidum, & frigidum, durum molle: ab ijs tertia species qualitatis quæ est passio, & passibilis qualitas, & quarta, quæ est figura: à tertia & quarta

specie oriuntur potentia, vt à primo ad postremum corpus, vel trina dimensio, quæ est ipsamet materia, quæque efficere potest omnes differentias positionis est prima omnium accidentium radix.

Neque obijciat, trinam dimensionem esse accidens, quia cum Philopono sustinebimus corpus, vel trinam dimensionem esse ipsamet materiam primam, quæ statim dum terminatur à forma differentias positionis efficit, vnde situs, vnde raritates, & densitates sunt, vnde calidum, frigidum, humidum, & siccum, vnde durum, & molle, passiones, passibiles, qualitates, figura, & demum potentia, quæ ab accidentium serie, per inde ac ab vna cathena omnes tam manifestæ, quam occultæ oriuntur: manifestæ sunt ex paucis alterationibus præcedentibus: occultæ ab innumerabilibus prægressis, quas solus Esculapius posset explicare.

Alij inueniant in negotio hoc difficili principia faciliora; sed, quæ animum component, quia non solum opinionem mutabimus, verum etiam eos laudibus ad sidera extollemus.

Responsio ad duas difficultates, quæ ex dictis exurgunt. Cap. VIII.

EX ijs, quæ dicta sunt in præcedenti capite, duæ exurgunt dubitationes, quæ videntur Aristoteli, & probis auctoribus cum primis reluctari: quatum prima est quia ex Aristotele diximus à raritate, & densitate passiones, vt calidum, & frigidum, humidum, & siccum; & cæteras, quæ sequuntur, prodire, & nihilominus in libris de generatione ab Aristotele statutum est primas qualitates esse calidum, frigidum, humidum, & siccum, & ab ijs rarum, & densum, & cæteras suum trahere exordium, quæ videtur contradictio manifestissima.

Secunda dubitatio est, quia dum diximus, situs varius, variasque partium positiones, & inde raritatem, & densitatem esse originem passionum, & potentiarum, cogimur Aristoteli, & Galeno aduersari, & incidere in sententiam Democriti, vel Thesali, qui ad laxum, & densum, tamquam ad affectum principia confugebant; quam sententiam Gale-

nos, & Aristoteles totis viribus conati sunt enectere.

Quo ad primam difficultatem attinet, respondemus nullum esse inconueniens, secundum varium considerandi modum rarum, & densum esse principia calidi, & frigidi, & calidum, & frigidum versa vice efficere raritatem, & densitatem: hanc loquendi varietatem in Aristotele de elementis loquente non vno loco obseruare possumus; etenim in libris de cælo videtur vocare grauitatem, & leuitatem formas elementorum; secundo verò de par. animal. c. 1. vocat grauitatem, & leuitatem elementorum qualitates: hæc omnia secundum varium intelligendi modum vera esse possunt: in libris de cælo, ubi considerat elementa, quatenus sunt principia recti motus, grauitatem, & leuitatem vocat elementorum formas, quia non alia ratione elementa localiter mouentur, nisi vt grauia, & leuia, & fortasse minus erraret, qui diceret grauitatem, & leuitatem esse formas elementorum: quia motus indicat formam, & forma est ipsa natura: quare, si moueri ad medium indicat grauitatē, potius grauitas erit forma terræ quam frigiditas. Hæc doctrina consentire videtur doctrinæ Arist. 1. de cælo: qui ex motu vult formas simplicium corporum inuenire: motus enim ad medium indicat grauitatem, quia talis est per grauitatem, à medio indicat leuitatem, quia ratio formalis ipsius motus est ipsa leuitas: nihilominus in lib. de par. animal. considerat grauitatem, & leuitatem, vt insequuntur elementorum formas, & vt sunt accidentia, & qualitates.

Simili modo ab Alex. Aphro. caliditates, frigiditates, siccitates, & humiditates vocantur elementorum formas, quia elementa ibi considerat, quatenus transmutantur inuicem, agunt, & patiuntur, & sunt principia generationis, & corruptionis, elementa enim solum ob quatuor qualitates miscentur, & sunt principia generationis, vt secundum hanc rationem, vel considerandi modum quatuor qualitates sint formæ elementorum: alia debet esse forma ignis, vt est entis gradus, alia, vt elementum est, alia, vt recto motu mouetur: Similiter alia est forma hominis, vt homo est, alia, vt pater, vt

quantus, vt philosophus, vel medicus, & sic de alijs.

Aristot. 3. metaph. tex. 17. vbi de qualibet re loquitur absolutè, & sine relatione; dum de quatuor qualitatibus verba facit, dicit, caliditatem, frigiditatem, siccitatem, & humiditatem non esse elementorum substantias, sed accidentia: Ad eundem modum nos dicimus, rarum, & densum efficere passiones omnes, calidum scilicet frigidum, & cæteras: & vice versa, quod rarum fiat à caliditate, & densum à frigiditate.

Quod rarum possit esse causa caloris hac experientia cognoscitur; destruat rarum & calidum, supponaturque; deinde fieri motum aliquem velocissimum, tunc à quo ex Aristotelis sententia pendet calor & raritas? cui dubium, quod materia ob motum prius fiet rara quam calida? prius enim rarefit materia, & deinde exurgit caliditas; accidit quoque, vt à genita caliditate rarefiat materia, & à frigiditate condensetur, & sic à calido rarum quoque fiat.

Varia igitur consideratione modo raritas, modo caliditas erit prior; quod caliditas sit quoque prior, exemplum est lotium turbidum, quod ab igne rarefaciente crassas partes, & mutante particularum minuarunt situm reddi potest splendidum, & perspicuum: sed reuera, si considerauimus prima initia caliditatis, semper raritas prius enasci videbitur, quam caliditas: quia prius à motu rarefit materia, deinde incallescit.

Inter cætera exēpla, quæ possent proponi, vnicum debet afferri ab Aristotele desumptum, quod est de motu diurno rapidissimo, qui alio modo non generat, & conseruat elementum ignis, nisi prius rarefaciendo materiam contentam sub orbe Lunæ, quæ rarefacta, deinde ignescit: ubi uerò motus diurnus est tardus, sicuti est sub polis, non rarefit materia, & per consequens non incallescit: unde plurimi celeberrimi peripatetici inter quos est Iacobus Zabarella, & Scaliger de elemento ignis loquentes dixerunt, sub polis elementum ignis non dari: quia ibi motus diurnus est adeo tardus, vt non possit rarefacere, & efficere igneam naturam: colligere ergo possumus, rarum, & den-

& densum efficere omnes passiones, & quales, quæ uocantur primæ, & à primis quoque rarum, & densum oriri posse.

Quo ad secundam dubitationem, negamus, sententiam propositam fauere Democrito, quia nos cum Arist. admittimus, sub quantitate rara, & densa, & sub alijs sitis differentijs formas delitescere, quæ sunt substantiæ, quæque à materia emergunt dispositionum officio; dicimusque disponi materiam ab octo differentijs positionis, unde raritates, & densitates uariæ, unde caliditates, & frigiditates, asperitates, & lenitates innumerabiles fiunt, unde mearus uarij, & pro infinita horum omnium uarietate uariæ, & infinitæ formæ enascuntur, quas Democritus non admittebat.

Similiter de Thesalo dicimus, quia ille solum ad duo communia, ad rarum scilicet & densum confugiebat, non admittens ab ijs specificas & particulares temperaturas, uel intemperaturas dari, quæ sint in facto esse, & quæ diuersimodè indicent.

Nos uerò cum Arist. ad passiones, & ad figuram: cum Gale. ad intemperiem, malam compositionem, & solum unitatem morbos omnes referimus.

Thesalus à Gale. in certamine uictus atque explosus fuit, ut doctrinæ inutilis inuictor: quodiam in uniuersalibus solum uersabatur, à quibus neque res pendunt, neque remedia quisque haurire pro mala debellanda ualetudine potest.

Quomodo Galeni fundamenta faueant sententia nostra. Cap. IX.

QUOD operatrices potetie tã occultæ, quã manifestæ oriãtur à uaria corporeæ substantiæ figura, & à sitis differentijs ex Gal. sine controuersia colligitur, qui omnes potetias, & impotencias tamquam ad primas causas reduxit ad figuram, situm, numerum, magnitudinē, & temperaturas: hominem rectè sanum uocat, dum in ijs optimè constitutus est: illum uocabit cursorem optimum, qui probè se habebit in partium corporis figura, numero, situ, & magnitudine: qui

pedem alteto longiorem sortitur, quam uis in ceteris conditionibus unicè se gerat, cum non uocabit cursorem, neque dicet, illum habere ecurrenti potetiam.

Ratio est, quia ex Gal. potetia dissimilariū consistunt in bona, & proportionata figura, magnitudine, numero, & positione: impotentia in mala, & improporcionata: uocantur ab illo qualitates, uel potetia manifestæ, quando aliquæ, & pauca, eeq; cognoscibiles in earū productionem cōspirant: occultæ, dū innumerabiles: si alicuius pes intorqueatur, & uacillet, oritur impotentia, quæ dicitur manifestæ; etenim situs omnis, conspicuus uiciatur; Si uerò figuræ internæ, numeri, & positiones multarum particularum ita uariantur ut causæ ignoretur, dicitur tunc occulta, quæ tamen ex Galeni sententia non prodit à substantia, sed à qualitatibus totius substantiæ.

Ad eundem modum potetia dissimilariū corporum possunt fieri occultæ, tū quia ab harmonia quatuor qualitatum possunt nasci gradus adeo particulares, ut nobis sint incognoscibiles; tum quia dissimilariū potentia ex infinitis alterationibus elementorum, & non ex paucis fit.

Tota hæc doctrina est Galeni libr. de const. ar. med. cap. 8. & 4. simp. c. 15. dum dicit, oculus fieri ex infinitis alterationibus; magis enim & minus rarum, uel densum, magis & minus calidū, uel humidum, graue, aut leue innumerabiles, & incognoscibiles uirtutes efficere possunt; omnes tamen quotquot sunt potetia reducuntur à Gal. ad hæc capita, ad temperaturas dissimilariū, ad magnitudinem, numerum, situm, & figurā dissimilariū.

Logici uero, qui res abinndas à determinatis subiectis considerant, alio modo diuidunt, dicunt enim potencias alias pēdere à tertia specie qualitatis, à passionib. nimirum, & alias à quarta, scilicet à figura: nequid exuat, alias qualitates à figura sitū, numero, & magnitudine, sed à figura tantum; quoniam omnia quatuor genera potentiarum dissimilariū ad unicam figurā à logicis reduci possunt: magnitudo namq; est figura, numerus partium est figura, situs, ut est luxatio, & aliud id genus ad figuram uiciatam, tamquam ad commune genus subalterrū reducū-

tur, dicimus iubalturnum, quia figura, & passiones omnes sicuti caliditas, & frigiditas, granitas, & lenitas, & quæ sequuntur (si altioribus principijs, & Aristoteli 8. phy. tex. 55. est credendum) pendunt à raritate, & densitate; raritas, & densitas à situ, situs denique, tamquam à subiecto omnium communissimo, à tripla dimensione, quæ est figurarum omnium origo; unde omnes occultæ, & manifestæ qualitates dependent.

Occultæ qualitates à Galeno vocantur totius substantiæ, quia ille gradus ultimus non pendet ab vnica qualitate illius, sed ab omnibus, videlicet à tali situ, raritate, densitate partium, à tali numero, figura, & magnitudine, vel à tali calore, frigiditate, siccitate, & humiditate, ut nulla determinata qualitas illius substantiæ sit, quæ non conspiret in huius occultæ potentie productionem.

Redditur quoque qualitas occulta, & abdita, quia quolibet qualitas, sit caliditas frigiditas, raritas, & densitas potest esse actionis causa sexcentis modis, scilicet calida, vel rara, ut quatuor, ut octo, ut centum, & ut mille, quilibet. n. gradus harum qualitatum potest nouam potentiam incognoscibilem, si alijs totius illius substantiæ qualitatibus misceatur, efficere.

Hinc merito à Medicis est decusum, quod si à Theriaca opij, vel trociscorum uiperinorum, vel aliorum componentium minima portio dematur, eius potentia eadem seruari non possit, & quæ dicitur de antidoto, de omnibus mistis ratio ualebit.

Experimentis confirmatur, quod dari possint potentia, seu virtutes operatrices, quæ non oriuntur à quatuor illis vocatis primis qualitatibus. Cap. X.

Hactenus uidetur esse probatum ratione, auctoritate, & experimentis quod qualitates occultæ non sint substantiæ operantes, sed accidentia pertinentia ad categoriam qualitatis: Nunc sequitur, ut pluribus experimentis ostendamus, quod non omnes qualitates reconditæ habeant originem à calido, frigido, humido, & secco, sed ab alijs innumera-

bilibus: quas omnes tamen ad differentiâs superius relatas reducere possumus.

Primum experimentum, quod est omnibus notissimum, est de magnete, etenim si magnes attraheret ferrum virtute illarum quatuor qualitatum, id potius fieret ratione caloris, quam aliarum, quare sequeretur, quod aromata, & alia calidiora citius ferrum attraherent, quod relictatur experientia. Præterea afferantur experimenta, ex quibus cognoscemus statim fieri nouas qualitates ex sola iuxtapositione sine interuentu quatuor qualitatum.

Primum experimentum: accipias vitrum nigrum, illudque iuxta ponas cæruleo vitro, protinus videbis ex utrisque vnitis nasci colorem violaceum.

Secundum experimentum: vnias vitrum cæruleum luteo, statim consurget viridis color: quis esset adeo stupidus, ut crederet has qualitates de repente factas fieri opificio calidi, frigidi, humiditatis, & sicci? patet ergo fieri posse plures nouas qualitates sine alteratione illarum quatuor, quoniam primæ non possunt facere sequentes, nisi alterando, & alteratio non fit in oculis, sed aliquo temporis cursu.

Tertium afferatur, si doronici virtute caloris, vel frigoris canes è vinis eximerent, hominibus non afferrent suppetias.

Quartum: Si salina suo calores scorpiones occident, ocyus meracum, quod calidius est, illos opprimeret: ergo doronici qualitas non à primis oritur.

Quintum: si putredo insignis suo calore vincet homines, quomodo alet lubricos?

Si opij drachma ob frigus occidat, cur glaciæ vnctio, quæ est frigidior, statim non exterminat natium robur.

Præterea ex mixtura variarum rerum perspè sine alteratione quatuor qualitatum illicet, & eodem momento temporis nouæ oriuntur qualitates, quæ indicantur quoque ab alijs, & nullomodo à primis pendere: afferantur experimenta.

Septimum: Accipiat aqua in qua ebullierint gallæ, hanc claram, & perspicuam videbis; accipiat alia in qua ebullierit calcantium, quæ clara quoque erit, vnâ in alteram infundas, illico sine ulla quatuor qualitatum alteratione maxima cū

admiratione videbis vtramque niger-
rum, atramenti colorem recipientem;
nemo viso hoc experimento audebit di-
cere ab alteratione quatuor qualitatium
colorem prodire, cum aqua fiat nigerri-
ma ferè in instanti: illud quod tale fit à
calido vel frigido non ictu oculi, sed
temporis spacio succedit.

Octauum experimentum, inuenias
aquam rosaceam plumbeo alembico stil-
latam perspicuam clarissimam, & huic
commisceas aquam communem purissi-
mam, videbis confectum in ijs perspicuis
aquis simul commistis enasci lacteum co-
lorem, cuius experimenti vsu cognoscit-
tur quoque, an rosacea aqua sit plumbeo
alumbico stillata, lacteus enim color a ce-
russa, quæ a plumbico producitur, ob-
missuram aquæ communis manifestatur
nulla facta alteratione in quatuor quali-
tatibus.

Nonum experimentum: dum similiter
lacteum suboritur color ex mistura aceti,
& tartari stillati.

Decimum experimentum eundem lac-
teum colorem enasci uideamus, dum mi-
setur aqua anisorum stillata, quæ per-
spicua est, aquæ fontis purissimæ.

Vndecimum: ex auripigmento, quod
est flauis coloris, & ex terra cerulea uel
succo ceruleo, qualis est endego si fiat
mixtio, statim fit color uiridis pulcherri-
mus: certe primæ qualitates tam cito id
non efficiunt.

Duodecimū: si ex ære & stamno, quæ
inter metalla sunt molliora fiat mixtum
id erit durissimum seu longè durius stam-
no & ære: quomodo hoc fiet a primis
qualitatibus?

Decimumtertium experimentum: si
permisceas æs, quod de molle est argen-
to & igne liquefiat resultabit illico me-
tallum longè durius ære & argento.

Quis uisus ijs experimentis auderet di-
cere, has qualitates nouas fieri à calido,
uel frigido; quod ex paucis his experi-
mentis colligimus, ex sexcentis colligi-
mus.

Verum ne prætermittam quandam
qualitatem felis, quæ nullo modo ad illas
quatuor primas reduci potest, audias
quid de sele nidius in Vngaria: erat No-
bilis uir Italus, qui dum erat prope selem,

licet cum nō uideret, statim in animi de-
liquium incidebat, & nisi aliquis, ei præ-
sto fuisset selem fugando suffocabatur,
nemo unquam potuit causam huius anti-
pathiæ referre in quatuor qualitates; sed
potius, si unicam nominare uelimus, in
densitatem, & angustiam; ille enim qui
sele præfente suffocari incipiebat, erat
angusti pectoris, asthmaticus; erat propen-
sus; in sele uero tria sunt deleteria, quæ
obnoxios dispenæ cum primis lædunt ce-
rebrum, expiratio, & pili; non erit ita-
que mirum, si ex ijs noua qualitas den-
sans gignatur, & per halitum felis alicui
communicari possit.

Idem crassus halitus est in uirosis bole-
tis, & opio, quare propius ad ueritatis
apicem accedemus, si dixerimus cum
Galeno lib. de const. ar. med. cap. 8. quod
qualitates occultæ fiant ex infinita uarie-
tate, & alteratione aliarum, hac tamè fe-
rie, ut iniuria omnium passionum, ut dicit
Aristoteles 8. phy. tex. 55. sit raritas, &
densitas; magis uel minus rarum, osten-
dimus superius, magis & minus dispen-
dere materiam ad generationem ignis, &
rarum esse posse prius calido.

Vitrum rubrum iuxta positum ceruleo
colorem facere uiolaceum densando.

Eadem ratione luteum uitrum nig-
rum ceruleo efficere uiridem.

Opium, & bolleti uirosi homines
ad necem perducunt non frigoris impe-
tu, sed densando, immobilesque reddendo
uitales spiritus; partes enim uitæ do-
natæ, cum egeant perenni motione, ut
natiua caliditas seruetur, denatæ ab ijs
& motu destitutæ pereant, oportet.

Demum halitus felis in aliqua spirita-
lium uasorum angustia tantum poterat
densare, ut uir ille in suffocationem cade-
ret; plurimæ ergo qualitates nouæ fieri
possunt, æque quo ad determinatos gra-
dus sepius in incognoscibiles.

Quis posset diuinare specificam & pro-
priam differentiam positionum interna-
rum partium, unde atramentum enasci-
tur ob mixturem aquæ gallarum, & cal-
canthi seorsum clarissima, & splendidis-
simæ; possumus tamen hanc, & quamuis
aliam occultam causam referre ad gene-
ra, de quibus superius egimus.

Deinde afferri potest exemplum om-

nium euidentissimum, & estque potentia motrix horologii; nemo sanæ mentis dicet horologii potentiam à temperatura prodire, sed à numero, situ, & figura rotarum, orbiculorum, & spiræ chalybeæ; impotentiam vero ab ijs vitiatis; quare, si in artefactis dentur potentiæ motrices non pendentes à temperatura, cur plurimi sunt adeo audaces, vt ignorantia crimini illis inurant; qui à situ, & à cæteris differentiis positionum sine vlla alteratione quatuor qualitarum putant plurimas virtutes prodire posse.

Eademque causa nimis audax fuit Fernelius, dum omnes motrices potentias animatorum retulit in substantiam: habet enim hæc verba lib. de additis rerum causis: stupidi hominis est credere animalis motum fieri à quatuor qualitatibus cum re vera omnis potentia mouendi debeat referri ad substantiam.

Quo pacto vir lepidissime ad substantiam vis referre, si humanus artifex varias dat virtutes motrices metallo mutando figuram, situm, & numerum rotarum; quanto facilius alma parens natura, quæ rotas, & (vt ita dicam) spiras viucentes diuini artificis efficere potest potentias motrices in ijs collocabit.

Obijcias ibi ante oculos innumerabilia instrumenta, quibus perexigui alicuius animalis pes componitur, sit culicis, vel formicæ, cognosces in perexiguo, & ferè insensibili pede esse necessariū, vt vasa, quæ ferunt nutritionem, quæ vitæ, quæ motum, & sensum, sint varia, & omnino diuersa, quia diuersum habent vsum, & cum perexigua particula moneatur secundum omnes differentias positionum, scilicet ante, retro, sursum, deorsum, dextrorsum, & sinistrorsum pro vsuum diuersitate totidem requiri debent instrumenta ad omnes motiones obeundas; ab illo enim instrumento, à quo mouetur culicis pes ante, non mouebitur retro; quare, si natura tot instrumenta tam promptè parat in omnibus rebus, ijsque minimis; cur ad simplicissimam substantiam audent omnes motrices potentias referre?

Quid prohibet, quin nos quoque hæc horologii similitudine dicamus, potentiam mouendi non esse substantiam sim-

plicissimam? sed potentiam ortam à numero, situ, & figura corporeæ substantiæ, & in ijs esse primum mobile, quod extra moueat ad spiræ chalybeæ similitudinem: Aristot. per analogiam artefactorum inuenit primam materiam; cur nos eius imitatione in tanta consilij angustia non poterimus per eandem analogiam de potentijs additis philosophari?

Audias quomodo Hieronymus Cardanus, qui occulta, & recondita in substantiam operantem referebat, semel hallucinatur: refert primo libro commentariorum quadripartiti, se lapillum vidisse, qui ob eius excellentiam aderat in potestate Pontificis Clementis Septimi; in cuius superficie erat neuus, vel macula, quæ in orbem tractu 24. horarum ad instar solis mouebatur; videns Cardanus hanc diuinam lapilli proprietatem referri non posse ad primas, vel secundas vocatas qualitates, eam statim in cathologo reconditarum à substantia prodeuntium recensuit.

Cardanus maximè fuit deceptus, quia maculæ circularis motus (sicut) deinde auditum fuit à situ, numero, & figuris internis prodierat; quoniam erat lapillus in orbem dispositus, & tali artificio accommodatus, vt pars maculata morbilis videretur continua, lapilli que poterat aperiri, & in eius cauitate erat spiræ chalybeæ, cuius virtute macula siue neuus 24. horarum cursum moueretur: vt primum causa huius virtutis lapilli reddita, est omnibus nota, nemo inde sustinebat illam motricem virtutem à substantia simplicissima, & occulta prodire: Cardanus itaque & Fernelius in hoc præcipue sunt decepti, quia dum videbant, motrices potentias non posse referri ad quatuor vocatas primas, putabat ad aliud non posse referri, quam ad substantiam: quamuis (vt ostendimus) commodè ad numerum, situm, figuram, & magnitudinem partium possint quoque reduci. Denique multa referuntur falsa, quæ facile creduntur ab ijs qui supponunt substantiam operari; referunt de Pyrrho, quod contactu pedis lienolios sanaret, quod quam sit falsum iudicent qui in Philosophia sunt versati.

Experimentis ostenditur, quod qui putant, qualitates occultas esse substantias operatrices, faciles sint ad credendum vanissima. Cap. XI.

Qui putant occultas potentias esse substantias operantes, sunt quoque faciles ad credendum infinitas alias vanitates; substantia .n. cum non subiacet sensibus nostris, sitque incognoscibilis, posito ab illis, quod operetur, malunt eam vocare opificem occultarum qualitatum, quam fateri, se abditarum rerum principia nescire; Albertus Magnus, Plinius, & plerique plures, qui de naturalibus virtutibus loquuntur, quique credere videntur potentias operatrices esse substantias, veris propterea sexcentas opiniones falsas immitcent.

Quod ita res se habeat, præstat aliquas istorum opiniones aperte falsas referre, quia exemplorum luce fabulosam opinionem libentius rejiciemus; referunt, echenidem qualitate substantifica posse impedire nauigij cursum: quod principis philosophæ, & experientie reluctatur: faciles sum, ut in has ineptias incidunt, quia cum substantiam nunquam viderint, vel alio modo cognouerint, posito ab ipsis, quod operetur, non solum ei videbitur a ratione alienum, quod pisciculi substantia posset nauigij cursum sistere, verum etiam planetas, & primum mobile: quis est ille, qui poterit virtutem incognoscibilem coarctare, & limitare?

Qui verò sustinebit, potentias operatrices esse qualitates accidentales, quamuis retusum haberet ingenium, nullo modo credere poterit, quod echenides pisciculus habeat illam potentiam; Etenim, si viderit, quod neque calefaciendo, vel rarefaciendo, vel densando, vel alijs enarratis potentij id efficere possit; statim hac sensata philosophia lubens explodet hanc de echenide fabellam.

Res hoc modo ab alijs recipitur, ubi pisciculus degere solet, aqua in orbem obvoluitur, dum vero naui hanc aquæ vertiginem pertransit (licet secundis ventis teneat cursum) quiescere cogitur, & tunc ob aquam scaruriëtem ab imo pisciculus quoque supernè fertur: qui vident Eche-

nidem, si de illis sunt, qui in substantiam referunt effectus naturales, qualiter philosophia seposita putant pisciculum substantifica sua virtute sistere nauim; ecce, quomodo potentiarum inuatores sint sæpè in philosophando desides, & ociosi: quomodo omnia omnibus credant: quomodo in monstruosas incidant sententias; & quomodo historias falsas, & mendaces non possint non admittere.

Sed aliqua de lapidibus afferantur, quæ omnino falsa, & impossibilia sunt: Albertus, & alij plurimi tenent Lapidem Aquilæ proprietate occulta conciliare amorem, augere diuitias, & partum, dum fertur, facilitare.

Dicunt præterea Lapidem Calcedonium collo appensum tollere illusiones phantasticas a melancholia ortas: Lapidem verò Celidonium, qui in ventre hyrundinis inuenitur, sub sinistra asella gestatum sanare epilepsiam.

Albertus habet Lapidem Crisolatum stultitiam pellere, & sapientiam augere: quid stolidius, & ineptius de ijs, quæ quotidie experiuntur, dici potest? quis inanitates has non rejiceret.

O nos felices, si lapis, qui pelleret stultitiam, & sapientiam auget, inueniretur! Qui verò arbitrantur operandi potentias a qualitatibus accidentibus prodire, nunquam defenderent illas fabellas; quia conantur fateri, potentias operatrices non operari sine contactu, & sine resistentia passi, horum quisque illico negabit, Lapidem Aquilæ facilitare partum, nisi ipsum deglutiat, nisi virtutem habeat aptiendi, rarefaciendi, vel calefaciendi: Neque admitteret Celidonium Lapidem sub asella gestatum epilepsiam anteuertere; quoniam si epilepsia sit in meatibus cerebri, nisi eius virtus intimum cerebri petat, & aperiat obstructas vias, nihil opis adferet.

Neque admitteret erratum illud vulgarissimum, quod scilicet per Lapidem saspidem collo appensum hæmorrhagia tollatur; quia ante oculos sibi statim obijceret, fluxionis causas a Galeno traditas esse vel copiam, vel malam qualitatem irritantem, vel vasorum imbecillitates, diceretque primo lapidem non tangentem vasa, vel sanguinem non posse esse copiam

coercere, vel irritantes qualitates demulcere, vel robur vllum adiungere venis; quia omnis actio fit per contactum, & si agēs vicerit, id eueniet, quia habebit maiores vires & non alio modo; Neq; demū admitteret Iaspidem cohibere posse omnes fluxiones sanguineas; hæmorrhagia orta ab imbecillitate vasorum indicat remedium astringens, a copia indicat aperiens: quo pacto Iaspis contraria efficiet? præterea Gal. 5. meth. cap. 5. tradit modos quibus fluxus tolli possit: habetque hæc verba, consuere prohibetur, & propter animi deliquium, & cum ad contraria reucllitur, & cū ad vicina deriuatur, & propter refrigerationem corporis, cum igitur lapis Iaspis neq; excitet animi deliquium, neq; reucllat, vel deriuat, vel refrigeret, non video quomodo possit cohibere fluxionē: neq; valet, dum dicunt, id cognosci per experientiam: quia sicuti magnes semper trahit ferrum: sic semper Iaspis susteret sanguinem: vel nisi semper saltem vt plurimum: tamen nunquam sistit.

Amplius, quis admitteret lapidem Iudaicum in brachio gestatum expellere renalem calculum? admitti fortasse potest huius lapidis vsus, quem Dioscorides approbat, quod uidelicet puluerizatus subtilissimè, haustusque è renibus calculos pellat, sed gestatus nequaquam.

Eodem modo non esset fortasse neganda lapidis lazuli uirtus a Mesie relata, quod uidelicet puluerizatus faciat, ut piluli, quando corroduntur ab acutis humoribus, in palpebris nascantur; quoniam puluis inpersus deterget, & malam qualitatem palpebrarum auferret, unde possent piluli sine difficultate enasci.

Præterea dicunt, crystallum in subtilissimum pollinem redactum melle commissum posse replere ubera lacte: hoc uideretur a principiis medicinæ, & philosophiæ alienum: nisi fortasse mel ex se id præstaret, quippe in sanguinem potest conuertere, quia enim, quæ toto genere differunt inter se, inuicem non agunt, & patiuntur: nihil potest conuertere in lac, quod in sanguinem prius non conuertatur.

Dioscorides refert plurimas herbarum proprietates occultas, sed fabulosas lautas è circulis uulgarium hominum, quæ

experientiæ, & principiis philosophiæ relictantur: lib. 1. cap. de ramo dicit, fama est, ramos huius ualuis, fenestrisve impositos ueneficia depellere: nec tamē credere uidetur Dioscorides, quod rami huius herbæ fenestris, vel foribus admoti depellat ueneficia, cum apertè dicat, esse famam, quasi diceret, non esse opinionem sapientum, sed communem, idest mulierum, vel rudiorum hominum, qui faciles sunt, vt omnia omnibus credant.

Eodem libro cap. de uiticæ habet hæc: virgam uiticis, qui manu teneat, dum iter facit, negatur, intertriginem sentire, quia fidem his nugis adhiberet, quod in itinere æquitando diuturno curi herba manu gestata nō permitteret coxæ per confricationem lædi, & aliquando excoriari? qua ratione, quo contactu herba manu gestata coxas tuebitur?

Amplius lib. 2. cap. 68. refert aranæum utriusque temporibus, aut fronti alligatum curare tertianam febrem; nō desunt *περὶ αράνης*, & excordes homines, qui ijs tricis credunt, illisque pro curandis febribus utitur; vtinam tertianæ febres, quæ aliquando phlebotomia, & medicinis non possunt curari, aranæi applicatione curarentur; atq; vtinam saltem alter araneus, qui candidam, tenuem, densamque telam orditur, alligatus in Loculo (ut dicit Dioscorides) lacertoq; appensus quartanam tolleretur. Capite 69. eiusdem libri refert, quod lacertæ caput intritum aculeos, & omnia corpori infixâ extrahi, & uaros, & fornicantes uerucas, & pensiles, quas crochordonas uocant, tollit; uix igne tolli possunt. uerucæ ob altas earum radices, & tanto minus lacertæ caput id præstare poterit; Quotum ergo Dioscorides hæc insulissima oculata alijs innumerabilibus miris uirtutibus præditis immiscuerit, fateor me latere, nisi dicamus, hæc attulisse, quia forsitan erant Arii ingenio accommodata, vel, & melius, ut Ario illorū medicarum simplicitatem significaret.

Lib. 3. de dyspnoia loquens, dicit uermiculos, qui in dyspnoia inueniuntur (hæc planta dicitur quoque labrum uenetis; estque illa, in qua ros, uel imber asseruatur) si in soliculo alligentur, & collo aut brachio appendantur, habere proprietatem

tem pellendi quartanam: Parimodo capite de spina alba dicit, quod eius semen gestatum serpentes abigat.

Capite vero 103. eiusdem libri de alyso quod hæc herba foribus appensa sit salutaris; & hominibus, atque animalibus, fascini amuletum, & quod purpureo linteo circumligata sua proprietate pecudum morbos abigat: quæ adeo vana sunt, ut vix credam, inueniri mulieres simplices, & *παρρησιότατες*, quæ hæctenus hac ineptias non animaduertierint.

De attractilide loquens refert, quod isti à scorpionibus, quamdiu herba hæc manum teneant, nullum experiantur dolorem; herba tamen deposita dolorem recrudescere: quæ omnino falsa sunt, quia experientia non respondet, nisi illis profuit, qui ita firmiter credunt, ut fides aliud animum auertat, & dolor inde sedetur, hocque est anodynum auertens animum; hocque modo circulatorum dentium dolores animum auertendo verbis, præstigijs, seu delusionibus, mitigant, & aliquando accidit, ut ex toto cessent dolores; quod, si propterea fieret, non solum attractilis, sed omnis herba dolorem istum scorpionis sedaret.

Insuper de proprietate conyzæ parux capite 136. huius libri dicit, quod huius herbae subtractu abigi possint culices, & pulices necari: vel nobis, si æstate, quando hæc animalia vellicant, & sua multitudine nos perturbant, aliud non esset nobis remedium, hæc ænus culices, & pulices nos totos comediscent.

Ad hæc capite 145. refert, quod si manu teneatur radix satyrj arithronij venerem exciter: dum manu renui satyrium, noui hac uirtute omnino carere; ego sanè huius radices satyrj proprietatem nescirem defendere, nisi sub nomine huius radices intelligeremus mentem quippe radices imaginem imitari uidentur.

In 4. libro plures refert occultas proprietates omnino falsas; uerum paucas proponemus, ut lectores uideant a Celeberrimis quoque Auctoribus, sæpe ineptias referri, & uera falsis commisceri: de pentaphylo dicit, quod dum incenditur, ad expiationem peccatorum, & ad castimonias iuuat.

Ad hæc capite de phænice dicit, quod hæc herba adligata in puniceo nullo sanguine supprimat.

Capite de herba sacra, quam sideritum uocant dicit quod, si eius decoctione spargatur triclinium, lateriores conuictus fieri, si addidisset, latiores fieri conuiuas triclinio maluatico uino referto sine controuersia omnes relationi Dioscoridis adlegererent.

Capite 79. eiusdem libri dicit, quod radix mandragoræ decocta emollire possit dentem elephantis ad accipiendam quancunque formam: hæc sunt uerba, radix mandragoræ ebur emollire, fertur, quæ senis horis cum eo decocta sit, & ad accipiendam quam effingere optaueris formam, ipsum facile præstat: quod est ridiculum, quia nec senis horis, nec senis annis ebur emolliret: nisi itaque Dioscorides ex aliorum sententia hæc proponeret, inter ueteres scriptores illo ineptior, & stolidior non inueniretur; ipse in epistola ad Arium fatetur, se militem egisse, & eaque collegisse, quæ illis temporibus erant in opinione hominum: ideo non est reprehensione dignus. Nos hac de causa has ineptias retulimus, ut Lector sibi ante oculos obiciat, & uideat, quomodo, qui facile credunt oculis, in uanissima sæpe incident.

Insuper cap. 121. dicit, quod asfer atticus, seu inguinalis herba dolorem inguinum leuet. si aridus eius flos sinistra manu dolentis decerpatur, & inguinibus adligetur, quo nihil dici potest magis a philosophia alienum, decerpatur enim dextra, vel sinistra manu uirtus floris semper eadem seruabitur.

Capite uero 131. de phlyteumate, & in sequenti capite de leontopodio dicit, quod hæc duæ herbae conueniant ad amatoria.

Postremo de mercuriali herba omnibus nota dicit, si feminæ à purgatione lunari trita solia mercurialis masculi genitalibus admoveant, mares inde gigni; & feminas, si mercurialis fuerit feminæ, reseruet sanè apud Reges, Principes, & Nobiles viros, qui masculos habendi desiderio flagrant remedium in re hac difficili casibus missum: sed cum à Dioscoridis temporibus adhuc usque tempora herba hæc pro

pro hoc obeundo munere in nullo sit pretio, est sine alia experientia in fabularum cathalogo collocanda.

Idem dicit Dioscorides lib. 3. c. 142. de testiculo canis, habetque hæc, qui edent testiculum canis marem, mares generabit qui sæminat, alterum sexum.

Denique in 5. libro de lapidib. plurima occulta refert, quæ omnino rationi, & experientia: reluctantur: aliqua proponantur de lapide selenite, quod adligatus artoribus reddat eos frugiferos de laspide, quod femorib. appensus partum accelleret de Ophite, quod collo appensus auxilietur lethargo; plures alias refert proprietates occultas lapidum ex opinione tamen, ut diximus, aliorum, quæ mouent risum, hand secus quam si eas ex ore incipissimi circulatoris audiremus alia quæque plura relata sunt à Dioscoride, quæ neque rationi neque experientia: respondent attullimus hæc, ut lector ijs excitus videat illorum errata, qui putarunt potentias operatrices esse substantias.

Plurimi alij fuerunt, qui, ut admiranda de occultis herbarum proprietatibus dicerent, magis adhuc aliena à ratione dixerunt: afferamus solum eas, quæ ab Andrea Matthæolo in limine sui Dioscoridis proponuntur, dum loquitur de laudibus plantarum, refert inueniri herbam a Magis vocatam Balim, quæ mortuis animantibus vitam potest restituere, comprobatur auctoritate Xanthi antiquissimi Auctoris, qui 1. libro suarum historiarum affirmaverit, Draconem virtute huius herbæ resurrexisse: & Thiloni similiter à Dracone occiso eadem, quæ balim dicitur, vitam restitutam fuisse.

Addit Matthæolus Iubam Mauritanie Regem scripsisse in Arabia cuiusdam herbæ auxilio uitam mortuo homini datam esse: quid stolidius, & magis philosophiæ repugnans dici potest?

Præterea ex Theophrasto, & Democrito refert Matthæolus æthiopidem herbam clausis foribus applicatam, eas statim aperite, nisi bipenis uehementius fores aperiret æthiopiæ, omnes despicerent eius usum: ego uero docerem Matthæoli puluerem qui aperit fores: hic est: in clauibus ponas puluerem pyrium seu bombardarum illum accedas, statim aperien-

tur fores.

Refert quoque, Democritum dicentem in India nasci achemenidem herbam, quæ dum comeditur ab ijs, qui tormentis lacerantur, omnia subito fateantur.

Similiter Plinius refert Achemenidem aliam, quæ si in hostium aciem traiciatur fugentur: hic est fructus illorum, qui putant substantiam operari: Qui vero sciunt omnia agentia habere contrarium, suscipere magis, & minus agere, & pati per contactum, non possunt in tam monstruosas sententias incidere.

Postremo ex omnibus empiricis ille est ineptior, & stolidior, qui putat posse verbis, breuiculisque, seu codicilijs caracteribus refertis collo appensis morbos curari: Quidam stupidi, & excordes empirici putant in hunc modum quartanam, erysipelas, epilepsiam, & plures alias egritudines depelli posse; sed hoc est deterrimum, & miserabile, quod licet quotidie has vanitates experiantur, non respiciant; mirandum præterea est, quod huius generis fabellæ legantur quoque apud veteres scriptores; etenim Q. Serenus pro curanda tertiana, vel quartana characteres, & nomina ridicula proponit.

Similiter Marcus Cato de re rustica pro curatione luxationis, & fractura particula 160. docet hanc cantionem: hæc sunt eius verba, luxum si quod est, ut ex cantes, hac cantione sanum fiet; moras danata daries dardaries est araries; docet deinde paulò inferius aliam cantionem pro curatione eiusdem luxationis, hæc est haut haut haut ista pista damiano damastra: addit, vel hoc modo, haut, haut, haut istagis, turtis, ardannabon damastra: puto, si quis caneret daries dardaries cum alijs sequentibus verbis annis sexcentis, quod ob cantum luxationes, vel fracturæ non curarentur: plura alia in auctoribus, qui adhibent fidem occultis inueniuntur, quæ cum principijs philosophiæ, medicinæ, & experientia: aduersentur, tatus erit, ut de ipsis non amplius loquamur.

Ostenditur, venenatos non cognosci ex veneni definitione, sed ex syndrome signorum communium a sex fontibus desumpta. Cap. XII.

Diximus in libri vestibulo præter qualitates occultas tria alia nobis tota sua substantia aduersari, quæ sunt venenum, putredo, & pus; ea tamen de causa eius substantia peccare dicitur, quoniam nihil est in ips, quod non sit dissimile, & contrarium partibus similibus, & dissimilibus corporis humani: eorum enim situs, numerus, figura, & temperatura ab humana conditione adeo distat, vt fiant contraria; contrarium enim est, quod in eodem genere ab alio maximè distat: his rationibus dicemus, doronicos esse canis venenum; quia eis in situ, numero, magnitudine, figura, & temperatura sunt vel maximè dissimiles: hominibus verò, quia non sunt adeo dissimiles, erunt salubres: eadem ratione putredines vitam hominibus auferunt, vermes ea vescuntur, & ex ipsa efflorescunt; lumbricis aloes est deleterium, hominibus familiaris medicina sturnis napellus seu cicuta est nutrimentum suauissimum, hominibus dirum, & truce venenum: coturnicibus veratrum ex Gal. 3. de temperamenti 4. est nutrimentum, hominibus verò medicamentum nullum igitur erit venenum absolute, sed solum in comparationem, & respectum quatenus videlicet sit, vel non sit oppositum propositis qualitatibus.

Error illorum mihi videtur inescutabilis, qui putant, venenum esse quid absolute, esseque substantiam aduersantem: O nos felices si venenum, lues gallica, rabies, napellus, & alia id genus alio modo, quam substantia sua nobis non officerent! quia cum substantia æquè omnia respiciat, & nunquam substantiæ, vel accidentibus contrarietur, non læderemur ab ips, & longè feliciori sorte frueremur.

Cognitis principiis, quibus venena nobis aduersantur, modo duo sunt de venenis perquirenda, scilicet definitio veneni & modus cognoscendi venenatos.

Quo ad definitionem attinet; Hieronymus Capituaceus percelebris vir hanc tradit: venenum est qualitas confestim

corruptiua cordis hominis.

Hæc definitio est adeo obscura, vt longè obscurior, & ignotior definito videatur; nulla enim est in hac definitione differentia, quæ nos doceat, quādo corrumpitur cor à veneno: Aristoteles 4. phy. de definitionis beneficio loquens dicit, qui cognoscet quid de loco, cognoscet quoque consequentia; si igitur ea definitio nos non docet, quando aliquis veneno sit iugulatus, eam despiciamus.

Insuper quot sunt, qui improviso expirant animam, & vitam finiunt ab alijs causis, quā à veneno? quo pacto ergo cognita illa definitione distinguemus, an improvisa mors sit veneno vel alijs causis secuta? Criton & Phreneticus (vt refert Hippocrates) decerpent mortem obeunt, quia postridie ab incepto squissimo morbo pereunt, attamen neuter illorum a veneno moritur.

Præterea venena in minima quā antitate subito non possunt cor corrumpere, vt in paulo maiori; Sublimatur enim arsenicum in scrupuli quantitate tractu 12. horarum ad exitium perducit; grana di 10. vel tria vel nihil, vel spacio 40. dierum id efficiet, non conueniet ergo veneno, ut venenum est, hoc attributum, vt confestim cor corruptat.

Adhuc sæpè porriguntur: virosa robustis hominibus, quorum cor non possunt corrumpere.

Nec mihi occurrant, quod robusti hominis cor aliquando nec confestim corrumpatur a veneno, quia virtus resistat, vel ad sint impedimenta; cur non penetrat ad cor, illudque corrumpat.

Quia nos quoque illis sic obijciemus: nisi virtus resisteret, essentque impedimenta, humores quoque facientes febrem statim corrumpere cor, quare per qualitatem confestim corruptiua cordis non approximamus veneni naturam.

Denique cito occidere, & corrumpere cor continet alijs, vt pestilentia, apoplexia, & alijs; quare ex hoc signo communi nihil colligimus: Quinimo incidimus semper in hunc vitiosum paralogismum: illud est venenum, quod cito corrumpit cor: hoc cito corrumpit cor, ergo est venenum: modus arguendi est in secunda figura ex duabus affirmatiuis iunctis, & irre-

Irreducibilis ad primam, quoniam maior non potest conuerti, nisi fiat particularis; quod si fieret in alium paralogismum incideremus, quia in prima figura ex maiori particulari nil sequitur, & esset falsus syllogismus.

Sunt, qui putant nigrum, seu liuidum colorem esse signum proprium, & tamquam caracterem venenatorum: quorū sententia non videtur veritati respondere, quia aliquando ob ægrotudines insignes aliquæ corporis partes fiunt nigræ, vel liuide: legamus historiam adolescentis decubentis in foro mendacium, vbi Hippocr. dicit, in illo ægrotante extrema fuisse liuida: Gale. verò ibidem in commento dicit, extrema liuida ob duplicem causam fieri posse, vel ob visceris alicuius inflammationem: vel quia emoritur calidum natium: quare cum calidum natium ob innumerabiles causas emori possit, liuor non indicabit venenum.

Præstat igitur, ut signorum syndromæ sufficientissimam perquiramus, quæ nos doceat cognoscere, quando aliquis veneno sit iugulatus: etenim sicuti Aristot. 2. post. dixit, nos non posse de æquiuoco genere vnicam habere definitionem, & demonstrationem; dat exemplum de longæuitate auium, & terrestrium animalium, dicit terrestria animalia esse longæua, quia carent bile; aues verò esse longæuas non ob hanc, sed ob alias causas: simili modo venena mineralia, plantarum, & animalium occidunt ob varias, & diuerfas causas, quare variæ debent esse definitiones, variæ signa, & varia remedia.

Syndrome signorum communium in dicatium venenatos colligitur à sex fontibus, quorum aliqui consistunt in ijs, quæ necessar. antecedunt, aliqui in ijs, quæ necessar. consequuntur.

Primus fons illorum, quæ necessar. antecedunt continet causas externas, sicuti si quis versaretur cum inimicis, vel cum veneficis, ex eius morte repentina cum liuore facile colligi posset, illum fuisse venenatum.

Secundus fons continet signa indicantia dispositiones patientis; Galenus 6. de loc. aff. c. 5. de hac re apposuit nos admonet & docet, cum homo sua natura probis humoribus abundans, ac sanorū mo-

re educatus repente moriatur, id veneno lethali esse secutum diligēt. sanè præteritus habitus, & dispositiones illorum, qui repente moriuntur oportet expendere, quoniam si aliquis fuerit dispositus, & propensius apoplexia, & de repente moriatur, nulla suspitio veneni habenda erit, quamuis liuidus esset. similiter, si supramodum pinguis esset, subita mors ei causa esset adscribenda: si haberet angustiam in pectore, ut de Antipatro Medico relatum est à Gal. idem dici deberet, angustiam enim illam ex interciso pulsu multo ante prænouit Gal. & multo ante præuidit exitium repentinum Antipatri: ecce, quod ex cognitione causarum extenarum, & dispositionum patientis aliquando causam repentinæ exitij penetramus dicimus aliquando, quia potest accidere, ut parte aliqua nostri corporis humores prauī adeo occulte, sensimque accumulentur, ut nullum unquam sensum sui exhibentes, hominem, qui uidetur indequeque sanus, in repentinum exitium trahant: quare non sat est patientem cum veneficis, & inimicis fuisse uersatū nullamque in ipso cognitam fuisse dispositionem minitantem subitam mortem, quia hæc omnia nos possent decipere, requiritur ergo, ut cōtemplemur tertium, & quartum fontē, qui continēt morbos & symptomata insequentia venenatos.

Morbi venenatorum sunt tumor corporis, oculi ualde tumentes, tumor uentris, & præcipue, si venena mineralia fuerint. Non semel uidi Carlostadij Croatiae ab illorum militum præfecto fuisse sublimati scrupulum clam exhibitum captiuis prædonibus, in quibus omnibus excitabantur uentriculi inflammationes, obseruabatur tamen hoc discrimen, ut aliqui quadraginta dierum cursu adeo premerentur, ut cum lienreria illorum uita terminaretur, alij uero fortiores continuo uomitu liberarentur.

Symptomata insequentia venenatos sunt stomachi anxietas, syncope, pulsus imbecillimi, pallor totius corporis, & subita mors: ex Gale. 6. de loc. aff. hæc colliguntur, habet hæc, si nigrum, & liuidum corpus reddatur, uel putredinem molestem oleat, signum est illud corpus ueneno iugulatum esse; ueritas roborabitur, si

cadem

eade ex alijs colligatur fontibus, ut scilicet sanus fuerit antea, vel versatus fuerit cum veneficis, vel habuerit inimicos, aut nullam habuerit dispositionem minitantiem exitum, ex omnibus enim fontib. si vnicum solum signum collegeris, verò affirmare poteris illum fuisse venenatum.

Sed quoniam diximus venenum esse æquiuocum, quia vnicam non potest habere de finitionem, cum aliqua sint frigida spiritus densantia, & suffocantia; aliqua calida, & exedentia; ideo varia erunt signa indicantia venenorum naturam: conijciemus venenum frigidum, & suffocans quale est opium; si stuporem, difficultatem anhelitus, & somnum profundum passi fuerint.

Memini me viderisse in finitimis locis, Vngariæ militem quendam, qui septem opij pillulas, vice aliarum purgandi gratia exhibendarum, deglutiérat; dum patientem vidi tanto cum impetu spiritum trahebat, ut paullo post deficeret, & è viuis, antequam possem, ei remedium dare, decederet.

Conijciemus venenum calidum, & exedens ex lotio sanguineo, ex visceribus oris, ex dysenteria, & ex alijs; hæc diuersa venenorum natura est in causa, quod vnicò non cognoscatur signo, sed syndrome signorum.

Neque qui cadauera aperiunt sine signorum syndrome firmam, & vndequeque perfectam cognitionem venenatorum comparare poterunt: Quis inveniet in cadauere scrupulum, vel drachmam sublimati in polinem subtilissimum exhibitum, alijsque cibis commisti?

A quinto fonte idest à iuuatibus, & legentibus colligimus aliqua, scilicet Theriacam, & vomitum iuuare: à sexto fonte, scilicet à locis affectis vt à vesica, corde ventriculo, & ore: ex quolibet igitur fonte, si vnicum saltem signum collegerimus dicere poterimus illum veneno fuisse iugulatum.

Offenditur, quod putredo febriem sit illa, quam philosophus vocat simpliciter, & quod omnia medicorum auxilia pro putredine auferenda sint preseruatoria, & non curatoria. Cap. XIII.

Acturi in præsentia de illa putredine, quæ febres efficere solet, nisi à

distinctione putredinis tradita ab Arist. & meteororum exordiamur, non video quomodo profundè de illa aliquid dicere possimus: dicit igitur philosophus putredinem duplicem esse, alteram, quæ vocatur vniuersalis & simpliciter, alteram vero secundum partem: Quod Aristoteles per putredinem simpliciter, & vniuersalem intelligat, quæ vsque ad elementa resoluit, videtur esse in scholis ab omnibus receptum.

Verum quid intelligat philosophus per putredineam secundum partem, est operæ pretium, vt præcognoscamus, si velinus scire, an putredo humorum sit illa, quæ vocatur ab Aristotele simpliciter, vel secundum partem.

Albertus Magnus per putredinem secundum partem intelligit putredinem elementorum.

Eraſtus intelligit formæ interitum, sed non vsq; ad elementa; illam enim putredinem vocat vniuersalem, & simpliciter.

Archiangelus Mercenarius in suis repetitis quæstionibus de hac materia loquens inuenit in Eraſto summam pertinacia dicens, quod putredo secundum partem non sit interitus formæ, sed sit solum alteratio qualitarum.

Iacobus Zabarella, cuius ingenium reuera vsque in Græcorum comparatione est euectum, tenet putredinem secundum partem, modò esse interitum formæ, veluti dum homo corrumpitur, & sit cadauer, vel dum vinum putrescit, & sit vapour; modò esse alterationem qualitarum, veluti dum vinum incipit putrescere, artamen practici possunt illud transponendo ex dolio in dolium reducere ad pristinam sanitatem, hanc putredinem Zabarella vocat quoque secundum partem, quamvis sit in solis qualitatibus; in quam sententiam, vt in medium quandam uiam uideo ijs temporibus animos studiosiori affectu, hancque nos quoque recipimus.

Quo pacto uero aliorum sententiæ reijciuntur, soluanturque argumenta aliorum in contrarium allata, quæstio tota legi potest in libris quæstionum naturalium Zabarelle, qui diffusè de hac re egit nostrum hic erat pauca declarare quid per putredinem secundum partem intelligendum esset.

Sequi.

Sequitur, vt modò quæramus, an humores in febrib, putridis putrescât simpliciter, vel secundû partē: Mercenarius, Zabarella, & pleriq; alij tenent putredinē humorû efficientiû febrem esse secundum partem, & non simpliciter; tenet. n. Mercenarius putredinem humorum esse alterationem, & non formæ interitum.

Zabarella verò dicit, aliquândo esse formæ interitum, aliquando solam alterationem qualitatum, datque exemplum, dum sanguis niutatur in bilē, vel in alii humorem toto genere præter naturam est cum interitu formæ sanguinis: dum verò ob putredinem humorum alterantur solum qualitates, non corrumpuntur formæ humorum, dicitque tunc Medicum auferendo occasionem aperiendo scilicet, euacuando, refrigerando posse humores, qui incipiunt putrescere, ad optimam temperaturam transferre.

Nemo, quod sciam, dicit, quod humores putridi sint simpliciter tales, sed omnes vna voce videntur decidere, putredinem humorum efficientium febrem esse secundam partem.

Arbitror tamen Galenum aliter sentire, quia putridi humores non solum alterantur, & putrescunt secundum partem cum interitu propriæ formæ; verû etiam putrescunt simpliciter, quia semper portio putrida resoluitur vsque ad elementa, & ad cinerem peruenit: tunc putredo est simpliciter, quando peruenit ad cinerem: Arist. enim 4. meteororum loquens de putredine simpliciter dicit, quod cinis est finis putredinis.

Quod verò putridi humores resoluantur in cinerem est Galen: 2. de differ. feb. & 3. præfag. 32. vbi habet, si natura illum veluti cinerem supramodum adustorum vacuare non antequerit, ille rursus in corpore manens, & concalescens magnam quandam ad putredinem propensionem contrahit: quare si causa, cur putredines excitentur, est cinis humorum ob putredinem adustorû, putredo febrium erit simpliciter, & vniuersaliter apparet hic cinis in urinis in fine putridorum morborum: præsertim speciem arcularum perexignarum: differt ab arenulis, quia hæ in fundo matellæ colliguntur; cinis in nubeculis sparsus conseruatur.

Dum verò Zabarella dicit, putredinē in solis humorum qualitibus existentem tolli per leuem medicinam, putredinem verò cum interitu formæ humorum nullo modo corrigi, vel reduci posse ad pristinum statum, eius pace distinctio ad rem non facit; quia nulla putredo, per leuem medicinam corrigitur.

Hæc tria sunt natura distincta: putrescibile, putredo, & putrefactum: putrescibile medicamentis tollitur; putredo solum est in fieri, putredo igitur erunt fumi, & vapores putridi, qui neque putrescibiles, neque putrefacti sunt, quique nulla medicina eos reddere possumus ad statum salubrem, sed in cinerem debent conuertri: cinis verò est res putrefacta.

Ab hoc principio orta est illa opinio nostra alibi quoque proposita, quod scilicet omnia auxilia pro putredine pellenda sint præseruatoria, & non curatoria, diriganturque in euacuandos, seu alterandos humores non putridos, sed putredini obnoxios, vel putrefactos, cineres, in obstructioneque aperiendas, in causas efficientes mediatas corrigendas, & nequaquam in auras seu vaporosos transpiratus euacuandos; quia alio modo halitus isti putridi non absumuntur, quam combustionem.

Hinc sanguinis euacuatio, quomodo-cunque consideretur, est solum auxilium præseruatorium putredinis: Galenus 4. method. cap. 6. habet, aliquando tolli sanguinis abundantiæ inedia, aliquando euacuatione per aluum, aliquando per balneum, aliquando per exercitium, & frictions: quopacto inedia tolletur abundantia, nisi modo præseruatorio, quatenus scilicet per inediæ paucillius sanguis gignitur. Similiter dicitur de alijs modis: quia sanguis non euacuatur per aluum, per balneum, per exercitium: obiter hic colligimus, quod sanguis ad aquatē non indicet phlebotomiam: lenientia similiter non portiguntur pro curanda putredine, sed, vt primæ viæ satecina liberentur: Serapia, vt refrigerentur viscera, vel vt aperiuntur meatus, & fluidi reddantur humores putrescibiles; liquatis enim succis, & vijs per quas meare possunt patefactis, ocys purgatur; du m

dum verò sunt aperti meatus, viscera quasi flabello ventilantur, & natura inde alacritas certamen abfoluere potest, melius digerendo humores putrescibiles, & melius euacuando putrefactos.

Pharmaca demum duplici de causa dantur, vel vt cinis tollatur, ne noua accessio scintillet, vel vt putrescibiles humores vincantur: Concludimus ergo putredinem esse fumos, vel auras, esseque medicinis inuincibiles, quia solum combustionem absumuntur, eius enim finis, Aristotele iudice, est solum cinis: colligimus ergo ex ijs, quod nullum auxilium medicum in putredine auferenda sit curatorium; & similitudinem, Zabarellæ de vino non facere ad rem, quia sicuti dum redit, non est putridum, sic humores, dum redeunt, non erunt putridi, neque secundum partem, neque simpliciter: humoresque putridos necessario in cinerem debere conuertere, & hanc putredinem esse simpliciter, & non secundum partem.

Reijcitur argumentum nonnullorum ostendens, putredinem insignem esse venenum. Cap. XIV.

Magna est controuersia hodierno die, an putridi humores possint aliquid naturam, & formam veneni subire: Qui putat seuissimam humorum putredinem fieri venenum, id conantur probare Galeni auctoritate in epidemicis, vbi historia Critonis, & Phrenetici declaratur, refert ibi Galenus, quod in illis collectus humor sit factus veneno lethali similis, & hinc de repente secuta sit mors: Inferunt, ergo humores aliquando in corporibus uiuentibus poterunt esse adeo perniciosi, ut fiant uenena.

Sed argumentum istorum redigamus in formam, taleque esse debet: omne quod est simile ueneno potest esse uenenum, putredo insignis est similis ueneno, ergo est uenenum: Argumentum est in quatuor terminis: primis erit, dum dicunt, omne quod est simile ueneno; Secundus est prædicatum huius propositionis dum dicunt potest esse uenenum: tertius est insignis putredo, quartus est, quod putredo sit uenenum: alius terminus est quod sit uenenum, & alius quod sit similis ueneno.

Insuper hoc argumentum in libris Elenchorum Aristotelis vocabitur elenchus compositionis, veluti si quis diceret qui sedet potest iacere, Socrates sedet, ergo Socrates iacet: vt hoc argumentum non esset in numero parallogismorum oporteret hoc modo formare conclusionem, ergo Socrates potest iacere, & non inferre quod Socrates iacet: similiter debebant inferre cum Galeno, ergo putredo insignis est similis veneno, & nequaquam quod sit venenum.

Demum, vt argumenti vanitas noscatur, ostendi potest, quod sit in quarta figura; quoniam subiectum minoris est latius & communius prædicato, quia ex illorum sententia putredo insignis latius se habet, quam venenum, quia ipsi fatentur dari putredines insignes, quæ sunt uenena, & quæ non sunt: similiter subiectum maioris latius se habebit, quia ex illorum quoque sententia non solum uenena debent dici uenena, verum etiam illud, quod erit simile: quare si oporteret conuertere maiorem nil sequeretur, quia argumentum esset in secunda figura ex duabus affirmatiuis; erit igitur putredo diuersa, specie, & genere a veneno.

Nos rationibus logicis, quæ sunt vniuersales omnibus scientiis reiectis propositum argumentum, vt iisdem rudiores possint plura similia argumenta quæ in scholis vagantur explodere; sicuti illud quod vtuntur sæpè nostratum aliqui, dum probant, calorem innatum esse caelestem, ex eo quod Aristoteles dixerit proportionem respondere elemento stellarum; hoc & alia similia argumenta in numero parallogismorum reponenda.

A quibus humoribus, & causis fiat pus. Cap. XV.

PVs demum reponitur inter ea, quæ peccant rota substantiæ, de eius causis igitur agendum. Plurimi putant, causam materialem puris solum esse massam sanguineam, ceteros vero humores extra venas existentes esse adeo rebelles, vt alteratrices partium non possint illos transmutare in pus, quin immo, nisi expellantur in abscessus, in feyrrhoc, vel in aliam

malam,

malam, & virosam excrementorum sobolem cedant oportet.

Confirmant suam sententiam auctoritate, & experientia. Primo asserunt Galeni locum 2. aph. 47. ubi habet hæc uerba, pus fit à calore misto præter naturam, & a calore secundum naturam, ideo vitiosam habet transmutationem ex sanguine, inferunt ergo, si pus fit cum transmutatione sanguinis, ubi non erit sanguis, ibi non fiet pus.

Deinde probant expetimentis, dicunt destillationem capitis pituitosam extravasatam restare in pectus, uel in articulos, attamen non posse in pus conuerteri: similiter ædema, scyrthi, & aliæ durities ab humoribus sanguine priuatis factæ, nunquam suppurantur: Inferunt ergo solum sanguineum humorem esse causam puris.

Antequam diluamus proposita argumenta, melius est, ut dicamus, quomodo res se habeat. Dicimus ex Galeno, non solum sanguineos humores in pus conuerteri posse, verum etiam cætera cretamenta corporis, quamuis maiori cum difficultate: Hinc Gal. 7. aph. 38. nabet viginti diebus suppurari in Thorace quod iunt à capite; addimus hanc minorem: at quod fluit à capite, & in pectus se colligit, est phlegma purum, ergo phlegma sine sanguine potest conuerteri in pus.

Præterea Hipp. & Gal. primo predictionem tex. 35. loquentes de tumoribus factis à frigidissimis humoribus dicunt humores frigidos tractu 60. dierum suppurari, si locus calidus sit; in pedibus enim, & brachijs ob distantiam à fonte caloris non possunt ullo tempore suppurari. Hinc in Thorace, ubi magnus calor est, 20. diebus humores pituitosi à capite delapsi suppurantur, in ventre 60. diebus, in pedibus nullo unquam tempore.

Gal. 3. præfag. 29. docet, quando expectanda sit conversio humorum in pus; ubi hæc leguntur, si vires robustæ sint, & humores calidi per excretionem sit iudicium: si frigidi, & vires robustæ, per abscessum: si calidi, & vires debiles sint per abscessum quoque indicantur; qui vero vires debiles, & humores frigidos habent, vel moriuntur, vel vix longo temporis interuallo humores concoquunt.

Ex ijs colligere possumus, quando fieri possit pus, & quando non: primo enim, si fuerint humores calidi, & vires robustæ, non fiet pus; & ratio est, quia humores calidi transpirant, & vires fortes expellunt per vias fallentes sensus nostros.

Hic notatur empiricorum quorundam error, qui tumoribus biliosis robusta existente virtute adiungunt suppurantia ex lacte, fatinis, & similibus quibus occluduntur pori, detinenturque acres vapores, detentique adeo effrenes euadunt, ut partem læsam, vel exedere incipiant, vel destruant, eaque in gangrænam desinat.

Semel vidimus erysipellam genæ dextræ emplasticis suppurantibus in gangrænam ob relativam causam terminatæ.

Iterum vidi Chirurgum imperium necasse hominē erysipelate in podice correptum his emplasticis: cautela est non solum, quia detinentur vapores acerrimi (ut diximus) verum etiam, quia genæ, mammillæ, nates ob molliorem facilitatem viuidus natiuus calor resoluitur: ubi igitur vires fuerint robustæ, & humores calidi; non convenient suppurantia, sed digerentia: si vero fuerint frigidi humores, & virtus robusta, per abscessum expectanda erit crisis.

Errant, qui in frigidis tumoribus, vel fluxionibus, quamvis robusta virtus sit, videntur digerentibus.

Ex ijs quoque colligimus ex frigidis humoribus fieri posse pus: hic quoque observatur illorum error, qui in vlcetibus vetustis pedum statim vtuntur lotionibus digerentibus. tenuem enim resoluunt, & crassum in scyrthosam dispositionem conuertunt: tunc si sanitate consequi desiderant, suppurantibus uti debent, quæ sola in pus conuertendo crassos, & frigidos humores partis circumstantis sanare possunt: si vero virtus sit debilis, & humores frigidi, vel moriuntur ægri; vel longo temporis spacio concoquunt.

Ratio colligitur ab Aristotele 2. sect. probl. 8. ubi dicit, lentum, & tenacem humorem tardè concoqui, quia difficilè diuiditur, & ad minima digeritur: si igitur virtus robuste difficilè potest etiam phlegma digerere, & ad minima

re; quantò maior erit difficultas, si calor fuerit debilis: erit igitur fermè impossibile, vt calore existente imbecillo, crassi, & frigidi humores digerantur, vel suppurantur.

Erat primum argumentum, quòd pus solùm fieret ex sanguine: quod negatur, quia sanguinea massa non est sola, & adæquata causa materialis puris; quinimò ostendimus pituitam existentem in cauitate pectoris ex Galeni sententia posse suppurari.

Quòd secundum argumentum de humore pituitoso perteniente ad articulos, quod non suppuratur; dicimus id euenire ob frigiditatem articulorum, dicimusque quòd si essent iidem humores pituitosi in ventre, vel in thorace, vbi calor vegetior est, in pus possent conuerti.

Demum, si experientiæ credendum sit, fateor, me semel vidisse quemdam iuuenem alioquin robustum, arthride catenatum ob destillantem catarrhum ca-

pice pulsum in genua, cui acciderit, vt pituita arthridem efficiens, in pus converteretur: quod experimentum, licet rarò accadat, cohæret tamen Galeni sententiæ 3. præfag. 29. dicentis in virtute valida frigidos humores per abscessum iudicari posse: nullum itaq; erit argumentum propositum, quòd humores frigidi non possint in pus conuerti.

Ex traditis in hoc libello patet, non dari substantias operantes, sed omnes potentias occultas esse in cathgoria qualitatis: patet quinetiam quæ esse possint genera, differentie, & initia occultarum qualitarum: ostensumque est, plurimos, qui tenent substantiam operari, prolapsos esse in monstruosas opiniones: Demum de modo cognoscendi venena; de putredine humorum, & à quo humore, & à quibus causis fiat pus; hæc enim omnia visa sunt pertinere ad ea, quæ peccare possunt secundum totam substantiam.

FINIS OCTAVI LIBRI.





SANCTORII SANCTORII

Olim

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIVM

In Quantitate peccantium Humorū perquirenda.

LIBER NONVS.

Quomodo per syndromem signorum quantitas peccantium humorum colligi possit. Cap. I.



Vperius de initijs reconditarum qualitarum, & de ijs, quæ substantia peccant, peregrimus: verum, quia quantitas immediatè substantiam sequitur, hic de quantitate peccantium humorum agemus; In pauca hanc speculationem conferemus, quia ex traditis in 6. libro, ubi cumulatissimè tractauimus de methodis cognoscendi humores, faciliè quoque copiam, seu quantitatem cuiuslibet humoris colligere poterimus. In præsentia iuvabit nos, si in exemplorum more illorum signorum concursus repetitionem fecerimus; excitabimus rudiorum animos, & promptos eos reddamus ad cognoscendam hanc peccantium humorum copiam.

Experiamur in primis traditos fontes pro cognoscenda bile, an ex illis quoque copiam, seu quantitatem biliosi succi colligere possimus: Fontes erant sex, causæ procatarticiæ, dispositiones patientis, morbi, symptomata, loci affecti, iuuantia, & lædèntia.

Causæ procatarticiæ gignentes bilem ad tria capita relata sunt, scilicet ad vicinitatem calidorum, ad motum, & ad alimentum: sub vicinitate est aer calidus temporis anni, vel regionis, vel constitutionis, vel hypo causti; præterea sunt balnea, vnguenta, & omnia calida, quæ tangendo nos calefacere possunt.

Sub motu, qui est revera caloris origo, est exercitium immoderatum, coitus, vigilia, animi passionēs, quæ sunt mætor, timor, gaudium, & ira.

Alimentum vel calefacit per se, vt aromata, & similia, vel per accidens, vt cibaria frigida, sed obstruentia: hæc enim bilem

tem aggregant: si patiens horum signorum omnium, seu plurimorum occasione fuerit excalescens, nullum erit ingenium adeo rectum, quod non videat in illo bilem copia peccare: sed veritas adhuc melius eluceſcet, si aliorum fontium signa non obſciterint.

Quare de ſecundo fonte loquamur, qui continet diſpoſitiones patientis; diſpoſitiones noſcuntur, cum per antecedentia, tum per conſequentia: ſigna antecedentia indicantia bilem ſunt hæc, patientem ex bilioſis eſſe ortum, eſſe macilentum, eſſe iuuenem cum venis latis; Conſequentia ſunt actiones animales, vt eſſe vigilem, mutabilem in ſententia, ingenio celerem, agilem in motu: vitales, vt eſſe iracundum, in venerem ſurere, pulſus habere veloces, & frontem totundam: naturales, in ſtomacho cibum nunquam eſſe moleſtum, aures plus debito bilioſis ſuccis ſcaterere, & alia plura, quæ legi poſſunt in 6. lib. ſi igitur hæc ſigna antecedentia, & conſequentia plurima in bilis productionem conſpirare obſeruauerimus, efficaciora argumenta depromemus, quod patiens ob copiam bilis laceretur.

Efficaciſſimum argumentum indicans copiam ſi in 3. 4. 5. & 6. fontibus inuenimus ſigna idem confirmantia; merebiturque vocari completam demonſtrationem, quia æquè docebit completa ſignorum communium ſyndrome, ac proprium quod vni ſoli, & ſemper conuenit.

In tertio fonte, ſi motus morbi fuerit velox, vt accidit in ardenti febre, in cryſtelle, & phreſi; ſi de tertio in tertium, idem coligeamus: ſimiliter, ſi motus paroxiſmorum fuerit celer, aliaque ſigna ſuperius declarata quoque conſpirent, alimenta quoque caleſcencia, nimius coitus aer æſtius, & animi paſſiones præceſſerint, hæc idem indicabunt.

In quarto fonte ſunt ſymptomata animalia, vt vigilia, ſitis intenſa, & ciborum inappetentia, quæ bilem eſſe copioſam ſignificant: dixit enim Galenus, dum de caſu Cleonaſtidis ſermonem habuit, quod ſitire, vigilare, & abhorreere à cibo conſtituant characterem bilioſorum ſucorum.

Quo ad naturalia ſymptomata bilem oſtendentia, ſunt expultrices deprauatæ

ſuntque excrementa ſlaua, præſina, vel æruginoſa, & alia in capite proprio declarata.

Quo ad qualitates mutatas, eſt citrinus color oculorum, & cæterarum partium corporis; amarities in ore: ſi multa, ex ijs in vnum conſpirare viderimus, non errabimus, ſi dixerimus bilem copioſam collectam eſſe.

Ad eundem modum oculos dirigemus in partes corporis affectas: ex traditis enim in 3. lib. cognoscemus, membranas præcipuè læſas indicare bilem: qui affectus ſi fuerit debito potentior eo maior illius ſpeciei bilis erit acceruius.

Demum ex iuuantibus, & lædentibus idem conſirmabitur, ſi inedia ægrum læſerit, quo magis lædatur, eo maior bilis copia indicabitur.

Quo ad pituitæ multitudinem attinet, ſi ex ſyndrome cognouerimus aliquam pituitæ ſpeciem peccare, vbi plura, & intenſiora fuerunt ſigna indicantia pituitam, ibi maior copia, & multitudo illius pituitæ aderit; quoniam in maiori quanto eiſdem ſpeciei & conditionis ſemper erit maior virtus.

Proponamus exemplum: Socrates portionibus, & obſonijs frigidis iam pridem altus eſt: à pituitofis parentibus oritur, vel ſenex eſtiſ morbo chronico, qualis eſt intemperies frigida, & humida ventriculi corripitur: & demum dolore grauatiuo laceratur: hæc quatuor ſigna à quatuor primis fontibus pituitam oſtendentibus deſumpta, certo certius indicabunt Socratem pituitæ multitudine vexari.

Si verò ijs ſignis addiderimus locos affectos, & iuuantia ſeu lædenda, quæ indicant pituitam, certitudo erit omnibus numeris abſoluta: loci affecti, qui pituitofis ſuccis præcipuè premuntur funt glandulæ, ventriculus, cerebrum & articuli: iuuantia ſunt euacuationes pituitoſorum ſucorum: lædenda ſunt frigida, & humida: verum, quia in 6. lib. cumulatiffimè de ijs ſignis egimus; ideo paucis in hoc loco de ijs dicendum.

Simili modo quantitas peccantis melancholia: perueſtigari poteſt: afferamus caſum, ex cuius obſervatione copioſa melancholia colligi poſſit: ſit patiens, qui indulſerit cibis calidis, & ſiccis, iſque ha-

beat dispositionem biliosam, quem admodum si esset à biliosis parentibus ortus, vel quod esset aliquod, de illis signis, quæ lib. 6. cap. de dispositione biliosa, scripta sunt; Idemque; patiens postquam passus sit tertianam febrem, in quartanam fuerit prolapsus: ijs positus nemo negabit, patientem hunc atra bile vexari: si vero in illo quarto, quinto, & sexto fonte signa ostendentia atram bilem inuenerimus in opinione confirmabimur, illum atram bilem, eaque copiosam lacerari.

Signa quarti fontis essent, si patiens scabie, leuce, vel simili corripitur affectu: quinti, si crura, vel mamillæ essent varicosæ.

Sexti signa sunt, si frigida, & humida iuuarent: dummodo in quolibet fonte inuenias apertum testimonium atræ bilis, non decipieris, si tunc copiosam atram bilem premere iudicaueris.

Eadem via quantitatem facis naturalis melancholiæ penetrabimus: Exempli causa, si viderimus ex signis primi fontis hoc adesse, quod scilicet patiens fuerit esculentis frigidis, & siccis, caseo, lacte, vino nigro altus: ex signis secundi, quod venæ tumide appareant: ex signis tertij, quod splen tumidus eum vexet, ex quarti, & cæterorum adsint aliquot ex illis in 6. lib. tradita; dicemus, illum fecerit melancholicam abundare, eoque abundantiotem esse, quo signa melius, & intensius appareant, humor non potest esse in pauca quantitate, & diu fuisse disposita viscera ab efficacissimis procacitatibus causis: neque affectus possunt esse debito truciore, & partes valde læsæ, & copia non ferire humores peccantes. Quod diximus de copia facis melancholiæ, eadem via est adusta dicendum, an copia peccet: De sanguinis vbertate non est hic agendum, quia cap. de polyæmia proposuimus signa; quæ nos sanguinis copiam indicare possunt.

Alia Methodus, qua perquiri possit humorum peccantium quantitas.

Cap. II.

POSumus quoque à posteriori peccantium humorum multitudinem per noscere, affectus posteriores, qui indicant

nimiam humorum quantitatem, sunt corporis grauitas cum contusione, lassitudo tensilis, tumor, durities, ruptura vasorum, & rigor siue caloris consecutione de his Galenus lib. de plenitudine vberissime scripsit.

Quod ob excrementorum copiam partes sentiantur graues, & quadam contusione oppressæ, est Galeni 1. method. cap. 2. qui dicit, quod partes viuentes patiantur ob multitudinem humorum, perinde ac ob extrinsecum pondus ingrauescant, & contendantur.

Inferre ergo poterimus ex sensu grauitatis in corpore esse humorum copiam: nec valere videtur versa vice, quod videlicet ubi sit copia humorum, ibi necessarium & semper grauitas, & contusio sentiantur: copiosum enim alimentum in robustum ventrem ingestum nullum pondus, nullamque grauitatem facit, quia ab alteratrice vinci potest: quinimo obseruamus tunc fortes homines potius sensum leuitatis perferentescere.

Similiter dum excrementa naturalia sunt copiosa, adherent tamen corpori aliquas suppetias, nullum pondus, vel grauitatem efficiunt: mesenterium, quia à copiosissima pituita intestinis lorice in morem adherente aliquid opis carpit non perferit copiosi humoris pondus: omne enim secundum naturam leuitatis sensum efficere solet, à lotio copioso vesica, donec frugem exhaurit, non ingrauescit, sed solum dum alendi virtute priuatur, vrina incipit grauitare, & mordere.

Hic obiter adagium huiusmodi vulgare scilicet, si vis sanus vinere meas sæpè, ut canis, reprehendi potest, quoniam ab vrina sine rorsu detenta vesica colligit voluptuosum fructus: similiter faeces intestinorum non grauitant, donec illis intestina pascuntur: valebimus ergo ex sensu grauitatis cum contusione colligere humorum copiam, sed non vice versa.

Galenus in Historia Virginis Larissæ, & Sileni ex grauitate colligebat copiam excrementorum: In virgine Larissæ erant tria symptomata ex quibus multitudo humorum colligebatur, scilicet grauitates capitis, dolor ocnlorum, & insolitus rubor faciei: In Sileno erat capitis grauitas, à qua similiter Galen. multitudinem peccan-

can.

cantiam humorum colligebat, sequitur ergo, vt nos quoque ex grauitatis sensu necessariò colligere possimus nimiam humorum quantitatem.

Præterea tensio sèpissimè insequi solet humorum multitudinem, sed non semper, quoniam fieri quoque potest à flatu extendente, & aliquando à siccitate partium, vt docet Galenus 12. method. cap. 7. dicens distensionem fieri à copia, vel siccitate: cognoscemus tensionem arguere multitudinem humorum, si tensio fuerit grauatiua; si fuerit sine grauitate, & siccitate flatuum copiam, si sine grauitate, & copia flatuum, dicemus tensionem siccitatem indicare.

Insuper ex tumore copiam humorum colligemus hoc præuiso, quod non fiat à flatu: Cognoscemus tensionem flatulentam ex sensu leuiritatis, tensionem vero ex humorum copia factam ex sensu grauitatis.

Ex duritie aliquando humores multitudine exuperare cognoscemus, post scilicet factum examen causerum, quibus omnia corpora durefcunt; causæ enim quibus partes corporis durefcere solent ex Galeno 5. simp. c. 5. tres sunt, quarum prima est siccitas, quæ in scyrthis obseruatur; Secunda est concretio, vt in glacie; tertia est humorum multitudo; quare si videris duritiem non esse ob scyrthium,

vel ob concretionem, faciliè colligere poteris esse ob multitudinem humorum.

Ex ruptura varforum, quia, si humores erunt in aliquo vase copiosi, vas faciliè patietur dieresim; Hinc Galenus 5. method. Inter cæteras causas dieresis posuit copiam & multitudinem humorum, dū enim viderimus diuisionem vasorum non fuisse factam à saltu, vel ab alia causa externa, vel à causa interna erodente inferre certò poterimus ob multitudinem humorum fuisse secutam.

Denum cum ratione diximus rigorem sine consecutione caloris arguere copiam humorum, quia Galenus dum loquitur de vxore Epicraris, dicit in illa muliere fuisse insignem copiam crudorum succorum, quia habuit rigorem sine caloris consecutione, dum enim à rigore excitatur calor, signum est adeo redundare frigidos humores, vt magis possit eorum frigiditas in refrigerando, quam putredinis caliditas in calefaciendo.

Ex dictis patet, quomodo ex syndrome signorum multitudo humorum cognosci possit, patet quinetiam, quomodo sine syndrome ex aliquo saltem signo propositorum idem scire possit, scilicet ex grauitate, tensione, duritie, tumore, ruptura, vel rigore sine caloris successione.

FINIS NONO LIBRI.



SANCTORII SANCTORII

Olin

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIVM

In reconditarum qualitarum in primis initijs perquirendis.

LIBER DECIMVS.

*Ostenditur, quod humores non moueantur
ex se, & proprio impetu, sed ab
alio. Cap. I.*

Acturi de ijs, quæ spectant ad motum localem peccantium humorum, agendum in primis se offert, an humores in corpore suomet ciantur impetu, vel alieno: suo, vt faciunt tum elementa, quæ grauitate, vel leuitate ascendunt, & descendunt, tum mista ex ijs, quæ, vt ait philosophus 1. celi tex. 12. à prædominante elemento mouentur: alieno, vt omnia externa, quæ videntur moueri ab alio violento motore.

Hæc res, quia apud Galenum est manifestissima, clara, æque prænitens in eius auctoritate æquo animo conquiescimus: habet enim 3. de facult. naturalibus cap.

13. quod humor non fluat à se, & proprio impetu, aliàs omnis fluxio ad inferiora fieret: sed vel à parte mittente, propellitur, vel à recipiente attrahitur. Clarius non potest hoc quæsitum decidere: primò habemus humores à se non moueri: deinde eos, qui aliter sentirent ducendo ad impossibile conuincuntur, quia, si humores ex se mouerentur, cum sint omnes aquei, & per consequens graues, sequeretur quod omnis fluxio fieret ad inferiora, perpetuòque sequeretur, quod hominum pedes essent tumidi, & caput sanguine, & cæteris recrementis priuatum, quod adeo reluctatur veritati, & experientia, vt nec oppillationes lateat, caput semper sanguine esse repletum; æquè enim humores obrepunt superiores, ac inferiores corporis partes, quinimmo, vt plurimum videmus in caput

ut sanguinem, & omnium generum excrementa facilius facultatum naturalium virtute insilire, quàm in pedes.

Accepto hoc fundamento à Galeno, quod scilicet humores suo non ciantur impetu, sed alieno: præstat hic, vt videamus quomodo moueantur: Galen. 3. de symp. causis cap. 4. habet moueri humores in viucentibus, vel quia transmittantur, vel quia attrahantur.

Duo itaque colligi possunt modi, & non plures, quibus mouentur humores, alter per transmissionem; alter per attractionem: Verum, vterius adhuc præstat, vt de hac re philosophemur, scilicet quot modis ab vna ad aliam partem humor transmitti possit: dicimus igitur primo aliquid transmitti, vel dum partes ab exteriori no frigore densantur, & roborantur: etenim robustiores reddite fortius expellunt humores excrementitios, qui deinde in debiliores particulas transmittuntur; Secundo, vel dum humores à calore liquefiunt, liquefacta enim, & fluidi facilius in alium locum ab expultrice facultate transmittuntur. Tertio dum ob imbecillitatem retentis defluunt excrementa: quarto humores transmittuntur, dum vis expultrix ob copiam, vel ob malam qualitatem, vel ob harum vtramque causam eos compellit.

Quo ad partes attinet, in quas transmittuntur humores, vel quæ suscipiunt, hæc debet esse cæteris debiliores, alioquin aliarum partium excrementa non susciperent, sed pro viribus repellerent: debiliores verò partes, quæ suscipiunt, vel sunt tales, quia hac sorte conditæ sunt, vbi non possint non suscipere cæterarum partium excrementa, quales sunt glandulæ, vel quæ debiles sunt ob intemperie, malam compositionem, vel solutam vnitatem: si enim sua natura viribus non sint exutæ, necessario dum implentur malis succis, earum vires debent reddi flaccidæ, & ferè perditæ ob malam valetudinem partium simularium, vel dissimularium.

Hanc doctrinam totam desumpsimus à Galeno 2. de fac. nar. c. 13. vbi habet hæc ferè verba, si in particula altera ab altera non est, ita non trahitur, sic altera in alteram, quod superuicinium est, à se deponit: & transeuntium ea viciat quæ est valentior:

subdi quod pars robusta in vicinam debiliorem reponit, & illa in aliam donec omnium imbecilliam inueniat.

Si vero humores non transmittantur, sed attrahantur à partibus suscipientibus tunc dicunt omnes, ob calorem, vel dolorem, vel vim vacui attrahis, si propriè loqui velimus melius est, vt dicamus, quod partes re vera non attrahant excrementa aliarum partium, quæ noxia, & incommoda illis sint, sed solum imbecillitatem suscipiant, quod non debent suscipere.

Hinc pars dolore correpta suscipit excrementa non quia attrahat, sed quia ob dolorem reddita sit imbecillis, & inepta ad expellendum excrementa à sanis partibus propulsa: adeo. n. à dolore partes redduntur imbecilles vt Gal. 5. meth. 4. dicat, quod nihil sit, quod magis proritet, & phlegmonas augeat quàm dolor: quia reddita parte imbecilli, confluunt excrementa aliarum partium in imbecilliores.

Neque opinio Asclepiadis est reiicienda dum dicit succos in parte dolore affectam confluere, & non attrahi ab illa.

Similiter pars aliqua corporis ob calorem præternaturam suscipit excrementa, non quia attrahat, sed quia ob calorem immoderatum redditur magis rara, idoneaque ad suscipienda aliarum partium excrementa: sicut enim frigidi est densare, ita calidi rarefacere.

Neque obijciant, si calor attrahat, quia reddat partem raram, sequitur, quod dolor excitatus à causa frigida, quæ densat partem dolentem, non possit esse causa attractionis, vel receptionis excrementorum.

Respondemus, dolorem à causa frigida eatenus attrahere, quatenus in parte dolente excitat calorem, est Galeni in methodo, quod dolor à causa frigida, factus calorem quoque excitet: eadem ratione vacuum suscipit excrementa, & non attrahit, quia, quod nihil est, neque attrahit neque expellit.

Colligimus ergo contra communem loquendi usum partes vi caloris, doloris, & vacui suscipere, & non attrahere excrementa: & has tres causas in vnicam tantum conuolare imbecillitatem: vacuum non est causa, vt recipiens recipiat ob aliam causam, nisi, quia ibi nulla est resisten-

tia similiter pars dolore affecta recipit, quia dolore vexata adeo redditur imbecillis, ut non possit resistere, & expellere aliarum partium excrementa: pars vero affecta calore suscipit, quia calor debilitat & rarefacit meatus, qui deinde suscipiunt, & excrementis implentur: hinc pars imbecillis frigida intemperie laborans nisi sit omnino viribus destituta, non suscipit, vel latijunt, attrahit aliorum excrementa, quia frigus magis potest in condensando, & muniendo partem, quam possit aliqua imbecillitas: humida tamen intemperies, quia laxat, ideo causa est, ut partes corporis flaccidæ promptè aliarum partium excrementa suscipiant.

Hinc in illam partem, ubi sunt tumores edematosi, plurima excrementa confluunt, quoniam nulla ferè est resistetia: quare attractio non fiet solum ratione caloris, doloris, vel vi vacui, sed ratione humiditatis, & omnium morborum, qui reddere possunt partes debiles, & imbecilles; & quamvis in scholis ab omnibus recipiatur, attractionem fieri ex Gal. ratione caloris, doloris, & vi vacui, nos dicimus, hac tres causas fuisse propositas, vel principales, nunquam tamen negavit Gal. attractionem posse quoque fieri ratione humiditatis, & cuiusvis imbecillitatis.

Neque obijciat, calorem lucernæ attrahere oleum sursum, ut conferuetur: ergo attractio fit ratione caloris.

Respondemus calorem attrahere oleum quatenus ratione caloris lucernæ oleum fit subtile, & uaporosum, de ratione vaporosi est ascendere: ecce quod calor non attrahit oleum, sed illud reddit vaporosum, & ut tale ascendit non attractum.

Negue analyticis principiis est consentaneum, quod attractio fiat per se ratione caloris, doloris, & vi vacui tantum: quia quando in eandem operationem multa conspirant, oportet, ut merito alicuius communioris, quod de omnibus prædicetur, id eueniat, & de illo solo per se primo dicatur: quævis ex triangulis solum sit scalenus, isosceles, & æquilaterum, qui habeant tres angulos æquales duobus rectis non tamè possumus dicere, quod habere tres angulos de illis prædicetur per se primo quia hoc attributum conuenit per se triangulo in communi, & deinde meri-

to communioris ad species refertur.

Similiter nos dicimus dum partes recipiunt, vel attrahunt excrementa aliarum partium, id non pendere per se à calore, dolore, & vi vacui, sed ab alio communiori, à quo vis attrahendi, vel suscipiendi dependet; & hæc est imbecillitas: Gal. enim lib. de causis morborum cap. 6. ait, naturam depellere id quod abundat in partes imbecilliores: dolor enim reddit partem imbecillam, calor imbecillam, & vacuam, quæ cum non resistat, in illam, tanquam in locum omnium imbecillimum excrementa confluunt; addas omnes morbos debilitantes, & robur auferentes esse causas, cur attrahantur, vel (ut melius dicamus) recipiantur excrementa.

Sola igitur pars mittens propriè habet vires mouendi humores, pars vero recipiens recipiendi, & nequaquam attrahendi: quam sententiam expressit Gal. 3. de facult. nat. 13. quod humores ex se non habeant motum, sed à parte mittente propellantur, vel à recipiente recipiuntur: non dixit à parte recipiente attrahi, sed recipi; Neque aduersatur nobis Arist. 7. phys. dum dicit, omnem motum violentum fieri tractu, pulsu, vel utroque, quia in exercitijs mechanicis omnes ij tres modi obseruantur; In viucentibus verò corporibus non tractu, seu potius pulsu dicimus moueri humores præter naturam; verum, quia in lib. de reuersione iterum agemus de hac re, hic finem facimus.

Quod sex sint modi, & non plures, quibus pars mittens est fluxionis origo Cap. II.

IN superiori capite ostendimus, empiricos de motu humorum loquentes bifariam a veris medicinæ fundamētis deflectere, primò, dum putant humores ex se, & proprio impetu moueri, quod (ut ostensum est) Galeno, & veritati reluctatur; Secundò, dum credunt partes recipientes propriè, & per se attrahere humores præter naturam.

Nunc sequitur, ut de parte mittente videamus, quomodo mittat humores; & an semper, dum mittit, læsa sit. Si quæ contemplatio medica in curandis affectibus emolumentum præstet, hæc erit; namque, si in qualibet fluxione pars mittens esset læsa, medicus tractans morbum à fluxione

ne factum duas semper deberet ægritudines curare, illam uidelicet, quæ est partis recipientis, & illam, quæ est partis mittentis, sin uerò nulla est necessitas, quod pars mittens semper sit læsa, non esset in fluxionibus curandis semper eodem modo laborandum.

Tres in primis a Gal. 3. de sympr. causis c. 4. proponuntur causas, quibus pars mittens cogitur transnittere humores in alias partes, quæ sunt humorum copia, qualitas mordax, & utraq; simul, scilicet copia cum qualitate mordaci unita.

Dum ab humorum copia tantummodo grauatur expultrix, cogitur transnittere in alias partes, ut sarcina humorum liberetur, & meliorem sanitatis gradum adipiscatur: tunc pars mittens, cum in sanitate confirmetur, nullo modico auxilio indiget: Cæcutiunt tamen, & uacillant Empirici, qui sæpè partes mittentes sanas in omni fluxione curanda importunè tractant præsidij chirurgicis, & pharmaceuticis. Semperque fluxiones astringentibus putant esse cohibendas, quod sæpè miseris patientibus difficultates, & aliquando exitum adfert.

Audias quomodo malè se gessit Empiricus in curanda hac fluxione sanguinea à copia sanguinis solum prouenies: Accidit semel cuidam athletæ, ut sanguis copia peccans ascenderet, & per uenas capitis in pectus sensim deflueret, & per tussim eiiceretur; empiricus mulierariam Athletam lacerabat, primò utebatur saccharo rosato, syrupo myrtino, & bolo armeno, quorum astringentiũ usus maximo erat impedimento naturæ tunc rectè operanti: Secundo eadem die dabat philonium, & diacodium, ur sifteret fluxionem, quâdo natura melius operari non poterat, quam copiosissimum sanguinem minueret; nullus error maior fieri poterat, quâ in sanguine copia peccante, nulla qualitate irritante, uti astringentibus, & refrigerantibus, quæ fluxum sanguinem in pectus cohibere possunt.

Galenus, qui nos omnia docet, præiudicium commune hoc erratum empiricorũ, qui materia exigente in pectore vtuntur diacodio, & philonio 1. de alimentorum facul. cap. 31. dum loquitur de papauere, à quo diacodium, & philonium suas ui-

res accipiunt, dicit, quod impedit, ne collecti humores è pectore egrediantur; hæc sunt uerba, inhihet papauer præterea, quæ ex thorace, ac pulmone tussè expuuntur; maxime igitur mirari debemus empiricorum nostri temporis inscitiam, quia ut plurimum, dum collectus est catarthus inhihet, ut dicit Galenus, quæ ex thorace tussè expuantur: consert solum diacodium, ut ibidem docet, ijs, qui catarthis fluxu tenui defluentibus, & non fluxis in pectore instantibus, fluxus enim aperienda est via ut re pant, quod expetiatur iuxta Galenum 2. in 6. de morb. vulgar. tex. 28.

Quod fiet expectorantibus validissimis: Si uerò patientes sint debiles, excitatur sternutamenta ut illo impetu reiciantur ea, quæ tussiendo non possunt: Audias casum in hoc proposito: Gal. 2. de sympr. caus. c. 5. habet hæc, indigentes nonnulli sputi per thoracè & pulmonè reiectione: quia sint imbecilli facultate, sternutamenta sibi fiunt, ut ob motionis impetum expuant ea quæ antea tussiendo non poterant.

Quando uero humores propellantur, quia solum copia peccant, tum ex lib. nono, tum ex sufficienti partium enumeratione cognoscemus: hunc in modum fieri sufficiens enumeratio, non præcæsit frigus densans, vel calor liquefaciens, neq; pars mittens fuit valde imbecillis, vel à mordaci qualitate molestata, quod cognoscemus ex methodis traditis in 5. & 6. lib. ergo pars mittens solum ab humorum copia coacta propellit.

An uero pars mittens illos gignat humores, vel aliunde recipiat, cognoscemus ex ijs, quæ dicta sunt de locis aff. 1. & 6. lib. Demum quomodo cognoscatur, an in parte mittente sit læsio per consensum, vel per essentiam, & ubi collocetur idio-pathia, vel protopathia, in 2. lib. ca. 3. proposuimus methodum, quia hæc omnia distinguui possint.

Secunda causa, qua pars mittens propellit, est qualitas mordax: quam cognoscemus, si uiderimus humores æstuarè, & ægrotantes feruere: Quæ uero esse possit determinata qualitas irritans, & mordax, ex dictis in 6. lib. ubi egimus de signis indicantibus succos calidos, salfos, & adustos cognoscemus.



SANCTORII SANCTORII

Olini

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIUM

In reconditarum qualitarum in primis initijs perquirendis.

LIBER VNDECIMVS.

Prohemium.

Acturi in quinque sequentibus libris de præstantissima illa Medicinæ parte, quæ pertinet ad solertiam pro inueniendis remedijs: iudicauimus fore necessarium, vt in hoc libello prius ostenderemus, quod a fonte analytico omnes proprietates, & conditiones indicationum, & omnia methodi principia, quorum virtute Galen. & ante ipsum Hippocrates potuerunt artificiosissimam medendi methodum constituere, exhaustiantur; clara est opinio Galeni 2. meth. cap. 6. vbi proponit, se in tota methodo solum de logica tractaturum, par igitur erat, vt scirel videremus, vnde Galenus hanc logicam desumpserit, cuius virtute tam præclaram medendi methodum potuerit in lucem promere:

Deinde ostendemus, quod omnes viæ ab Empiricis, vel Methodicis inuentæ pro auxilijs inueniendis vacillent, & in numero paralogismorum collocentur.

Tres præcipue fuerunt medicorum sectæ, Empirica, Methodica, & Dogmatica: omnes tamen crediderunt Hippocratem fuisse suæ sectæ auctorem.

In Empirica floruit Acro, qui, ex Gal. libro de subfiguratione empirica c. 7. fuit primus, qui de hac secta scripsit, deinde secuti sunt illum Rasis, Serapio, & alij plures: quorum nomina citantur a Gal. 2. meth. vltimo, vbi præter Serapionem ponuntur Menodotus, Theodas, Glaucius, Apollonius, Calicles, Theodorus, Heraclides, & Lycus; ij non quærebant causas, quia putabant, illas esse incognoscibiles, sed solum ex symptomatum syndrome eligebant remedium ab alijs inuentum: Dum laborabant pro inueniendis reme-

remc-

remedijs, ad hæc tria confugiebant, ad *errores* scilicet inspectionem propriam, ad historiam, & ad analogismum: vtebatur analogismo, idest argumento à simili in his tribus, in materijs auxiliorum, in affectibus & locis affectis.

In Methodica Themison, & Sotanus fuerunt præcipui, temporeque Neronis floruit quoque Thesalus, qui esse Plinio tam grandem pecuniam, & existimationem acquisivit, ut in via Appia in illius monumento de ipso legeretur, quod fuerit *sat peritus* idest victor Medicorum: Aulus est in Epistola, quam misit ad Neronem (referente Galen. primo methodi cap. 2.) de se ipso hæc dicere: „cum novam sectam condiderim quæ sola vera est; quia qui ante me medici fuerunt, nihil utile prodiderunt uel ad sanitatem tuendam uel morbos propulsandos. Subdit, Hippocrates noxia præcepta tradidit sed addidit Galenus, dum contradicit Hippocrati, id efficere in surdo Theatro: quia illi nemo respondet, & id acquisivisse, quod celebrat, & clarus Zalus, qui Homeris statuum flagellavit, & Salmones, qui Iovem est imitatus, isti Methodici.

Putabant sex mensem curriculo totam artem medicam posse addicere; etenim omnes morbos solum referebant ad communissimam, scilicet ad laxum, densum, & ex ijs mixtum: in ijsque quiescebant: neque ad specificas differentias morborum descendebant.

Indogmatica, cuius sectæ auctor reuera est Hippocrates, quem Gale. Auenennas, & innumerabiles sequuntur, alio ingenij acuminis, alioque spiritu artem medicam construxit; empirici enim analogismo fallaci, & deceptorio incedebant; dogmatici demonstrationibus cum experientia iuncti s philosophabantur.

Methodici in communissimis persistebant; dogmatici non solum generalissimas indicationes expendunt, sed, ut dicit Galenus 2. method. 7. & 1. meth. 1. & alibi à generalissimis ad subalternas, & à subalternis ad specificas differentias cognoscendas procedunt, habentque artem præclare fundatam, & in perquirendis remedijs servant veras artis conditiones, exordiuntur à fine, ordine scilicet resolutivo, & nunquam desistunt, donec ad

ultimas perveniant differentias; quem procedendi modum esse perfectæ artis conditionem docet Galenus 1. meth. 7. Aristoteles 7. metaph. tex. 23. & 3. de moribus cap. 3. ubi dicit, artis ordinem esse à fine, 6. de moribus cap. 5. & 7. cap. 8. ubi dicit in actionibus finem esse principium sicuti in mathematicis suppositiones; hoc resolutivo ordine Galenus, & Auerroes in suo colligit totam artem medicam tradiderunt.

Dogmaticos igitur insequemur, qui virtute indicationum potuerunt hæc frugiferam methodum componere; ostendimusque, quod principia methodi, proprietates, & conditiones indicationis à fonte analytico desumptæ, & quod aliter viæ, quæ per analogismum empiricum, & experientiam sine demonstratione procedunt, sint ineptæ, & quæ per falsos syllogismos, & petitiones principiorum ad communissimam errata sectatores perducant ad quos duos fallēdi modos quælibet falsa methodus sit in medicina, sit in physica, & denique sit in Iurisprudentia, reducit, & quælibet bona, & vera virtute logices cognoscitur: quinimmo in nullum prælabemur errorum, qui non accidat ad logices imperitiam: Ita enim ex Galeno loco (superius citato est omnium methodorum prima radix: quinimmo Gal. lib. de caus. procacitatis vocat temerarios, qui tractant decreta medica, & philosophica sine logica peritia. Præterea lib. de sectis dicit non solum anatomiam esse medico necessariam, sed etiam logicam, ne aliquando propter iophismata decipiamur.

Ostenditur ex Aristotele, & Galeno per solam indicationem methodo incedendum esse nequaquam per experientiam, & analogismum. Cap. II.

Si inquam logica facultas aliquid præstitit operi medicinæ, in præsentia sum. num asserti enolum: num, quia agendo de virtute methodi, ne verbum quidem moveri potest; nisi id prius ab analytico fonte desumatur, & secundum leges logicas decidatur: hæc sententia videtur esse Galeni 2. method. cap. 6. ubi utitur ijs verbis; de experientiali inuentione



SANCTORII SANCTORII

Olini


IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIVM

In reconditarum qualitatum in primis initijs perquirendis.

LIBER VNDECIMVS.

Prohemium.

 Crut in quinque sequentibus libris de præstantissima illa Medicinæ parte, quæ pertinet ad solertiam pro inueniendis remedijs : iudicauimus fore necessarium, vt in hoc libello prius ostenderemus, quod a fonte analytico omnes proprietates, & conditiones indicationum, & omnia methodi principia, quorum virtute Galen. & ante ipsum Hippocrates potuerunt artificiosissimam medendi methodum constituere, exhaustantur; clara est opinio Galeni 2. method. cap. 6. vbi proponit, se in tota methodo solum de logica tractaturum, par igitur erat, vt semel videremus, vnde Galenus hanc logicam desumpserit, cuius virtute tam præclaram medendi methodum potuerit in lucem promere :

Deinde ostendemus, quod omnes viæ ab Empiricis, vel Methodicis inuentæ pro auxilijs inueniendis vacillent, & in numero paralogsismorum collocentur.

Tres præcipue fuerunt medicorum sectæ, Empirica, Methodica, & Dogmatica: omnes tamen crediderunt Hippocratem fuisse suæ sectæ auctorem.

In Empirica floruit Acro, qui, ex Gal. libro de subfiguratione empirica c. 1. fuit primus, qui de hac secta scripsit, deinde secuti sunt illum Rasis, Serapio, & alij plures: quorum nomina citantur à Gal. 2. meth. ultimo, vbi præter Serapionem ponuntur Menodorus, Theodas, Glaucius, Apollonius, Calicles, Theodorus, Heraclides, & Lycus; ij non quærebant causas, quia putabant, illas esse incognoscibiles, sed solum ex symptomatum syndrome eligeabant remedium ab alijs inuentum : Dum laborabant pro inueniendis

remed-

remedijs, ad hæc tria confugiebant, ad *virtutem* scilicet inspectionem propriam, ad historiam, & ad analogiismum: utebatur analogiismo, idest argumento à simili in his tribus, in materijs auxiliorum, in affectibus & locis affectis.

In Methodica Themison, & Soranus fuerunt præcipui, temporeque Neronis floruit quoque Thesalus, qui esse Plinio tam grandem pecuniam, & existimatione acquisiuit, ut in via Appia in illius monumento de ipso legeretur, quod fuerit *lat perix* idest victor Medicorum: Aulus est in Epistola, quam misit ad Neronem (referente Galen. primo methodi cap. 2.) de se ipso hæc dicere: „cum novam sectam condiderim quæ sola vera est; quia qui ante me medici fuerunt, nihil utile proderunt nel ad sanitatem tuendam vel morbos propulsiandos. Subdit, Hippocrates noxia præcepta tradidit sed addit Galenus, dum contradicit Hippocrati, id efficere in surdo Theatro: quia illi nemo respondet, & id acquisuisse, quod celeberrimus, & clarus Zalus, qui Homeris statuam flagellavit, & Salmenes, qui Iovem est imitatus, isti Methodici.

Putabant sex mensium curriculo totam artem medica posse addici; etenim omnes morbos solum referebant ad communissima, scilicet ad laxum, densum, & ex ijs mixtum: in ijsque quiescebant: neque ad specificas differentias morborum descendebant.

In dogmatica, cuius sectæ auctor reverendus est Hippocrates, quem Gale. Auenennas, & innumerabiles sequuntur, alio ingenij acumine, alioque spiritu artem medicam construxit; empirici enim analogismo fallaci, & deceptorio incedebant; dogmatici demonstrationibus cum experientia iuncti s philosophabantur.

Methodici in communissimis peristebant; dogmatici non solum generalissimas indicationes expendunt; sed, ut dicit Galenus 2. method. 7. & 1. meth. 1. & alibi à generalissimis ad subalternas, & à subalternis ad specificas differentias cognoscendas procedunt, habentque artem præclarè fundatam, & in perquirendis remedijs servant veras artis conditiones, exordiuntur à fine, ordine scilicet resolutivo, & nunquam desistunt, donec ad

ultimas perveniant differentias; quem procedendi modum esse perfectæ artis conditionem docet Galenus 1. meth. 7. Aristoteles 7. metaph. tex. 23. & 3. de moribus cap. 3. ubi dicit, artis ordinem esse à fine, 6. de moribus cap. 5. & 7. cap. 8. ubi dicit in actionibus finem esse principium sicuti in mathematicis suppositiones; hoc resolutivo ordine Galenus, & Auerroes in suo colligit totam artem medicam, tradiderunt.

Dogmaticos igitur insequemur, qui virtute indicationum potuerunt hæc frugiferam methodum componere; ostendemusque, quod principia methodi, proprietates, & conditiones indicationis à fonte analytico desumptæ, & quod aliter viæ, quæ per analogiismum empiricum, & experientiam sine demonstratione procedunt, sunt ineptæ, & quæ per falsos syllogismos, & petitiones principiorum ad communissima errata sectatores perducant: ad quos duos falsi modos quælibet falsa methodus sit in medicina, sit in physica, & denique sit in Iurisprudencia, reducitur, & quælibet bona, & vera virtute logica cognoscetur: quinimo in nullum prolabemur erroris, qui non accidat ad logices imperitiam: Illa enim ex Galeno loco superius citato est omnium methodorum prima radix: quinimo Gal. lib. de caus. procatarcticis vocat temerarios, qui tractant decreta medica, & philosophica sine logica peritia. Præterea lib. de sectis dicit non solum anatomiam esse medico necessariam, sed etiam logicam, ne aliquando propter sophismata decipiamur.

Offenditur ex Aristotele, & Galeno per solam indicationem methodo incedendum esse nequaquam per experientiam, & analogiismum. Cap. II.

Si inquam logica facultas aliquid præstitit opis medicinae, in presentia tamen affirmari enolum: nolum, quia agendum quidem moveri potest; nisi id prius ab analytico fonte desumatur, & secundum leges logicas decidatur: hæc sententia videtur esse Galeni 2. method. cap. 6. ubi utitur ijs verbis: de experientiali inventionem



SANCTORII SANCTORII

Olim

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIVM

In reconditarum qualitatum in primis initijs perquirendis.

LIBER VNDECIMVS.

Prohemium.

Acturi in quinque sequentibus libris de præstantissima illa Medicinæ parte, quæ pertinet ad solertiam pro inveniendis remedijs : iudicauimus fore necessarium, vt in hoc libello prius ostenderemus, quod a fonte analytico omnes proprietates, & conditiones indicationum, & omnia methodi principia, quorum virtute Galen. & ante ipsum Hippocrates potuerunt artificiosissimam medendi methodum constituere, exhaustantur; clara est opinio Galeni 2. method. cap. 6. vbi proponit, se in tota methodo solum de logica tractaturum, par igitur erat, vt semel videremus, vnde Galenus hanc logicam desumpserit, cuius virtute tam præclaram medendi methodum potuerit in lucem promere:

Deinde ostendemus, quod omnes viæ ab Empiricis, vel Methodicis inuentæ pro auxilijs inveniendis vacillent, & in numero paralogismorum collocentur.

Tres præcipue fuerunt medicorum sectæ, Empirica, Methodica, & Dogmatica: omnes tamen crediderunt Hippocratem fuisse suæ sectæ auctorem.

In Empirica floruit Acro, qui, ex Gal. libro de subfiguratione empirica c. 1. fuit primus, qui de hac secta scripsit, deinde secuti sunt illum Rasis, Serapio, & alij plures: quorum nomina citantur à Gal. 2. meth. vltimo, vbi præter Serapionem ponuntur Menodotus, Theodas, Glaucius, Apollonius, Calicles, Theodorus, Heraclides, & Lycus; ij non quærebant causas, quia putabant, illas esse incognoscibiles, sed solum ex symptomatum syndrome eligeabant remedium ab alijs inuentum: Dum laborabant pro inveniendis

remc-

remedijs, ad hæc tria confugiebant, ad *analogiam* scilicet inspectionem propriam, ad historiam, & ad analogismum: utebatur analogismo, id est argumento à simili in suis tribus, in materijs auxiliorum, in affectibus & locis affectis.

In Methodica Themison, & Soranus fuerunt præcipui, temporeque Neronis floruit quoque Thesalus, qui esse Plinio tam grandem pecuniam, & existimationem acquisivit, ut in via Appia in illius monumento de ipso legeretur, quod fuerit *lax periti* id est victor Medicorum: Aulus est in Epistola, quam misit ad Neronem (referente Galen. primo methodi cap. 2.) de se ipso hæc dicere: „cum novam sectam condiderim quæ sola vera est; quia qui ante me medici fuerunt, nihil utile prodiderunt vel ad sanitatem tuendam vel morbos propulsandos. Subdit, Hippocrates noxia præcepta tradidit sed addidit Galenus, dum contradicit Hippocrati, id efficere in surdo Theatro: quia illi nemo respondet, & id acquisivisse, quod celebret, & clarus Zalus, qui Homeris statuum flagellavit, & Salmenes, qui Iovem est imitatus, isti Methodici.

Putabant sex mensium curriculo totam artem medicam posse addisci; etenim omnes morbos solum referebant ad communissimam, scilicet ad laxum, densum, & ex ijs nullum in ijsque quiescebant: neque ad específicas differentias morborum descendebant.

In dogmatica, cuius sectæ auctor revera est Hippocrates, quem Gale. Auenennas, & innumerabiles sequuntur, alio ingenij acumine, alioque spiritui artem medicam construxit; empirici enim analogismo fallaci, & deceptorio incedebant; dogmatici demonstrationibus cum experientia iuncti s philosophabantur.

Methodici in communissimis perstebant; dogmatici non solum generalissimas indicationes expendunt; sed, ut dicit Galenus 2. method. 7. & 1. meth. 1. & alibi à generalissimis ad subalternas, & à subalternis ad específicas differentias cognoscendas procedunt, habentque artem præclare fundatam, & in perquirendis remedijs servant veras artis conditiones, exordiuntur à fine, ordine scilicet resolutivo, & nunquam desistunt, donec ad

ultimas perveniant differentias; quem procedendi modum esse perfectæ artis conditionem docet Galenus 1. meth. 7. Aristoteles 7. metaph. tex. 23. & 3. de moribus cap. 3. ubi dicit, artis ordinem esse à fine, 6. de moribus cap. 5. & 7. cap. 8. ubi dicit in actionibus finem esse principium sicuti in mathematicis suppositiones; hoc resolutivo ordine Galenus, & Auerroes in suo colligit totam artem medicam tradiderunt.

Dogmaticos igitur insequemur, qui virtute indicationum potuerunt hæc frugiferam methodum componere; ostendemusque, quod principia methodi, proprietates, & conditiones indicationis à fonte analytico desumptæ, & quod aliæ viæ, quæ per analogismum empiricum, & experientiam sine demonstratione procedunt, sint ineptæ, & quæ per falsos syllogismos, & petitiones principiorum ad communissimam errata sectatores perducant: ad quos duos falsi modos quælibet falsa methodus sit in medicina, sit in physica, & denique sit in Iurisprudentia, reducitur, & quælibet bona, & vera virtute logices cognoscitur: quinimo in nullum prolabemur erroris, qui non accidat ad logices imperitiam: illa enim ex Galeno loco superius citato est omnium methodorum prima radix: quinimo Gal. lib. de caus. procacitatis vocat temerarios, qui tractant decreta medica, & philosophica sine logica peritia. Præterea lib. de sectis dicit non solum anatomiam esse medico necessariam, sed etiam logicam, ne aliquando propter philosophata decipiamur.

Ostenditur ex Aristotele, & Galeno per solam indicationem methodo incedendum esse nequaquam per experientiam, & analogismum. Cap. II.

SI inquam logica facultas aliquid præstitit opis medicinæ, in præsentia lumen affert emolumentum, quia agendo de virtute methodi, ne verbum quidem moveri potest; nisi id prius ab analytico fonte desumatur, & secundum leges logicas decidatur: hæc sententia videtur esse Galeni 2. method. cap. 6. ubi unitur ijs verbis; de experimentalium inveni-

tione



SANCTORII SANCTORII

Olini

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIVM

In reconditarum qualitatum in primis initijs perquirendis.

LIBER VNDECIMVS.

Prohemium.

Acturi in quinque sequentibus libris de præstantissima illa Medicinæ parte, quæ pertinet ad solertiam pro inveniendis remedijs: iudicauimus fore necessarium, vt in hoc libello prius ostenderemus, quod a fonte analytico omnes proprietates, & conditiones indicationum, & omnia methodi principia, quorum virtute Galen. & ante ipsum Hippocrates potuerunt artificiosissimam medendi methodum constituere, exhaustantur; clara est opinio Galeni 2. method. cap. 6. vbi proponit, se in tota methodo solum de logica tractaturum, par igitur erat, vt semel videremus, vnde Galenus hanc logicam desumpsit, cuius virtute tam præclaram medendi methodum potuerit in lucem promovere:

Deinde ostendemus, quod omnes viæ ab Empiricis, vel Methodicis inuentæ pro auxilijs inveniendis vacillent, & in numero paralogismorum collocentur.

Tres præcipue fuerunt medicorum sectæ, Empirica, Methodica, & Dogmatica: omnes tamen crediderunt Hippocrati fuisse suæ sectæ auctorem.

In Empirica floruit Aëro, qui, ex Gal. libro de subfiguratione empirica c. 1. fuit primus, qui de hac secta scripsit, deinde secuti sunt illum Rasis, Serapio, & alij plures: quorum nomina citantur à Gal. 2. meth. vltimo, vbi præter Serapionem ponuntur Menodorus, Theodas, Glaucius, Apollonius, Calicles, Theodorus, Heraclides, & Lycus; ij non quærebant causas, quia putabant, illas esse incognoscibiles, sed solum ex symptomatum syndrome eligebant remedium ab alijs inuentum: Dum laborabant pro inveniendis

remed-

remedijs, ad hæc tria confugiebant, ad *utroque* scilicet inspectionem propriam, ad historiam, & ad analogismum: utebatur analogismo, idest argumento à simili in his tribus, in materijs auxiliorum, in affectibus & locis affectis.

In Methodica Themison, & Soranus fuerunt præcipui, temporeque Neronis floruit quoque Thesalus, qui esse Plinip tam grandem pecuniam, & existimatione acquisiuit, ut in via Appia in illius monumento de ipso legeretur, quod fuerit *lat perius* idest victor Medicorum: Aulus est in Epistola, quam misit ad Neronem (referente Galen. primo methodi cap. 2.) de se ipso hæc dicere: „cum novam sectam copdiderim quæ sola vera est; quia qui ante me medici fuerunt, nihil utile prodiderunt vel ad sanitatem tuendam vel morbos propulsandos. Subdit, Hippocrates noxia præcepta tradidit sed addit Galenus, dum contradicit Hippocrati, id efficere in surdo Theatro: quia illi nemo respondet, & id acquisivisse, quod celeberrimus, & clarus Zalus, qui Homeris statuam flagellavit, & Salmenes, qui Iovem est imitatus, isti Methodici.

Putabant sex mensium curriculo totam artem medica posse addisci; etenim omnes morbos solum referebant ad communissimam, scilicet ad laxum, densum, & ex ijs mixtum: in ijsque quiescebant: neque ad specificas differentias morborum descendebant.

Indogmatica, cuius sectæ auctor reverentissimus Hippocrates, quem Gale. Auctennas, & innumerabiles sequuntur, alio ingenij acumine, alioque spiritu artem medicam construxit; empirici enim analogismo fallaci, & deceptorio incedebant; dogmatici demonstrationibus cum experientia iunctis philosophabantur.

Methodici in communissimis persistebant; dogmatici non solum generalissimas indicationes expendunt; sed, ut dicit Galenus 2. method. 7. & 1. meth. 1. & alibi à generalissimis ad subalternas, & à subalternis ad specificas differentias cognoscendas procedunt, habentque artem prælatè fundatam, & in perquirendis remedijs servant veras artis conditiones, exordiuntur à fine, ordine scilicet resolutivo, & nunquam desistunt, donec ad

ultimas perveniant differentias; quem procedendi modum esse perfectæ artis conditionem docet Galenus 1. meth. 7. Aristoteles 7. metaph. tex. 23. & 3. de moribus cap. 3. ubi dicit, artis ordinem esse à fine, 6. de moribus cap. 5. & 7. cap. 8. ubi dicit in actionibus finem esse principium sicuti in mathematicis suppositiones; hoc resolutivo ordine Galenus, & Auerroes in suo colligit totam artem medicam tradiderunt.

Dogmaticos igitur insequemur, qui virtute indicationum potuerunt hæc frugiferam methodum componere; ostendimusque, quod principia methodi, proprietates, & conditiones indicationis à fonte analytico desumptæ, & quod aliter viæ, quæ per analogismum empiricum, & experientiam sine demonstratione procedunt, sint ineptæ, eæque per falsos syllogismos, & petitiones principiorum ad communissima errata sectatores perducant ad quos duos fallidos modos quælibet falsa methodus sit in medicina, sit in physica, & denique sit in Iurisperdentia, reduciur, & quælibet bona, & vera virtute logica cognoscitur: quinimo in nullum prælabemur erroris, qui non accidat ad logices imperitiam: Illa enim ex Galeno loco superius citato est omnium methodorum prima radix: quinimo Gal. lib. de caus. procacitatis vocat temerarios, qui tractant decreta medica, & philosophica sine logica peritia. Præterea lib. de sectis dicit non solum anatomiam esse medico necessariam, sed etiam logicam, ne aliquando propter iophismata decipiamur.

Ostenditur ex Aristotele, & Galeno per solam indicationem methodo incedendum esse nequaquam per experientiam, & analogismum. Cap. II.

Si inquam logica facultas aliquid præstitit opis medicinae, in presentia sum. num asserti enolum: nuntum, quia agendum de virtute methodi, ne verbum quidem moneri potest; nisi id prius ab analytico fonte desumatur, & secundum leges logicas decidatur: hæc sententia videtur esse Galeni 2. method. cap. 6. ubi utitur ijs verbis; de experientiali inuentione

tione alibi egimus, de logica in his commentarijs differere proposuimus.

Quod verò in meth. solum per indicationem perquirantur remedia, & nequaquam per analogismum, & experientiam nunc facile colligi potest ex Galeno 1. method. cap. 4. ubi dicit, institutum esse sermonem habere de remedijs, quæ non empiriæ, sed methodo, & per indicationem inueniuntur: idem confirmat 2. meth. cap. 7. quare methodo inuenire erit per solam indicationem auxilia deprehendere: excludit igitur experientiam, & analogismum, quibus empirici in remedijs perquirendis vtebantur: deinde 12. method. 5. habet, si alteratio in spiritu fiat, vel ab aliquo venefico, vel à quolibet alio veneno, esse negotium extra methodum medendi, & ratio est, quia non potest indicatione comparari, sed alio instrumento, experientia scilicet, & analogismo.

Cæterum, quia ab initio constituimus analyticis principijs philosophari, quibus Galenus quoque potuit methodum, & alia immensa volumina in lucem promere, idcirco ab hoc fonte desumemus rationes, cur à methodo solum indicatio, & nequaquam experientia, & analogismus comprehendatur.

Aristoteles 2. priorum cap. de inductione dicit, methodum habere formam syllogismi: Quo fit, ut merito colligere possimus methodum ab vniuersali procedere, nullus enim est syllogismus qui non sit fundatus in dicto de omni, uel de nullo: colligimusque, analogismum, & experientiam non pertinere posse ad methodum, quia ex particularibus solum procedunt.

Insuper 3. priorum loquens de diuisione dicit, quod diuisio est parua particula methodi, quia diuisio est imbecillis syllogismus, ex quibus verbis rectè colligit in illo loco Alexander Aphrodisæus, quod Aristoteles per methodum intelligat perfectum syllogismum: quare neque experientia, neque analogismi, qui carent virtute illatrice, ut infra melius patebit, spectabunt ad methodum, sed indicatio sola, quæ non à particularibus, sed ab vniuersalibus procedit.

Ex Galeno idem patebit, etenim 4. method. declarans quid sit methodus, dicit,

esse viam vniuersalem, quæ potest cuiuslibet singulari applicari: methodus re vera non esset bona via, nisi ab vniuersali ad minus vniuersale cum illatione procederet: cæteræ enim omnes viæ, quæ à singularibus ad vniuersale procedunt, sicuti sunt exempla inductiones imperfectæ, analogismi, & experimenta, sunt explosæ & reiectæ ab optimo syllogismo, ut inconcludentes, & necessitate omnino earentes: methodus tamen, cum à fine ad ordinata in finem procedat, erit syllogismus à priori, & à causa finali procedens, in numero syllogismorum concludentium collocabitur.

Galenus 3. method. 9. causam, impedimentum, & vrgens, quæ verè indicant, vocat fines, indicatio vero, cum ex materia cognita indicantis procedat, ostendit & insinuat remedia, quæ antea erant tenebris inuoluta: sola ergo, & unica indicatio ad methodum medendi pertinebit.

Amplius illud sciendi instrumentum ad methodum medendi pertinebit, quod est ab vniuersali ostendi potest exemplis, quod omnia remedia, quæ particularibus applicantur, si aliquid boni, vel mali efficiant, id virtute specifica fiat: si tertiana Socratis tollatur rhabarbari drachma, id fit tum ratione illius specificæ rhabarbari virtutis, tum ratione illius determinati gradus tertianæ Socratis, qui est quid specificum, quia prædicatur de infinitis indiuiduis, infinita enim indiuidua inueniuntur tali tertiana obfessa, quæ illa specifica virtute rhabarbari curari poterunt: omnia itaque remedia, quæ inueniuntur, & omnia inuenta, quæ accomodantur indiuiduis, aliqua virtute specifica operantur.

Hinc sapientissimus Galenus, qui profundè omnia nouit libro de optima secta ad Trasib. cap. 48. de hac re loquens habet, quod à specifico affectu indicetur morborum expulsio, quare si indicatio pro remedijs inueniendis desumatur ab esse specifico, & vniuersali, erit syllogismus, & sola pertinebit ad methodum medendi: si enim indicatio à singularibus, & non à specifica natura desumeretur pro morbis pellendis, careret illatione syllogistica, esset incognoscibilis, & om-

ninò uana in remedijs perquirendis: Sed, ut res omnibus pateat, experiamur exemplis, an res ita se habeat.

Si indicatio est syllogismus, requiruntur tres termini ita sibi cohærentes, ut tertius ex duobus inferatur: exempli gratia primus terminus, uel maior extremitas erit remedium; secundus terminus, uel medius erit indicans, ex quo inferitur remedium; tertius erit minor extremitas, quæ omnibus subiicitur, & est infirmus omnium, quique non solum sub primo, uerum etiam sub secundo locatur, eritque indiuiduum aliquod, quod aliquo specifico affectu sit corruptum; erit igitur indicatio perfectus syllogismus.

Hic ab illis discedimus, qui arbitrantur indicationem esse syllogismū imperfectum; quia in syllogismo imperfecto nulla esse potest bona illatio, ualere debet hæc, bona est illatio ratione formæ in indicatione, ergo est perfectus syllogismus: est perfectus, quia ab uniuersali procedit, per tres terminos naturales: est perfectus ratione materiæ, quia procedit ex ueris, ex notioribus, & causis cognitionis remedium: est perfectus, quoniam uersatur in medio specifico non particulari, & corruptibili, sed æterno, de quo scientia habetur: est perfectus, quia procedit semper à continente ad contenta, perpetuoque habet maiorem uniuersalem: nulla itaque inuenietur conditio perfecti syllogismi ab Aristotele tradita, quæ indicationi non conueniat.

Quo pacto uerò exponi debeat Galenus libro de optima secta ad Thrasyb. & alibi dum dicit, indicationem esse comprehensionem iuuantis sine ratiocinatione, antequam huic capiti coronidem imponam, explicabo.

Posito, quod methodus seruet naturā perfecti syllogismi, & quod solum uirtute indicationis inueniantur remedia, ut probatum est, sequitur, quod reliqua instrumenta, experientia scilicet, & analogismus, quæ non seruant syllogisticam uirtutem, sint extra methodum.

Patet de experientia, quia non procedit ab uniuersali: est auctoritas philosophi 1. metaph. in principio, quod experientia uersetur tantum circa singularia: Præterea experientia, cum procedat ab eodē

ad idem, à singulari scilicet ad singulare, nihil concludit, quia petit principium: nunquam ualebit, rhabarbarum Socrati contulit, ergo & Platonij; nisi id inferatur merito alicuius specifici indicantis: Indiuidua sunt infinita, & incomprehensibilia, & non operantur, nisi ratione alicuius specificæ differentię; Hinc Aristoteles probauit libris priorum ex puris particularibus nil sequi, ratio huius traditur ab Auerrhoe in epitome illorum librorum, qui dicit, quod radix omnium syllogismorum concludentium sit dictum de omni, & de nullo.

Præterea ab experientia particulariū nil sequitur, quia cum particularia sint corruptibilia, corruptibilem facerent conclusionem, & per consequens scientiam, quæ est fructus conclusionis.

Demum nihil ex particularibus inferitur, quia particularia sunt contenta, nec aliquid continere possunt: omne enim quod inferitur, uirtute continentis inferitur: uerum alia plura dicuntur in sequenti libro cap. de falsa experientia: satis est nobis, ut hic à methodo, ratione Galeni, & Aristotelis auctoritate experientiam excludamus.

Sicuti experientia nihil concludit, estque extra methodum, quia est Inductio: similiter analogismus erit extra methodum, quia est exemplum: primò nō concludit exemplum, quia ex Aristotele 2. priorum reducitur ad tertiam figuram cum conclusione uniuersali, in qua minor nunquam conuertitur, quod est in analyticis monstruosum.

Aristoteles quoque amouet exempla à syllogismo, quia ostendunt primum de medio persimile tertio, quod omnino principijs analyticis aduersatur, quoniā, si medius terminus sit similis, & nō uniuocus, fit transitus de genere in genus: In methodo perquiruntur remedia per syllogismum à fine ad ordinata in finem in eodem genere, & merito, quia contrariū unius generis non potest esse cōtrarium alteris: albu contrariatur nigro, quia album, & nigrū in colorum genere cōueniunt, non tamen album cōtrariatur dulci, cum genere discrepet; similitudines igitur differunt genere: quæ uerò conueniunt, non possunt dici similia; quia eandem

dem naturam, & idem quod quid est genericum habet: cum igitur analogismus sit argumentum à simili ad simile, nullo modo poterit aliquid concludere.

Accedit, quod Aristoteles 1. post. text. 19. dicit, si argumentum debet concludere, debet habere media, & extrema, quæ sint eiusdem generis.

Huic veritati plurima, quæ dicuntur ab Aristotele in libris post. consentiunt; dicit philosophus, conclusionem geometricam ex principio arithmetico inferri non posse, quamvis Arithmetica, & Geometria saltem genere generalissimo conveniant; quanto minus ex medio simili, & analogo aliquid concludi poterit? Sequitur ergo, quod experientia, & analogismus sint extra methodum, careantque virtute syllogistica, & nihil, quod sit ignotum certa illatione notificare possint.

Sed occurrit magna dubitatio, quia diximus, indicationem esse perfectum syllogismum: quod videtur Galeno libro de optima secta c. 11. & alijs in locis aduersari, ubi dicit, indicationem fieri, sine experientia, & ratiocinatione.

Respondetur, processum a cognitione indicantis ad cognitionem indicati fieri cum discursu; cum tamen esse adeo velocem, ut vix à nobis animaduertatur, & propterea dictum fuisse à Galeno esse sine ratiocinio: quod re vera, si omnino sine ratiocinio intelligeretur, à Galeno quoque non admitteretur, nihil .n. quod percipitur est nobis connatum ab ortu naturæ; anima enim nuda, & tamquam tabula rasa in hanc lucem venit; omne igitur vel comparantur experientia, vel discursu, sed indicatio non comparatur experientia, ergo discursu, eo magis cum non detur alter modus sciendi occulta.

Hinc Auerthoes de cõmunibus principijs, & dignitatibus loquens 2. post. in fine dixit, eorum cognitionem non esse nobis connatam, sed inductione cognoscendam; tamen inductionis a nobis non animaduerti: quare si ex Auer. percipimus per inductionem velocissimam principia notissima, qualia sunt, omne ipsum est maius sua parte, & similia: cur non poterimus dicere indicationem, quæ per experientiam, & inductionem non potest haberi, fieri quoque cum discursu?

Cogimur alterum duorum fateri, vel quod cognitio indicatorum sit nobis cõnata, quod est omnino falsum: vel per inductionem, & experientiam acquiratur, quod repugnat Galeno, qui semper distinxit experientiam ab indicatione, vel quod indicatio fiat cum discursu velocissimo, quod est illud, quod volumus.

Demum exemplum huius velocissimi discursus, qui fit ab indicante præcognito ad perquirendum indicatum, observatur quoque in demonstratione propter quid, dum scilicet ab effectu notiori procedimus ad cognoscendam causam, & deinde ab illa regredimur post mentalem quandam considerationem ad effectum, sicuti Aristoteles à motu æterno Motorem æternum cognovit, deinde regrediens à Motore æterno ad motum æternam demonstrationem propter quid formavit, quæ potest vocari verum cuiusque discursus exemplar.

Referuntur attributa indicationis, & logica virtute deiegitur erratum illorum, qui morbos in causas diuident. Cap. III.

GAleni auctoritatibus, & rationibus ab altiori schola desumptis, ostensum est superius, quod methodo procedere non sit per experientiam, vel analogismum, sed per solam indicationem remedia inuenire. Sequitur itaque, ut ex animo in hoc libello declarem conditiones, & proprietates huius frugiferæ, & fructuosæ indicationis, quando eius præcognitio tam admirabilem utilitatem nobis pollicetur. In perfacili cognitione sanè versamur, si satis nobis esset referre, quæ à Galeno de indicatione sapientissimè traduntur.

Andias quam paucis potissima fundamenta, quæ ad veram indicationem pernoscendam nos ducunt, possint ex Galeno huc transferri: 2. meth. 7. & plerisque in locis in optima perquirenda indicatione docet, non esse transeundum de genere in genus, sed esse diuidenda generalissima in subalterna eiusdem generis, & hæc in specifica, ex quibus solum colligi possunt præiudicia: 9. meth. 14. quod nunquam

in facienda hac indicantium diuisione sit tranſeundum de genere morborum, in genus cauſarum, nec verſa vice, de quo principio in hoc capite agemus: libro de optima ſecta ad Thraſybo. cap. 48. dicit, quod non à generaliffimis, vel ſubalterna indicatione, ſed ſolum à ſpecifica indicetur morborum expulſio: 1. meth. 3. dicit, de ratione indicantis eſſe, vt ſit notius indicato: libro de optima ſecta cap. 40. & 2. method. cap. 13. quod vnum indicans indicet vnum contrarium, & non plura: 4. method. 3. quod debeat eſſe præſens: 3. method. 1. quod ſit illud quod curatur: 7. meth. 13. quod omnia indicantia debeant referri ad tria ſcilicet ad vrgens, ad cauſam, & ad impedimentum: Demum 1. method. 9. quod ſymptomata ſint accidentia morbi, & non indident libro verò 11. cap. 12. quod ſymptomata nullam habeant ſubſtantiam, & ſemper ſint in fieri: tandem 3. method. capit. 1. & alibi, quod bona indicatio ſumatur ab eſſentia indicantis, & nequaquam ab eius accidentibus: per hæc præcipua fundamenta Galen. potuit methodum, vel artem perquirendorum remediorum nos docere; potuitque inde tot ac tanta de arte medica in lucem promere.

Ego autem conuertens mentis aciem ad hæc methodi arcana, & videns, quod omnia, quibus nixus eſt de indicatione referre pendeant ab analytico fonte, vt ipſemet Galenus 2. meth. capit. 6. teſtatur; optimum factu exiſtimaui, ſi oſtendero, quod omnes conditiones indicationis, quia iam recitauimus, à logica pendeant, & quod altiori veritatis robore poſſint confirmari. In primis ſe offert, vt explicemus, quibus principijs commotus voluerit, indicantium diuiſionem fieri in eodem genere, nullo vnquam tranſitu de morbis in cauſas commiſſo; ſed à generaliffimis ad ſubalternas, & ab ijs ad ſpecificas perueniendo indicationes: Hæc diuiſionis indicantium conditio non vno loco à Galeno propoſita multoties ab Ariſtotele confirmatur: 2. enim poſt. tex. 19. docet, quod quid eſt inueniri non poſſe, niſi facta diuiſione in eodem genere: ſi igitur naturam, & quod quid eſt indicantis pernoſcere voluerimus, opus erit eandem philoſophi præ-

ceptionem ſeruare: nunquam enim remedium inuenire poterimus, niſi quod quid eſt indicantis præcognoſcamus: In eodem genere indicans, & indicatum, quod eſt eius contrarium inuenitur: & merito indicantis percipitur indicatum.

Quare, ſi fiet tranſitus de genere in genus, neque indicans, neque indicatum inuenietur: non indicans, quia, vt tale, non eſt, niſi in vñico genere: non indicatum; quia contrarium vnus generis nunquam poteſt eſſe contrarium alterius: quia ex Ariſtotele 1. poſt. tex. 21. & in prædicamentis genera, eorum differentia, & proprietates ſunt omnino impermiſcibiles; debet igitur diuiſio fieri in eodem genere.

Præterea idem quoque hac experientia confirmatur, nigrum non opponitur calido, nec album frigido; quia genera colorum, & primarum qualitarum inter ſe differunt: tanto minus proprietates generaliffimorum generum ſibi inuicem aduerſabuntur: magnum, vel paruum, Dominus, vel ſeruus, quæ pertinet ad oppoſitionem relationis, non opponuntur calido, vel frigido; quia genere differunt.

His motus Galenus 9. meth. 14. dicit, quod nullo modo morbus debeat diuidi in cauſas; quia morbus, & cauſa genere differunt: docet ijs verbis Galenus hoc analyticum arcanum: affectus verò handquaquam in cauſas deduci eſt aptus, ſed in differentias, nã aut in ſimilaribus conſiſtit partibus, aut in inſtrumentarijs: in ſimilaribus eſt intemperies, &c. O quam ſepiffimè rudiores noſtrates in vicioſam, hanc diuiſionem incidunt: ſunt enim qui diuidunt febres hoc modo, alia eſt bilioſa, & alia eſt melancholica: Sunt præterea, qui diuidunt intemperies dicendo, quod alia ſit cum materia, alia ſine materia, quæ diuiſiones ſunt vicioſæ; quia ſic, cum tranſitu de genere morbi in genus; earum intemperies enim eſt morbus, humor peccans eſt cauſa efficiens; quod erratum adeo Ariſt. & Galeni principijs repugnat, vt omnino ſit inexcusable.

Inſuper 2. poſt. cap. 8. docet, nunquam diuiſionem eſſe faciendam per differentias, inter quas cadit medium, quia erramus, vel ſupponendo aliquid falſum, vel ſuperfluum adiungendo, vel aliquid adi-

mendo; si igitur diuiserimus morbum in differentias alterius generis, dabitur medium in differentiis; unde hic error addendo superfluum, vel adimēdo aliquod necessarium requisitum, & nunquam indicans, vel indicatum inuenietur.

Quia febris ut febris semper est interperies calida, causa vero febris non semper est calida: quia pituita, quæ efficit quotidianam est frigida: quomodo igitur ex hac praua diuisione colligi poterit remedium.

Idem colligemus ab exemplo Aristotelis proposito in eodem cap. ubi dicit, si animal diuideretur in has differentias, quod habeat pennas scissas, vel integras, diuilio redderetur vitiosa; quia diuidetur per differentias accidentales; In qua diuisione duo essent errata, primum quia fieret transitus de genere in genus; animal n. est substantia, habere pennas accidentis; Secundum, quia habere pennas scissas, vel integras non sunt differentie animalis, sed auium, etque accidentales.

Accedit, quod indicata non sunt indicata non sunt accidentia illius generis, in quo indicans collocat: nisi sunt species, de quibus genus prædicatur in quid, & per se primo modo; æquè enim de albedine & nigredine prædicatur color.

Quod arcanum nos docet subtilissimus Auerrhoes, qui loquens de numero prædicatorum primi modi dicendi per se, dicit hæc quinque in eo inueniri, genus proximum, differentiam remotam, genus remotum differentia proximā & totā definitionē: exempla pro his, quinque prædicatis pertinentibus ad primum modum dicendi per se hæc sūt: si de febre diceremus, quod esset morbus, quod esset morbus similiarium, quod esset interperies, interperies calida, & quod esset interperies calida, & sicca omnium partium corporis: omnia hæc prædicata, quamuis subalterna genera essent centum & ultra, dum modo sint eiusdem generis, & reduci possint ad aliquod ex quinque prædicatis, erunt primi modi; omnia enim unicam naturam, & quidditatem declarant: similiter ita in primo modo est hæc propositio, homo est rationalis, ut hæc, homo est viuens, est sensitiuus, & est substantia.

His premis motus principijs Gal. dixit

quod à generalissimis ad subalterna, & ab ijs ad specifica sit descendendū, ut essentia indicantis inueniatur: optimè nouerat, quod omnia vniuoca prædicata in generibus proponuntur, ut specifici indicantis naturam melius declarent, & melius indicata seu remedia insinuent.

Quæ vero dicuntur de morbis non possunt accommodari causis antecedentibus, quia causæ, & attributa, quamuis explicent, & insinuent morbi naturam, in eodem modo dicendi per se de morbo non prædicantur; bilis efficiens tertianam de febre tertiana prædicatur in quarto modo, in quo locatur causæ efficientes, quæ loco aliquando à causatis separantur; nunquam tamen inuenietur attributum essentiale explicans essentiam in primo modo dicendi per se, quod loco, vel definitione à proprio genere, uel subiecto separari possit.

Cum igitur causæ efficientes, & attributa morbi essentialia genere differant, contrarium unius non relictabitur alteri: hinc quod relictatur febre non est necessarium, ut relictetur bili, uel pituitæ est tamen necessarium, ut relictetur febri, ut est interperies, & ut est morbus.

Hinc contrarium, quod destruet hominem, destruet ut est animal, & substantia, omnia enim genera, & differentie remotæ, & proximæ unitæ formam specificam constituunt: ultima enim differentia est epilogus omnium priorum generum & differentiarum existentium in eadem linea prædicamentali; alienæ uero differentie erunt accidentia, quia solum suis generibus, & speciebus per se conueniunt, nisi dicamus, quod proprietates generum sint permiscibiles, quod est omnino à philosophiæ principijs alienum.

Quibus rationibus motus Galenus, qui omnia ab hac altissima philosophia desumpsit, dixit, quod non sit transcendendum de genere in genus in specificis indicationibus, dixitque 1. method. 3. quod nullo modo conueniat desumere indicationes ab accidentalibus differentiis.

Præterea, ut in tanto negotio aliquamur solertia, alia adiungamus, ut questum alijs analyticis principijs roboretur: si non licet morbum diuidere in symptomata propria, quæ immediatè à mor-

bo semper dependent, & in secundo modo dicendi per se de ipso prædicantur, quanto minus licebit diuidere morbum in causas efficientes, quæ minus adnexæ sunt morbis, cum loco aliquando separari possint à morbis, & in quarto modo de morbis prædicentur.

Illeigitur, qui transibit de genere causæ in genus morbi, vel vice versa nunquam inueniet indicans, vel indicatum propriū neque sciet leuissimum, & facillimæ curationis morbi certa, & infallibili methodo curare: quia indicans, & indicata sunt in proprio, & non alieno genere; ratio singularis, cur, si quis perquireret remedium in alieno genere centum annorum tractu, illud nunquam inueniret, est quia vni contrario vnica sola est contrarietas, quæ genere conuenit; de quo tanto principio in hoc libello in proprio cap. secundum easdem leges logicas tractabimus.

Ab his rectè præcognitis facillè colligere poterimus, quoties rudiores medici in perquirendis propriissimis indicationibus a recta philosophandi ratione desleantur.

Sed, vt aliquis famosus error ab imperitia logicæ dependens notetur, afferatur talis, qui satis communis est: Quidam putant, magnitudinem morbi per se primo indicare pharmacum, & venæ sectionem.

Primo errare videntur, quia in vnica est contrarietas; ipsi tamen putant venæ sectionem, & pharmacum æquè aduersari morbo magno.

Secundo, quia transseant de genere in genus, morbus magnus est vnum genus, venæ sectio, cum euacuet, primo respicit causam, & est aliud genus.

Tertio, quia morbus magnus est differentia subalterna, in qua non est perscrutandum, vt paullo post in proprio capite ostendemus; affectus præter naturam vehemens indicat remedium vehemens & magnum, remedium verò magnum, & vehemens est subalternum, quod diuiditur in pharmacum, & venæ sectionem, vel in alias auxiliorum species.

Quarto, quia contrarium, quod relictum indicanti, inuenitur in specificis, & non subalternis differentijs qualitas enim prædicatur vel de colore, vel de sapore,

contrarium dulci non potest relictum colori albo, quia in eodem genere, sub quo non datur aliud subalternum, inueniuntur contraria specifica; sub coloris genere non est aliud genus, sed solum sunt colores, qui specie inter se differunt, & in quibus resident contrarietates illarum specierum.

Quinto: si remedium magnum est indicatum, quod ab effectu præter naturam vehementi, & magno per se indicetur, ergo venæ sectio per accidens indicabitur à morbo magno; hætenus enim non est inuentus tam rudis philosophus, qui rationem illam analyticam rejiceret, quæ est, quod vni per se, alteri per accidens conueniat, quare ea posita, sequetur necessario, morbum magnum primo, & per se venæ sectionem non indicare, cum ab illo primo, & per se indicetur magnum remedium: quopacto verò se res habeat, & quomodo defendi possit Gal. dundixit, magnitudinem morbi indicare venæ sectionem, in sequenti lib. declarabimus.

Tandem, vt alijs analyticis rationibus confirmemus, quod transitus de genere morborum in causas non possit concedi, non omitemus illam Aristotelis præceptionem textus 20. primi libri post. quæ est, quod nunquam possit probari conclusio geometrica per principium arithmeticum, vult enim eo loci, quod media, & extrema sint eiusdem generis; quare, si medius terminus, qui docet nos passionem propriam, est eiusdem generis, quanto magis nos in cognoscendis specificis indicantibus quæ cum suis generibus in primo modo dicendi per se conueniunt, debemus procedere per ea, quæ sunt eiusdem generis.

Præterea, si non liceat ex philosopho in demonstrationibus vti principijs communibus pro cognitione passionis, sicuti ab illo ostenditur in famoso illo paralogismo Britonis de quadratura circuli, quanto minus licebit transscendere, vt cognoscamus propriū indicans; sed melius, quanto minus licebit transscendere in cognoscenda non dicam passionem indicantis, sed naturam ipsiusmet indicantis, quæ est medius terminus ducens nos ad cognitionem remedium? Hæc itaque sunt principia, cui potuit Galenus firmiter su-

stinere, quod in diuisione indicantium nunquam sit transeundum de genere morborum in genera causarum.

Inde in logica desumitur, quod à generalissimo, vel subalterno genere affectus prater naturam non indicetur causa. Cap. IV.

Galenus 1. ad Glauco. c. 1. refert, quod tribus modis in perquirendis indicationibus rudes medici possint errare. Primò, dum vitiosè diuidunt transeundo de genere morborum in genus causarum, vel versa, vice, de quo errandi modo egimus superius. Secundò, dum in generalissimis indicationibus persistunt; Galen. lib. de sectis ad eos, qui introducuntur cap. 12. reprehendit methodicos, qui ab affectibus generatim, & non speciatim indicationes sumunt. Tertiò, dum in subalternis.

Nunc sequitur, vt eadem virtutis logica duo hæc sequètia errorum genera exploramus pertinet quoque hoc ad analyticum fontem, quia, qui rerum naturas específicas perquirunt, & in genericis fiant in duos impingunt scopulos, scilicet in petitiones principiorum, & in falsos syllogismos.

Quod petant, patet, quia quod cōuenit superiori supponunt inferiori adaptari posse: exemplum est, dum dicunt, tertianam indicare refrigerandum & humidandum quod non conuenit tertianæ, vt tertiana, sed vt est intemperies calida, & sicca, quod est genericum; tertiana enim est species intemperiei calidæ, & siccæ.

Florum medicorum erratum est vnum de tribus erroribus circa vniuersale, quod ab Aristotele 1. post. cap. 5. est reiectum. Sed, vt res eluceat exemplis tractetur: tertiana erit calida vt duo; hæc intemperies, si expelli debeat, non casu, & fortuito eligitur auxilium refrigerans, quia ex omnibus refrigerantibus, quæ sunt sub orbe Lunæ ynicum solum dabitur, quod erit huic tertianæ contrarium proportionatum, & iuuans; est enim inter auxilium, & morbum illa proportio, quæ est inter causam efficientem, & effectum, quam proportionem Aristoteles ad quartum modum dicendi per se retulit; causa

igitur non erit causa illius effectus, vel auxilium non erit auxilium tertianæ, nisi fuerit proportionatum, & proprium, quod ei soli conueniat.

Habet Galenus 3. de temperamentis cap. 4. hæc verba, „cuiuslibet corpori conuenire proprietatem quandam temperamentum quæ huic temperaturæ sit consentiens: nisi igitur inuenerimus cuiuslibet proprietates temperamentum propriissima remedia non attingemus.

Qui igitur in genericis indicationibus stant, non inuenient auxilium, quia illud proprium, & proportionatum refrigerans à solo gradu caloris tertianæ colligitur, quod est quid specificum, & nequaquam genericum; nimium, vel exiguum frigus nunquam inducet sanitatem, quia nimium efficiet nouum morbum, exiguum tertianam non vincet, quare, cum nulla sit proportio inter indicans specificum, & auxilia generica, auxilia generica nullam vim, nullamque necessitatem operandi habebunt: neque generica indicantia nobis insinuare poterunt auxilia proportionata, & vera.

Præterea auxilia (& hæc est potissima ratio) specifica, quæ sunt causæ sanitatis, in nullo modo dicendi per se de indicationibus genericis prædicantur; non in primo, quia auxilia, vel indicata respectu morbi sunt causæ efficientes; in primum enim solum internæ causæ ingrediuntur: non in secundo, quia indicata sunt causæ efficientes externæ; non in quarto, quia nulla est proportio (vt probauimus) inter causam specificam, & affectum genericum, ergo in nullo, ergo non inducent sanitatem, quia nullam cum affectibus habebunt proportionem.

Amplius, qui à genere desumit indicans specificum in parallogismum incidat oportet; colligitur ab Aristotele 2. post. tex. 12. vbi aperte reiecit consequentiam à genere ad speciem: vultur Aristoteles hoc exemplo, si quis probaret glaciem esse aquam, quia in aqua est defectus caloris, incidere in parallogismum cum principij petitiones quia, qui dubitat de glacie, eodem prorsus modo dubitabit de defectu caloris: etenim medius terminus, quo aliquid inuenitur, non potest esse definitio

maiori extremi, sed ratio quiditativa subiecti, uel causa aliqua extrinseca: quare qui probaret in Luna esse eclipsim, quia in illa sit pratio luminis, faceret demonstrationem ridiculam; quia esset per definitionem formalem eclipsis; qui igitur colligeret remedia, exempli causa, a pleuritide quatenus est inflammatio, & pleuritidi remedia generica applicaret, expressum transiit ad genus, ad speciem, qui nullo modo ab Arist. admittitur, committeret.

Præterea, si indicatum genericum esset accommodatum indicanti specifico, sequeretur, quod indicans non vnum indicaret, sed plura, scilicet genericum, & specificum, quod relictur Galeno, Aristoteli, & rationi.

Galenus libro de optima secta ad Trasylb. cap. 40. & alibi dicit, vnum indicare vnum, & non plura.

Aristoteles 1. de celo virtute huius principii, quod vni vnum sit contrarium, inuenit celestia corpora non constare ex eminentijs elementorum, vt Plato censuit; sed esse quintam essentiam omnino distinctam ab elementis.

Rationi reluctatur, quia in omni genere vni uoco inuenitur, quod vni vnica sola est contrarietas: In colorum genere sola albedo aduersatur nigredini, & non alia coloris species: in saporum genere dulcedini sola amarities reluctatur: In alijs qualitatibus generibus mollitiei durities, lentori friabilitas, grauitati lenitas, crassitie tenuitas, asperitati lenitas, & raritati densitas; neque in superioribus generibus inueniuntur alie differentie, vel species, quæ ijs reluctentur; Verum, quod vnum indicet vnum, altioribus rationibus desumptis ab analyticis primordijs in proprio capite colloquemur.

Insuper, si omne calidum, quod est in nostro orbe, est tale, vel in primo, vel secundo, vel tertio, vel quarto gradu, ergo omnia erunt specifica, & non generica; probauimus superius, quod quilibet determinatus gradus predicetur de pluribus numero differentibus; vt quid ergo volumus indicationes a genericis haurire?

Quod uero, qui a genericis collignant auxilia incidunt in falsos syllogismos, patet, quia progressus a communibus indi-

catis pro specificis indicantibus tollendis est causa remota: cadet igitur discursus in argumentum a positione consequentis ad positionem antecedentis; nunquam ualebit hæc consequentia, est calidum; ergo est calidum ut duo; ualet tamen a positione antecedentis ad positionem consequentis, scilicet est calidum ut duo, ergo est calidum.

Vnde sit, quod a singularibus non hauriantur indicationes, sed solum ab affectu specifico. Cap. V.

QUOD a specifico affectu indicationes solum desumantur, nos docet Galenus non uno loco, & præcipue libro de optima secta ad Trasylb. & in methodo non uno in loco, ubi apertè dicit, morborum expulsionem a specifico affectu indicari, & optima cum ratione; quia, quæ methodo traduntur sunt uniuersalia, & nequaquam singularia; Galenus 4. method. 4. uocat methodum viam uniuersalem. Nos quoque superius logica uirtute probauimus, indicationem desumi ab uniuersalibus; ostendimus tamen, quod hæc uniuersalia, a quibus indicationes desumuntur, non possint esse generalissima, uel subalterna, sed solum specifica, quod confirmat Gal. 1. ad Glanc. cap. 1.

Hic par est, ut examinemus, an a singularibus possint desumi indicationes: occasio, quæ nos mouet ad hoc querendum, est, quia omnes uerbi nidentur prima facie esse indiuiduorum, & sola indiuidua omnibus uideantur sanari; uel mortem obire, & non species.

Quod igitur a singularibus nullo modo indicationes possint desumi, patebit in primis, quia de singularibus nec methodus, nec ars, nec scientia dari potest; Scientia enim ex Aristotele 1. post. est æternum: deinde omne remedium, quod aliquem particularem hominem potest curare, & omnes morbi indiuiduorum quasdam sortiuntur naturas específicas æternas, quæ alijs infinitis indiuiduis contingere possunt: Exemplum. Socrates quartana detinetur, assidue, uel carthami usu liberatur, dicimus, quod hæc natura quartanæ Socratis, quæ hoc remedio tollitur, in sexcētis alijs eadē sit, eodemq;

remedio auferri possit; nullum enim indiuiduis improprium est, nisi hic & nunc reliqua omnia sunt specifica, & infinitis alijs communicabilia: Galenus altissimis rationibus in methodo probauit à loco, & tempore non sumi indicationes; sed à substantia, & vltque quod indicans sit specificum, & sit illud, quod curetur; de qua re altiori philosophia paullo infra agemus.

Insuper si particularia curarentur, illorum indicationes nobis remedia non ostenderent; quia non datur progressus a particulari ad particulare; esset igitur ars medica omnino vana, & ridicula: etenim si inductio, & quæ procedit à multis particularibus, & exempla, quæ ab vno ad vnum saltem procedunt, non valent, suntque ab Aristotele, quia non fundantur in dicto de omni, & de nullo, a recto concludendi modo reiecta: quanto magis, si curarentur particularia, eorum indicationes particulares, quæ nullum supponerent processum, scilicet neque à multis, neque ab vno, deberent explodi?

Hinc Galenus 9. method. cap. 6. dicit, in vniuersalibus esse methodum medendi, in particularibus verò solum methodi exercitium: ratio est quia in quolibet ægrotante plurimi specifici affectus commiscuntur.

In Socrate quartana correpto erit specificum alioquod temperamentum omnino diuersum ab alijs, eritque ætas, consuetudo, robur, habitus corporis, anni tempus, constitutio, causa, loci, symptomata, mores animi, horum motus, & aliæ specificæ naturæ, & conditiones, quarum aliquæ in multis inveniuntur, rarò tamen omnes: quo fit, vt ars medica multis reddatur difficultatibus obstructa.

Hæc est causa, cur Galenus 2. meth. 7. & 1. meth. cap. 1. dixit, quod in quolibet ægrotante debeamus methodum exercere, & applicare non indiuiduis, sed naturis specificis in ipsis contentis: exercitium fiet distinguendo, & separando plurimas affectuum species simul in particularibus confusas: quibus cognitis fiet quoque expendendo, atque librando, quæ indicantia magis possint, quæ prohibeant, & quæ debeant conseruari: de quo indicantium æquilibrio in quintodecimo libro examina-

stituemus: In hoc loco satis nobis sit, vt colligamus, quod a specifico tantum affectu indicetur morborum, & causarum omnium expulso, & quod ab indiuiduis vt indiuidua nulla vnquam possit indicatio colligi.

Vnde sit, quod indicans vnum indicet.
Cap. VI.

Satis clara atque prænitens est Galeni sententia, quod vni indicans, vel vnus affectus præter naturam vnum tantum indicatum seu remedium, quod idem est, indicet, & vnum indicatum ab vnico indicante solum indicetur, 9. meth. 12. habet, conferentis indicatum semper esse vnum: & 11. meth. 13. vnam sepe dari ex quaq; re indicationem: libro de opresecta ad Trasib. cap. 45. vnum iudicare vnum quia vni vnum tantum aduersatur. Gal. 1. de nat. humana comm. 5. vnus morbi ait vnicum esse remedium.

Rationes verò, quæ nos docent, & cogunt ad dicendum, quod vnitum tantum indicatum ab vnica essentia indicetur, ab altiori schola sunt desumende; etenim, huius cognitionis merito mille difficultates, quæ animos rudiorum perturbant enodari poterunt. Proponitur itaque, quæsitum, quod vnum indicet vnum intelligendo quatenus vnum, quod est respectu vnus & eiusdem, ad idem, & secundum idem, eodem modo, & eodem tempore, quibus omnibus seruatis vnum indicat vnum, alioquin vnum posset indicare duo, tria, quattuor, & centum, respectu scilicet diuersorum.

Tertiana febris, est vt intemperies calida, indicat refrigerandum, vt sicca, humectandum; vt biliosa, euacuandum, vt a tenui bile fit, in crassandum: vt a putrida, ventillandum, vt bilis mouetur in partem principem, reuellendum, & alia plura indicata ex vnico morbo respectu diuersorum colligi possent: Hinc a Galeno in methodo sepe repetita est illa sententia, quod tot debeant esse methodi, quot morborum idæ, simplicemque ideam vnum indicatum indicare, plures plura.

Cæterum videamus, quomodo ab Aristotelis philosophia hæc indicantis conditio, quod vnum indicet vnum, habeat exordium.

dium. Indicans & indicatum inuicem sibi aduersantur, suntque contraria: at ex Aristot. 1. de generatio. tex. 51. & ex Gal. 1. meth. c. 7. contraria sunt in eodem genere, & in vnico genere nō possunt esse plura duobus, dulce aduersatur amaro, & in saporum genere non inueniatur aliud, quod contrarietur amaro, nisi dulce: vni ergo vnum aduersabitur, & non plura: indicans igitur, cum insinuet nobis, quod nam sit contrarium, quo possit vinci, & superari, contrariumque vnicum tantum sit, vnicum indicabit, & non plura.

Sed vterius est querendum, cur scilicet in vnico genere vnica tantū sit contrarietas: patebit hoc ex definitione contrarietatis, est enim Aristotelis 10. metaph. tex. 23. contrarietas esse maximam differentiam eorum, quæ sunt sub eorū genere: similiter Temistius 1. phy. 47. dicit, quod contraria sunt, quæ eiusdem generis extremos margines obtinent: & D. Thomas in Meteorolog. dicit, quod contraria sunt duæ formæ maximè distantes in eodem genere, vt calidum, & frigidū in genere primarum qualitatum, album & nigrum in colorum genere, & quare cum maxima differētia in vnico genere sint duo tantum extrema, in quolibet genere duo tantum erūt opposita, & vnica erit contrarietas, quare vnum, si indicet contrarium, non potest nisi vnum indicare: media vero, quæ sunt inter hæc extrema, non relinquantur extremis, nisi id fiat participatione extremorum: alio enim contrariatur cæruleus, & viridis, quatenus hi colores medijs nigro participant.

Hinc Aristoteles 8. phy. 64. dicit, quod contraria se mutuo corrumpunt, & impediunt, vt motus, qui est sursum, destruat motum, qui est deorsum, motus tamen in latus nō impedit motum, qui est sursum: hinc est, quod in vnico genere solum duo extremi margines sibi aduersantur, ea vero, quæ sunt aliorum generum, cum sint, (vt ita dicam) in latus, & non in longum, non erunt extrema, & per consequens sibi inuicem non aduersabuntur.

His principijs philosophus nouit, quod vni vnum tantum sit contrarium: Ijs 1. de celo deprehendit motum circulem nō esse naturalem elemento ignis, sed aliunde pendere, quoniam, si esset naturalis, se-

queretur primo, quod vni duo essent contraria, motui scilicet circulari ignis rectus deorium, & sursum: Secundo, quod simplicis corporis duplex esset motus, scilicet rectus, & circularis, quod est omnino impossibile, ab vnica enim simplicissima natura duo prodire non possunt.

Per hæc principia philosophus altius eleuatus inuenit motum circulem celo conuenire per se: & cum motus primo, & per se à natura pendeat, coactus fuit quæ dicere, cæli essentiam esse quintam, & nullo modo, vt censuit Plato, ex eminentijs elementorum constare: coactus quoque fuit 9. metaph. tex. 17. dicere non esse timendum quod cælum aliquando staret, quia eius motus in orbē est à natura.

Hoc principio, quod vnum, vt vnum det vnum, & non plura, Aristotel. 2. post. in principio collegit definitionem, dare tantum quid, probatque deinde quid neque per demonstrationem, neque per alia instrumenta posset haberi.

Verum ex dicti s oritur dubitatio, quia non videtur, quod in vnico genere vnica tantum sit contrarietas: In genere enim primarum qualitatum duæ sunt contrarietates, & per consequens quatuor contraria, altera enim contrarietas est in actiuis, altera in passiuis, vt calidum aduersetur frigido, & humidum siccō.

Respondeo, quod in quolibet genere vno vnica est contrarietas, intelligendo de genere vniuoco, & proximo, infra quod non est aliud genus, sic dicimus in genere primarum qualitatum duo esse genera, alterum actiuarum, quod in se vnica contrarietatem conseruat: alterum passiuarum: vel dicimus in vno genere, vnica esse contrarietatem respectu vnius, & eiusdem, ad idem & secundum idem.

His principijs non animaduertis non est mirum, si in scholis sæpè rudiores conterant tēpus in argumentis probabilibus: exemplum tanti erroris erit, si ob oculos ponamus cribratam illam difficultatem, an magnitudo morbi indicet venæ sectionem, & pharmacum: qui esset persuasus ab Aristotele, & Galeo, quod vnum non possit indicare plura, tempus non amitteret in legendis magnis voluminibus quomodo magnitudo morbi indicet

sectionem venæ, & pharmacum; Sed illud decidere, magnitudinem morbi indicare magnum remedium; & deinde non primo, & per se sectionem venæ, sed secundario, decideretque aliud esse indicans venæ sectionis, & aliud pharmaci, si vñ indicetur ab vno solo; verum, quia de hac re alibi verba fecimus, ostendimusque, qui dici possit de indicante venæ sectionis; ideo non est, vt iterum acta agamus.

A quibus analyticis rationibus pendeat, quod indicans debeat esse notius indicato. Cap. VII.

SI in medicis contemplationibus satis esset nobis summæ auctoritatis viris concedere, in hac re possemus in Gal. & Arist. sententia conquire: Gal. enim 1. meth. 5. habet hæc verba, quoniam omnes morbi curationem inuenire propositum est, necessarium est prius morbi naturam scire; & 13. metho. 6. à methodo excludit, quæ à tota substantia operantur, cum eorum essentia sint ignotæ, & sexcentis alijs in locis affirmat, naturam morbi prius esse cognoscendam, veluti 1. de artic. comm. 32. ante curationem duo esse cognoscenda, affectum scilicet, & locum affectum; Indicans igitur, vel affectus præter naturam, si eius remedium perquirere velimus, debet præcognosci.

Præterea ex ijs, quæ superius ostendimus, indicans est medius terminus, quo indicatum seu auxilium morbi perquirimus; at de ratione medij termini ex Arist. tres sunt conditiones, prima, vt sit notior; Secunda, vt sit causa cognitionis illius, quod querimus; tertia, vt sit adæquata.

Verum, quia argumenta ab auctoritate, vt docet Arist. 1. topic. c. 1. sunt probabilia, & non demonstratiua, proponenda erit ratio, quæ possit ostendere, cur indicans debeat esse notius indicato, & hæc est.

Nisi indicans erit notius, ergo erit, vel æquè ignotum, vel ignotius, alter non datur modus, si ignotius, aliud non poterit inferri, nisi aliud, quod Aristoteles 1. post. cap. 3. contra sophistas probauit, scilicet si est hoc, est hoc; putabant sophistæ, quod omnia sciri possint per demonstrationem, scilicet inferendo ex principijs cōclusionem, & ex cōclusionem prin-

cipia, quorum procedendi modus erat cum petitione manifestissima præmissarum: non possumus cognoscere principia demonstrationis, quæ sunt notissima ex cōclusionem, quæ ignotior sit.

Aristoteles 2. post. efficacissimis rationibus illos reprehendit, qui ex principijs notioribus non procedunt, quin imo tex. 3. videtur reprehendere Xenocratem qui utebatur syllogismo duplante, in quo vnicuique definitio probatur per aliam pro cognoscenda animæ naturæ definitio tamē quæ erat medius terminus; erat ignotior cōclusionem; hæcque erat, numerus se ipsum mouens est principium vitæ, anima est numerus se ipsum mouens, ergo est principium vitæ; nullo modo igitur ex principio ignotiori aliquid concludere possumus.

Patet similiter alio exemplo, quod ex æquè ignotis nihil inferatur, veluti si probaretur, quod anima esset immortalis, quia sit impassibilis; æquè notum est nobis, quod sit immortalis, ac impassibilis.

Demum Aristoteles tenet non solum demonstrationem, verum etiam definitionem esse ex notioribus nobis; quare, si ex indicante inferimus remedium, est necessarium, si bona fuerit illatio, vt indicans prius sit nobis notum indicato.

A quibus principijs analyticis pendeat hæc indicantis conditio, quod indicans debeat esse præsens. Cap. VIII.

QUOD indicans debeat esse præsens est Galeni 4. meth. 3. hæc sunt verba: à nullo eorum, quæ adhuc non permanent, sumitur indicatio remedij ex vñ; 3. metho. 1. habet, quod illud, quod indicat sit illud, quod curatur; aliquid sanè non curatur, nisi sit præsens; præsentia igitur erit accidens inseparabile indicantis.

Neque obijciant, quod Galenus dicat 4. methodi cap. 3. præsentis esse curationem, futuri verò præcautionem & prouidentiam, proptereaque dari indicantia, quæ dici non possunt præsentia.

Respondemus, quod nos præcautionem possumus morbos futuros, curando malas dispositiones, quæ, licet minentur futurum morbum, sunt præsentia.

Galenus de phrenetic. dispositionibus lib.

lib. de morb. vulg. verba faciens, hæc consignavit memoriæ: mirabile est, quod hi morbi subitò inuadant sanos, subdit: sed mala hæc pedetentim crescant in corpore, vt in morbis à cane rabido: deinde dicit, in hoc corpore fuit coaceruatus humor lethali veneno similis, & cum factus sit malignus, repente apparuit lethale symptoma: qui Phrenetici morbum hunc futurum anteuertere voluisset, fuisset operæ pretium dispositiones præsentis remedijs auferre, & non symptoma, vel Phrenesim, quæ adhuc non aderat.

Ad eundem modum, si præcauere velimus colicum dolorem, qui ex vitrea pituita fit, præcauimus eracuando viscosam pituitam, quæ est præsens, quæque degenerare potest in vitream, ita vt indicans perpetuò debeat esse præsens. Præterea nunquam in morbis incidunt homines, nisi habeant ante viscera disposita: de Sileno hæc dicit Galenus, vtique non incidisset in morbum grauissimum, nisi antea fuisse paratum corpus: dispositiones igitur sunt omnium morborum semina præsentia, & ab ijs quatenus insistant, & sunt præsentis sumuntur indicationes præcauendi futuros morbos.

Quomodo ex altioribus Aristotelis principijs deduci quoque possit, quod indicans non indicet, nisi sit præsens, patet, quia alio modo indicata seu remedia per noscere non possumus. nisi per indicantia, quæ mediorum terminorum vices subeunt, sed fit est, quod auctoritate Aristotelis 2. post. tex. 11. & 13. media, & extrema sunt cõgenita, & eiuſdem temporis, & vbi nõ sunt congenita, cõsequentiæ non valent, idcõ si remedium præsens non colligetur ab indicante præsentem, sed à futuro, vel præterito erit vanũ, & nullas habebit vires in pellendis morbis.

Sed, vt hæc profunda Aristot. doctrina omnia confirmemus, in exempla conferamus præceptum Aristot. traditum loco citato, vbi dicit, quod vana & ridicula esset illi demonstratio, quæ fieret ex medio præterito, & quæsitò præsentem, exemplum est, si quis probaret esse eclipsim, quia, fuit interpositio terre: similiter vana esset, si quis ex medio futuro quæsitũ præsens vellet colligere, sicuti si quis diceret, est eclipsis, quia erit interpositio terre.

Ad eundem modum dicimus, cum indicans sit medium, vnde indicatum seu remedium colligitur, sequi necessariò, si bona illatio esse debeat, quod eo modo, quo remedia sunt præsentia, eo sint quoque indicantia.

Insuper ex Aristotele 2. post. loco citato, si causa temporis momento præcederet effectum, propositio fieret accidentalis, & nihil inde sequeretur: quod esset accidentalis patet, quia non esset de omni exempli, si animal rationale temporis momento prius esset risibilitate, hæc non esset vera, animal rationale est risibile, quia posset esse animal rationale, & non risibile; non esset de omni, quia duæ conditiones requiruntur in prædicatis de omni, altera, vt effectus semper prædicetur de illo subiecto, altera, vt prædicatum omnib. indiuiduis illius speciei competat.

Hinc quoque fit, quod, si aliqua differentia temporis esset inter indicans, & indicatum, quod vnũ scilicet esset præsens, & aliud præteritum, vel futurum, vel vice versa, indicans, non esset indicans illius indicati, & illud indicatum non posset inferri ab illo indicante, quoniam nihil inferitur, nisi saltem fundatum sit in dicto de omni; expedit igitur, vt indicata, quæ vera, bona, & propria sint, debeant esse simul tempore cum indicantibus, si ab illis inferri debeant.

Neque aliquis obieciat ex Aristotele 2. post. tex. 11. quod aliquando sint demonstrationes, in quibus causa præcedat tempore effectum, ibi enim philosophus, vt hoc declarat, dat exemplum, & dicit: à Medijs inferitur bellum Atheniẽsibus ob hanc causam, quia Athenienses bellum gesserunt aduersus Sardes: ecce; quod causa est præterita, & effectus præsens.

Respondemus, Aristotelem proposuisse illud exemplum, vt causas externas explicaret apud Aristotelem simplicissimè exempla falsa sunt, dummodo Aristoteles via exemplorũ declarat quod proponit, sint facti, aut vera exempla, nullæ vnquam ei curę fuit: Aristoteles centies repetit in libris post. propositiones demonstrationis debere esse per se, vel saltẽ de omni: dum dicitur, Athenienses semper pati bellum à Medijs, dum ipsi irruunt in Sardes, hæc non est de omni, quoniam posset contin- gere,

gere, vt in Sardes irruerent, & nullum inde à Medijs bellum paterentur.

Concludimus ergo; quod ex ijs, quæ nō sunt de omni, nihil interri possit, quia non sunt cōgenita, & quod remedia, quæ ex indicatibus inferuntur, debeant inferri ab indicantibus præsentibus, & non futuris, vel præteritis, vt erat probandum.

Posita hac veritate, & quæ confirmata analyticis principijs, faciliè apparebit illorum medicorum vanitas, dum consulant quid sit faciendum post tres, vel quatuor dies, cum sæpè post horam omnia varientur indicantia? per sepe incidunt in illud erratum, dum à præteritis indicantibus hauriunt remedium: falluntur ægri, qui à Medico absente consilium petunt, interim antequam consultationes scribatur, ex morbo morbi succrescunt, & aliquando contraria emergunt indicantia, vnde Medici consilium ægrotanti reddunt perniciosum.

Offenditur, quod indicans non sit externū, sed sit illud quod curatur, Cap. IX.

QUOD indicans in methodo medendi sit illud, quod curatur, aperte docet Galenus 3. method. 1. ijs verbis, absurdum est asserere, aliud esse quod indicat, & aliud quod curatur; Quo fit, vt 4. method. 3. dicat, nullam extrinsecam causam, qualis est aer, locus, anni tempus, & alia id genus, indicare ratio, cur externa non possint indicare, est, quia indicantia debent inueniri in genere affectuum præter naturam, facta scilicet diuisione generatissimi in subalternas differentias, & harum in specificas, in quibus solum indicantia inueniuntur, sicuti ex Gal. libro 1. ad Glauc. cap. 1. & de optima secta ostendimus: Qui igitur ab externis indicationem desumunt, transeunt de genere in genus, quia externa in affectuum genere non continentur.

Præterea omnia externa sunt singularia, & vt singularia ex Galeno non indicant, ratio analytica, quæ fallere non potest, ex eo pendet, quia indicata inferuntur, & colliguntur ab indicante, sed sic est, quod nullus datur inferendi modus à particulari ad particulare, ergo externa, quæ sunt particularia, non indicabunt: In

ijs non datur inferendi modus, quia omnis illatio ex Aristotele fundari debet in dicto de omni, vel de nullo.

Exemplum, erit indicās, quod insinuat remedium frigidū, vt duo, quod esse potest lactuca, hepatica, aer hyemalis, & infinita alia externa, hæc tamen non indicant, tum, quia sunt infinita, tum, quia illa debent appellari remedia, quæ primariò indicantur à specifico aliquo affectu præter naturam, calidum vt duo erit specificum indicans, post quod aliud non est in methodo cognoscibile: hoc indicat frigidum vt duo, sub frigido vt duo sunt inferiora, vt lactuca, & alia, de quibus in methodo agi non debet, sed in libris de simp. med. fac. & alibi, hæc igitur erit quod, quæ causa, cur externa non indicent.

Præterea illa tantum ad methodum pertinent, quæ indicatione comparantur, sed externa non sunt huiusmodi, quia sunt singularia circa quæ non versatur indicatio, sed experientia, ergo ad methodum non pertinent.

Amplius, si externa in methodo medendi essent indicata, sequeretur, quod vnum indicans haberet duo indicata, quod est inconueniens, quia superius ostendimus, quod vnum indicans indicet vnum indicatum, & non plura: quod vero vnū indicans haberet duo indicata, patet, quia esset indicatum specificum, & externa materia remedij, quam putas tu esse remedium: Exempli causa, frigidum vt duo erit indicatum specificum; lactuca vero, aer, vel alia extrinseca causa erit aliud, quod destrueret non solum methodum, verum etiam totam philosophiam, vt in capite proprio ostendimus.

Insuper logicis firmissimis principijs hoc relictatur, quia primo post. cap. de tribus errorib. circa vniuersale Aristoteles dicit, quod error est attribuere superiori, quod inferioris est; calidum vt duo indicat frigidum vt duo, & hæc paria sunt; dum verò putas ab indicante calido vt duo indicari lactucam, abertat, quia lactuca est quid inferius, & merito frigidum vt duo, quod est specificum, refrigerat; frigidum enim vt duo potest persistere sine lactuca, quia, vt alibi ostendimus, quodlibet inferius accidit suo superiori, & superius sine illo stare potest.

Demum locus affectus, aer, quæ externa sunt per accidens prædicatur de morbo, vel causa: Exempli gratia, inflammatio accidit pleuræ, nullus igitur est nexus inter locum, & morbum, vel causam; quare; qui pro curandis morbis colligerent curatiua indicationes à loco affecto, inciderent in elenchum accidentis, perinde ac, si arguerent hoc modo: omnis albedo est color, homo est albus, ergo homo est color, quod est ridiculum, quoniam hæc sententia, quidquid prædicatur de prædicato prædicatur & de subiecto, in accidentalibus non habet locum.

Ad hanc paralogismi formam reducimur erratum illorum, qui indicationem à loco affecto desumunt, qui hoc modo posset formari: omnis morbus indicat, pars corporis est affecta morbo, ergo pars corporis indicat, nā sicuti albedo est accidens hominis, sic morbi est accidens partis corporis, & sicuti color est prædicatum per se albedinis, sic indicans est prædicatum per se morbi, quatenus est causa efficiens pellens morbum, vel causam, quæ in quarto modo dicendi per se habent locum.

Quod de loco affecto dictum est, de aere, de ætate, & de cæteris est dicendum: quod scilicet solui ea indicent, quæ curantur, quæ sunt in facto esse, & quæ sunt in eodem genere præter naturam: ea vero sint indicata, quæ sunt specifica, & quæ in alijs infinitis particularibus inueniri possunt: nisi omnes hæc conditiones indicantis, & indicati obseruentur: neque indicans, neque indicatum erunt vera indicantia, & vera indicata.

Occurrunt duæ dubitationes: altera, quia ex Galeno, causa non videtur indicare curationem, sed præseruationem quo fit, vñ non videatur verum, quod omne quod indicat, curaretur.

Altera dubitatio: Galenus dicit, ab ære sumi indicationem curatoriā: habet enim 9. met. 14. hæc verba, tres sunt scopi curatorijs hauriendi, à morbo scilicet, à temperatūra, & ab aere: quod est contra illud quod diximus.

Tollitur prima dubitatio, quia omne quod indicat est causa; morbus enim indicat, quatenus est causa symptomatum: Causa vero antecedens, quatenus est causa morbi: & quamuis Galenus dixerit,

causam præseruationem, morbum curationem indicare; attamen 2. aph. comm. 21. vocat garulos illos, qui disputant de ijs nominibus, dicit enim ibi, quod causarum quoque abolitio dici potest curatio; vbique Galenus nominum micrologia reprehendit; nos vero acturi de hac re in lib. 15. altioribus fundamentis nodum hunc enodabimus.

Tollitur secunda concedendo, quod aer indicet extra methodum medendi; quemadmodum temperatura indicat sui conseruationem, sic aer est contemperandus, & vt talis conseruandus; quæ consideratio potius pertinebit ad libros de tuenda sanitate; vel dicimus aerem indicare morbi naturam, & non indicatum, de quo loquimur.

Vt altioribus principijs probeatur symptomata non indicare. Cap. 2.

QUOD symptomata non indicent, Galenus in methodo nō vno loco docet 2. method. cap. 4. habet indicationem prædij non desumi à symptomatibus, sed solum ab ipsa substantia, per substantiam intelligens morbum, à quo tamquam à proprio subiecto enascitur symptomata: 3. method. 1. dicit, quod indicans sit illud quod curatur, symptomata, cum non curentur, sed morborum ablatione auferantur, nullo modo indicare poterunt; Præterea illud quod curatur est permanens, & cum vocetur à Galeno substantia, est independens, & in facto esse; symptomata vero sunt accidentia in fieri, dependentia, insequentia morbum, vt umbra insequitur corpus: quod sint accidentia, & insequentia substantiam, est Galeni 1. method. 9. dum dicit, sanis quidem nobis accidentia, ægrotantibus symptomata nuncupantur.

Insuper Gal. 4. meth. 3. dicit, a nullo eorum quæ adhuc non permanent sumitur indicatio ex vsu. Addimus nos minorem sed symptomata non permanentes: sed dependent, sunt in fieri, quia sunt accidentia morborum; ergo ab illis non sumitur indicatio.

Confirmatur quod accidentia semper pendeant & sint in fieri ex nominis ætiologia, quia accidens græcè dicitur

συμβιβαστικῶς, idest simul veniens, sicuti subiectis accidens simul venit, semper dependet, & semper fit; similiter symptomata simul veniunt cum morbis semper ab illis dependent, sunt in fieri, & morbis ablatis, omnia cessant esse; nihil igitur symptomata, vt talia sunt, indicabunt.

Insuper alia sūt principia, eaque altiora, quæ nos omnino cogunt ad dicendum, quod symptomata non indicent: audite, omne quod indicat in arte medica indicat contrarium positium; & non priuatiuē, quæ enim opponuntur priuatiuē, non sibi inuicem destruunt; dū nos quærimus remedium contrarium, illud nō solum expiscamur, quod indicat, vel morbo possit aduersari; verū etiā quod possit in certamine illud vincere; at sic est quod omne, quod est in fieri, nullum habet esse positium, ergo nullum habebit contrarium positium, omnia enim, quæ sibi aduersantur, debent esse positiua, & in facto esse, alioquin, cum non sint, non poterunt sibi contrariari. Sed clarius omne quod est in fieri, est in fluxu, at oppositio, quæ obseruatur in ijs, quæ sunt in fluxu, sunt duo termina, scilicet a quo, & ad quem, quorum alter cum sit præfens, cessat, vel corrumpitur, & per consequens sibi inuicem relinqueri non possunt: quare nunquam dabitur hoc contrarium, quod posset symptomata, quatenus sunt in fieri, & dependentia, depellere: vt quid igitur empirici symptomata curant, si nondantur symptomatum remedia?

Sed eadem solertia prestat, vt disquiramus, an symptomata indicent: audite, illud, quod propriè & per se insinuat aliquid, non potest aliud genere diuersum insinuare, sed sic est, quod symptomata propriè insinuant morbos, ergo non insinuabunt remedium, quod a morbo, vt ostendimus, genere differt: Præterea ab eo, quod est per accidens, non potest sumi indicatio, quia nulla scientia, & nulla infima ars ita rudis esse potest, vt aliquid colligat ex accidentalibus; oportet enim ex proprijs, & ex ijs, quæ sunt per se procedere, si aliquid inuenire velimus, alioquin frustra tempus terimus: quod tanto magis in methodo medendi debet obseruari, quanto Galenus 2. metaph. 7. dicat, indicationem esse organum inuētiō-

nis, cuius merito remedia debent perquiri: Indicatio sanè non potest esse organū inuentionis, nisi esset syllogismus cōcludens a liquid, quod erat prius ignotum.

Porrò, qui indicationem haurient a symptomatibus semper incident in Elenchum, in quo sumitur non causa pro causa: Exemplum, alui fluor est symptoma: quia a symptomatibus sumunt indicationem, dicent, fluxum semper indicare remedium astringens: arte medica omnino ignari astringentium ysu aliquando atcebut commodam nature euacuationem, & aliquando interficient: causa fluxus est bilis, à qua deberet sumi indicatio; quare cum a symptomate illam hauriant, sumunt pro causa non causam.

Amplius, quod symptoma nullomodo indicet remedium, nec remedium indicet a symptomate, patebit, quia vel cōsiderabitur symptoma vt finis, in quem remedia dirigi debeant, vel vt effectus superabilis, & vincibilis a remedio, quod secundum hunc sensum est causa efficiēs; dicimus, quod quocūque modo consideretur est necessarium, vt indicans, & indicatum sibi inuicem respondeant in aliquo modo dicendi per se, omnes enim causas, quæ sunt veræ, quæ aliquid efficiunt, & quæ aliter se habere nō possunt sub aliquo necessitatis gradu debent cōrineri.

Omnes conueniunt philosophi, quod causæ externæ, vt efficiētes, & finales sint in quarto modo dicendi per se: videamus ergo, an symptoma possit dici causa finalis, in quem remedia dirigi debeant, & an remedium possit dici causa efficiens superans, & vincens symptomata.

Quod symptoma nō possit esse positum finis, est Galeni sententia 3. meth. 9. vbi dicit, quod in affectib. præter naturā triplex sit solum proponendus finis, causa scilicet illud sine quo non, & vrgens, sub qua distinctione symptomata, ut symptoma non collocatur: Præterea symptoma non potest esse finis, quia de ratione finis est, vt sit quid vltimū, independents, quo adeptō quiescimus; at symptoma est accidens dependens a morbo est quid posterius, & in fieri, ergo nō erit finis, in quem remedia dirigi debent: Insuper quando remedium tollit morbum accidit remedio, vt symptoma quoque tollatur; considera-

tum igitur remedium, vt dirigitur in finem, respectu symptomatis erit accedens & non causans; quare si nullus erit progressus ab accidente ad accedens, nullus quoque erit à remedijs ad symptomata.

Auerroes. n. in quadam digressione contra Temitium redarguit demonstrationem ab accidente ad accedens vt vanam, & chimericam: fundamentum huius rationis est Aristo. 4. meta. tex. 14. vbi dicit, quod nunquam accedens est accedens accedens: nullum accedens, vel nullus effectus de effectu, vel alio accidente per se dicitur, erit igitur causa finalis petenda à subiecto, quod est independens & vltimum, quodque non sit in fieri: si demum vixerimus, quod symptoma sit effectus vincibilis à remedio, & hoc modo symptoma indicet contrarium, iam ostendimus superius, quod oppositio contraria versetur inter terminos positivos, & non priuatiuos, quare cum symptoma sit in fieri, remedium, quod est positium, symptomati non relictabitur: nulla sanè est sub eodem potentia, quæ corporis eadem manente presentia, eius umbram possit destruere.

Demum, si indicata agerent in symptomata, vt in contraria; sequeretur, quod symptomata agerent quoque in indicata: sunt Aristo. hæc verba, faciunt autem, & patiuntur contraria ab inuicem: sed sic est, quod symptomata sunt in fieri, ergo non agent; agentis enim proprium est, vt sit in facto esse, si agere debeat: patet ergo symptomata non indicare.

Quibus logicis principijs probetur locum affectum in methodo curatrice non indicare. Cap. XI.

SI satis mihi esset propterea Gal. sententias considerare, hic acturus, an locus affectus in meth. medendi indicet, possem cum alijs, in verbis magistri conuiescere: clarissimum enim est apud Galenum, locum affectum indicare conseruationem, & nequaquam contrarium: causa, cur omnia ad examen logicum in hoc libello reuocamus, est Gal. qui 2. meth. c. 6. & alibi proponit in tota methodo agendum de locis: parigitur erat, vt semel videretur, quæ nam esset hæc logica, cuius vir-

tute Galenus tam præclaram methodum edere in lucem potuerit.

Quod ex Galeno solus affectus non indicet, in primis patebit, quia 3. metho. 1. dicit, quod solum quod curatur indicat contrarium; à medico enim solum causa, & morbus curantur, indicant contrarium, partem vero affectam simile, vt conseruetur.

Amplius morbi & causæ sunt accedentia superabilia locorum affectorum; ergo a loco affecto non indicabitur remedium morborum, & causarum; pleura enim sine pleuritide, & pulmo sine peripneumonia stare possunt: nec valet, pleura est affecta præter naturam, ergo est inflammata; pulmo est læsus, ergo est peripneumonia: cum igitur accidat, vt pleura inflammetur, si à pleura affecta, vel ab alio loco affecto procedemus ad inueniendum remedium pleuritidis, vel alterius morbi, vel causæ, in eodem semper in enthymema ex signo solubili omnino explosum atque reiectum ab Aristotele. Et a Galeno 2. de temperam. c. vltimo, vbi reprehendit illos qui ex proprijs, & inseparabilibus non procedunt, hæc sunt verba, in his omnibus peccant plerique medicorum, ex eo quod proprias notas respuunt, atque ad ea, quæ non perpetuo, sed frequenter accidunt conuertuntur.

Insuper si locus affectus indicaret, sequeretur quod idem indicaret duo contraria; modo enim pars corporis redditur affecta ab intemperie calida, modò frigida; modò patitur adiapneustiam; modò ecphrasim, quam reclusionem Græci vocant; si igitur locus affectus indicaret in methodo curatrice, idem in affectibus contrarijs indicaret opposita, quod esset inconueniens.

Amplius, si quis diceret, pleuritidem indicare plebeotomiam, quia plena sit affecta, idem est, ac si diceret, hominem esse risibilem, quia sit Italus: causa hic à loco desumpta est omnino extranea, & falsa. Aristo. 2. post. tex. 25. dicit, quod qui referunt causam non ad æquatam pro æquatam tripliciter errent, vel dum afferunt causam partialem pro totali, vel dum pro proxima afferunt causam remotam vel extraneam, sicuti est locus respectu locati, hæcque postrema est alijs deterior.

Postremò indicata desumuntur, vel ab essentia indicantis, vel à consequentibus essentiam; at locus affectus neque pertinet ad essentiam indicantis, neque ad ea, quæ consequuntur essentiam; ergo ab illo non debent desumi indicata: non ad essentiam; quia vnum indicat vnum; locus affectus indicat plura, quia pluribus; ipsique contrariis affectus premi potest; non ad ea, quæ consequuntur; quia quæ consequuntur quatuor sunt, & alia non dantur, suntque actio, passio, præsentia, & substantia non loci affecti, sed causæ peccantis.

Inde fit, quod quid agendum debeat necessario desumi ab essentia specifica indicantis. Cap. XII.

QUOD desumatur ab essentia indicantis quid agendum, non vno loco ex Galeno colligi potest, dicit enim libro de optima secta ad Trasib. quod à specifico affectu in dicitur morborum expulsio, at sic est, quod affectus specificus est eius essentia, ergo quid agendum ab essentia indicantis desumitur.

Ceterum ad altiora methodi principia mentis aciem conuertamus: dicit 4. methodus 4. quod methodus, vt methodus est via vniuersalis cuiuslibet particulari applicabilis: quare si methodo inquirere, est per indicationem, & viam vniuersalem procedere, vt in limine huius libelli quoque probauimus, sequetur, quod remedium methodo inuentum sit vniuersale, & non particulare, & si vniuersale, sit quoque essentia; omnia enim, quæ supra particularia collocantur, sunt essentia, & naturæ vniuersales, vel quidditates rerum, non infinitæ, vt sunt particularia, sed finitæ; non corruptibiles, sed æternæ, & quæ solæ artibus; & scientiis subiiciuntur.

Præterea illud, quod indicat contrarium est forma, ergo à forma, quæ est rei essentia quid agendum desumitur: pater ex Aristotele, D. Thoma & Themistio, quid dicunt; quod contraria sunt duæ forme extreme in eodem genere.

Galenus 1. method. cap. 12. dicit contraria esse duo extrema generis: sicuti ianitas, & morbus; symmetria & ametria, de-

sitas & raritas; id quod est secundum naturam, & id quod est præter naturam, quo loci Galenus videtur reprehendere Aristotelem quod non seruet suam legem in omnibus: quia 1. physicorum formam, & priuationem vocat contraria, & in post prædicamentis oppositionem priuationem: Sed defenditur, quia lato modo desumpsit contrarium.

Insuper cum ex Galeno probatum sit, a cognitione indicantis inuentionem remedium pendere, sequetur, quod in dicans sit medius terminus, quo peruenire possumus in notitiam remedij: remedium vero sit maior extremus, & agrotus minor; ab indicantis igitur natura, & essentia solum colligere poterimus remedium pro cura huius, vel illius agrotantis.

Amplius; patet, quod hæc essentia, à qua colligitur quid agendum, non sit supra specificam essentiam, neque infra, ex his, quæ superius probata sunt; pater quoque quod quid agendum, vel remedium, quod indicatur ab essentia specifica indicantis, non debeat esse supra specificam naturam & essentiam; quia in eisdem errores incideremus, sicuti diximus de indicantibus genericis; incideremus enim in diminutam diuisionem, in petitionem principij, in secundam figuram ex duobus affirmatiuis, & applicaremus indicatum generis cum specifico alicui morbo, quod esset à ratione alienum.

Exemplum huius erroris est, dum rudiores desumunt remedium interceptans à materia fluente, putantque inueniri interceptiens genericum, & commune, quod possit omnibus fluentibus humoribus satisfacere, quod interceptiens genericum est quid superius, & hætenus neque à Galeno, neque vnquam ab alio inuenta est materia istius auxilij interceptiæ: nam si in crassando interceptare voluerimus, tunc indicabitur à materia tenui; si allringendo, ab angustante auxilio; quare non facit, vt colligamus esse interceptiæ, nisi interceptiens auxilium (cuius materia est occulta), diuidatur in crassificiæ, & angustans, vt illud specificum inueniamus remedium, quod non ab essentia generica sed specifica indicatur; generica enim respectu inferiorum subiecti materiae vi-

cum,

em, ipsaque non sunt, quæ rem complēt, quæ rem constituunt; quia nunquā sunt convertibilia, sola specifica sunt illa, quæ omnia constituunt, & ab illis effluunt operationes; quoniam per illa sunt, & conservantur; ea igitur, vt naturalis erit conservanda, & vt præter naturam contrarijs corrigenda.

Vt errant, qui pluratribus indicantia faciunt. Cap. XIII.

IN nulla artis medicæ parte plures se offerunt difficultates elcutiende, quam in hac contemplatione, quæ ad medendi methodum pertinet, quamvis Galenus omnia reddiderit clara, & prænitentia: causa est, quia nostratum plurimū non in primis fontibus medendi methodū addiscunt, sed vel ex librorum indice, vel ex parvis rudiorum hominum opusculis, vel ex eorum sermonibus colligunt aliqua, perperam intellecta de indicatione.

Ex Galeno 10. methodi 2. vbi de putridis febribus loquitur, dicit, tria tantum esse indicantia, scilicet morbum, causam, & virtutem: quæ sententia infra quoque confirmabitur altissimis philosophiæ principijs: nihilominus non desunt qui putant suffulti verbis Galeni perperam, intellectis; plura alia indicantia dari, quæ ad illa tria non referantur.

Sunt quised importunē defendunt indicationem desumi in Therapeutica à loco affecto, ab ætate, ab aere, à morbi magnitudine, à morbi temporibus, à consuetudine, & similibus, vt in nostratum medicorum cantilenis audiuimus, & in opusculis impressis legimus.

In hæc errata non prolaberentur, si ad potiora methodi exordia, & fundamenta reficerent: Quis, vbi hoc principium per nosceret, quod omne, quod indicat in Therapeutica cureretur, diceret locum affectum, ætatem, aerem, tempus anni indicare?

Quis vbi comprehenderet hoc aliud, quod indicans vnum indicet, diceret, magnitudinē morbi propriē indicare, cum Galenus dicat 4. methodi 6. magnitudinē morbi indicare purgationem, & sanguinis detractionem, quæ duo sunt? It de propria indicatione esset locus nō sibi

constat 9. meth. 12. vbi dicit vnum indicatum ab vno indicari, & non plura.

Quis denique præuiso, quod infra remedium specificum nullum sit indicatum, sed tantum materiæ indicatorum, quæ non ad methodum medendi pertinent: sed alias medicinæ partes, diceret ab aere, ab ætate, & similibus sumi indicationem? quæ omnia methodi fundamenta a Galeno sunt disertissimē (vt superius ostendimus) declarata, & pro virili nostro analyticis rationibus confirmata.

Occasiones, quod plura tribus indicantia faciant, sunt nonnulla Galeni loca præuē intellecta, Galenus enim 13. methodi 16. habet, coindicantia esse virtutem, ætatem, aerem, & consuetudinem, statim altiori Galeni philosophia spreta, plurimi rudiores colligunt ætatem, aerem, & consuetudinem indicare.

Similiter habet Gale. 3. meth. 3. in vlcere cauo sumi indicationem a loco affecto: similiter colligunt locum affectum indicare: vident 9. methodi 14. referri a Galeno, quod indicatio specifica sumatur ab ætate, consuetudine, & ab aere, ideo statim colligunt, hæc omnia indicare, & per consequens indicantia esse plura tribus.

Causa erroris istorum est, quia indicans sumitur dupliciter, vel pro affectu, cui primo reluctatur indicatum, & de hoc est in methodo loquendum, vel sumitur indicans pro signo indicante affectum præter naturam, quod indicans non indicat remedium, sed indicat naturas affectuum, illoque manifestat, & declarat; de quo indicante omnes scientiæ, & facultates agunt, & hoc non est illud, quod contrarij indicat, & ad methodum pertinet.

Ostendimus cū Galeno superius, quod de ratione verū indicantia sit quod curetur, & sit forma opposita remedio: ætas florens non indicat venæ sectionem; 4. de ratione vict. 19. dicit secāda est vena, quando ætas est florens; quia vt plurimū in ætate florente virtus est adeo robusta, vt faciliē ferre possit sanguinis euacuatio, nem; accedere tamen potest, vt ætas florens sit viribus confracta, & nō permittat,

rat, & sit signum perpetuæ veritatis, atas igitur erit, vt plurimum signum indicās, quod venæ sectio tuto fieri possit.

Similiter tempus non per se indicat remedium; dicit enim Galenus 4. methodi 4. quod tempus non indicat per se, quinimo cap. 5. eiusdem libri habet, in vlcere diuturno inueniri iuuans, vel remedium non ex diuturnitate vlceris, sed ex tali vitio succi: ecce quod succus, & non tempus indicat iuuans remedium, quamvis tempus diuturnum possit esse signum mali succi: eadem dicimus de aere: dum quispiam patitur vlcus, & aer tunc sit humidissimus, aer est signum in vlcere in-fensorem humiditatem fieri, quæ deinde humiditas indicat exicans remedium, quod sit validius.

Cæterum quorsum hæc disputatio, cum doctrina Galeni sit aperta, & perspicua? ex Galeno (vt diximus) 10. methodi 2. tria tantum enumerantur indicantia à causa videlicet, à morbo, & à virtute desumenda; ergo cætera, vel ad hæc reducuntur, vel erunt signa significantia morbum, vel causam, & non remedium.

Quod tria sint indicantia, potest analytica virtute sic confirmari: causa, cur termini ad conficiendam optimam demonstrationem neque plures, neque pauciores tribus requirantur est, quia nihil fieri potest, nisi tria conspirent, scilicet causa quæ efficit, res effecta, & subiectum: analytica enim principia omnia ad vnguem declarant.

Quod verò causa efficiens in medicina à re effecta distinguatur patet, quia à

se inuicem sunt separabiles; febris putrida efficit hecticam, abit, & remanet hectica: seruabitur, ergo inter causam, & morbum nexus quarti modi dicendi per se; exemplum erit ædificator, ædificium, & materia ædificij; morbus, causa, & subiectum vinens.

Ijs tribus res constant, & quilibet discursus, nisi sit deceptorius ijs tribus formatur, si quis addiderit quartum in paralogismum cadet; si quis adimerit tertium, ex duobus nihil fieri poterit: Medici igitur est, contrarijs duos terminos, scilicet causam, & effectum dirimere, tertium, quod erit subiectum, conseruare.

Cætera omnia præter tria proposita erunt vel antecedentia, vel signa conuenientia, quæ de natura eorum non sunt sicuti de ædificio dicimus tempus, & magnitudinem non pertinere ad naturam ædificij; sed ad signa an facile, vel difficile erui possit, ædificium temporis vetustate ferè absumptum indicabit facile, recens difficile erui posse: magnitudo ædificij indicabit difficultatem, quæ sunt signa ostendentia naturam ædificij, natura deinde ædificij, quatenus ex lignis, & marmoreis lapidibus constat, varia indicantur; etenim, vt lignea igne, vtque marmorea ferro esse demollienda.

Ad eundem prorsus modum tria sunt indicantia, causa, morbus, virtus; magnitudo, morbi, vel tempus morbi indicant naturam morbi; sed non remedium, quod destrui possit morbus, quod est illud, quod quærimus in methodo medendi.

FINIS VNDECIMI LIBRI.



SANCTORII SANCTORII

Olim

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIVM

In Analogismis, & Experimentis perquirendis.

LIBER DVODECIMVS.

Quid sit analogismus Empiricorum, & quomodo formetur. Cap. I.

DIxiſmus, quòd à varijs medicorum ſectis tria fuerint obſervata instrumenta pro inveniendis morborum remedijs, ſcilicet indicatio, analogiſmus, & experientia. Oſtenſum eſt in libro ſuperiori, quod indicatio erat instrumentum certiffimum; quia omnes eius conditiones, & proprietates firmiffimis analyticis principijs conſentiebant. Modo, ut differant hæc instrumenta inter ſe, & quantum valeant, ſecundùm eaſdem leges logicas examinabimus.

Differ indicatio ab analogiſmo, & experientia, quia per indicationem colligimus remedium ab indicante præcognito; niſi enim indicans prius rectè cognoscatur, non poſſunt remedia per indicationem perquiri: hinc tota Galeni methodus, quæ ſolum per indicationem

inuenit remedia, tradit quoque modos cognoscendi omnia indicantia præter naturam; quia ſolum illis præcognitis, remedia cognoscuntur.

Remedia verò, quæ per experientiam inveniuntur, non à præcognitione indicantis, ſed ab aliorum obſervatione colliguntur; verbi cauſa, ſi viderimus, quòd aliquis uſu portulacæ ſtupore dentium, fuerit liberatus, & deinde ceteros eodem ſtupore correptos iuvare videamus, tunc dicemus ſuiſſe inuentum per experientiam, & non per analogiſmum, quod portulaca iuuet.

Quæ demum per analogiſmum perquiruntur, non pendent ab obſervatione eiſdem affectus, ſed à ſimilitudine quadam; analogiſmus enim ex Galeno lib. de opt. ſecta, & alibi eſt comprehenſio remedij per ſimilitudinem.

Verùm, quia duplex eſt analogiſmus; alter empiricorum, & alter dogmaticorum; par eſt, ut in hoc capite prius decla-

remus ex Galeni sententia quid sit analogismus, & deinde in sequentibus distinguamus analogismum vtilem ab inutili.

Galenus libro de opt. secta ad Trasylb. c. 10. & alibi de virtute analogismi habet hæc verba, tunc inveniuntur remedia virtute analogismi, quando causa, vel indicans ignoratur, & de illo nulla sit facta observatio, sed affectus videatur symptomatib. alijs præcognitis esse quâsimilis: Ex ijs verbis colligimus duo requiri, vt formetur analogismus, alterum indicans ignoretur, dum enim præcognoscitur, non indigemus analogismo; quia tunc per indicationem procedere possumus: alterum, vt in affectu, pro quo remedium quæritur, non sit facta aliqua observatio, vel experientia; sed solum à simili in remedium inuentione procedatur.

Subdit Galenus, & tradit exemplum, vt clarius intelligatur modus procedendi per analogismum: hæc sunt verba, esto aliquis demorsus ab hamorho serpente, ac sanguis effluat nos ignari, quæ causa affectum attulerit, neque vlla observatio instructi, ea adhibebimus remedia, quæ ad sanguinis eruptionem ortam ex diuisione sunt accommodata; ignota itaque causa, nullaque facta experientia, dabitur hic tertius modus inueniendi remedia per analogismum, qui est per similitudinem.

Quis enim posset causa ignota symptomatum per indicationem inuenire remedium? quis quoque posset pro affectu, de quo nulla facta est observatio, remedium per experientiam reperire: analogismus igitur, quando erunt inuenienda remedia, per similitudinem, habebit locum.

Similitudines verò, quibus vtitur empirici in analogismis consiciendis, traduntur à Galeno libro de subfiguratione empirica cap. 11. & alibi, vbi dicit, quod à locis affectis, ab affectibus, & à materijs auxiliorum depromuntur similitudines.

A locis affectis, sicuti si in brachio aliquod appareret symptoma, idque aliquo auxilio sanaretur: empiricus, qui vtitur similitudine locorum affectorum, quando viderit quod simile symptoma accidat cruri, statim ob similitudinem harum partium extremarum, putabit eodem remedio posse cruris affectum tolli.

Ab affectibus colligunt similitudines, exempli causa: si fluxus sanguinis è naribus bolo armena suppressatur, eodem remedio putant empirici, alui sanguineum fluxum arceri posse.

A materijs, velut si cydonium præstet auxilium; à simili dicunt mespillum idem emolumentum allaturum; quia ambo vires astringentes sortiuntur.

Cæterum, quam sæpe ob hanc malam philosophandi rationem in errores prolabantur, antequam initijs analyticis empiricorum errata aperiamur: casus, & exempla medica, quibus conuinci possunt asserantur.

Expendamus sputum sanguineum, cui dubium, quod modò profluet sanguis ob fracturam, modò ob erosionem venarum, ob diapidisim, & modò ob anastomasmum? quis tam rudis crederet, quod vnum remedium posset accommodari omnibus ijs diuersis, & contrarijs causis.

Simili modo erit in aliquo egrotante vrinæ suppressio, an ne hoc symptoma, aliquando ob calculum, aliquando ob inflammationem, & aliquando ob distensionem vesicæ sit? symptoma est vnum, vel similitum, nihilominus remedium non potest esse vnum; etenim, si suppressio fuerit facta ob distensionem, tunc, si immiserimus catheterem, statim iuuabimus; quia vrina è vestigio disfluat: si vero suppressio fuerit facta ab inflammatione, ex vi catheteris nullum habebimus leuamen.

Galenus libro de optima secta ad Trasylb. cap. 23. loquens de analogismo assert hoc exemplum; si suppressio fiat ob inflammationem, adiungendum esse cataplasma, si ob calculum, esse secundum, vt extrahatur.

Similiter vlcus cauum non indicat vnum Sarcoticum quia in aliquibus vlcibus cauis Thus est sarcoticum, si vlcus est in pueris, atamen in nauta & rusticis Thus non est Sarcoticum, sed concoctorium id est pus generans quod Galen. testatur 3. meth. cap. 3. Ibidem dicit quod magna est methodicorum temeritas, dum putant vnum sufficere in vlcere sanatione: Thus enim in cauis vlcibus puerorum est Sarcoticum: in cauis vlcibus rusticorum est suppurans.

Ecce igitur, quod in vnico affectu remedia diuersa, & aliquando contraria esse debent: ecce; quod ex similitudine symptomatum nullo modo colligere possumus remedium.

Postremo tantum abest, vt affectuum similitudo indicet vnum remedium, vt sæpe possit accidere, quod affectus omnino dissimilis requirat idem remedium: exempla afferuntur à Gal. loc. cit. vbi dicit in tetano, emprostotano, & opistotano, quæ sunt symptomata diuersa, vnicâ esse affectuum naturam, vnicamque formalem causam, & hanc esse conuulsionem, dicitque eadem requiri remedia, licet symptomata videantur esse contraria.

Demum poterit esse sanguinis eruptio, obstructio, inflammatio, qui affectus licet sint diuersi, possunt tamen ab vnica plenitudine pendere, quæ vnico quoque remedio tollitur, scilicet euacuante; quare nec vnicum symptoma, nec simile nos docebunt remedium; nec dissimile & contrarium remedium indicabunt.

Ostenditur, quod analogismus ratione forme sit paralogismus. Cap. II.

Numquid analogismus empiricorum sit modus ineptus perquirendi remedia, nec ne, dicimus, quod non ad medicum, vel philosophum hæc consideratio pertineat, sed ad syncerum logicum, cuius munus est decidere, an argumenta, falsa, aut vera sint: In hoc capite igitur analogismi vitia, ad arguendi formam pertinentia declarabimus.

Primum igitur analogismi vitium est quia medius terminus, quo vtitur empirici pro cognitione remedij, est communior passio curandi, & eius remedio, quod vniuersum pertinet ad secundam figuram ex duabus affirmatiuis, quæ ab Arist. in lib. prior. & 2. elench. c. 5. est reiecta; medius enim, quo vtuntur in analogismo, est similitudinem symptomatum cōcursus, qui obseruatur in affectibus omnino diuersis, quales sunt vrinæ suppressio, sputum sanguineum, & alij plures, qui à diuersis fiunt causis; erit igitur symptomatis similitudo quid vniuersalius, & ex illa nihil inferri poterit: non valet, est lumen, ergo est sol, cum ignis, & plura putrida luceant.

Nec dicant empirici, quod multa re-

quirant, quibus distinguere possit suppressio à calculo, ab illa, quæ fit à distensione, vel inflammatione vesicæ, qui, si rectè distinguerent, coacti admitterent distinetam cognitionem causarum, quas putabant esse incognoscibiles: nunquam suppressionem vrinæ à calculo factam ab alijs distinguunt, nisi quoque cognouerint, quòd illius causa calculus sit.

Similiter dicendum de sputo sanguineo; empiricus, exempli causa, semel sanauit sanguineum sputum saccharo rosato, quia sanguis qualitate peccabat; nunc supponatur, quod ob sanguinis copiam sputum sanguineum fiat, tunc quomodo ex concursu eiusdem symptomatis, nisi causam cognoscere) colligere poterit remedium? saccharum rosatum in copia sanguinis maximè lederet: similitudo igitur est medius terminus nimis vniuersalis, vt inde remedia pro auferendis causis colligere possimus: de ratione medij termini ex Aristotele est, vt contineatur, & contineatur, si solum cōtineatur, nō est amplius medius, & ex eo nihil sequitur.

Quis admitteret hunc paralogismum factum ex medio termino, qui solum continet, & à maiori extremo non continetur? ignis est elementū, aqua est elementum, ergo aqua est ignis: elementū, quod est medius terminus ab igne non continetur, hinc ex illo nihil inferri potest.

Præterea analogismus non solum est argumentum in secunda figura ex affirmatiuis; verum etiam est irreducibilis ad primam: audias, quomodo syllogizant, dum ex suppressione vrinæ colligunt remedium consistere in vsu catheteris: omnis affectus cathetere indiget, qui est alteri, cui profecerit quamissimilimus; sed hæc suppressio vrinæ est affectus ei, cui profecerit quamissimilimus, ergo hæc suppressio indiget cathetere.

Hæc propositiones neque per conuersionem, neque per transpositionem possunt redigi ad primam figuram: non per conuersionem, quia maior propositio, in qua prædicatur est communius subiecto, fieret particularis, & per consequens esset vana: quia in prima figura ex maiori particulari nihil omnino inferri potest.

Quod igitur affectus quamissimilimus latius se habeat, quam ille, qui eget cathe-

tere, patet, quoniam similitudo istius affectus non solum est in calculosis; verum, etiam in vesicæ distensione, & inflammatione: erit ergo necessarium, ut illa maior sit sicuti posuimus: posito verò, quod in maiori medius terminus prædicetur, illud est secunda figura; quia etiam in minori prædicabitur: nisi quis in alium peiorem errorem transiret dicendo, quod datur quarta figura, in qua propositiones sunt præternaturam, & in qua semper medius continetur, quod est monstruosum, veluti si diceremus, dolium esse in vino, vel arcam in nupis.

Nō per transpositionem, quia transponas maiorem, vel minorem, semper medius terminus prædicabitur, & erit secunda figura ex puris affirmatiuis.

Præterea dum dicunt, illud remedium esse iuuaturum, quia profecit alteri huic quam similimo, incidunt in enthymema ex signis communibus, quod nō concludit: quis inferre, quod mulier pepererit ex eo, quod pallida sit, cum pallor ab innumerabilibus causis euenire possit? eodem modo affectuum similitudo est communis ijs, quibus supprimitur vrina ob calculum, ob inflammationem, & ob distensionem vesicæ.

Insuper, qui hoc analogismo, vel argumento à simili vtuntur, in remedijs perquirendis arguendi modum ab exemplo desumunt, veluti Socratem correptum sputo sanguineo hæmatites, vel saccharū rosatum iuuat, ergo & alios sputo sanguineo correptos iuuabit: hæc ab exēplo cōsequētia ab Aristotele 2. priorum cap. de exemplo reiicitur, quia est à parte ad partem, quod non sequitur, ut ibi docet.

Ad hæc ab Aristot. exemplum vocatur inductio imperfecta, quæ cadit semper in tertiam figuram cum vniuersali conclusione, quæ non sequitur; quia ex particularibus neque vniuersale, neque particulare colligi potest; non vniuersale; quia ex Arist. de ratione conclusionis est, ut semper deteriorē partē sequatur, si à præmissis debeat contineri: nō particulare, quia non datur processus ab eodem ad idem.

Scio, me plurimis nauseam fortasse inferre ob hanc toties repetitam logicam, verum, quia nullam aliam inuenire possumus viam, qua reiici possit salus ana-

logismus, aliqua sumus excusatione digni, eo magis cum Aristotelem imitemur qui alio modo in naturali philosophia, & metaphysica non potuit veterum philosophorū parallogismos infringere, quàm logica, non semel, sed decies repetita; quare non erit ab re, si alijs quoque medijs logicis hunc empiricorum analogismum reicerimus.

Si analogismus aliquam haberet inuentionis vim, eam, cum ex similibus exemplis procedat, colligeret (ut diximus) virtute inductionis; at ab Aristotele 2. post. text. 4. ostensum est, quod occultum per inductionem nunquam possit inueniri, ergo analogismus erit omnino inutilis: medici munus est remedia, quæ sunt occulta, perquirere; etenim, si ex se non essent, neque experientia, neque demonstratione indigeremus.

Ratio potissima, cur inductio non aperit occulta, est, quia semper procedit ex particularibus, à quib. nil sequitur, omne enim quod infertur debet fundari in dicto de omni; vel de nullo; ut altissimis rationibus ab Arist. in lib. prior. probatum est.

Præterea, dum aliquid occultum per aliquam ostensionem manifestatur, solum id fieri potest ratione trium terminorū, qui sunt inter se distincti, & tales, ut maior terminus differat à medio forma seu definitione, dum enim definitione formali conuenienti, non manifestatur quod queritur, & argumentum redditur omnino ridiculum, quia semper supponat principij petitionem.

Hæc doctrina est Aristotelis 2. post. tex. 12. vbi probat, quod nunquam per definitionem seu formam maioris termini occulta manifestentur: exemplum Aristotelis est tale: si quis probaret glaciem esse aquam ob defectum caloris, nihil probaret; quia defectus caloris formaliter non differt à glacie; & hæc est causa, cur neque genus, neque differentie maioris termini possunt manifestare quæ situm.

Quod igitur argumentum in quibus medius terminus sit genus aliorum terminorum sit vanum, cōprobetur aliquo famoso exemplo, hocque offerat: omne quod est substantia est, phoenix est substantia, ergo phoenix est argumentum est nullum; quia substantiam esse est medius terminus.

terminus, estque genus phœnicis, & in maiori propositione est manifestissima. petitio; quia, qui negabit phœnicem esse, negabit quoque, phœnicem esse substantiam.

Eadem sequentur incommoda, si quis probaret per differetiam quesiti, veluti, si quis probaret, hominem esse, hoc syllogismo; est animal rationale, ergo est homo; Cum igitur medius terminus forma seu definitione debeat differre ab eo, quod queritur, quomodo transeundo à particularibus ad aliud particulare, quæ non forma seu definitione differunt, poterimus aliquod occultum remedium manifestare? particularia .n. cum sint eiusdem speciei, non differunt forma, transitus ergo erit ab eodem ad idem; si diuersæ speciei, erit transitus omnino vitiosus; quia particularia, vt particularia solum, per hic, & nunc distinguuntur.

Amplius si committatur petitio principij ob transitum, qui sit à genere ad speciem, quanto maior committetur à particulari ad particulare? species, quamvis forma aliquo modo conueniat cum genere, est tamen maior differentia inter speciem, & genus, quam inter particulare, & particulare.

Maximus erit error illorum, qui approbant remedia, quia alios iuuarunt; quandoquidem illorum petitio non est ob transitum à genere, vel differentia ad speciem, sed ob transitum à particularibus ad particulare, inter quæ nulla omnino cadit formæ distinctio.

Ad hæc, supposito, quod empiricorum analogismus sit inductio, vel transitus à particularibus sine causarum cognitione, in alia duo errata ad formam arguendi pertinentia empirici videntur prolabi.

Primum erratum est, quia de ratione præmissarum est, vt contineant conclusionem; sed sic est, quod particularia nihil possunt continere, ergo ab illis nihil colligi, vel inferri poterit; si igitur vim inductiuam habebit analogismus, vt aliqui putant, erit in perquirendis remedijs vanissimum argumentum.

Secundum, qui arguit ex particularibus necessariò incidunt vel in primam figuram, vel in secundam cum maiori particulari: maior particularis neque in pri-

ma, neque in secunda figura accommodari potest: non in prima, quia medius terminus, si debeat manifestare, cur passio inheret tubicæ, debet in maiori contineri, & in minori propositione continere: Non in secunda, quia in hac medius prædicatur in maiori de quesito, seu de maiori extremitate, at sic est, quod de ratione maioris extremitatis est, vt semper contineat minorem; ideò semper maior in secunda figura erit vniuersalis: nullus igitur relinquetur modus probandi, quod analogismus possit esse argumentum aptum ad perquirendum aliquod remedium quod sit occultum.

Ostenditur, quod analogismus ratione materiae sit paralogismus. Cap. III.

QUOD analogismus empiricorū peccet quoque in materia, faciliè ostendi potest: illud in primis se offert analogismi erratum, quod ab Arist. reijcitur 1. post. c. 5. quod est, dum attribuitur inferi ori, quod superioris est: obseruant, exempli causa Empirici, quod aliquod remedium curet tetanum: statimque putant, quod illud non possit conuenire emprostotano, & opistotano: quia sunt affectus dissimiles: putant enim, quod remedia, hauriantur ab affectibus quamsimilibus: error illorum est, quia quod tetanum curat non est tetani remedium, sed conuulsionis, quæ æquè prædicatur de tetano, & de alijs suis speciebus: eadē ratione, dum curant inflammationem factam à pleuride virtute phlebotomiæ, credunt hoc auxilium conuenire inflammationi, & affectibus quamsimilibus, & non alijs.

Error hic apud Aristotelem aperte reijcitur, dicit enim quod habere tres angulos non euenit primo schaleno, sed triangulo: curatur inflammatio remedio, quod tollit plenitudinem, quod non conuenit primo inflammationi: à plenitudine enim obstructio, febris, & sexcenta symptomata omnino dissimilia oriri possunt.

Præterea multis modis ab admirandis Arist. præceptis traditis in lib. post. analogismus empiricorum deflectit. 2. post. tex. 25. agens philosophus de adæquata causa, prout potest esse medius terminus in optima demonstratione, dicit, quod in huius causæ inquisitione triplex error cō-

mitti possit, quorum primus est, dum affertur causa communis loco adæquata.

Secundus, dum affertur causa extranea.

Tertius, dum partialis; dicimus igitur, quod dum attribuitur tetano, quod est conuulsionis, accipiunt communem causam pro adæquata: non licet in Medicina, in qua tractatur de hominis vita, uti figuris: sed Poetis sunt relinquenda.

Eodem modo dicimus, dum ab vrinæ suppressione cōmuniter sumpta colligūt esse vrendum syringa, quod ex medio communi procedunt, qui est ineptus ad perquirendum remedium accommodatum pro tollenda suppressione facta ab inflammatione, vel calculo est: Galeni, locis si perius citatis, quod syringa conuenit si solum in distensione vesicæ, in inflammatione verò cataplasma externum, & in calculo sectio Lithotomi.

Amplius Aristot. 2. post. circa finem, ubi agit de ritè proponendo problemate, dicit, quod in qualibet contemplatione, ne labamur in syrtes, debeamus proponere passionēs, æquē dicantur de subiectis; si quis applicaret risibilitatem animali, vel hominibus Italis tantum, & non Turcis, & Indis alij, nihil de hac passione posset concludere: similiter, si daretur remedium, quod curaret tetanum, & empiricus non crederet, illud quoque conuenire opistotano, & emprostotano, nec ritè problema proponeret, & de hac re loquens semper vacillaret; quia remedium curans tetanum est accommodatum conuulsioni, quæ deinde dicitur de propositis speciebus.

Dum verò vice versa, speciei remedia applicat generi, ut diximus de syringa, quæ omnibus vrinæ suppressionibus ab illis applicatur, errant, quia, ut optime dicit Auerrohes, species non est de natura generis, sed genus de natura specierum: accidit enim species generi, & genus sine aliqua specie stare potest: nihil enim pateretur animalis natura, quamuis sub cælo non esset Leo, vel Homo, quia animal posset se conservare sine homine, & sine leone: species igitur quælibet ex se non erit de essentia animalis.

Præterea, qui vtrunt analogismo trāscunt ad similia, & inde colligunt remedia; at transitus ad similia non fit in gene-

re vniuoco, sed analogo, ea enim quæ vñs uocē conueniunt, non dicuntur similia; sed eadem.

Addimus, quod, qui vtuntur analogia semper trāscant de genere in genus; quanti vero sit hoc vitium, Arist. 1. post. & Gal. 1. ad Glauc. & alibi, demonstrant ex medio alterius generis nihil concludi posse; media enim & extrema 1. post. text. 20. ex eodem genere vniuoco sunt sumenda: ratio est, quia inter analogata nulla est naturæ conuenientia, nec dependentia; medulla, quæ est in animalibus, & quæ est in arboribus, quamuis analogicè conueniant, seruētque similitudinem, attamen eorū naturæ toto cælo inrer se differunt: similiter septum, & ossa natura differunt.

Ad eundem modum dicimus, quod suppressio vrinæ à calculo facta, licet quam similitima sit illi, quæ sit ab inflammatione, & analogicè cum illa conueniat differt tamen ab illa toto cælo: nemoque est ita mente obcæcatus, qui diceret, quod illæ suppressiones (quamuis sint quam similitimæ) natura non differant.

Insuper cum empirici ex symptomate, diuerso colligant remedia diuersitate, & ex simili simile, eodem modo in errorem incidunt, sicuti qui prauè, & per differentias accidentales diuidunt, quod ab Arist. reijcitur 2. post. text. 19. & 20. non potest diuidi substantia, quod alia sit calida, alia frigida, vel quod alia sit anterior, alia posterior: similiter conuulsio, quod alia sit tetanos, alia opistotanos: quia hæc sunt accidentia, & passionēs ægrorum, & non propriæ differentie conuulsionis, à quibus solum debent remedia desumi.

Ad hæc ex Aristotele loco citato habemus, quod inter inembra diuina illarum differentiarum, quæ genere conueniunt, si proba fuerit diuisio, medium nullum cadere possit: at qui putant tetanum, emprostotanon, & opistotanon esse tales differentias, ut inde remedium perquiratur accipiunt illud à differentiis, inter quas datur medium, vel quæ sunt accidentales, à quibus per se nihil colligi potest.

Porrò ex ijs, quæ ostendimus, remedia solum inferuntur ab aliquo, quod sit vniuersale; & prædicatum, quia medius terminus ducens nos ad cognitionem cuiusque quæsit, nunquam potest esse particularis,

cularis, sed solum specificus, nisi admittamus quartam figuram, & alios monstruosos errores, de quibus superius: sed tetanos, ut tetanos non est quid vniuersale, & prædicatum, sed tetanos, ut conuulsio, quæ dicitur etiam de alijs differentijs; ergo nihil erit in tetano, quod possit nobis significare remedium pro illius affectus cognitione.

Nec mihi quis obiiciat, quod Empirici nulla vtantur diuisione, quia arbitrabantur causas esse imperceptibiles: namque antiqui, quæ vnum specimen similitudinum habebant, coacti admittere debebant, dari causas saltem innominatas, quas dicebant esse imperceptibiles: quarum similitudines diuersum indicabant remedium: diuersæ igitur similitudines diuersas morborum naturas ab illis incognitas significabant: erant igitur coacti similitudines diuidere, ut formarent varios analogismos: & varia colligerent remedia.

Quod vero similitudines symptomatum, quibus vtuntur, illos decipiant, patet: quia sæpè sub vnico membro ponunt, quæ toto genere differunt, veluti dum stat apud illos pro specifica differentia suppressio vrinæ: suppressio enim est quid æquiuocum, & sub hoc nomine significari potest calculus, vesicæ inflammatio, vel distensio.

Eundem errorem committunt in materijs auxiliorum, & in locis affectis: In materijs, quia licet cydonium astringat, & inde roborat ventriculum, errant dum dicunt mespilum astringi, ergo roborat: Galenus enim libro de optinia secta ad Trasylb. dicit, absinthium roborat, quia astringit: marubium, quamuis aliquo modo astringat, non tamen roborat ventriculum, quin imo, eum reddit imbecillum, & flaccidum.

In locis affectis quoque errant: quia oleum rosarum ex Galeni methin vulneribus capitis est concoctorium, in alijs corporis partibus est repercutiens: similiter Gal. lib. 8. de sectis ad eos, qui introducitur c. 8. dicit, quod acetum cum oleo rosato aurium inflammationi optimus sit, oculorum verò noxiom, inflammatione gurgulionis spinæ Egyptiæ fructus est idoneum medicamentum, itidem alumen, scilicet, quæ oculis maximam afferent læ-

sionem, quare qui per similitudines affectuum, vel materiarum, vel locorum in affectuum procedunt, in perquirendis remedijs errabunt, & hoc fallaci modo ægros sæpius lædunt, quam proderint.

Denique, qui ex sola symptomatum similitudine remedia colligunt nulla præhabita cognitione causæ efficiētis, & materialis, vel subiectiui, nec vniuersalem, nec particularem præceptionē habebunt, non vniuersalē, quia, si de vrinæ suppressione loquamur, falsa est hæc propositio, suppressio, ut suppressio requirit catheterē, quia valeret, ergo omnis, quod est falsum: nō particularem, quia hæc quoque, si seuerè philosophari velimus, non valet, aliqua suppressio requirit catheterem, quia non quatenus aliqua suppressio, sed quatenus hæc aliqua suppressio pendet à distensione; de quo vero, & subtili philosophandi modo Auer. loquens 1. post. text. 21. proponit, an sit verum, dum dicimus, aliquod animal est risibile, dicitque, quod propositio est per accidens, & per consequens falsa, quia ut optime dicit Auerr. omne per accidens falsum est: homo non quatenus est aliquod animal, est risibilis; sed quatenus est homo; similiter non aliqua suppressio indiget catheterē, ut aliqua suppressio, sed quatenus ob distensam vesicam talis est; quoniam remota causa distensionis, remanet adhuc aliqua suppressio, sicuti remoto homine, remanet adhuc aliquod animal, quod non est homo, & quod non est risibile.

Hinc Arist. ne in similem incideremus errorem 2. post. valde laborauit, ut nos doceret, quomodo ritè debeat proponi problema, docuitque, quod passio querenda debet applicari illi subiecto, cui æquè conueniat, quodque non excedat passionem, neque ab illa excedatur; docuitque, quod, quando subiectum passionis propriè delitescit, coarctari debeat per concursum multarum passionum communium, donec innominatum subiectum fiat conuertibile: quem modum procedendi Aristot. 2. post. exemplo animalis habentis quatuor ventres declarat, dicitque, quod cognosceretur, quia habebit cornua, & carebit dentibus superioribus.

Empirici ex similibus symptomatibus neque causas, neque propria subiecta pote-

rant inquirere, quia logica omnino spoliati cecorum more in scopulos in qualibet contemplatione medica illidebant.

Præterea empirici neque incognitas causas concursu similium symptomatum coarctabant, vt vera remedia inuenirent, nec separabant vtilia ab inutilibus: omnia illorum signa erant inepta ad docendum; quia vel erant communia, vel supergredientia.

Quod communia non coarctata nihil doceant, sufficiat nobis, vt afferamus paralogisimum Brissonis, qui per hoc commune principium, scilicet, quæ sunt eisdem maiora, & minora sint inter se æqualia, putabat colligi posse quadraturam circuli: neque videbat, quod principium erat commune, & per consequens aliquando falsum: quattuor enim, & sex sunt simul maiora tribus, & minora octo, non tamen sunt æqualia.

Quod denique supergredientia semper decipiant, patet, quia sunt alterius generis, & ex illis nihil inferitur: nunquam igitur ex concursu similium symptomatum remedia colligemus.

Quid sit Analogismus Dogmaticorum, & quomodo formetur. Cap. IV.

SI affectus præter naturam ignoretur, non per indicationem, quæ à præcognita natura morbi dependet, remedium inuenietur: sed per experientiã, vel analogisimum; per experientiã, si illius morbi aliquam habuerimus obseruationem; per analogisimum, si occulta, & noua fuerit ægrotudo, quia illa, vt occulta, nõ præcognoscitur, & vt noua, non obseruatur per experientiam: exemplum est lues gallica, quæ, dum ab Indijs fuit ad nos delata, neque per indicationem, vel experientiam in eius curatione erat procedendũ: sed solum per analogisimum dogmaticum, statim enim ad nos non fuit guaiacum delatum.

Differentiam inter analogisimum dogmaticum, & empiricum tradit Gal. lib. de opt. secta ad Trasyb. c. 18. & 19. vbi dicit, quod dogmaticus separat vtilia ab inutilibus: Empiricus confusè miscet, ac implicat vtilia inutilibus.

Declarans Gal. quæ sint vtilia, & quæ

inutilia, dicit quod symptomata vtilia ad bonum analogisimum pertinentia sunt quæ desumuntur à causis, locis affectis, & à virtute: inutilia vero, quæ desumuntur à symptomatibus patientis, quæ licet aliquando sint diuersa, veluti sunt emprostotanos, & opisthotanos, eadem administrant remedia, & licet aliquando eadē videantur esse, vt dictum est de suppositione vrinæ, & de spū sanguineo, omnino diuersa debent proponi auxilia.

Dogmaticus, quamuis sibi proponat curandum morbum occultum, dummodo eius causam, virtutem permittentem, & locum affectum ex actionibus ipsis cognoscat, adeo innominatam morbi naturam coarctat, & limitat, vt semper virtute analogisimi accommodatum remedium perquirat.

Exemplum, supponamus, occulti morbi causam esse bilem, an ne statim dicimus esse euacuandam? Sed quomodo? nisi cofugiamus ad locum affectum, & virtutē? loci affecti ex læsis officijs cognoscuntur, ex respiratione læsa dicimus Thoracem esse læsum, ex vomitu ventriculum, ex delirio cerebrum, & sic de alijs; si igitur eger in vomitu erit valde pronus, dicemus ventriculum esse læsum: cognito igitur causam esse bilem, locum affectum esse ventriculum, & vires permittente, statim virtute analogisimi dogmatici colligemus, quod vomitorium sit proportionatum remedium.

Hic Dogmaticus analogisimus est indicationi valde similis: sicuti. n. indicationes à causa desumptæ dicuntur præseruatiue, à morbo curatiue, à virtute vitales: sic in hoc analogismo obseruantur symptomata causarum, & locorum affectorum, qui limitant causam, & describunt innominatam morbi naturam: humores peccantes sunt communes causæ morborum: à locis affectis morbi sunt specifici.

Ex Galen. 3. de sympt. causis cap. 2. habetur, atram bilem, si in toto redundet facere elephantiasim, si in parte canceri; bilem flauam, si in toto icterum, si in parte, erysipelas, si in ventriculo, vomitum, si in membranis cerebri, phrenesim, & sic de alijs partibus; patet igitur, quod loci affecti limitent quoque innominatam morbi naturam.

Hip-

Hippocrates, & Galenus, cum sæpè videant specifica indicatã esse nobis occulta, vtuntur in perquirendis remedijs analogismo dogmatico, quippè qui post indicationem tenet primum locum: & præcipuè æde ratione videt. in ac. comm. 19. cuni videant, quod indicans specificum phlebotomiæ sit occultum, & innominatum, illud per consensum signorum declarant, vt inde nos possimus scire, quando conueniat sanguinis missio: dicit magnitudinem morbi, virtutem robustam, & floridam ætatem indicare sanguinis enacuationem: at re vera, si vnum indicet vnum, & vnum indicetur ab vno: ex ijs tribus non colligemus per indicationem, quando sit mittendus sanguis: sed per analogismum dogmaticum.

Pater primo, quia sola magnitudo morbi non sufficit, patet secundo, quia magnitudo remedij indicatur à causâ, & à morbo: quam instantiam nunquam Alexander Massaria, neque ceteri, qui putarunt magnitudinem morbi esse propriũ indicans phlebotomiæ, soluere potuerunt.

Magis dum sit quid genericum, quod limitatur à virtute, & aliquando à loco affecto præstanti, non pertinebit ad indicationem: relinquitur ergo, vt pertineat ad analogismum dogmaticum: alij .n. nõ dantur modi, quibus inueniri possint remedia, nisi tres propositi, qui sunt indicatio, analogismus, & experientia.

Similiter dum Gallica lues ad nos fuit delata non statim potuerunt medici per experientiam, & indicationem præsidia inuenire: non per experientiam, quia antea talem morbum non viderunt: nõ per indicationem, quia specifica huius affectus differetia erat ignota, neque illico cognitum fuit guaiacum, per analogismum igitur in curanda lue procedebant: videbant affectum fuisse quam simillimum ijs, qui ex corruptione, & putredine fiunt; ideo poterant dicere morbum ratione propriæ essentia: esse magnum, & poterant dicere, robore virium permittente phlebotomiam fore illis frugiferam.

Amplius videbant, in confirmatis affectibus scabiosis hydrargiri inunctionem valere, videbaturque à gallica lue scabies, & plurimus alios affectus cutaneos produci; ideo poterant virtute permittē-

te concludere, similem inunctionem gallico morbo profuturam.

In hoc exemplo de lue gallica est inuenta hæc inunctio per analogismum dogmaticum, primum quia obseruatur ex symptomatibus sensibilibus magnam esse causam, quæ magnum requirit remedium: Secundo obseruatur, locum affectum fuisse præcipuè cutim; quare, remedijs auferentibus cutaneos morbos seniores, merito concluditur esse procedendum: Tertio obseruatur, virtus permittens, quæ scilicet sit fortis, quoniam remedia magna sine forti virtute non debent administrari.

Discrimen inter analogismum Empiricorum, & Dogmaticorum est, quia Empiricus in remedijs inueniendis procedit per signa communia: Dogmaticus per conuertibilia: Empiricus à particulari ad vniuersale facit transitum, dicit enim iuuat cydonium, ergo & mespillum, & alia similia astringentia, quod nõ valet: Dogmaticus ab vniuersali ad particulare procedit, ei non sat est scire, quod mespillum astringat, sed exquirat quo gradu id efficiat, a gradibus igitur procedens ad remedia inuenienda est transitus ab vniuersali, & nequaquã à particulari: Empiricus procedit per symptomata patientis, quæ sunt omnino inutilia, vt ostendimus: Dogmaticus per symptomata causarum locorum affectorum, & virtutis.

Exempli causa, diceret Empirici, Socrates, qui non poterat incedere, lotionibus curatus est, ergo & Plato, si incedere non poterit, iidem lotionibus curabitur; Dogmaticus, quamuis nesciret, quo morbo Platonis incessus sit impeditus, procedens tamen per signa locorum affectorum, causarum, & virtutis remedium certum inueniret; quia quereretur, an læso principaliter sit in musculis, & in quo, an in neruorum trunco, & stipite; atque cognita parte affecta: cognito, virtutem permittere, & causam esse humorem frigidum, quod facile cognitum erit, remedium promptissimè inueniet.

Dogmaticus partes affectas ex lesis officijs proprijs profundè perquirat, & deinde per analogismũ, si occultus sit morbus, remedium colligit: Empiricus non distinctè de locis affectis agit, sed solum de

de symptomatibus patientis, quæ ad rem non faciunt: tota enim medicæ artis difficultas stat in exacta locorum affectorû cognitione; quod cognouit Galenus, qui 13. method. cap. 20. dicit, si quis adimat indicationem à parte desumptam addiscet totam medicinam sex diebus: Dogmaticus, quamvis morbus deliteat, distinguit symptomata, & perquirat in qua actione læsa, in quo exeat, & in qua mutata qualitate sint: Empiricus non considerat genera symptomatum pendentium à causis, & locis affectis; sed à patiente, quo fit vt ferè semper transeat de genere in genus; quia idem symptoma patientis potest sub diuerso symptomatum genere, & sub diuerso causarum genere contineri, quale est sputum sanguineum, quod modo fit à venarum erosione, modo ab apertione osculorum, & modo à sanguinis nimia tenuitate.

Dogmaticus distinctè quærens quæ pars sit affecta, & quæ sit causa affectus, consultus in perquirendis remedijs procedit: si aliquis haberet aluû adstrictam, & medicinam ab empirico peteret, ab illo alia non dabitur, nisi quæ à symptomatibus patientis colligi possit; at symptoma patientis est alui restrictio, dabit ergo medicinam aluum mouentem, quam præ manibus habebit, quamque cæteris omnibus, qui adstrictam aluum habuerunt, porrexerit.

Dogmaticus verò, quamvis nesciret ob quem morbum adstrictam aluum patientis haberet, inueniet per læsa officia in qua parte corporis occultus morbus sit; expendet virtutem totius, & partium, & ex symptomatum concursu remedium necessariò colliget frugiferum: si viderit ventrem esse exiccatum, nõ dabit aloem scamonium, & alia soluentia id genus; sed potius tamarindos, & cassiam: namque hæc lenientia reddent corpus fluidum, & humectum, & omnem siccitatem, & ardorem compescunt.

Si viderit esse aluum adstrictam; quia iecur non gignat bilem, nõ dabit rhabarbarum: si viderit ob nimios flatus esse adstrictam, videritque ventriculum esse læsum; quamvis nesciret, quo morbo laboraret, colliget ex flatibus, & læsione ventriculi non esse dandam cassiam, sed potius

hieram, dummodo tamen virtus totius & partis affectæ permitteret. diximus virtutem totius, & partis à Dogmatico considerari ad differentiam Empirici, qui cum sæpe non consideret, an virtus partis permittat, in grauissimos incidit errores.

Plurimi sunt, qui in erysipelate mamillarum, & aliarum partium mollium, & flaccidarum vtuntur suppurantibus, quæ mirum in modum laxant, quo fit, vt pars debilis ob Empirici erratum in gangrenam sæpe cedat, sicuti contigit cuida bono viro patienti natum Erysipelas qui ab Empirico suppurantibus occisus fuit, atq; huiusce facinoris testis fuit Paulus Parauicinus de Capellis, Vultuæno Berbenensis ex Nobilissima Vallisellinæ familia medicæ studiosus inter meos discipulos diligentissimus, mihiq; addictissimus, vt alias in nostra Arte parua illius mentionem fecimus, & eius ingenij eximias laudes recensuimus qui pari modo interfuit Illustrium Medicorû Dogmaticorum Cætui, quæque præclara atque condigna dicta fuere contra hosce Empiricos, in proprio reposituit Enchiridio.

Similiter, dum aliquis claudicat, Empiricus hoc solum symptoma considerat, & pro huius symptomatis curatione vult vnicum esse remedium; nihilominus pro varietate causarum, & locorum affectorum varia sunt; etenim si aliquis claudicaret, quia humores ad pedes descendant, remedium non applicabitur pedibus, sed partibus supernis, vnde procedunt: si propter ruptum os remedium toto genere differt ab illo: si propter luxationem similiter erit omnino diuersum; Hæc omnia Dogmaticus distinguit, & quamvis morbus esset occultus, dummodo cognoscat particulam affectam, causam, & virtutem totius, & partis permittit, colliget remedium iuuans, & non decipietur: Empirici nunquam remedium certum inuenient, quia procedunt ex concursu symptomatum patientis, transeundo de genere in genus, & permiscendo symptomata, quæ sua natura sunt impermiscibilia.

Vi colligitur à veris Medicine fundamētis, quod experientia sit fallax. Cap. V.

O Stendimus, analogisimum Empiricorum esse ineptum ad perquirenda reme-

remedia: Nunc, an per experientiam melius perquiri possint morborum auxilia, est videndum: Empirici nostrates sunt persuasi, quod experientia in tanto negotio vnica sit; etenim si bis, vel ter videntur correptum putrida febre, vel alio morbo, post exhibitum aliquod remediū fortitum esse bonum euentum, non amplius de remedio hæsitant, sed omnibus eodem genere morbi pollutis illud dant: vnde vixant non modo ægrotos, qui post eorum remediorum exhibitionem pereunt, verum etiam, qui sanantur; natura viribus donata duplici vixit solertia, altera in pellendis morbis, & altera aliquando in corrigendis, & emendandis plagis ab infans Medicis insiliis, de quibus ea dici possunt, quæ à Galeno in fine primi libri method. dicuntur, Tyrannorum more isti, quæ ipsi videntur, pronunciant citra demonstrationem: illi non modo demonstrant, neque à demonstrationibus discunt.

Hæc tamē diuina ars magis ab Empiricis nostratibus, quàm à Priscis est lacerta; Prisci constinebant tres fontes, vnde remedia colligebāt, scilicet inspectionem propriam, historiam, & analogismum: deinde ad hæc tria capita omnia referebant remedia, ad fortuitum, consultum, & imitatorium, & demum ex signorum syndrome quid agendum colligebant.

Nostrates sine analogismo, & experientia remedia obseruant: quinimo, si legerimus Aristotelem, clarè videbimus, illos non percipere quid significet experimentum: Aristoteles 2. post. cap. ult. & 1. metaphysices, ubi docet, quomodo fiat experimentum, habet hæc verba, ex sensu fit memoria, ex multis memorijs fit experimentum, multæ namque memoriæ numero experientia vna est, ex qua deinde vniuersale in anima fit.

Empirici, dum vident post exhibitum medicamentum ægrum subleuari, illicò putant de illo factum esse experimentum, quod ab experimenti definitione est omnino alienum: apertè nos docet phylloso-phus, experimentum neque ab vnica sensatione, neque à multis, neque ab vnica memoria, sed ex multis, & iteratis memorijs fieri: quare tantum abest, vt medicamentum, post quod vident ægrum

bis, vel ter subleuari, dicatur experimentum, vt neque memoria, neque sensatione bona de illo dici possit: & ratio est, quia vt plurimum Empirici decipiuntur circa sensationem, putant enim sanationem ab haustu medicamento pendere, quando à natura viribus optimis prædita prodit.

Prima causa, cur experimentum Empiricorum sit fallax, est, quia putant ex re semel visa colligi posse experimentum, quod Aristoteli, vt diximus, aduersatur dicit Galenus 4. meth. cap. 3. nos indigere longa experientia in virtutibus medicamentorum cognoscendis: addit hæc verba, esset profecto felicitatis munus, si quis inspecto litargyro, aut castoreo, aut cantharide protinus eorum vires intelligeret: quare longa obseruatione & non simplici inspectione consequimur experientiam.

Secunda, quia circa res sensibiles decipiuntur, causa erroris est: quia in quolibet ægrotatæ variæ, & diuersæ sunt conditiones, nature, & affectuum idæ, & quolibet potest variare medendi modum: Gal. 7. meth. cap. 6. dicit inspiciendæ sunt proprietates naturarum & 2. meth. 6. habet quod tot sit medendi rationes, quot morborum idæ, hæcque varietates rerum, cum Empirici non consulant, numquam ab experimentis sciunt remedia haurire.

Quæ vero efficiunt varietates, sunt natura ægrotantis, ætas, tempus anni, regio, præsens Constitutio, robur, habitus, consuetudo, solitum exercitiū, morbus, causa, locus, symptomata, morbi similes, mos motus, repletio figuræ partium, pulsuum motus, animi mores, iuuantia, & lædentia: sine distincto harum conditionum examine nunquā obseruabimus experimentum, illæ enim variam, & diuersam naturam agentis, & patientis patefaciunt.

Galenus 2. methodi cap. 5. dicitur curationes ab Empiricis colligi ab apparentibus concursibus signorum, & ab illis despicere causas vt incognoscibiles: & Tyrannorum more iubet sic esse procedendum. Subdit Galenus, Nos Dionysium, Phalarim cæterosque Tyrannos odio prosequimur quod iubent imperentque non suadent ac docent, sicuti Solon, Draco & Lycurgus: debebant igitur rationibus do-

et inam suam tradere: tunc quisque potuisset videre an bona vel mala sit censenda.

Quis diceret valere has consequentias? Cassia profuit Socrati, ergo & Platoni proderit? dum erat iuuenis, ergo dum est senex? In hyeme, ergo etiam in ætate? dum erat in Germania, ergo dum est in

Italia? Spirante austro, ergo & aquilone? profuit dum erat debilis, ergo dum est robustus? Nautæ, ergo & Nobili passueto, ergo & insolito? ociofo, ergo exercitato? tertiæ, ergo & quartanæ? homini bilioso, ergo & pituitoso? In hepatis affectione, ergo & in stomaci? In remissis symptomatibus, ergo, & in vrgentibus?

Proprietates quoque morbi, & constitutionum sunt considerandæ: scribit Montanus Venetijs, 1527 febres quasdam fixuisse, quæ solum illis interficiebāt, qui utebantur cassia; similiter nō valet, medicamentum profuit in benigna febre, ergo & in maligna inuabit; In augmento, ergo & in decremento; In repletionē, ergo & in inanitionē; in pulsu veloci, ergo & in tardo; In hilari, ergo & in tristi, & sic de alijs omnibus dici potest; omnes igitur conditiones sunt in quolibet ægrotante considerandæ, quia quælibet variare potest medendi modum.

*Particulares
conditiones ægri
ob quas variantur
medicina.*

(A Galeno 2. ad
Glaucōnem c. 2.
& Hippocrate
1. aph. 2.

(Ab Auicēna 4.
1. c. 3. & alibi hæc
& alie colliguntur
conditiones.

(Natura ægrotantis
(ætas
(tempus anni
(regio
(morbus
(presens constitutio
(robur
(habitus
(consuetudo

(Ars solita
(causa
(locus
(symptomata
(similes morbi
(proprietaes morbi
(bi
(mos
(motus
(repletio
(motus pulsus
(excrementa
(animi mores
(figura
(inuantia
(lædencia

His igitur non rectè ab empiricis consideratis non est mirum, si in experimentis conficiendis infinitis decipiantur: propositæ conditiones colliguntur ab Hippocrate, Gal. & Auicenna: ab Hippocrate 1. aphorismorum 2. ubi habet, inspicere oportet regionem, anni tempus, ætatem, & morbum: A Gal. 2. ad Glaucōnem c. 2. ubi proponit ætatem, tempus, anni, regionē, presentem constitutionem, robur, habitū, consuetudinem, naturam ægrotantis: & c. 1. addit mores, pulsum, motiones, calores, & colores: libro de arte medicinali præ cæteris proponit in quolibet curandæ affectu inuantia, & lædencia: Ab Auicēna

quattuor primi ea. tertio decem proponuntur, quæ sunt tribus carminibus expressæ.

Ars, ætas, regio, ætatis, complexio, forma, Mos, & symptoma, repletio, tempus, & usus.

Et, bene si numerus, figurā addere debes.

Tria quoque carmina vagantur per scholas, quæ exprimunt, quæ sint in quolibet ægrotante consideranda; hæcque sunt.

Temperies, ætas, celi status, ars solita, morbus

Vfus, causa, locus, symptomata, innata facultas,

Consimiles morbi, mos, motus, pharmaca, gestus.

Ecce quam varia sint præcognoscenda, antequam remedium experiamur; ecce quã vana propterea sint rudiorū hominū secreta; illud .n. quod semel iuuit mutata aliqua conditione ex propositis posset interficere: est igitur necessariū, vt cōditiones agentis, & patientis exactē præsciamus, si velimus rectē mederi: Gal. 1. aphor. in princ. dicit, subiectum circa quod Medicus versatur non ex corio, aut ligno factum est, in quo errata sine dolore possent emendari, sed ex carne, vt detrimentum nullum sine pœna possit resarciri.

Dogmatici itaq; videntes experientiam esse periculosam, essequē argumentum à particularibus, dixerunt esse coniungendam cum ratione, ne nos decipiat.

Hinc Gal. lib. de sect. c. 1. redarguit Empiricos dicentes experientiam sine ratione in remedijs perquirendis sufficere.

Galenus 3. methodi cap. 2. loquens de illis qui sola experientia sine ratione incedunt, dicit cauo vlceri esse oleum & ceram remedium aduersissimum: Similiter ærugo ad leuorem tonsa inspersa: quia si de oleo & cera loquamur faciēt ulcus putreficere: ærugo uero phlegmonem & cōuulsionem excitabit: ergo per experientiam cera oleum & ærugo ad implendum ulcus cautum non ualebunt: Addit Empirici nunquam hæc miscebunt, ego sanè hæc miscebo, & maxima iuuabunt, quia ex duobus temperamenti immodicis resultat accommodatissimum remedium. Sarcoticum, quod per experientiam sine ratione Empirici non intelligunt.

Hinc Galenus 2. meth. cap. 6. dicit sine recta ratione tutam experientiam habere non possumus: addit, ratio non leue momentum obtinet ad experientiam, uel ornandam, uel corruptendam. Sed quantum recta ratio adiecit, tantum uel etiam amplius uitiosa detrahit.

Similiter Gal. 3. aph. 11. docet, quã fallax sit experientia, habet hæc uerba, si quis expertus fuerit sex, uel septem homines aliqua medicina purgatos, dicere certò non poterit, quod omnes homines post hæc ex necessitate purgabūt: quod non strates Empirici non obseruant, ubi enim uidēt medicinam semel iuuasse, eam non solum dant, sed statim exhibita, certam sanitatē in omni regione, in omni acris

constitutione, in qualibet natura, sit biliosa, uel pituitosa omnibus pollicentur.

Similiter Galenus 7. de compositione med. per genera c. 4. habet, si quis post me æquē studiosus, ac ueritatis amator extiterit, ne temerè, ac subitò ubi bis, ter uel usus, expertusque sit, ferat sententiam; frequenter enim ei ex longa experientia; quemadmodum & mihi usu uenit, in secundo gradu dicta in tertium incipientem transponi debere uidebantur.

Si igitur sapientissimus Galenus post longam experientiam aliquando est deceptus, tanto magis, si ex illa aliquid colligemus, idem nobis contigerit; cum igitur nostratum Empiricorum plurimi neque ratione, neque experimentis utantur; neque intelligat, sicuti ostensum est, quomodo fiat experimentum, eos reprehendimus non ut Medicos, sed ut carnifices, eosque non solum ab hac præclara arte, sed à bonorum hominum quoque congressibus explodemus.

Plinius loquens libro 29. suæ Historiæ naturalis ca. 1. habet hæc uerba: nulli magis, quàm se Medicum profitenti creditur, addit, negotiantur enim animas nostras, & experimenta per mortes agunt.

Quid itaque scelestius est, quam in Republica hosce admittere? quid in Ciuitate deterius, quàm consentire, quod ab ijs occultis carnificibus homines innocētissimi sæpè occiduntur; illi ut plurimum sunt scientiarum, & omnium bonarum artium ignari: si ab ipsis rationem medendi queramus, nobis referunt nomina, ignota, & qualitates occultas: de quibus Galenus 3. de præfag. ex pulsibus 5. ait, qui nihil sciunt ad alterum de duobus confugiūt ad nomina ignota, uel ad qualitates occultas si percutiemur, unde lau. ferint suarum opinionum fundamenta, cit int Hippocratem, & Galenum, non tamen particularia loca, quasi quod sacris sit interdictum, Auctorum libellos, & capita propria referre.

Ostenditur ex analyticis principijs, quod experientia sit fallax, & periculosa.

Cap. VI.

Iam patet ex Hippocrate & Galeno, quod omne experimentum sit fallax, & pe-

& periculofum, nunc altioribus principijs ostendemus experimenti fallacias prima est, quia omne experimentum acquiritur per inductionem, vel exemplū; at sic est, quod inductio, & exemplum reducuntur ad falsum syllogifinum, ergo experimentum erit fallax: quod inductio, & exemplum deducantur ad falsum syllogifinum, patet, quia ambo concludunt in tertia figura cum conclusione vniuersali, qui arguendi modus est ab Aristotele reiectus: quia de ratione conclusionis non est, quod sequatur nobiliorem, sed ignobiliorem partem; ratio denique cur conclusio insequatur ignobiliorem partem est, quia si bona sit, semper continetur à præmissis, & contentum semper est ignobilius continente.

Patet similiter, quod, qui procedunt per exemplum, & inductionem, supponant colligi posse vniuersale, quia nō possent dicere, quod portulaca sit iuuatura. Platonem; quia Socrati stupore dentium affecto aliquid opis præstitit, nisi virtute huius vniuersalis conclusionis, scilicet, quod omnibus hominibus eo stupore affectis possit accommodari; quare, cum hæc conclusio ab experientia desumpta sit vniuersalis, sique in tertia figura non valebit, & erit vana: Aristoteles solum sex modos possibiles tertiæ figuræ proposuit, hunc vero cum conclusione vniuersali, vt inutilem reiecit.

Patet similiter, quod experientia, exemplum, & inductio pertineant ad tertiam figuram, quia medius terminus, qui consistit in particularibus exemplis, necessarius debet subijci, quia prædicata in propositionibus naturalibus non possunt esse particularia.

Amplius, quando experimentum colligetur à particularibus, nō cōcludet, quia ex puris particularibus nihil sequitur: Neque obijcias, quod experientia non ex duobus particularibus, sed & pluribus colligitur; quia respondemus, quod si ex mille eam colligeres, non posses vniuersalem conclusionem inferre; quinimo si per milliona millia inducetes adhuc non posses conclusionem vniuersalem haurire, quoniā quælibet species vniuersalis sub se continet infinita particularia.

Amplius cum conclusio non sequatur,

nisi ex prædicatis, quæ saltem de omni dicuntur, scilicet, quod insint infinitis subiectis illius speciei, & semper, dato adhuc quod per infinita particularia induceres, tibi adhuc esset videndum, an semper omnibus attributum conueniat: quod est omnino impossibile, vt mortalis homo per experientiam consequatur.

Præterea, experimentum cum fiat procedendo à singulari ad singulare, nihil concludere potest; quia ad colligendum aliquid requiruntur res termini formaliter distincti: si medius terminus formaliter non differret à maiori termino, aut esset de demonstratione; qui enim ostenderet esse eclipfism, quia in luna est luminis priuatio, nihil doceret, & syllogifinum ineptissimum faceret, quia eclipfism, quæ est maior terminus formaliter non differt à priuatione luminis.

Similiter errant qui probant portulacam esse iuuaturam Socratem, quia iuuat Platonem, & ratio est, quia Socrates, & Plato formaliter conueniunt: ratio analytica, cur ex ijs, quæ forma conueniunt nulla sequatur conclusio, est, quia de ratione medij termini est, vt contineat minorem, & contineatur à maiori; dum verò formaliter ab alijs terminis non differt, nec continetur, nec contineretur.

Insuper, si portulaca sanat Socratem, id efficit, vel quia conuenit propriè, & per se Socrati, vt est tale indiuiduum, vel per accidens: si per se, hic syllogifimus, iuuat Socratem, ergo omnes stupore dentium affectos iuuabit, erit nullus, quia, quod vni per se, alteri per accidens conuenit: si per accidens, inde nullam conclusionem veram, & æternam inferre poterimus: Quod verò per accidens portulaca indicetur à stupore dentium Socratis patet, quia indicatur quoque à stupore aliorum indiuiduorum: patet, quoque, quia portulaca posset stuporem dentium non solum in hominibus, verum etiam in alijs animantibus auferre: denique posset per accidens conuenire Socrati ratione regionis quatenus portulaca, in Europa hanc virtutem, & non in alijs locis habet.

Plantæ nonnullæ in diuersis Regionibus varias, & diuersas sortiuntur vires: Ferunt de Persico, quod in Persia sit virtus,

rus, quamvis apud nos sit suauissimum alimentum.

Postremo posset portulaca hunc stuporem tollere ratione habitus, ætatis, vel temperamentis: sunt Nautæ: & senes valido, & forti habitu præditi, qui vsu portulacæ stupore dentium non liberantur: ecce igitur quàm ineptum sit experimentum sine ratione ad colligendam vniuersalem conclusionem.

Ad hæc singularia, circa quæ versatur experientia, vt sunt singularia, nullas habent proprietates communes, sed solum vniuersaliusque proprias, quæ sunt hic, & nunc; Sed sic est, quod illud, nunc & illud hic, quippe conveniunt Socrati, vt Socrates est, neque præteritis, neque futuris hominibus, neque alijs præsentibus convenient, ergo ab experimento nihil colligi poterit.

Amplius nullus est processus à particularibus ad cognitionem genericam, vel specificam, quia particularia accidunt generibus, & speciebus, potest enim humana species stare sine Socrate, & Platone, & animal sine homine, sed non Plato, vel Socrates sine homine, & sine animali, quo fit, vt in quolibet discursu possimus ab vniuersali ad particularia procedere, sed non versa vice.

Præterea auctoritate Aristotelis, Alexandri, & multorum patet, quod experientia non det vniuersale: Aristoteles 1. metaph. non longè à principio dicit, quod experimentum est circa singulare: ars vero circa communes conceptiones; additque: experimentum quo ad actionem, & quo ad cognitionem esse singulare: 2. verò post. tex. 6. reprobatur philosophus inductionem, vt insufficientem ad cognoscendum quid est, & vniuersale: & primo elenchorū dicit in omni inductione committi petitionem principij.

Alexander Aphro. 1. top. c. 1. definiens inductionem, quæ est experimenti idea, & quæ à singularibus procedit, dicit, inductione est oratio, ex qua quibusdam positis aliquid aliud, quam quæ posita sunt accedit, sed non ex necessitate: ecce quod ab inductione nec vniuersale, nec particulare colligi possit; quia dicit, nihil ab inductione ex necessitate sequi: similiter c. 10. primi top. Alex. dixit, inductionem esse

progressum à singularibus ad vniuersalia, qui tamen non est possibilis: & ca. 11. eiusdem libri dicit, inductionem habere verisimile, sed non necessarium.

Auerthoes 2. priorum cap. 29. dicit inductionem nobis non conferre, quamvis completerentur omnia particularia.

Diuis Thomas videns ab inductione particularium vniuersale ex necessitate non concludi in libris post. vbi de inductione loquitur, habet hæc verba, inductione non concludit nec demonstratiue, nec syllogisticè ex necessitate.

Io: Grammaticus dixit, inductionem esse inutile ad cognoscendum vniuersale: merito itaq; dicere poterimus, quod experimentum, quod ex omnium consensu inductione fit, sit fallax, & periculosum.

Sed magna exurgit dubitatio quia, est Aristotelis auctoritas, & ratio, quod experimentum det vniuersale Aristotelis 2. post. cap. vltimo habet hæc verba: Cum vnum particulare in memoria steterit, tunc primum incipit in anima esse vniuersale: sed sic est, quod particularia virtute inductionis, vel experientie conferuntur in memoria, ergo inductione, vel experientia pariet vniuersale.

Insuper videtur quod Hipp. inuenerit principia medica vniuersalia ex particularibus: Varro enim Strabo, & Plinius dicunt Hippocratem ex tabulis ægrotantium Æsculapij templo, quæ erant innumerales artem medicam consecisse, ergo ab experientia vniuersale cognoscitur.

Præterea experimēta videntur parere cognitionem causarum, & demonstrationem quia; at sic est, quod causarū cognitio est vniuersalis, ergo experimenta indicabunt vniuersale; maior pluribus exemplis confirmatur; sed duo omnium vice afferri possunt; suntque, quia non videtur, aliomodo addisci posse hæc vniuersalia, quod guaiacum sit causa curationis gallicæ luis, & rhubarbarum bilis, quam vsu experientie, minor est manifesta, & non indiget probatione; Arist. 2. post. in princ. non semel dicit, quid, quod est vera rei causa, esse vniuersale, & prædicatiuum.

Primo respondemus auctoritati propositæ, quod propterea, dum particulare est in memoria, incipiat esse vniuersale in anima, quia in quolibet particulari est

est inclusa tota natura vniuersalis, quare non ab experientia particularium, ut particularia sunt, sed quatenus in quolibet indiuiduo est totum vniuersale, scientias & artes, quæ vniuersalia tractant, acquirimus.

Intellectus separat vniuersale à singularibus suo proprio lumine, & nequaquam inductione, & experientia, quæ circa particularia tantum versantur.

Nec valet ratio Speusippi dicentis (vt refert Philopon.) non dari definitionem nec cognoscere vniuersale, quia cuncta nõ cognoscimus: quia vt optimè contra. Speusippum habet Arist. 2. post. in quolibet indiuiduo est natura vniuersalis, quæ est cognoscibilis sine vlla inductione.

Si in vniuerso orbe vnica esset particularis homo, ita tota, & completa esset humana species in illo solo, ac in infinitis hominibus; Arist. 2. post. in fine libri dicit, intellectum separare hominem à Callia homine; quia in Callia est inclusa tota humana species; vocat ibi vniuersalia, *et usque*, id est indiuisa, quia in quolibet particulari est tota simul.

Si vniuersale esset diuisum in multa, particularia, & non esset totum in quolibet, esset interitui obnoxium, est Aristoteles 12. metaph. tex. 49. quod si plures essent primi Motores, materiam haberent, & per consequens essent corruptibiles, vniuersale igitur, cum totum in vnico solo indiuiduo stet, inductio, vel experientia, quæ sit transiundo à particulari ad particularia in hac re erit vana; quia non adferet nobis cognitionem vniuersalium, sed solum particularium.

Amplius si inductio fieret per infinita particularia eiusdem speciei, & interim intellectus suo lumine non separaret naturam vniuersalem à conditionibus indiuiduantibus, de notitia vniuersalis actum esset; hæc sententia videtur esse Auerrhois 2. prior. cap. 29. vbi hæc habet, inductionem nobis non conferre per se, si etiam complerentur omnia particularia.

Ad exempla, quod scilicet experientia vsu hæc vniuersalia nesciant quod omne genitum sit corruptibile, quod guaiacum tollat gallicum, & rhabarbarum biliosum morbum, respondemus primo, quod ab experientia nemo vnquam col-

liget propositiones vniuersales, & necessarias, sed solum indefinitas.

Hæc propositio, omne genitum est interitum Gal. libello de tibe dicit, neque esse necessariam, neque scientiam parere: imo addit se demonstrasse in libris de demonstratione (vtinam illos libros haberemus) illam propositionem, omne genitum esse corruptibile non excedere fines probabilitatis quamuis per experientiam cognoscamus esse necessariam: quare, præter experientiam requiritur ratio quæ nos cogat & ex qua colligere possimus vniuersale.

Hæc propositio guaiacum curat gallicum est indefinita, & non vniuersalis: ab experientia nemo colliget, quod omne guaiacum enret gallicum morbum, nec vice versa, scilicet, quod omnis affectus Gallicus à guaiaco curetur; etenim non implicat contradictionem, si dixerimus, quod detur aliqua lucis gallica, quæ guaiaco non curetur, & aliquod guaiacum, quod nullam gallicam luem curare possit.

Similiter non implicat, quod detur aliqua bilis, quæ non purgetur rhabarbaro, & aliquod rhabarbarum, quod bilem nõ purget: omnia igitur, quæ experientia nesciunt, videntur esse indefinita, & nequaquam vniuersalia.

Secundò, dum dicunt experientiam, quoniam procedit ab effectibus ad causas, esse demonstrationem à posteriori de ratione cuius est, vt pariat vniuersale.

Respondemus, experientiam non procedere ab effectibus ad causas, sed ab effectibus ad subiecta particularia, & indefinita, per quæ processum nec statim, nec per regressum causas cognoscere possumus, quinimò Auerrhoes quæst. quinta decima logicali quæstionè probat, quod nullum subiectum dare possit quid, & causam passionum: exempla sunt, si demonstrarem, quod homo respiret, quia sit animal, nihil demonstrarem, quia animal est subiectum, & non causa respirationis: causa vero est pulmo; dantur enim animalia, quæ non respirant.

Aristoteles 2. post. tex. 25. vocat subiectum passionum causam remotam; quæ non potest dare propter quid; datque hoc exemplum: si probarem vitem pati fluxum soliorum per latifolium habens,

problema effert accidentale; quia latifolium habens non est causa, sed subiectum quod non per discursum, sed per experientiam cognoscitur: causa uera est congelatio humoris.

Præterea per subiecta, quæ sunt cause remotæ, non peruenimus ad uniuersale, quia ex subiectis solum colligimus conclusionem negatiuam in secunda figura in cameſtres, ratio analytica, quod res ita se habeat, est, quia si causa remota est melius terminus debet prædicari; quod enim est uniuersalius, semper prædicatur, & fiet secunda figura: si uero à causa remota bonam uelimus colligere conclusionem, oportet, ut semper sit negatiua, & semper reducatur ad illum modum, qui dicitur cameſtres; quia ex puris affirmatiuis in secunda figura nihil colligitur.

Dum uerò dicunt, quaiacum sanasse Gallos, Indos, & Italos, dicimus, quod non afferunt causam, sed subiectum, in quo causa est inclusa: Hactenus nescitur, cur lignum curet gallicum uirus: Sunt qui dicunt, causam esse reconditam, & pertinere ad substantiam ligni qualitatem: Sunt alij, qui putant, id effici ob diaphoreticam ligni uirtutem; hinc Scaliger exercit. 180. dicit, in eundem usum ualere aquam ex theriaca destillatam, corticem Iuniperi, tormentillam, Cardum benedictum, Scordeum, & dictamum.

Amatus Lusitanus refert, se curasse gallicum morbum buxo: ecce, quod solum cognoscimus per experientiam, lignum curare gallicum; sed cur id efficiat, nescitur: causa est; quia experientia seu inductio transit à particulari ad particularia, & affert in medium subiecta, quæ solum componere possunt propositiones particulares, uel indefinitas, & nequaquam uniuersales: quodq; de guaiaco dictum est de rhabarbaro, & de omnibus expertis dicendum arbitramur.

Non tamen negamus inductionem, uel experientia conferre posse ad cognoscendum uniuersale, quia ut dicit Boetius in prædicamentis, experientia est exemplorum collectio, postquam collectionem intellectus proprio lumi-

ne excitatur ad separandam naturam uniuersalem ab individuali; tota enim natura uniuersalis est in quolibet indiduo, ut sæpe uisus indiduis, sæpe quoque intellectui offertur uniuersale: Auerroes 2. priorum 29. habet, inductio nem inferuire cognitioni uniuersalis ex accidente, quatenus scilicet ob multorum exemplorum collectionem frequentius offertur intellectui obiectum uniuersale, quod in quolibet particulari est inclusum.

Intellectus uerò primò proprio lumine à conditionibus indiduantibus naturam uniuersalem toties per inductionem oblatam fecernit.

Secundò logicis præceptionibus promptius eam exquirat: afferatur exemplum; scio per experientiam, quod vesicantia attrahant, sed hæc propositio, quod vesicantia attrahant, est indefinita: etenim nescio adhuc, an omnia attrahant, confirmabor tamen, quod omnia talia sint, si uiderimus, quod causa attractionis uniuersalis sit, quod scilicet attrahant, quia omnia calida, & dolorifica attrahant; confirmabor adhuc melius argumento à contrariis; quia contrariorum eadem est disciplina; dicendo, si omnium frigidorum proprium fuerit repellere, omnium calidorum erit attrahere; & inde omnia vesicantia attrahent.

Denique, ut omnis scrupulus auferatur confugere possumus ad contradictoriam principium, cuius uirtute logicus, & Metaphysicus potest conuincere proteruos exempli causa, dicimus, aliquod calidum attrahit, hæc est uera & omnibus notata igitur posita & concessa dicimus quod eius contradictoria sit falsa, quæ est nullum calidum attrahit, quæ proposito, quamuis sit negatiua, est uniuersalis & uirtute huius principii sine inductione cognoscitur, similiter dicimus, quod hæc propositio est falsa, aliquod vesicans non attrahit, dicimusque quod ex necessitate eius contradictoria debeat esse uera, quæ est omne vesicans attrahit: ecce igitur quopacto uirtute logica, & metaphysica possumus uniuersales propositiones pernoscere.

FINIS DVODECIMI LIBRI.

Sanctiij Sanctiij Pars I.

Bb

SAN-



SANCTORII SANCTORII

Olim

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIVM

In Analogismis, & Experimentis perquirendis.

LIBER DECIMVSTERTIVS.

Ostenditur, quod omnia errata, quæ committuntur in administrandis remedijs, ad tria capita reducuntur. Cap. I.



Ognitis instrumentis, quibus remedia inueniri possunt; reliquum est, vt de erroribus, qui fieri solent in administratione remediorum agamus: recta remediorum administratio ex Hippocrate, & Galeno 2. in 6. de morb. vulg. tex. 32. consistit in proportionato, Quanto, Quando Quomodo, & Vbi.

Si malè administretur remedium intra, & non plura errata incidere possumus: quorum primum erit, dum remedium administratum est superfluum & abundans: Secundum, dum est diminutum: Tertium, dum est transcendens, & omnino remotum à natura remedij.

Quod ad hæc tria capita omnia errata, quæ committuntur, reducuntur, potest auctoritate Aristotelis confirmari, qui

2. post. tex. 4. dicens, quod omnia errata, quæ fieri possunt in formanda diuisione, & definitione ad tria tantum capita reducuntur; quorum primum est, dum addimus aliquod superfluum: Secundum, dum auferimus aliquod requisitum necessarium: Tertium, dum transcendimus de genere in genus: nos igitur eadē præceptione philosophi admoniti ad eadem capita omnia errata, quæ possunt committi in administrandis remedijs, reducemus.

Si medicamentum non fuerit quantum oportet, necessariò vel erit plus, vel minus, vel transcendens & extraneum: nostrum igitur erit, ut in omni administratione remediorum præuideamus, ne in aliquod erratum ex illis incidamus: hoc enim præuiso rectè administrabimus præidia.

De erratis Empiricorum circa quantum diminutum. Cap. II.

Quamvis sit dandum medicamentum ab alio loco non defumitur, quam ab actione indicantis, sed hac lege, ut à summa actione summa dosis, à mediocri mediocris, & à minima minima medicamenti quantitas debeat præscribi; ratio est, quia vni vnum est contrarium; sic quædam certa dosis erit contraria indicanti, & non quælibet indiscriminatim ut Empirici rudiores putant: qui præsidij quantitatem à communibus indicationibus, & non à specificis sumunt; modò ægrotautes vexant diminutis, modò superfluis, & modò extraneis medicinis. Sed aliquot incipiemus Empiricorum errata afferre, dum diminuta quantitate præsidiorum vtuntur.

Plurimi in catarrho salso, in pectus procumbente, causa roborandi pulmonem, ne exulceretur, & fiat phthisis, dant quotidie solum drachmas duas sacchari rosati; quod præsidium est diminutum, & nihil efficere potest; quinimò in itinere hæc quantitas sacchari rosati amittitur, antequam perueniat ad Pulmonem: Si saccharum rosatum debeat roborare, & astringere pulmonem, expedit, ut eius uirtus illum tangat, & alteret: est Aristotelis præceptum agentem non introducere effectum, nisi tangat, superet, & domineatur patienti.

Galenus 2. ad Glauco. cap. 2. docet, quot partes corporis pertranseat medicamentum, antequam perueniat ad pulmonem dicit, primum quidem os, fauces, stomachum, uentriculum, & quædam ex tenuioribus, intestinis pertranseat, deinde eas, quæ sunt in mesenterio, uenas; deinde eas quæ in cauis partibus hepatis: ex quibus ad eas, quæ in gibbis sunt; hinc ad concauam peruenit uenam, postea ad cor, & deinceps ad pulmonem: neque negare possumus, quin in singulis his partibus quibusdam admisceatur humoribus, ac quandam transmutationem, atque alterationem pro natura uisceris capiat; quare uirtus quæ relinquitur, minor omnino est, atque imbecillior, quam membrum affectum iuuare possit.

Qua ratione igitur suffulti porrigit in pulmonis affectum solum drachmas duas sacchari rosati; quando ad pulmonem hoc diminutum præsidium perueniet? Hinc Galenus loco hoc citato loquens de affectibus, qui in profundis corporis partibus sunt, dicit, non præsens uis medicinæ est consideranda, sed qualem obtinebit, quando ad membrum peruenierit: subdit, quod enim per multorum corporum media ipsi patienti est occurrus, omnino exoluitur, & uiribus deficit, si ab initio fuerit imbecillum: Tantum aduentitij roboris adiungere oportet, quantum in transitu amittitur, ut quod relinquitur æquale remaneat ei quod tactu iuuat.

Idem Galenus lib. de arte med. cap. 95. uult à situ partium esse colligendas præcipuas intentiones: quare, cum pulmo sit roborandus, & astringendus, non duarum drachmarum uirtus unquam erit peruentura ad pulmonem, sed potius trium, uel quatuor unciarum, quæ possent bis, ter uel diei spacio exhiberi: habet Galenus loco citato quod, quæ iuuare debent pulmonem: si per os assumantur, exasperent uentriculum oportet; ridicula ergo erit diminuta hæc sacchari rosati dosis in roborando pulmone.

Videntur quoque diminutè agere, dum pro somno conciliando inungunt tempora unguento populconis, oleo uiolæ, & amygdalologalæ. ex amygdalis recentibus, cum aqua uel iusculis: hæc autem sunt perexiguæ uirtutis, & uix pueros reddant ad somnum procliuos: quin accidit, ut egri ob fædos unguentorum odores uigilem, & insomnem ducant totam noctem.

Errant, quia tempus in his conferunt, & interim omittunt, quæ sunt præstantiora, & efficaciora ad somnum conciliandum, ueluti est pedum lotio a cena administrata, quæ fit ex capitibus papaueris, matre uiolarum, & rosæ siccis, & lactuca; hæc enim reuellendo uapores, qui excitant uigilias, somnum conciliant.

Præterea, quæ mirabile afferunt emolumentum, dimitunt, ut est syrupus de papauere, eius extractum, & puluis capitum papaueris, quippe drachmæ pondere mistus ferculis nullum reddit saporem, & miras habet uirtutes in conciliando somno: iuuare præcipue, ut dixit

Gal. 12. meth. cap. 8. in his qui tenues habent humores.

Similiter, si quis magnis grauetur obstructionibus vtuntur vncia cum dimidia oxymellis: quæ diminuta dosi vix ad ventriculū peruenit; partim enim detinetur in paristhmis, partim in esophago, & partim per spūm illicdē ferē reiecitur: quomodo ergo obstructions melenterij, plenīs, & Hepatis reserabit? vix odor huius perexiguæ quantitatis oxymellis perueniet ad has altiores partes: Ego igitur manē tres vncias, & vesperi eandem quantitātē repeterem, & si impenderet periculum, ne oxymel ventriculū vellicaret, tibi illud permiscerem: hoc enim modo quotidie oxymellis vnciæ quinque & sex possent illis preberi; qui pertinacissimo humorum infarctū opprimuntur: Gal. 8. meth. cap. 4. dicit quod oxymel strenuē detergit, nec febres accendit. Addit saccharum habere similem virtutem detergendi.

Hic obiter notandum, falli illos, qui dicunt tempore Galen. nullum fuisse sacchari vsum. Idem, dum pro auferendis oculorum inflammationibus, & doloribus vtuntur aqua rosacea, vel aqua dulci tepida: non iuuant agrotantem; quia hæc sunt diminutæ virtutis; quamuis aliquantulum sedet dolor, paulo post tamen reddit.

Præterea, si vtantur aqua rosacea plumbeo alembico stillata; ledunt patientes, quia ceruse, quæ in rosacea aqua hoc modo parata delitescit, reprimit, & transpiratum tollit, vnde truciore excitantur dolores: omittunt phlebotomiam, & cathartica medicamēta, quæ à supernis partibus reuellunt, & summa cum omnium admiratione sanant: Galenus in methodo fatetur, medicamenti exhibitione hominem oculorum inflammatione obiectum ad sanitatem perduxisse.

Omittuntque Hippocr. auxilia 6. aph. 31. proposita, vbi dicit, meri potionē, balneum, fomentum, sanguinis missionem, & pharmacum soluere oculorum dolores: præstat tamen, vt profundē inquirantur causæ, vt sciamus eligere præsidium, quod tutō possit administrari.

Omittunt in doloribus oculorum pertinacissimis yescantia, quæ occipitio ap-

plicata diuinitus dolores, & inflammationes oculorum tollunt: Sciunt amici mei, quibus ingentissimam oculorum fluxionem vesicatorio occipitio adiuncto statim cohibui.

Insuper sunt, qui ardenti febre, vel diarrhæa biliosissima correptis feri lactis libram solum porrigunt, quib. nisi aliquod euidentissimē prohiberet, essent quinque & sex feri libræ præscribendæ: Ex Hippo. & Gal. 4. de rat. vict. 29. quod vnica die dari possint duodecim libræ lactis asinæ, & vltra: Nos quoque illorum imitatione copiosissimo sero caprino in caloribus, & siccitatibus corrigendis vti optima ratione possumus.

In eundem errorem labuntur rudiores dum in collica procedente à materia vitrea proponunt enemata diminutæ virtutis, & improporcionata, veluti est illud quod fit chamæmello, anetho, & laurino oleo, quibus admista sit hiera, quippe in collicis leuioribus solum aliquid posunt, in contumacissimis causas auferre non possunt; & quamuis frequenter hos clysteres iniiciant, attamen non sunt tanti, quanti hostilem humorem euincere possint: assidua repetitio clysteris non sumitur ab actione indicantis vehementis, sed à præsentia.

Idcirco repetitio diminuta remediorū nunquam poterit insignem vim indicantium demolliri, quia vis, & præsentia genere differunt: Valentiora enemata in collica passinoc omnium contumacissima sicut ex decocto carminatiuo, in quo drachma cum dimidia troscorum alhandal, & centaureæ minoris manipulis ebullierint, & ex oleo amygdalino dulci, quod pharmacum attemperat.

Diminutum quoque erit auxiliū, dum in pueris, qui abundant lumbricis vtuntur enemate ex lacte, & saccharo, gratia alliciendi lumbricos: sæpè antequam lac vnicum alliciat, pueri pereunt: efficax, & proportionatum erit aloë non lota, quæ promptē eos occidit, & propellit per aluum: Ceterum, si pueri adeo ab insectis ijs premerentur, vt instaret mortis periculū, adfunt pillulæ, quæ conficiuntur ex aloë, terebentina, & mercurio, quæ confectum omnes occidunt, & pueros certissimē sanant; pillulæ sunt perexiguæ, ad quas

quas tamquam ad lumbricorum proprios hostes confugi mus.

Porrò, vt pluribus exēplis explodamus diminutas medicinas, dum gonorrhæam tractant, putant cassiam, ptisanam, infrigidans Galeni, laminas plumbeas renibus applicitas satis esse, quæ sunt omnino remedia diminuta, ne dicam transcendētia: causa erroris est, quia putant in gonorrhæa auferendum esse quoniam renes refrigerandos: dum dicunt, quod gonorrhæa sit affectus renalis, æquè est, ac si diceret, quod esset hepatis, vel intestinorum, quoniam locus affectus non sunt renes, sed glândulæ adstantes: hæ igitur essent detergendæ terebenthina, aqua B. Virginis, vel Villæsi, vel Calderiana largè epota, in quibus bullierit liquiritia, ijs enim plurimos gonorrhæa correptos sanauimus.

In suppressis mensibus diminutè agūt, dum dant conservam capillorum veneris, pulegium, iusculum ciceris, quæ omnia vt plurimum nihil operantur; quia maior est resistentia passī, quam vigor illorum: proportionatum auxilium est sanguinem euacuare, si adsit aliqua plenitudo, per sectum cubitum, deinde per saphenam: qui tundunt saphenam non secto cubito, minora vasa circa matricem magis implentur, & obstruuntur: quo fit, vt læpissimè pro mouendīs mensibus secta saphena non iuvet, nisi cubitum prius secetur. Nisi forsitan mulier esset puerpera: tunc enim si retineantur purgationes, non est secundum cubitum, ne nimia puerperij malitia peteret super nas partes.

Hinc Galen. libro de venæ sectione ad Erasistratū citat casum famulæ Margei: quæ dum filiam peperit nullo prodeunte sanguine, eo ad vertebrae costarū detortum est cum magno dolore: secta vena propè talum cessauit dolor & liberatur.

Demum diminutè agunt phlebotomando quibusdam. n. magno robore predictis euacuant in magnis febribus sex viciās sanguinis, vnde sarcina non amota ægri in magno persistunt periculo.

Audias casum à Galeno citatum lib. de curandi ratione per sanguinis nūssionem cap. 14. his verbis, nemini quibusdam ad sex vsq; libras sanguinem detractum fuisse, ita vt febris protinus extingueretur.

Sanctorij Sanctorij Pars I.

tur, nec vlla secuta sit virium efflatio. Ecce quod dummodo vires robustæ sint largè sit euacuandum sine vllō periculo quod vires cadant.

Non solum diminutis sæpè vtuntur medicinis, vtrum etiam extraneis; dum enim vident ægros magna siti ferè enectos, non pudet, proponere plurima saccharo condita, vt sunt marinatæ, conseruæ ex acido citri, iulubæ, quæ licet sine saccharo fortasse possent sitim arceret: tamen saccharo mistæ, est omnino impossibile, vt sitim auferant: mulieres vident, & sciunt pueri, quod saccharum contendant sitim; satius esset nihil sumere, quia lingua non polluta ijs dulcibus aliquid horarum spacio æger minori tentaretur siti.

Si aliquid esset concedendum, est ptisana actū frigida, quæ os abluendo eam sedat: deinde si sero lactis actū frigidus sæpè os abluatur, omnino mitigabitur: sed feri pauxillum pro vice, Arist. 1. probl. 37. & 3. probl. 21. quærens cur febricitantibus parum & sæpè potio danda sit, dicit multam præcipientem deserti, paucam tardè & profundè irrigare: sicuti pluuia quæ paulatim defluit magis humectat, quam quæ cum impetu: non solum igitur dulcia erunt inepta in siti pellenda, verum etiam eum intendent, & merito, quia facilè bileseunt: Hinc mirandum est, quod medicis, licet videant quotidie dulcibus non sedari sitim, videant ab ægrotantib. respni, non respiciant, nec ab his abstineant.

Errata empiricorum circa quando.

Cap. III.

Quando sit danda medicina, nos docet præsentia indicantis, & absentia prohibentis: mirum igitur est, quod Empirici leuissima de causa dāt pharmaca: est Galeni sententia 3. aphorismorum 14. quæ admonet, quod sæpè non sint corpora purganda: hæc sunt verba, neque tamen ea, quæ sit per purgantia pharmaca, superfluitatum euacuatio idonea est, quia valdè indigentibus, & ex longis interuallis vtilis est, nam euacuatio superfluitatum, quæ quotidie generantur in corpore, minor est, quam exigua operatio purgantis pharmaci; si quis voluerit bis in mense, aut semel vt

ea, veritus ne agerentur, superfluitates, docebit, & corpora trahet in malā consuetudinem, non sepe accidit, vt in corpore tot sint excrementa congesta, vt solum pharmacis, & non viuendi norma, possint tolli: quot sunt, qui vexantur grauedinibus, & catarrho, qui nullo sumptu pharmaco recta viuendi ratione seruata, vel breui liberantur? quippe qui si pharmacis tractarentur, nec citius, nec melius curarentur: præcipueque sunt, qui destillatione tentantur, ob imbecillitatem, vel ob frigiditatem externam densantem, & exprimentem cerebrum, vel ob caliditatem liquefacientem; ijs nullo vnquam tempore conueniunt pharmaca.

Amplius superflue, & importune agūt in grauedinibus, & destillationibus capitis, dum nimiam in mediam cholericiis præcipiunt: dicit Hippoc. & Gal. 2. de ratione vict. 44. biliosorum ventrem ob ieiunium repleti cruditatibus; à quibus deinde vapores eleuantur, caputque obrepunt, vnde tempora pulsant.

De nimia inedia loco citato dicit, inediam ex intempestiua cibi oblatione crudum reddere morbum: 2. verò de ratione vict. 30. reddere bilem amariorē: Secunda sectio aph. com. 22. inedia biliosis febrem asserere; aduersus Erasistr. dicit, eliquare carnes, & mordicando stomachum efficere morsum cordis; quo in loco loquens de D'odoro Grammatico dicit, inediam intempestiuam motus epilepticos, & vertiginosos facere.

Similiter lib. de sect. venæ aduers. Erasistr. dicit, quod inedia inter ea, quæ caput replent ad eam emineat, vt ex illa tensio vehemens circa brachia & manus oriatur: & 8. metc. 2. habet picrocholos ob intempestiuā inediam in hæcticā incidere.

Errant sæpe Empirici, dum intempestiue vtuntur terebra in capitis vulneribus; intempestiue ea vtuntur, quia, quando æger esset viribus destitutus, in opere ipso posset edere extremum spiritum: nullum magnum remediū est, dum virtus non permittit, administrandum: etenim si phlebotomia non possit administrari in virtute languida, quanto minus terebratio, quæ est vulnus ferè lethale, conueniet? intempestiue quoque ea vtuntur, dum putant, à seuerissimis ac-

cidentibus colligi posse, quod pus sit & olētum, licet non sint fracturæ signa: intempestiue dum nesciunt qua sub parte Cranei sit pus.

Causarum, cur terebratio aliquando mortem pariat, prima est, quia vehementem excitat dolorem in vtraque membrana.

Secunda, quia aer tangens duram, & piam matrem efficit magnam lationem.

Tertia in opere ita concutitur cerebrum, vt aliquando fiat attonitus affectus. Hinc Galenus 2. de loc. aff. 9. & 4. de loc. aff. 3. dicit inter perforandum Cranium, si quis premendo nimium violauerit membranam, sopor accidet.

Quarta, terebratio sepe sanguinis profluium contingit, & inde mors.

Quinta, terebrando sepe fit noua inflammatio, & inde mors.

Sexta, aliquando propter inflammationem accenditur febris, & deinde sequitur exitium.

Septima, in terebratione cranei requiritur summa inedia, quam si in tanto labore ferant, vt plurimum pereunt.

Octaua squamma ossis fracti sepe non percipitur, vbi sit, vt hinc reddatur opus inutile non sine mortis periculo.

Dicimus igitur, quod in magna consilij angustia melius sit terebrationem dimittere; sagax enim natura sæpe parat sibi iter, & sine terebratione squammam latentem, & absconditam saniem expellit, vel resoluit, & insensibiliter digerit.

Exemplū huius admirandæ operationis naturæ est pus in pleura inclusum, quod aliquando ad vasa vrinæ fuit propulsum: posset itaque facilius propelli si fuerit inclusum sub craneo, per foramina ossium cranei, etenim os cuneale habet decem, & octo foramina, occipitium septem: in temporibus vtrinque sunt quatuor, quatuor quoque sunt communia occipitio, cuneali, & temporibus per quæ natura posset pus excernere: nos tamen non omnino negamus terebrationis vsum, vt fecerunt Conciliator, & Cardanus, quorū opinio omnino reluctatur experientie; multi enim mortem obirent, nisi terebratio administraretur; quare supposito, quod virtus permittat; quod sciat, vbi sit pus, vel squama ossis, semper terebratio

bratio erit admittenda.

Empirici solent errare, dum vtuntur repellentibus, quando non oportet: nouem sunt casus, quando repellentia non conueniunt.

Primus ex Galeno colligitur 3. de med. loc. c. 2. vbi dicit, non esse vtendum repellentibus, quando humor fluit ad eminentiora auris, axillorum, & inguinis, &c. & ratio est, quia materia peteret partem principem; partes enim principes in glandulas expellunt excrementa, vt in cloacam, & inde innumeris liberantur malis.

Secundus casus, quando repellentia nocent, est, dum egreditur materia venenosa, vel dum fluit in partes ignobiliores à corde distantes.

Tertius in motu critico nō vtimur repellentibus; quinimo, si tumor criticè factus sit, laxantibus est tractandus, vt in maiorem molem eleuetur: hic obiret quinque conditiones bonæ crisis à Gale. traditæ 1. aphorismorum 20. afferuntur, quarum prima est, vt fiat per euacuationem, & non per abscessum: secunda, vt euacuentur humores peccantes: tertia, è directo: quarta, vt ager faciliè tolleretur: quinta, vt fiat die critico: quando igitur seruabatur hæc conditiones crisis euacuationis non erit repellentibus impedienda.

Quartus casus in plethora, vel cacochimia repellentia nocent: est Galeni de arte medicinali capite 96. & alibi, quod in principio apostematum plethora existente, non sint adiungenda repellentia: hæc sunt verba Galeni, corpora plethorica non admittere humoris retrocessus, cum vndique plena sint.

Quintus est, quando pars est adeo imbecilla, vt imminet periculum, ne calor partis extinguatur. Hic casus colligitur à Galeno 6. de med. loc. cap. 7.

Sextus est, quando pars afficitur vehementi dolore; tunc .n. vt dolor mitigetur, est lenienda; est Galeni 2. ad Glauc. cap. 2.

Septimus est, quando fluit materia ad partem vicinam parti principis, si in facie esset erysipelas, ibi repellentia propellerent ad cerebrum excrementa, quod esset inconueniens, eadem ratione, qui in angina vterentur repellentibus, errarent.

Audio his temporibus Medicum rationalem parti externæ gutturis in angina apo-

crustica applicare, à quo medendi modo, nisi abstineat, verendum est, ne aliquem miærum iugulet.

Octauus, dum materia est fixa, hucquè colligitur ex Galeno 13. metho. cap. 6. in principio enim fluxionis, quando humor videlicet est in venis, & in itinere, vt possumus repellentibus, quando verò est inclusus in spatij nullo modo: quia humor factus crassius amplius nō potest regredi.

Nonus casus est, dum tumor factus est per congestionem, tunc .n. vti debemus digerentibus, & non reprimentibus.

Duo alij à Guidone ponuntur casus prohibentes repellentia: quia re vera possunt reijci, alter est, dum affectus sit solum à causa externa: alter, dū fluit materia crassa, horum primus est vanissimus, quia in vulneribus illicdō vtimur repellentibus: secundus relictatur Galeno 14. methodi 17. vbi hæc leguntur: repellunt enim non solum quæ altrungunt, verum etiam, quæ sine adstrictione refrigerant.

Aliqua igitur repellentia sunt frigida & humida, & aliqua frigida & secca, & hæc sunt fortiora, quia alstringunt: dicimus, quod repellentia frigida, & humida, qualia sunt lactuca, nimphæa, & alia id genus sint reprimentia accomodata humoribus biliosis; frigida verò & secca pituitosis, & crassis: quod Galeni testimonio confirmatur 6. de med. loc. cap. ultimo vbi dicit, in capite, si sint acoræ sublaue vtat repellentibus potius refrigerantibus, si acoræ sint ex pituita vtat alstringentibus: ecce igitur, quod Galenus vtitur repellentibus, dum fluit materia crassa, & pituitosa: tandem de materia fluxa loquens Galenus 13. metho. 6. dicit, tunc esse vtendum digerentibus, & non repellentibus.

Causa verò, cur in fluxione vti debeamus repellentibus, duplex à Galeno afferitur 11. methodi cap. 15. altera est, quia repellentia virtute sua adstrictoria afferunt robur partibus, ne recipiant excrementa: altera est, quia exprimunt humorem tenuissimū inclusum: hæc sunt Galeni verba, apocrustica auxilia sunt adhibenda, quando fluxio petit aliquā partem, tum quia dant robur partibus, & roboratis prohibetur fluxio; tum, quia alstringentia tenuissimum succum exprimunt: ibi Galenus reprehendit illos, qui vtebantur la-

xantibus, quia laxando tollitur affectum partium robur, & partes implentur excrementis.

In hoc loco nostratum Empiricorum error notatur, dum ante totius purgationem in qualibet inflammatione vtuntur laxantibus, vt est oleum amygd. & alia vnguenta emollientia: quod Galeno relictatur, dicit enim 2. ad Glauconem, vbi loquitur de inflammatione, quod duo errata ab Empiricis in curandis inflammationibus committuntur, primum est, dum localia applicant non purgato corpore. Secundum, dum vtuntur laxantibus: 13. methodi c. 15. docet in omni inflammatione esse vtendum moderatis astringentibus gratia corroborandi partem affectam: quinimò refert ibi casum Theagenis Cynici philosophi, qui, cum haberet phlegmonem in Iecore, ab Atalo Medico laxantium vsu, est occisus.

Occurrunt dubitanda; quia sunt Empirici nonnulli, qui vtuntur repellentibus in glandularum ægritudinibus, quod ijs, quæ superius dicta sunt, relictatur: confirmant auctoritate Rasii, qui libro de apostematibus dicit, plantaginein conuenire strumis, at plantago est auxilium reprimens, ergo.

Præterea Galen. 2. ad Glauconem pro curandis struinis vtitur plantagine.

Insuper afferunt Galenum 14. met. 17. dicentem: exiguum vitiosum humoris, etiam si quis ad viscera, & ad magnas venas retrudat, nullum malum committet; quare non videtur inconueniens, si exiguus humor in glandulis sit, quod aliquando repelli possit ad partem principem.

Demum Galen. 10. de comp. med. sec. loc. vbi agit de podagra, dicit in fluxa materia, & in parte ignobiliori nos vti posse repellentibus, hæc sunt verba: administra totius euacuatione, vtimur repellentibus fluxionem in manibus, & pedibus, iuxta coxendicem verò minimè, ea cum in profundo sita sit iunctura, sanguis ex vicinis, & ambientibus vasibus à musculis ad illam truditur; patet igitur, quod aliquando ex Galeno possint ignobilioribus partibus applicari repercutientia.

Ad primum argumentum respondeamus, Rasium locutum fuisse de plantagine sicca, & non viridi; sicca enim abstergit,

& discutit; viridis verò reprimat: Hinc Galenus 6. simp. med. cap. de plantagine dicit folia, & radices plantaginis exsiccitas valere ad obstructions Iecoris, & Renū apertendas: Hinc innumerabiles notantur errores illorum, qui vtuntur hyemalibus siccis loco recentium, quæ natura, & qualitate valde differunt.

Ad secundum argumentum, quod Galenus 2. ad Glauconem doceat esse vtendum plantagine, quæ astringit: Respondemus, quod Galenus non dicit plantagine adstringere, sed *aperire*, quod verbum significat sistere, & compescere quare plantago, vt sicca & detestoria ex Galeno compescet strumas, & non vt viridis, & repercutiens: Galen. 14. methodi 11. dixit, quod strumis illa conueniat curatio, quæ debetur scyrthis, & tumoribus induratis; quibus nullo modo conueniunt astringentia.

Ad tertium, dato quod collectus humor in glândulis esset exiguus, dicimus illum esse adeo rebellem, vt timendum sit, ne viicera illum euincere possint: Præterea dicimus, Galenum non intellexisse de humoribus existentibus in glandulis, sed in alijs partibus: nulla enim alia corporis pars recipit humores adeo coctioni contrarios, & rebelles, vt glândula.

Ad postremum dicimus, quod in podagra solū corpore purgato licet vti repellentibus, neque illico in partem principem posset retrudi, quia pedes valde distant à visceribus principalibus: In glândulis vero auriū, & gutturis si vteremur repercutientibus, statim confluerent humores ad caput: tutius tamen semper est, vti repercutientibus corpore: existente purgato: exemplum enim est Galen. 14. methodi 17. traditum de Matrona Romana habente Herpetem in malleolo, quæ medicamento ex alga, quamuis corpus non erat purgatum, sanabatur, & paulo post iterum in alijs partibus rumpebatur vsque ad genu, tandem à Galeno sanatur vsu feri lactis; cui admixtum sit scamonee pauxillum.

Falluntur quoque plurimi dum porrigunt ægrofantibus alterantia, & cibum, quando non oportet: præscribunt post duas horas ab incæpto paroxysmi calore, esse dandum scrapium, & post scrapium elapsis

elapsis duabus, vel tribus horis ouum, & quod pessimum est, mulierū iudicio hoc summi momenti munus commendant.

Errant, quia sæpè incipiunt ægræ exardere, & post inceptum calorem trium horarum spacio conseruantur extrema frigida, quod significat accessionem adhuc esse in augmento, quod cum ita sit, valde ledunt, quia naturam rectè operatèrem à sedibus febrilis foci distrahunt: & morbum intendunt.

Præterea dato quod in aliquib. duabus horis ab incepto calore, incipiat declinatio, non tamen id omnibus febricitantibus accidit: Gal. 2. de diff. feb. 3. & 11. dicit, longas, seu breues accessiones modò pendere à multitudine peccantis humoris, modò à qualitate, modò ab imbecillitate, & demum ab angustia meatuum, quare, cū humoris quantitas, qualitas, imbecillitas, vel meatuum angustia modò sit maior, modò minor, eadem ratione accessiones erunt modò breuiores, modò longiores, & in longioribus accessionibus erunt longiora principia, & longiora augmenta, vt omnino sit ridiculum in ægotantibus omnibus accessiones in horas eodem modo semper diuidere; in aliquib. enim post duas horas ab incepto calore erit adhuc principium, in alijs augmentum, & in alijs status; quare hæc norma alterandi, & nutriendi est periculosa.

Falluntur quoque dum post tres horas à potione syrapi dant alimentum, tunc enim potest paroxysmus esse adhuc in augmento: quāti uero sit hoc erratum, colligitur ab Hippocrate 1. de morb. vulg. com. 2. tex. 26. vbi dicit, Filiam Philonis septima die mortuam esse, quia intempestiuus cænaui.

Similiter Gal. dicit, Filiam Eurianactis mortē obisse, quia in paroxysmo comedit vtiq. racemum: si itaq. in augmento dabitur cibus, vel alterans serapium, in discrimen adducetur ægrotus: medicus igitur iuuare non poterit, nisi prius cognouerit principium accessionis, & declinationis, accessionis, vt ante quinque horas possit proportionatum nutrimentum præscribere; declinationis, vt alterantia, & deinde cibus opportunè exhibeatur.

Sæpè abertant, qui in hac re tanti ponderis sunt relationi mulierū, quoniā inæ-

rore confectæ sæpè referunt extraneas, & minime ad rē confrentia: illæ semper veretur, ne æger fame pereat: neq. aliud cogitant, quā vētriculum cibis multæ nutritionis infarcire: si medici ab illis quærant accessionis principium omnia præposterè referunt, vocant. n. vt plurimum paroxysmi principium, dum æger incipit anxietatibus premi, quod potius ad augmentum pertinet.

Demum vel ægotanti, si ab illo Medico tractetur, qui stat relationi mulierum, quia huius medici auxilia necessariò importunè, & præposterè administrantur ex quibus quantum detrimenti sequatur, cæteri iudicent.

Similes medici sunt nostratum empiricorum plurimi, qui in maligna febre, vel nullum principium insultus obseruant, vel de accessionibus omnia concedunt mulieribus; & quod exitiolum est, manè audent præscribere, quæ vesperi, media nocte, & sequenti die essent administranda, quod erratum est inexcusabile.

Videtur, quod plurimi vtantur purgantibus, & varijs auxilijs in statu morbi, quando minus oportet: Empirici, dum dicit, & trucia sæuiunt symptomata, præcipuè videntur confugere ad purgationes, ad sanguinis missiones, & ad vesicantia.

Errare videtur; quia clarissimè Hipp. 2. sect. aph. 29. oppositum docet his verbis: vigentibus morbis quiescere multò præstat: & Gal. in com. habet hæc verba: circa initia morborum, in quibus speramus agrum conualiturum, tentandum est, maiora asferre remedia, vt venæ sectionem, & aliquando purgationem, quorum neutrum oportet adhibere morbo consistente, quia tunc actiones morborum quammaximè sunt; & infra, cum fiant actiones, superfluum est euacuare.

Prima ratio cur in statu morbi magnis remedijs non sint tractandi ægotantes, est, quia tunc virtus est defatigata: est Gal. 1. aph. 25. quod humores non sint euacuandi, nisi virtus valida sit.

Secunda, quia natura non est distrahenda à concoctione, natura enim tunc agit singularè certamen, à quo si remouebitur facillè succumbit: verum, quia aliquando turgent humores, vel magis possunt indicantia ad indicandum reme-

dia, quam enarrata prohibentia ad prohibendū; ideo Dogmaticus in statu morbi aliquando etiam vteretur magnis remedijs, quod est faciendum non sine exacto indicantium æquilibrio.

Reprehenditur tamen mos illorū, qui in omni morbi tempore, & quolibet die sanguinē ab aliqua parte mittūt, vel medicinis impotentijs vexant ægrotos, & nunquam permittunt, vt æger quiescat.

Plurimi plus nutriunt in statu morbi, quam in principio; ij Gal. Hippoc. & præcipuis medicinae fundamentis reluctantur: Hippoc. 2. de rat. vict. in ac. 18. eos reprehendit, qui primis diebus absolutam inediam obseruant, dum verò ad statum morbi propius accedunt ijs, quæ maxime nutriunt, vtuntur: hæc sunt verba, verum & medicos contra omnino, in cuius oportet facere non ignoro, quippe qui ab in toto duos, aut tres dies, aut etiam plures ægros fame cruciant: deinde, & sorbitione, & potus exhibent.

Empirici hunc ordinem Hippocratis pervertūt, primis diebus præscribitur feruentibus panem madefactum in iure pulli, & ouum recens: in statu, ijs addunt contusa caponis; quod omnino aduersatur etiam Galeno 1. sect. aph. 8. vbi dicit, cum morbus est in vigore, vitum victu tenuissimo, tum quia magna symptomata ægrum vexant; tum quia natura est occupata coctioni humorum.

Præterea in statu morbi virtus est adeo languida, vt vix possit tenuissimū cibum assimilare: Galenus 1. aph. 4. dicit, in euacuato corpore refectiones non sunt secure, cum natura sit facta debilis, & non possit coquere, neque distribuere alimentū, vel assimilare: primis diebus debilitantur ægroti medicinis, & phlebotomia: in statu cū sint debiles, refectiones nō sunt secure: Præterea non sunt secure, quia (ut diximus) distrahitur natura ab humorum coctione: nihilominus mulieres, circulatores: & Empirici aliam obseruant medicinam, putant uirtutem languidam indicare, quæ ualdē nutriunt, & fortem indicare inediam: Galenus 1. sect. aph. com. 12. desumit rationem uirtutis ab ijs tribus, à uiribus egrotantis à constitutione morbi, & à particularibus accessionibus.

Quo ad uires egrotantis attinet, Galen.

2. methodi 5. dicit, quando uirtus facilius morbum tolerat, tunc ægrum esse cibandum: addi potest, at sic est, quod in statu morbi maxime læduntur ægri, & minus tolerant, ergo minus cibandi.

Quo ad constitutiones morbi, dicimus, in inflammationibus minus esse nutriendum; quia inflammatio semper habet annexam intemperiem, & solutam unitatem; præterea inflammatio est ferè uniformis, & non edit paroxysmum, in cuius declinatione natura possit quiescere: hinc dicimus inflammationem magis prohibere cibum, quam intemperiem sine inflammatione.

Demū dicit Gal. quod paroxysmi prohibent cibū; quia natura tunc est maxime occupata, & non potest cibis, & morbi insultibus uacare. Hinc Gal. 1. ad Glauc. 10. dicit, in tertiana non exquisita solum alternis diebus esse cibandum, ut effugeret periculum cibandi in accessionibus.

Verum non negamus, quod aliquando non sint ægroti in statu quoque rescindi, & præcipue si aliquod urgens sit, quoniam est Gal. 1. aph. 9. ubi dicit, quo circa aliquid in ipso vigore morbi nutrire cogimur, ubi casus interuenit robur nature dissoluens: Præterea sūt picrocholi, qui habent corpora disposita ad hecticas febres, de quibus Galen. in meth. dicit, quod nisi cibo in principio paroxysmorū refocilentur, in habitum hecticum cadāt oportet; si igitur nullum fuerit urgens, quod cibum indicet, seruanda erit Galeni sententia, tom. 1. ad Glauc. 13. ubi dicit in acutis in principio uictu solidiori, si uires nō ualent, in statu iuniori, tum 1. sect. aph. ubi dicit, in longis morbis oportet conseruare uires quales accepimus, in acutis satis eas seruare debilitatas.

Quoties uero sit dandus cibis, dicit Galen. 2. de ratione uict. 36. ijs uerbis imbecillitas indicat: sæpe quidem, sed paulatim dandum alimentum: firmitas semel, & multum, quod plurimi Empirici non obseruant, quia dum uires sunt languidissimæ, dant quæ maxime nutriunt, & sæpe dum robuste parum.

De erratis circa quomodo. Cap. IV.

Quomodo agendum à passione indicantis desumitur: indicans non potest

tietur à remedio tribus modis, vel quia indicatum seu remedium sit diminutum, vel abundans, vel extraneum; ratio est, quia vni indicanti (vt diximus) vnicum debet esse remedium, & non plura: omnia igitur, quæ non iuuabunt sub aliquo ex ijs tribus continebuntur.

Cæterum remedia malè administrata, quæ pertinent ad Quomodo, sunt proponenda: exordiamur ab extraneis; hæc enim nullo modo conueniunt, quia, cum sint alterius generis, non aduersabuntur morbis, si vera est Aristotelis sententia proposita in prædicatione qualitatis, quod in illo genere, in quo est vnum contrarium, sit & alterum.

Quidam putant, quod calculus in Renibus, & Vesica existens frangi possit succo citri, electuario ex vitro, decocto saxifragiæ, verbenæ.

Quidam valdè confidunt in cinere scorpionum, in Yrci sanguine: quæ materiæ nec diminutæ, nec abundanter possunt calculum frangere, vel comminuerè; vocabuntur igitur remedia extranea, & transcendencia.

Si remedium esset istius virtutis, vt lapillum existentem in vesica, vel in renibus posset frangere, prius viscera exanimaret, intestina vellicaret, & ad vltimum partes viuentes, qua transiret, laceraret, antequam calculi extimam superficiem comminueret.

Hic non possum omittere, quin erratū cuiusdam nostratis rejiciam, qui in percelebri viro calculo vesicæ laboratè multis diebus vsus est electuario ex vitro: dum enim putat calculum comminuerè, exedit intestina, dysenteriam efficit, & immaturè tam præclarum virum interimit.

Errauit, quia remedia, quæ haberent virtutem frangendi calculum, nihil efficerent, nisi super ipsum detinerentur; actio ex Aristotele 1. de gener. non fit nisi per contractum.

Sed demus, & non concedamus, quod hæc remedia, quæ per os assumuntur, sine læsione aliarum partium tant ad calculum, illum solum obuoluant, & tangerent, quid tum postea? frangerent ne illud? obuoluas calculum polline vitri, vel adamantis, quod fortius est, & anni spacio sic obuolutum conseruas, experientia videbis,

calculus integrum, & nullomodo comminutum conseruari: quod cum ita sit, fatuum erit credere, quod assumpta per os possint calculum renum, vel vesicæ comminuerè.

Dum in Renum, & vesicæ inflàmatione vtuntur diureticis, videntur errare; quoniam diuretica ad loca illa affecta alia plura excrementa secum rapiunt, & morbum intendunt.

Eadem ratione videntur errare, dum in collica passione exhibent pharmaça, hæc enim intestinum collum debilitatum recrementis implent, vnde truciore, & seuestiores succrescunt dolores.

Clysteres etiã potèntes non euacuant à toto, quia in appèdice cæci intestini adest valvula, quæ impedit ingressum ad superiora. Hinc Gal. 5. met. dicit, vix ad ieiunum ascendere clysteres: Neque obstat alius Gal. locus 2. de sympt. caus. vbi habet clysteres peruenire posse ad vètriculum, quia hoc contingere potest quando ventericulus & intestina sunt valdè imbecillis & valvula valde laxata: quo casu vera est Rasis sententia à continentis d'centis, si initiantur suo clysteres, ad nonū ventericulum & ad nares posse peruenire præcipue si intestina laxata & debilia sint.

Similiter non licet in vteri passionibus menses mouentia porrigere, vt plurimi Empiricorum quotidie faciunt: quod manifestissimè errent, est Gal. auctoritas 6. de morb. vulg. com. 2. text. 7. hæc sunt verba, vitata vesica, aut renibus, melius est per alium deriuare, quam per vrinam euacuare: & 13. methodi c. 11. d' c't, cū iecur incipiat phlegmone laborare, & aliquis tentet medicamenta exhibere, maxime excitabit inflammationem equè ac, si cum renibus, aut vesica laborat, aut vterus, & menses deuocat: subdit ac vomitu vti pudibundis laborantibus est auxilium reuclens: valebit ergo in Gal. doctrina hæc consequentia, vterus, renes morbo laborent ergo neque diuretica, neque menses mouentia sunt porrigenda: non tamen omnia diuretica sunt interdicienda, sed solum calida, quæ secum ferunt alia excrementa; quia si partes illæ fuerint refrigerandæ, & contemperandæ, diuretica frigida, vt lac, sem. mellonum, & alia id genus laudantur.

Præterea si esse aliquod vrgens veluti in desperata vrinæ suppressione, tunc ad cantharides confugimus; nunc nō loquimur de vrgentib. sed solum de indicantibus: laudat Gal. vomitum, vt auxilium reuellsens, qui pndibunda laborantia valdē iuuat; Ego in seuiſſimo arenularum dolore hæcenus non inueni præstantius remedium vomitu, statim mitigantur dolores, quod fortasse sit, quia loco ab impetu vomitus arenulæ dimouentur.

Præterea, qui vtuntur in calculo diureticis calidis, errant primo, quia diuretica secum ferunt excrementa, & aperiunt meatus.

Secundò lapidem denudant, & inæqualem, & asperum reddunt: lapis, dum crescit, inæqualiter crescit, quia augetur iuxta-positione, conditio eorum, quæ crescit per iuxta-positionem non est, vt æqualiter, & secundum omnes partes crescant, quia hæc est conditio animatorum, & hæc est ratio, cur calculi, ut plurimum inæquales, & asperi sint: utrum, quia renes, aut vesica asperitate laderetur, sagax & prudens natura cum muscosa, & lubrica pituita induit, ne partem uiuentem vellieret.

Diuretica magnum affrunt detrimentum, quia calculum circumuentum viscosa pituita denudant, qui ob asperitates adeo pungit, ut post breue deinde spatium vlcus exitiosum efficiat, unde adeo crucia excitantur symptomata, ut nulla mors hac crudelior accidere possit.

Audias quomodo famosus quidam Circulator hac sceleratissima morte calculosum perempsit: Hic porrexit misero nalentissima diurecia, quæ mouerunt lotia fæculentissima, quia viscosa, & lubricam pituitam, quæ erat tamquam calculi puluinar, à calcenlo separauit: illico melius habuit; putabatque iam esse liberatum, & Circulatorem, ac Æsculapium laudibus ad sydera extollebat: Verum post paucos dies calculus nudus, & asper cepit paulatim exedre, & terebrare vesicæ parietes, & doloribus, quos ante nunquam fuit expectatus, nexari; mox factò ulcere, eoque cancroſo ut uidimus post tectum eius caduere, tot penis lacerabitur, ut farear, me ante nunquam uidisse mortem uiolentam, quæ esset hac trucior, atque crude-

lior: miser potuisset, uel se permittere Lithotomo cum spe salutis, uel nullo temporis tractu sine cruciatibus adhuc frui lucis vsurâ; uoluit tamen circulatori, vel potius carnifici se committere: patet igitur non solum ratione, verum etiam experientia, quod calida diuretica in calculosis sint pernicioſa.

Inter extranea remedia pro malis qualitibus, veneficis debellandis à nobis reponuntur margaritæ, bezoar, cornu cerui: bezoartica; laudata à Pharmacopeis, quia ijs citius, quam alijs medicinis, defecunt: hæc aliquando Probus Medicus cogitur exhibere, quamuis sit manifestissima impostura, quoniam dum æger in deterius labitur: si antea bezoartica medicus non adhibuerit omnes putant illi esse malorum remedium acceptum referendum.

Ratio, cur Beozar, quod defertur ad nos despicere debet, est, quia reserunt sudorem excitare, quod (vt docet experientia) est falsum; Præterea in nostro Bezoartico lapide intrinsecus est nucleus, vel palea, quod ostendit esse artefactum.

Insuper videtur fabulosa eius Historia, à Serapio lib. agg. habetur esse lachrymâ cernorū orientis, quæ sic fiat, cerui comedunt serpentes, vt deponant senium, deinde intrant flumen & immerguntur vsq; ad caput, & tandem morantur, donec sentiant ueneni vires esse superatas; interea emittunt lachrymâ, quæ oculorum angulis adheret donec exsiccat, inde cadit, & inuenit: Alij dicunt, quod in ventre huius animalis bezoar inueniatur, quod si ita esset mercatores, qui Venetias tot preciosos lapillos adferunt, semel ceruum deferrent.

Eadem ratione rejicimus, quod ferunt de virtute cornu rhinocerotis aduersus venena; quia experientiæ non respondet: vereor ne, quod refertur de rhinocero sit omnino falsum; per rhinocerotem intelligimus monocerotem, & non quemlibet monocerotem (multa enim sunt animalia monocerota in quibus cornu è media fronte protenditur) sed intelligimus illum monocerotem, de quo refertur esse feram indomitam quidem & hominibus crudelem & ob eius robur inexpugnabilem, quam feram aiunt virginis puellas ita uenari, vt ipsi viſis, manſue-

scat & iuxta eas in fornū delapsam capi, & ligari posset: similem monocerotem inueniri negamus; etenim, si tam virtuosum quadrupes inueniretur, integrum apud Regem Hispaniarum, vel Turcarum fuisset visum, & expertum; sed apud neminem istorum, virtutes cornu monocerotis celebrantur, ergo non est credendum, quod alibi inueniatur.

Præterea inter Bezoartica sunt Hyacinthi, coralli, & cæteri preciosi lapilli, quippe si experientiæ, & rationi stādum neque occultis, nec manifestis qualitatibus iuuant maligna febre correptos: non occultis; quia, hæc qualitates (vt ostensum est libro 8.) non dantur; non manifestis, dicunt enim exsicando hæc Bezoartica aduersari putredini, at sic est, quod assumpta non possunt tangere putredinem in sidetē venas proximæ cordi, ergo non exsiccabunt: nulla actio manifesta sit sine contactu; exempli causa, si adesset vlcus putridum in extrema corporis parte, & Medicus exsiccat medicamentum non vlcis, sed alijs partibus adiungeret, nunquam vlcus exsiccaret, quinimō Astantes medicum valde iriderent.

Similiter quo pacto volueris putredinem existentem in uenis proximis cordi bolis cordialibus exsiccare? Ergo non semel bolos cordiales per secessum integros vidi excretos.

Præterea dato, quod smaragdi, Hyacinthi, & saphiri possint malignā putredinē acere: dicimus, quod ij lapilli, quos habemus, non sint orientales, sed boreales, & vilissimo pretio emantur.

Ad hæc dato, quod essent orientales, & quod mirificam haberent virtutem, nostrates illis abutuntur; quia aliqui cibis illos permiscunt, aliqui tribus horis ante cibum illos sumunt: Est Auenzoar 1. Theophrast. cap. 1. qui ijs verbis docet tempus opportunum sumendi smaragdum, qui sumperit Theriacam, vel smaragdū non recipiat cibum, nisi post septem horas, & non exhibetur cibo in stomaco existente, præterea pulueres bezoartici cibis commixti plura incommoda ægrotantibus afferre possunt; quia sicuti ex quolibet puluere misto humidis rebus fit gluten; sic bezoarticus pulvis cibo mistus gluten efficiet, quod venas capillares Hepatis

summa cum ægrotantium iactura obstruere possit.

Videntur errare, dum ægrotantibus alterantia, quæ habent potentiam refrigerandi dant actū calida, est Galeni 3. de temp. eap. 4. quod viscera ab illis refrigerari non possint, nisi caliditas actualis, & acquisita prius preceat; hæc sunt verba, dum aliquid agendo patitur, in patiente si est aliquis effectus acquisitiui ex accidente, perit celeriter; subdit Galenus, in applicandis iis, quæ natura sunt nobis frigida, & per accidens calida, si debeant refrigerare perit prius acquisitiui calor; datque hoc exemplum Galenus, si papaueris succus exhibeatur calefactus, paullo post in ventre euadit frigidus, & natura ad tollendum acquisitiui calorem extrinsecum immixtus magis affligitur, quod ita se res habeat, proba experientia dicens, quod ptisana, lac, & far demissa in ventrem imbecillum aliquando euomi actū frigida; ventriculus enim antequam concoquat, prius acquisitiui calorem superat, quo superato aggreditur concoctionem, & solui illo concoquendi tempore alterantia frigida refrigerant, quando vero sunt coctæ, & superata non refrigerant, sed augent calorem naturalem: quodque ita sit, audite Galenum lococitato: lactuca afficit corpus nostrum, vt medicamentum toto concoquendi tempore, ubi iam est assumillata, & coctæ, non amplius refrigerat, sed naturalem calorem auget: alterantia igitur refrigerantia non debent esse actū valde calida, nec calefacientia actū frigida, sed moderata quia actio syruporum non incipit, nisi reducantur ad pristinam naturam.

Sed exurgit dub. quia ex Gal. 13. meth. 12. habetur, quod alterantia extrinseca non debeant applicati actū frigida, quare tanto minus dabimus alterantia intrinseca actū frigida, hæc sunt Gal. verba, si hepatis inflammatione laborare incipit, medicamentum actū frigidum non applicabis; at si brachia, vel crura incipiant inflammatione affligi, medicamentum poterit apponi actū frigidum.

Respondemus, quod Galenus dum dicit, inunctionem actū frigidam non esse apponendam regioni Hepatis, quod non intelligit ratione indicantis calidi, de quo

nos loquimur, sed ratione prohibentis: meatus externi circa regionem hepatis non debent frigidityte externa astringi, quia per illam partem maximè ventilatur iecur, alterantia igitur nec calida, nec frigida esse debent, non calida; quia actus alterantium omnium insequuntur energiam potentiam: non frigida, quia magis potest prohibens, relatum, quam indicans: in pedibus, vel cutibus inflammatis ubi magis potest indicans, quam prohibens, actus frigida alterantia apponuntur: Ex ijs colligimus erratum illorum, qui in alterantibus glacie utuntur, sit enim indicans calidum ut libet, nunquam alterans refrigerabit, nisi prius caliditas acquisita, ut dicit Galen. loc. cit. omnium destruat.

Lædunt quoque feblicitates, dum eos collocant in aere calido, & ocluso: permittuntque, ut æstivis temporibus claudantur fores; & fenestræ, perinde ac febribus indicare calefaciens, & non refrigerans: aer inclusus tam malis halitibus refertur, ut faciliè interna viscera ad maiorem putredinè disponant: audiamus Galenum 9. methodi 14. qui aerem calidum febrientibus omnino interdicit, si morbi species est calida, & sicca præparabis ambientem aerem cubiculorum frigidiorum, & humidiorum; subdit, in æstate, in morbo calido & sicco subterraneas domus eligimus, & ad septentrionem versus, ac aspergas humore assidue, eorum pavimenta exornes germinibus, & floribus frigidis: malè igitur agunt, qui permittunt, ut claudantur fenestræ: aer non perflatur, eundem calidus, & putridus, & febrienti nihil potest esse eo deterius, & perniciosius; hinc Galen. in morbis calidis subterraneas domus ad septentrionem versus locatas eligeat, ut aeris caliditas, & halitus putridi, qui eleuantur in cubiculo, novi, & puri aeris flabello ventilarentur, & mala qualitas caloris febribus reprimeretur.

Malè agunt quoque, dum permittunt, ut plurimi ingrediatur cubiculum; quia multorum halitus aerem corruptunt, Galenus 10. methodi cap. 8. habet; turba amicorum calefacit cubiculū, quare prohibendum, ne ingrediantur: si turba amicorum, qui ægrotaantium animos sedare,

ac demulcere possent, est à Gal. interdicta ne cubiculum calefiat; quanto magis erit prohibendum, ne claudantur fenestræ? non solum enim calefieret cubiculum, verum, fulgines putredinosæ cum puris aeris inspiratu non perflatur, in deteriorem conditionem laboratur æger.

Nec obijciant, quod ab aere frigidiore cutis densetur, & obstruatur, & inde maius detrimentum nascatur.

Galen. enim loco citato statim occurrat huic dubitationi his verbis, „ quod ex aeris frigidi inspiratione magis sit futurum commodum, quam ex cute densanda incommodum.

Verum quamvis condensatio cutis sit causa caloris, potest quoque vitari hoc incommodū si æger cooperiatur, aer enim frigidus inspiratus interna viscera refrigerabit, & intensum calorem compeſcet, nihil enim promptius temperaturas humorum immutat, quam aer, ut dicit Galenus 3. de hum. com. 2. hæc sunt verba, si aeris nos ambientis temperies immutetur, etiam humores necessariò, immutabuntur: nihil itaque citius emendabitur ænem viscerum calorem, quam aer frigidus: & nullus error in febribus malignis, & ardentibus maior fortasse erit, quam ægros in locis calidis oclusis, & hominum turba plenis tenere.

De Erratis circa ubi agendum. Cap. V.

Quia actiones, & usus omnium partium corporis non callent, nunquam (ut ait Galenus 1. de loc. ast.) internas ægritudines cognoscere, & curare, poterunt; quia ex læsis officijs ubi sit indicans, & ubi debeat remedia applicari, est colligendum; Galen. 13. meth. c. 17. & 18. & alibi ducet, quod à substantia indicantis ubi sit agendum desumatur.

Nos in 3. libro tradidimus methodos cognoscendi specificas partiū affectuum differentias; quarum contemplatio tanta est, ut Galenus 13. methodi cap. 20. dixerit; si quis adimeret indicationem summam à parte, is totam medicinā sex diebus addiceret: nostrū hic est, aliquot errata Empiricorum, qui internas substantias indicantium non perquirunt afferre:

re: quoniam de modo cognoscendi internas affectuum ideas in libris superioribus abunde egimus.

In primis illud se offert commune errorum medicorum vulgarium, dum in omni morbo putant, humores peccantes purgantibus medicinis tolli posse; est Galeni ad posthumum cap. 3. quod multæ sint viæ, quas natura aperit pro expellendis excrementis, per vomitum videlicet, per alui profluuium, per vrinæ multitudinem, per sudorem, per sanguinis eruptionem, per hæmorrhoidas, &c. cur itaque plurimi in omni morbo putant cathartici esse vtendum; perinde ac natura non posset per alias regiones corporis aggredi crism, quam per alium; ac vnica esset indicantis subsistentia, vnicum vbi agendum, vnicusque, & vniformis in omnibus medendi modus.

Dum natura est prona & procliuvis, vt soluat morbum per sudorem, vel per vrinam, si portexeris pharmacum, impedit illicd crism; quia motu contrarium efficit; raptus humorum per alium est omnino oppositus raptui per sudorem, per vrinam, per vomitum, & per fluxionem sanguinis è naribus.

Amplius Galenus 5. de loc. aff. 2. & alibi de morbis, qui sūt in pectore dicit, nō euacuari excrementa pectoris per alium, nec per vrinam: peccatis quoque est Historia Pythionis ab Hippocrate propolita, in qua refert Galenus, affectionē pectoris, quæ erat in Pythione per sputa persectē curari, vrina adhuc manēte cruda; quia, vt subdit Galenus, affectus pectoris nec per vrinā cognoscitur, neque expurgari: Sæpē Thoracis morbi soluantur, & superantur vrina cruda persuerate: qui igitur putant, cathartici morbos omnes curari posse, toto celo aberrāt, quia plurimæ sunt viæ, eæque inter se contrariæ, per quas solers natura morbos soluit.

Cæterū veritas melius percipietur, si ægros ab Hippocrate propolitos expēdamus, quia in illis, tāquā in speculō omnia potiora medicinæ fundamenta elucent: Horophons 17. die sudore iudicatur: ponamus, quōd medicus plebeus dedisset Horophonti phatmacū 16. die, certē non sudasset, quia medicamentum trahens ad intem: humores diuertisset naturæ incli-

nationē, unde magis grauata natura facile potuisset æger ad exitum peruenire.

Cleonaetides 80. die copioso sudore iudicatur; si hic æger fuisset tractatus ab Empiricis nostratibus, qui solis pharmacis putant tolli posse morbos, sudorem antrevertissent, & natura per medicinas distracta ab hac optima crisi in peiorem statum fortasse incidisset.

Mulier decumbens in litore trimestri sætu grauida 14. die per uomitū, & sudorem ægritudine liberatur: cui dubium; quod si Empiricus ei pharmacū dedisset die 12. vel 13. quōd crisis hæc fuisset distracta, & decima quarta nō fuisset liberata?

Cherionas vigesima liberatur multitudine biliosarum urinarum, si pharmacum sumpsisset, naturæ impedita fuisset, & crisis illa die non esset secuta.

Virgo in Abderis ardentefebre vigesima septima per sudorē copiosissimum liberatur: eodem modo liberatur (ut dicit Hippocrates) Nicodemus: si rudis Medicus ijs dedisset medicamentum paulo ante crism, an ne malè egisset, profligando naturam, quæ non erat inclinata, ut per alium moueret?

Mulier morosa tertia die liberatur; quia muliebria multa descenderūt, quomodo ergo hæc mulier potuisset liberari medicamento? pessimum igitur est arbitrari, quod medicinis soluentibus omnes ægotantes sint tractandi.

Virgo in Larissa sexta die liberatur per fluxum sanguinis è naribus, & sudore; erat ergo humoris peccantis subsistentia supra gibbum iecoris; quia narium vena à iugularibus enascuntur, & iugulares à caua prodeunt, quæ supra gibbum habet suam sedem: Quomodo igitur per alium excrementa exstentia in caua propensa, ut per sudorem, per nates, vel per vrinam excernantur, medicamentis auferri poterunt?

Meton quinta die morbo acutissimo liberatur per sanguinis enacuationem è naribus: Hippocrates sapientissimus, ut illicd Metonem ad pristinam sanitatem transferret, noluit mouere per alium, sed paulo ante crism ei parauit lotiones capitis; quia uidebat harum auxilio naturam iuuari ad periclitam crism facienda: quibus administratis, largè è naribus effluxit

effluxit sanguis, & sine medicinis statim fuit liberatus: noſtrates Empirici non ſolum caput lauiffent, immo, ſi probus Medicus in ſimili caſu lotiones propoſuiſſet, increpaſſent, & ei vitio vertiſſent, tantus eſt mœdendi abuſus.

In ſimili caſu mea ſententia fuit ſemel iniuſte reieſta: erat patiens in quo ſtillæ ſanguinis è naribus incœpere in die indicatoria, Ego imitatione Hippocratis lotiones capitis propoſueram; cæteri medici ſummis fere vocibus, medicinam, & hyrudines hæmorrhoidibus applicandas propoſuerunt, & inde naturæ adeo fuerunt impedimento, vt amiſſa occasione floris ſanguinei è narib. facta fuerit viſcerum inflammatio, & miſer, qui omnino debebat ab hoc diſcrimine enatare, tandem importunis medicinis ſuneratus eſt.

Quorſum poſt tres dies voluiſtis repetere medicamentum leniens, ſi paulo ante inteſtina ſæcibus fuerunt euacuata? Quorſum voluiſtis vti llyrudinibus in partibus infernis, ſi natura euacuationi per nares erat inclinata: opus erat, vt initaretur mihi Hippocratem, qui Metonem lotionibus ſtatim liberauit: variæ enim ſubſiſtentia indicantium omnino variat ubi ſit agendum: ſi ſubſiſtat indicans in Thorace, non debemus vti medicinis, vt vidimus in Pythione, quia Thoracis affectus per tuſſim curantur ſic febris ardens per ſudorem, vel per vrinam iudicatur, inflammatio iecoris præcipuè ſanguinis profluuii, tertianæ vomitu, & ſplenetici hæmorrhoidibus: verum antequam adminiſtrentur auxilia, opus eſt, ſigna omnia indicatoria expendere, quia hæc nos docebunt naturæ inclinationem.

Poſtquam de fluore ſanguinis è narib. locuti ſumus, ſe offert ridiculum remediū empiricorum, qui dum arcere volunt fluxum ſanguineum è naribus adiungunt aſtringentia narium pinis, credentes quod indicans ſubſiſtat in naribus, cum ſubſiſtat in venis cauiſ. Hinc tollitur hæc hæmorrhagia ſectio cubito, quia ſeruantur quatuor requiſita reuulſionis, quorum primum eſt, ſeruare rectitudine, ſecundum per vaſa communia euacuare, tertium trahere ad originem, quattu per diſtantiſſima.

Demum ſepè videmus, pueros lumbrici-

cis vexatos, ab Empiricis, qui neſciunt ubi ſubſiſtant, medicinis importunis tractari, quia, dū lumbrici ſunt in tenuibus inteſtinis, vtuntur clyſtere, dum in craſſis potionib. Auic. l. 3. ſen. 16. tract. 4. cap. 25. dicit, vermes ſi ſupra vmbilicum fuerint, adminiſtranda ea quæ bibuntur, & ſi fuerint apud vmbilicum, & ſub eo, clyſteria imponenda: qui igitur præbent medicamentum per os, lumbricis exiſtentibus in craſſis, agunt fruſtra, quia antequam deſcendat medicina, ita alteratur in ſuperiſ partibus, vt eius virtus reſuſa non valeat vermes occidere, niſi fortaiſſe medicamentū ſit natura inſuperabile, ſicuti eſt mercurium; quod mirificè illos occidit, vel quod à Gal. li. de theriaca ad Piſ. proponitur, eſtque cantharis læuigata pota cum radice brioniæ, quæ medicamenta ſemper ſunt lumbricis deleteria: ſimiliter ſi vtantur clyſteribus lumbricis exiſtentibus in partibus ſuperioribus, tempus conterunt, & fruſtra vexant ob incognitam ſubſiſtentiam ægrotos.

Vt errant, dum in lienis affectibus putant, quod ubi agendum ſit vena ſaluatella. Cap. VI.

Hodierno die, & olim ante Gal. in animis multorum vixit error hic inlignis, quod ſaluatella vena ſit ſplenetica, lienofis ſolum conferat, & quod falſiſſimum eſt à ſplene exordium trahat: quo ſit, quod nullus ſit quartanarius, nulluſq; inflammatione ſplenis correptus, cui non ſecetur hæc vena.

Cæterum, quia error eſt valde communis, præcipua eius fundamenta proponam, eaquæ conuellam, vt veritas melius eluceſcat: primum aduerſariorum fundamentum videtur, quod à Gal. colligi poſſit 3. de anatomicis admi. c. 5. ubi habet hæc verba, lienem iuuari aſſerunt ex euacuatione venæ inter anularem, & minimum digitum.

Conſirmant ſimiliter ſuam ſen. Gal. auctoritate 1. de hum. com 13. ubi dicit, lien inflammationem patiente venam ſiniſtræ manus internam ſecabis ſi iecur fuerit inflammatum, internam dextræ.

Præterea l. de cur. rat. per ſim. c. 14. 16. & 2. ad Glau. habet, lienem inflammato venâ

manus sinistrae dicit esse experiendam.

Idē cōfirmat 13. methodi 11. ijs verbis, vbi iecur phlegmone est correptū, secatur vena in dextra manu, vbi lien in sinistra.

Insuper confirmant suam opinionem auctoritate Hippoc. lib. de morbis partic. 25. vbi habentur hęc verba, peripneumonia, & pleuritide laborantibus venā manus splenitidem appellatam esse aperientiam: addunt, Soranum Ephesium in sua introductione cap. 1. hęc afferre, in lienis inflammationibus venam secus minimum digitum existentem suo quoque tempore aperiri consuevisse.

Auicē. lib. 3. fen. 22. tract. 1. c. 25. vbi dicit, in lienis, & iecinoris affectibus, saluatellę sectionē anteposuerunt sectioni Basilicę; Præterea est Oribas. 7. collect. med. 1. 3. & alibi est Act. ser. 3. c. 12. Paul. 1. 3. de re medica; Alex. lib. 8. cap. 12. Actuarius lib. 3. methodi cap. 1. Rasis 9. ad Almanforem cap. 70. Haly 7. pract. cap. 40. Rabi Moyses particula 22. suorum aphorism. & demum Serapio tract. 6. sui breuiarij capite 15. conuincere videntur, quod in affectibus lienis, & vbi melancholia redundat, sit saluatella vena secanda.

Quo ad Galenum attinet, respondemus, quod 3. de anat. admī. cap. 5. ex sententia aliorum loquitur; verba Galeni hęc sunt, afferunt lienem, iuvari ex euacuatione saluatellę, cum igitur dicat, asserunt aliorum opinionem proponit; Dum vero asserunt loca 1. de hum. com. 13. in inflammatione videlicet lienis venam sinistrae manus interuam esse secandam, & 2. de ratione vict. 10. & alibi cit. locis; respondemus Galen. per manum, nisi dicat summā manū semper intelligere brachium; 3. enim de anat. admī. declarans, quod in brachio sint duę venę, & vna arteria, habet hęc verba, vna sanē arteria, duę autem venę in totam manum pereperant, quod nullo modo de summa manu potest intelligi sed de brachio.

Nec obijciat, quod Galenus 1. de hum. 13. clarē dicat, esse secundam venam, inter digitum minimum & anularē: quia ibi intentio est Galeni enumerare omnes venas, quę aptę sunt, vt secantur: proponit saluatellam, quia ipsa quoque adferre potest magnam beneficium hepatis, & lienis, dum virtus non fert euacuationem

per vasa cubiti, quę cum sint maiora, maiorem requirunt virtutem permittentē, vel dum venę cubiti non apparent; Neque Galenus loco citato saluatellam vocat splenicam, neq; dicit, magis iuare splenem, quam venę cubiti, a quibus immediatē saluatella dependet.

Quo ad Hippoc. quod dicit 1. de morb. 25. saluatellam esse splenicam: Respondemus libros illos de morbis esse ex omnium ferē opinione genuinos, & spurios.

Quo ad Soranum Ephesium attinet, dicimus nobis non reluctari; quia solum refert, quod suis temporibus in lienosis saluatellam secant: priscis enim & modernis temporibus fuerunt empirici, qui corporis anatomem nunquam viderunt, quique in communem de saluatella abusum inciderunt, qui ad hęc vsque tempora, quasi per traditionem in animos nostratum hoc erratum transtulerunt, meritō igitur Soranus reprehendit illorum opinionem, qui crediderunt, quod lienosis magis saluatella, quam vena cubiti prodesset.

Similiter Auicē. ex aliorum sententia est locutus, quia dixit, quod aliqui sectionem saluatellę anteposuerunt Basilicę.

Idem Oribasius loco citato aperte dicit, quod nonnulli in affectibus lienis eligunt saluatellā; eius verba adeo sunt clara, vt non indigeant explicatione.

Quod vero Paulus non fuerit illius sententię, quod saluatella sit spleneticā, illud legamus libro 3. cap. 49. vbi dicit laborante liene anteposendam esse cubiti venam, eique summę manus: si Paulus credidisset saluatellam esse splenicam ei in affectibus lienis non anteposuisset sectionem venę cubiti: Alexander quoque loco citato habet, hęc verba non apparentibus venis brachij, saluatellam esse substituendam; idem quoque dicit Actuarius; vt mirandum sit, quomodo, qui sequuntur Empiricorum abusum audeant asserre auctoritates falsas: Tandem Serapio, vbi dicit, ex sinistra manu in febre, melancholica sanguinem esse extrahendum per manum dicimus, illum intelligere brachium, nisi addat summam.

Nulla igitur auctoritate Græcorum, vel Arabum Empirici poterunt defendere, quod saluatella sit spleneticā, habeat

que cum morborum splenis prærogatiuam, quam venæ cubiti non haheat maiorem: Veteres enim nominati auctores, qui omnium bonarum artium fuerunt auctores in tam manifestum errorem non poterant incidere.

Cæterum auctoritate, & experientia anatomie confirmemus, quod saluatella non sit splenetica: Legamus Aretheum antiquiorem Galeno lib. 2. de curat. acut. morb. vbi habet hanc verborum seriem, nonnulli medicorum dixerunt venam, quæ est inter minimum, & anularem digitum ad lienē vsque pertingere; verum, & hæc ipsa est propago venarum cubiti, sed cur isti potius eam, quæ propè digitos est, quam quæ in cubito, cum venæ cubiti amplior sit, & ad fluxum habilior eligunt? mirabatur Aretheus crassissimam medicorum suorum temporum ignorantiam, qui nesciebant, vnde saluatella traheret suum principium.

Eadē ratione quoque nos mirari possumus nostratum Empiricorum insecutiā, qui de re medica, de Hippocr. & Gal. & de re anatomica semper loquuntur, quāuis nunquam Hippocratem, & Galenum legerint, vel anatomiam viderint.

Insuper confirmatur Galeni auctoritate 3. de loc. aff. cap. 7. vbi dicit, dum sanguis melancholicus abundat, venam cubiti esse secandam, nec verbum quidem de saluatella protulit: sed clariis adhuc Galenus libro de cur. ratione per s. m. ostendit, quod saluatella cum lienosis nullam habeat prærogatiuam, habet enim hæc uerba: inuenire tamē nequeat, quam obrem medici in lienosis sanguinem detrudere neglexerint, si quidem ingentem utilitatem prouenire conspexi, si libram dumtaxat detracta foret ex interna sinistra cubiti: Cui dubium, quod si saluatella lienosis magis conferret, quā uena cubiti, quod de saluatella eo loci, & non de uena cubiti asser locutus.

Amplius Galenus loco citato habet hæc: affecto liene haud æquē adiuuerit circa anularem digitum sinistra manus, incisa uena, ac si internam cubiti secueris: Qui putant saluatellam esse spleneticam dicunt, non reperiri in codice græco particulam (haud) uerum esto, quod non reperiatur quid tum? sequitur ne

propterea saluatellam magis conferre lienosis, quam cubiti uena, cum dicat æquē, hanc & illam iuuare lienosos?

Demum 2. libro de ratione vict. in ac. comm. 10. habet, affecto liene maximè est secunda uena interior cubiti, quæ si non appareat, secetur ea, quæ ex cubito obliquo venarum sit: & hæc est mediana, quæ similiter, si non appareat siccari debet humeralis; si tandem, si omnes sint occultæ, secetur, quæ in vlna existunt, inter quas est saluatella: ecce quod quælibet alia cubiti uena magis potest ex Galeni sententia in lienosis affectibus pelendis, quam saluatella.

Verum ut manifestissimo testimonio ostendam quænam sit uera & genuina Galeni sententia legamus lib. de cur. rat. per sangu. mis. cap. 14. sub finem capituli, vbi habet hæc fere uerba, nihil notatu dignū solet effluere ex ijs uenis in angulis oculorum, neque sub lingua, neque inquit si in pedibus aut summis manibus secantur: quare perspicuū est ex Gal. sententia nullam maiorem utilitatem otiri ex sectione saluatellæ, quam ex alijs.

Denique anatomie experientia exactè docebit, saluatellam nihil cum splene habere, nisi commune consensum, quē habere potest quælibet uena cum uniuerso corpore; de quo communi consensu Gal. lib. de uenæ sect. aduersus Erasistr. cap. 4. & Hippocr. lib. de alimento, dicunt omnium partium corporis esse vium confluxum, & unam conspirationem: omnes anatomici Prisci, & Moderni sciunt, splenem surculis uenæ portæ solum irrigari: omnesque similiter sciunt, uenas manus, & brachiorum non esse portarum: quare, qui dicit saluatellam esse spleneticam, quemadmodum elapsis mensibus à Rudi Oenobarbo audiuius in re clarissima, & apertissima ad libitum, & improposito uanissima protulisse: Hic reddens rationem, cur saluatella multum iuuat spleneticos, dicebat in anatome imposuisse specillum in canum uenæ saluatellæ, & sensim per communem cauitatem peruenisse ad lienem: ego aderam, sed admiratus eius audaciam, tacui; tum, quia ille erat ineptus, ad discendum, tum, quia illum docendo esse magnum inimicum lucratus.

Tandem

Tandem cum non semel viderim ex sectione saluatellæ splenicum recepiſſe beneficium notatu dignum, cogitavi id evenire ratione anastomosis arteriarum summæ manus cum venis saluatellis, & quia lien est reſertiſſimus arterijs, ideo per saluatellam ſectam depleri lienem, niſi igitur hæc ſit cauſa, cur ſectio ſaluatellæ iuuet ſplenicis, magis quam alia vena cum qua non ſit anastomosis, aliam adinuenire neſcirem.

Proponuntur octo ſophiſtica argumenta, quibus nonnulli probant, quod ſemper ad cutim debeant attrahi humores maligni veſicantium auxilio. Cap. VII.

Qui in omni maligna febre vtuntur veſicantibus, hoc fundamentum videntur eſſe iuſſulti, quod ſemper ſit proprium naturæ, vt turgentes humores ad cutim propellant: ſi igitur hoc fundamentum reiecerimus, inde ſtatim patebit, quod malè agant, qui in omni maligna febre vtuntur veſicantibus.

Ceterum antequam ex Galeni fundamentis veritatem declaremus argumenta illorum, qui ſemper in maligna febre trahūt turgentes materias ad cutim proponamus, eaque pro viribus diluamus.

Primum aduerſariorū argum. deſumptum eſt à Gal. 3. de naturalib. facultat. 13. vnde primo methodi 20. & lib. de cur. ratio. ne per ſim. hocque eſt: excrementa abvna in aliam partem, donec omnium imbecillimam inveniunt, tranſmeare: addūt, ſed hæc pars imbecillima eſt cutis, ergo.

Conſentiam argum. quia ex Gal. 2. de vſu par. e. 5. quando cutis non ſuſcipit excrementa corporis, partes interiores magis afficiuntur, & eò magis, quòd interiores partes reddite ſint imbecillores ab obſtructione, intēperie, uel inſlāmatione; Ex ijs inferūt ſemper humores malos eſſe trahēdos ad cutim, & per conſequeſcētia turgēte materia ſemper cōuenire.

Secundum argumentum ſumunt ex Tueyd. teſtim. dicentis, in truci illa peſtilentia fuiſſe ſervatos illos, in quorū manus, vel pedes procumberent maligni humores, qui exedebant, & ulcerabant illas partes: ex hac Hiſtoria colligunt naturam ſēper habere promptitudinem expellendi malos humores in extremas partes; colligi-

guntque, partes extremas non ſine maximo beneficio ueſicatis poſſe exulcerari, & naturam ſemper exercere hoc munus expellendi malignos humores ad cutim.

Tertium colligunt ex Gal. 1. de cib. boni, & mali ſucci, ubi habet: quibus nihil horum accidit, interierunt omnes, aut eū manifeſto viſceris vnius phlegmone, aut ob uehementem, & malignam ſebtiū: qui vob ſeruati ſunt, id fuit factum, uel ob eruptiones in cutim ſiue per ſudorē, ſiue per eryſipelata, vlcera, phlegmones, herpetes, impetigines, pſoras, & lepras. Ex hac auctoritate, & experientia inferunt, malignos & turgidos affectus optimè curari poſſe tranſponendo humores peccantes ad cutim veſicantium auxilio.

Quantum argumentum à Galeno deſumunt 5. methodi cap. 12. ibi hæc verba leguntur, atque cum ita iam vacuati eſſent, qui euaturi erant, his puſtulæ, quas exanthemata vocant, nigra toto corpore, multæ conſertim apparuerunt, vlcero. ſæ quidem plurimis, omnibus certè ſic: Inde colligunt, quod ſit conuenientiſſimum, vt in omni febre maligna ad cutim propellantur turgentes humores.

Quintū deſumunt ex caſu Hiorophōtis 3. in 1. epid. ab Hippocr. propoſito; Huic ægroto morbo exiſtēte crudo accidit abſceſſus in eruribus, & inde maligniſſimo affectu liberatur, inferunt ergo optimum foret, ſi in omni maligna febre, crudo quoque exiſtente morbo ad erura, virtute veſicantium traherentur humores.

Conſirmant quoque, quod morbo exiſtente crudo id fieri poſſit exemplo Sileni, & Critonis, & de Sileno Gal. in com. dicit, non periſſe Silenū nono die, vt erat rationi conſonum: ſed vnde primo; quia papulæ ad cutim octauo diē tranſmiſſæ ſunt, ergo & nos, vt naturā imitemur, morbo quoque exiſtente crudo, humores ad cutim veſicantibus tranſponemus.

De Critone, cui ſecundo diē erāt confluxi humores ad pedem, dicit Galenus, cum pes totum humorem peccatē non caperet retroceſſit; & quia malignus erat excitauit furioſum delirium, & periit; ex hac Hiſtoria colligunt, veſicantia conuenire in febribus malignis, quia humores dum eſſent attracti & confluxi ad pedes non retrocederēt, ſi continuò veſi-

cantium beneficio expellerentur, & noui humores illuc attraherentur.

Sextum argumentum est à simili, dicunt enim, si in qualibet febre crudo existente morbo vtamur in principio cucurbitulis, frictionibus, & balneis: & in peste, carbunculis, & bubonibus apparentibus, vtamur ferro, igne, & vesicantibus: cur in febre maligna materia existente cruda, & furiosa non conueniret vsus vesicantium ad cutim, & postremas partes humores trahentium? addunt, si in morbo canis rabidi statim vrinus, scarificamus, vesicantia adiungimus, vt virus non petat altiores, & nobiliores partes: similiter erit procedendum vesicantibus, dum humores maligni repetunt ad cor.

Septimum argumentum ex Hippocrate colligitur; 6. enim aphorismorum habet, erysipelas ab interioribus ad exteriora bonum: Galenus in commento dicit, omne quod ex profundis, & nobilioribus partibus ad cutim transfertur: bonum contra vero, si ad interiora, malum & Hipp. paulò post dicit, ab angina habita, si tumor fiat in collo, bonum Gal. in com. dicit, quod causa huius est; quia ex partibus infirioribus, & principalioribus transferre passionibus ad cutim confert; similiter 3. aph. 20. & 4. de acutis 30. habet, quia transpositio ad exteriora, ad cutim, ad pedes, ad manus semper confert ad salutem, ideo in angina, si appareat tumor in collo est bonum, trahitur enim materia à cento ad circumferentiam.

Octauum argumentum desumunt ex 8. de comp. med. sec. loc. c. 4. vbi Galen. in stomachi distensione, & inflatione dicit esse applicandam spongiam aceto acerrimo imbutam pedibus, & brachijs gratia reuulsionis: eadem ratione dicunt, in omni maligna febre conuenire vesicantia; quæ exulcerando attrahant humores malignos petentes cor ad partes extremas: adduntque, quod nihil fortius attrahere possit vesicantibus, quia id efficiunt ratione caloris dolores, vi vacui (& vt aiunt nonnulli) similitudine totius substantiæ, putant enim quod deleteria vesicantium natura deleterios, & malignos humores attrahat, vt magnes ferrum; His, & similibus argumentis sussulti plurimi dicunt, turgidam materiam semper esse

transponendam ad cutim, idque promptè fieri posse vesicantium auxilio.

Offenditur, quod argumenta superius allata pro vesicantium defensione sine paralogismi. Cap. VIII.

NEgare nunquam potui, quod humores prauis, & maligni aliquando non debeant transponi ad cutim, & ad extremas partes vsu potentissimorum reuellentium, inter quæ tenent vesicantia primum locum: verum qui ex propositis argumentis colligunt, quod non aliquando tantum, sed semper prauis humores malignarum febrium debeant his potentissimis reuulsorijs ad cutim transponi, manifestissimum errorem incidunt; ideo eorum argumenta superius relata rejiciam, & potiora (nisi me fallat opinio) fundamenta hic, & in sequentibus capitibus pro vesicantium defensione proponam.

Primum fundamentum est, quod natura modò moueat per alium, & modò per urinam, modò per tussim, & modò per cutim, Gal. 1. aph. 21. habet euacuantibus conferentia loca sunt intestina, venter, vesica, uterus, cutis, nares, &c. subdit Gal. ex ore Hipp. dicens: medicum naturæ inclinationem obseruare, & si idonea fuerit inclinatio, ei adminiculari, si verò noxiam illam reuellendo prohibere: est quoque Hipp. sententia 2. in 6. de morbo. vulg. 28. quæ ijs verbis exprimitur: reuellendum est, si non repât, quo expediat; si verò quò expediat, eis aperiri davia est, prout singuli repât: quibus positus: si natura nullam inclinationem habuerit ad cutim, vt quid auxilio vesicantium vti volumus? quasi quod natura esset alijs vijs destituta, & nunquàm esset inclinata ad mouendum in partem contrariam cuti: quasi, quod nunquam crisis fiat per alium, & per eruptionem sanguinis è natibus, quæ è diametro opponuntur crisi, quæ sit per eruptionem cutis, pedum, & brachiorum.

Secundum fundamentum est, quod materia turgens, & maligna moueatur modò per cutim, modò per alium, modò per urinam, & modò per fluxionem sanguineam, & per alias partes: patet ex Hippocrate, quia in aphorismis dicit, si materia turgat dandum medicamen-

tum

tum in principio, & id fiat cum præmeditatione, idest dandum est medicamentum, quando materia habet raptum ad ventrem, in quo casu nullo modo sunt ad cutim transponendi humores, & ratio est, quia eodem tempore in uiuentibus non licet uti moribus oppositis.

Quod uerò crisis non fiat semper per cutim, non desunt exempla Hipp. Meton enim sanguinis eruptione è naribus quinta die liberatur: Mulier morosa largè cic. Crisis mēstruis per uterum malignissimam febrem euincit; Virgo in Larissa superat acutam febrem sexta die, quia copiosus è naribus effluxit sanguis: stupidi itaque & hebetis ingenij est arbitrari, quod ad cutim semper maligni humores debeant uesciantium auxilio transponi.

Tertium fundamentum: si natura uerget per nares, & medicus per aluum, uel per aliam regionem nellet euacuare, naturam rectè operatē impediret, eius uires frangeret: & ualdè opprimeret, notissimus enim est Hippocratis aphorismus superius quoque citatus, & quod natura uergit ed ducere oportet, &c.

His iactis fundamentis omnia argum. facile solui possunt, quia omnia concludunt, quod semper sint transponendi humores maligni ad cutim, & ad partes postremas, quod propositum fundamentis ab Hippoc. & Gal. desumptis reluctatur.

Primum argumentum erat tale; omnes humores sunt transponēdi ad locum debiliorem, at cutis est locus debilior, ergo ad cutim sunt transponendi: argumentum est in secunda figura ex duabus affirmatiuis, & ad primam figuram reduci nō potest; maior propositio est falsa, quia humores sunt transponendi, quo natura uergit: dummodo locus sit conueniens, nihil refert, quāuis non esset cæteris omnibus debilior: minor uerò non potest conuerti, quia non solum cutis est locus debilior, verum alie quoque partes aliquando esse possunt loci debiliores: si n. natura est inclinata euacuationi per aluum, tunc aluus erit locus debilior, si per nares, uel tussim; nares, & trachea erunt partes, quæ minus resistent, & quæ vocari poterunt cæteris omnibus debiliores.

Quod attinet ad secundum tertium quartum, & quintum argumentum dici-

mus, quod omnia vnica responsione dilui possunt: quia omnia colliguntur ab exemplis: ostensum est in fine superioris libri, quod exempla, experimēta, & inductiones nullo modo concludant; hæc n. instrumenta primò procedunt ex meris particularibus, à quibus nil sequitur, secundò ex exemplis, & experimēta cadunt in tertiam figuram cum conclusione vniuersali, quod est monstruosum, & ab Aristotele 2. priorum cap. de inductione reiectum.

Nam, quamuis in illa pestilentia à Thucydide relata omnes, quibus nō acciderit aliqua in cutim humorū eruptio, perierint, non propterea sequitur, quod natura in omni pestilentia, & in omni maligna febre eodem modo disposita sit ad transponendos humores per cutim, aliquando enim peste affecti liberantur per narium hæmorrhagiam, aliquando per alui fluore, uel per alias regiones sine ulla inclinatione, & eruptione in cutim.

Similiter dū dicunt, quod illi solum seruati sunt, qui eruptiones in cutim habuerunt, & quod Horophōs, Silenus, & Chrito fuerunt ob transmissionem humorum in cutim subleuati; nihil concludunt; quinimò miror, cum ab exemplis uelint hoc vniuersale colligere, quod in omnibus maligna febre correptis sint transponēdi humores ad cutim, non proponant mille alios nostri tēporis ægrotates, qui quotidie per transmissionē humorū ad cutim liberantur; sepiissimè enim uidentur malignas febres curari per sudore, erysipelas, abscessus, vlcera, & per alias eruptiones in cutim: ergo quoque eis proponere mille alios ægros maligna febre correptos, qui curati sunt per fluxum sanguineum è naribus, per alui fluorem, & per urinam: uanissima itaque erunt argumenta proposita: reluctanturque rationi, experientie, & auctoritati Hipp. & Gal.

Ad sextum argumentum, quod erat ficti vniuersi, crudo existēte morbo, cucurbitulis, & in bubonibus pestiferis ferro, igne, & vesicantijs, cur non licebit in febribus malignis, uti iisdem remedijs, quæ ad cutim transponunt humores?

Respondentis nullam esse similitudinem inter bubones, quippe qui iam cuti adherent, in quos virosi humores confluunt, & humores malignos latentes in

venis, qui nullam inclinationem, & propensionem ad cutim ostendunt: ostendimus libro de indicatione, quod non partes corporis sint illæ, quæ indicant; sed natura propria ægritudinis, quæ dicitur de morbo, & de eius causa: morbum cutis, vel aliarum partium affectuum de lætis partibus per se non prædicantur, quia morbi & causæ sunt accidentia locorum affectuum.

Præterea, propositum argumentum est analogissimum empiricum, quia procedit ex symptomatibus ægrotantis, & non ægritudinis, quia colligunt esse vitendum vesicantibus non à natura malignæ febris, vel ab humorum inclinatione, & propensione, sed à symptomatibus Horophotis Sileni, vel Chritonis, quæ non pertinent ad methodum curandorum morborum, accidentia enim sunt extra methodum.

Amplius experientiæ non respondet, quia modo humores maligni habent raptum per alium, modo perveniunt, vel per alias partes.

Denique argumentum propositum videtur esse à simili, & dicitur enchimema ex signo solubili, quod rejicitur ab Aristotele in libris priorum; etenim humorum transpositio ad cutim est signum solubile, & accidens si præstabile malignarum febrium, ostensum est superius per varias regiones moveri posse malignos humores.

Addunt quoque nonnulli, quod sicuti in morsu canis rabidi virius, & vesicas excitamus, ne virtus cor obrepat, eadem ratione in malignis febribus utemur vesicantibus.

Respondemus, quod in morsu canis rabidi locus affectus est pars externa, in malignis febribus est cor, vel partes proximæ cordi, quæ possint propellere virosos humores per hæmorrhagiam naturalem, vel per alias regiones, tuncque Medicus trahens ad cutim impedit naturam rectè operantem.

Ad septimum quod dum transferuntur à profundis partibus ad cutim humores mali, sit bonum: respondemus, quod bonum quoque est; ut transferantur ad intestina, & ad vasa urinæ, quare argumentum non concludit, quod propterea vesicantia semper bona sint, sicut tantum, ut aliquando bona esse possint.

Ad octavum, dum dicitur, sicuti in sto-

machi distensione à Galeno, & Archigene laudatur, ut spongia aceto acerrimo imbuta partibus ex tremis applicetur, causa revellendi huiusmodi mores; eadem ratione dicitur valere in maligna febre vesicantia: argumentum non sequitur, aperte enim dicit Aristoteles 2. priorum cap. de exemplo, quod primum de medio nunquam concluditur per simile tertio, ratio est, quia similitudines sunt passionum generum, & non specierum; indicationes (ut ostendimus) solum desumuntur ab ideis specificis, & non à genericis, vel singularibus.

Præterea alijs quoque modis posset hoc argumentum infringi: sed quia credimus in malignis febribus vesicantia, aliquando habere locum, hoc argumentum cum alijs propositis inter probabilia collocabimus.

Reijciuntur argumenta illorum, qui nunquam admittunt vesicantia in malignis febribus. Cap. IX.

Sunt alij, qui tenent in maligna febre, nunquam esse humores transponendos ad cutim vesicantium auxilio: quorum opinio est omnino falsa; quia licet hoc vehemens auxilium febri, ut febribus, incommodum sit, attamen illius maleficio aliquando summum beneficium in transponendis humoribus ad cutim compensatur.

Primum argumentum, quod nullo modo in febribus liceat uti vesicantibus, adversarij desumunt ab auctoritate Hippocratis, Galeni, & cæterorum Græcorum, qui nunquam usi sint vesicantibus.

Argumentum est probabile, & per consequens nullius vigoris: quod sit probabile patet ex Arist. 1. top. ibi enim dicit, quod omnia argumenta ab auctoritate desumpta sunt probabilia; quod topica, & probabilia argumenta sint nullius vigoris patet, quia omnia sunt cum principij petitione, supponunt enim, quod est probandum, si nihil supponeret, non essent argumenta probabilia, sed demonstrationes.

Præterea, qui colligunt esse spernendum vesicantiū usum ex eo quod Gal. vel Hipp. de illis non sint locuti, adeo vanū faciunt argumentū, ut neque verè topicū, & probabile dici mereatur; locus enim topicus

esset, si proponerent auctoritatē Gal. quæ clarè exprimeret vesicantia non esse admittenda in febribus malignis, quod non inuenient; apud Gal. enim, & Hippoc. neque reijciuntur, neque nominantur vesicantia, quare argumentum neque inter topica collocari meretur.

Secundum argumentū; illud medicamentum ex Hipp. & Gal. in febribus solum est permittendum, quod quietē parit, sed vesicantia quietem nō pariunt, sed tenent in motu totum corpus, ergo non sunt in febribus admittenda; maiorē probant, quia concoctiones quiete sunt.

Primò respondemus concedēdo, quod vesicantia noceant, attamen dicimus, ad eo iuuare, & prodesse posse, ut illius maleficio ægrotantes longē maiori beneficio compensentur.

Secundò dicimus, quod argumentum propositū est vitiosum, quia est in prima figura cum minori negatiua, quod ab Arist. est reiectum; quia non concludit, est enim à destructione antecedentis ad destructionem consequenti, tali pacto si est aqua est elementū, sed non est aqua, ergo non est elementum, quod non sequitur.

Similiter dicūt si medicamentum quietem pariat, est admittendum, sed vesicantia non pariunt quietem, ergo non sunt admittenda; reducitur ad primam figuram cū minori negatiua hoc modo, omne medicamentum quietem pariens est admittendum, vesicantia non pariunt quietem, ergo non sunt admittenda: quod nullam habet virtutem illatiam.

Tertium argumentum colligunt ex Hippocrate, qui habet, si in principio febrium acutarum materia turget, pharmacum est propinandum; inferunt, ergo non vesicantia.

Respond. non semper in malignis febribus conuenire vesicantia, sed solum quando humores possunt trasponi ad cutim; etenim, si habeant raptum ad intestina, pharmacū standū est; quando Hipp. dicit, si materia turget, dandum est pharmacum, idque fiat cum præmeditatione, intellexit tūc esse consulendū, an humores turgentē habent aliquā inclinationem ad alium, quia, si nulla esset humorum propensio in illam partem; nō pharmacū, sed alijs auxilijs transponentibus

humores, eo quò vergerent vteremur.

Præterea accidit materiæ turgen- ti, vt possit per aluū euacuari; qui igitur ex hoc accidet, vult concludere, quod in acutis, dū materia turget, solum pharmacū administrari possit, & nō alia auxilia, inoidet in Elenchorum accidetis, qui apud Aristotē tenet primum locum Elenchorum in re.

Præterea Arist. 2. post. 25. explodit duplex problema à demonstratione: æquiuocum, & accidentale, quis nō videt, habere raptum per alium prædicari per accidet de turgente materia? quis non videt, admodum rarò accidere, quod in acutis, dū turget materia, dari debeat pharmacum?

Quartum argumentum, si papulæ efflorescunt, vesicantia impediūt hanc humorum, vel vaporum transmissionem ad cutim, quæ, vt in casu Sileni nos docuit Hippocrates, utilis est: Silenus enim non vndecimo die, sed nono perijisset, nisi octauo apparuissent papulæ, quod verò vesicantia impediunt, patet, quia non ad cutim, sed ad postremas partes attrahunt humores; argumentum est nullum, quia nos non tenemus vesicantia in omni febre maligna esse administranda.

Præterea argum. est vitiosum; quia est à partibus ad totum, quod est ualde explosum in 2. prior. non ualet in acutis febribus cum papulis vesicantia non conueniunt: non conueniunt in malignis febribus cum narium hæmorrhagia, uel cum alui fluore, ergo nunquam conuenient; argumentum est omnino uanum.

Quintum argumentum: excretiones, dum crudi sunt humores, dicunt non iuuare: quod argumentum nullum sit, patet: quia possem propterea dicere, non esse in principio morbi phlebotomādum, leniendum, vel pharmacū exhibendum, quod reluctatur Hippocrati dicenti in principio, si aliquid uidetur mouendum moue, & si materia turgeat aliquando pharmacum in principio, crudis existentibus humoribus, sicut exhibendum.

Sextum argumentum, dicunt, quod vesicantia calefaciāt, & propterea febribus nullo modo cōuenire. Respōdemus primò, quod omnia medicamēta quoque calefaciunt; disputationis cardinē nō perceperunt, quia omnes concedūt, quod uesicantia, & omnia medicamenta corpora

viuētia lēdant : agitur hic an maius affe-
rant beneficium, quā maleficiū, pareat,
quod vesicantia non calefaciant; quia si
ex Galēno quinto methodi decimoter-
tio catarrhus falsus suffert Thapsiam, &
capit non calefit; tantō minus cor, & cæ-
tera viscera à vesicantibus, quæ extremis
partibus, quæ valdē à corde remotæ sunt,
patientur calorem; Hinc Gal. 2. de diffe-
rentijs feb. vltimo dicit, partes, quibus ad-
hibentur sinapismi, & vesicantia calefie-
ri, & non remotas.

Demū, dato, quod vesiciā calefaciāt,
& ægros perturbent, nō sequetur, si ma-
ius ab illis oriretur beneficium, quā ma-
leficiū, quod non essent administranda, ex
Gal. 14. met. 13. colligitur quod vt curetur
morbis periculosus, possumus facere aliū
min us periculosum; Hinc morbos incu-
rabiles aliquando facinus, vt à mortis pe-
riculo liberētur egri; sicuri, dum abscindi-
mus arteriā, vt curetur aneurisma, carnē-
que abscindimus vt tollatur grangæna.

*Offenditur, quod maligni, & turgentes hu-
mores possint aliquando vesicantium
auxilio transponi ad cutim. Cap. X.*

TAm furiosam malignitatem aliquā-
do humores excipiunt, vt nisi exter-
nis partibus vehementissima reuulsoria,
qualia sunt vesicantia, adiungantur, vi-
scera illis impleātur, & inde pereant; ne
sigitur hoc accidat, prudēs medicus, spre-
ta febre, humorum cruditate & ægrotā-
tis quiete cogitur ad extremum hoc au-
xilium confugere: Quod verò in arte me-
dica habeat locum, & à Galēni princi-
pijs, & fundamentis non abhorreat, po-
test plurimis auctoritatibus confirmari.

Primus locus est 1. de hum. com. 13. vbi
habet hæc, si redundancia ad caput, aut
ventrem feratur, medicamēta mordacia
manibus, pedibusque admota reuellere
contrariam in partem solent; valet ergo
in Galēno hæc consequentia, redundan-
cia fertur ad caput, ergo manibus, & pe-
dibus sunt apponenda mordacia; an verò
mordacia sint ex cantharidibus, euphor-
bio, flammulationis, vel ex alijs: nihil refert:
quoniam materiæ remediōrū ad metho-
dū non pertinent: satis est, quod hoc au-
xilium reuellens materiam petentem ca-
put fieri possit ex acri medicamento.

Neque obstat, dū dicunt febrem impe-
dire, quoniam in omni casu sunt indican-
tia, & prohibentia librandā, & trutināda;
quia semper ei, quod magis urget, est at-
tendendum: etenim (vt dicemus in libro
de iudicantium æquilibrio) dum fit com-
paratio inter vrgetia, & causas principa-
les, causæ principales non sunt tanti, vt
impediant vrgetia, quin ad se creatio-
nem trahant: similiter, dum fit compara-
tio inter causam, & morbum, prius atten-
dimus causæ, quam morbo; quinimō læ-
penumerò omnino spernimus morbum;
in pituitosa enim febre vtimur exsiccanti-
bus, quæ reluctantur febri: si denique
fit cōparatio inter impedimenta, & mor-
bum, morbum quoque despiciamus, veluti,
si in capitis vulnere squammæ ossis de-
tineantur; tunc tantum abest, vt vulnus
trahat ad se curationem, vt potius dilate-
tur, & maius fiat, vt commodè ossium
squammæ egrediantur.

Empirici nostrates, quia de hoc indi-
cantium æquilibrio nihil omnino sciunt,
incidunt quotidie in seccata errata; quia
tota re vera medicandi peritia in hac in-
dicantium comparisonem consistit.

Quibus positis, ad obiectonē respon-
detur, quod licet vesicantia noceant fe-
bri, possunt tamen malignis humoribus,
qui urgentium vicem subeunt tantum
prodesse, ut maleficiū longē maiori be-
neficio compenseetur.

Hinc, licet maxime hominib. noceat,
vt arteria abscindatur, attamen in anen-
rismate vt maius malum euitetur, abscin-
ditur; tunc magis potest urgens, quam
corporis arteria, quæ maxima cum diffi-
cultate agglutinatur. refert Gal. 5. meth.
septimo & 14. methodi: historiam iuuenis
cui secta cubiti arteria coaluit.

Similiter digitum morsum à uipera,
uel à cane rabido uitæ gratia abscindi-
mus: Galenus 3. de loc. aff. 7. circa casum
rustici, cuius digitum uipera mormorde-
rat, qui falce istam partem, ab ultimo ar-
ticulo refecaret: Hinc in gægreña igne,
& ferro corporis particulas auferimus;
quia ei quod magis urget, est uacandum:
Hinc, ut hominis uita saluetur, terebra-
mus craneum, & uulnus ferē exitiosum
facinus. Hinc erisicum uulnus inter
anum, & testes fit, ut extrahatur lapis.

Patimodo Plinius 7. natu. historiarum cap.9. refert de partu cæsareo Scipionem Africanum priorem, Iulium Cæsarem, & Manlium, cæso ventre matris natos esse. Paulus Aegin. ait mortem non sequi ex necessitate ablata, & dissecta matrice, vulnus non necessariò est lethale: ideo satius est periclitari, an infans saluari possit, quam spe adæpta relinquere negotiũ.

Quò fit, vt Cornelius Celsus li.3. in fine noni capituli iurè hæc dicant. Circumspecti hominis est, & nouare interdum, & augere morbum, & febres attendere, quia curationem, vbi id quod est, non recipit, potest recipere id quod futurum est: quapropter quamuis vesicantia febres accendant, vigilias inducant, continuò ægrum vexent, & aliquando intollerabiles incendi difficultates pariant, nõ propterea semper, & in omni casu sunt despicienda: an ne, si solummodo illorum auxilio posset diuerti humorum turgētium furor, & impetus in cor, & cerebrum, illis vteremur? & omnia mala faceremus, dummodo ægrotus mortem non obiret.

Semper miratus sum, quod dētur Medicis, iique dogmaticis, qui respuunt ea de causa vesicantia, quia calefaciunt, & quia augent febrem, quod, quamuis sic esset, ostendunt prima artis medicæ initia non callere, quia tota ratio medicandi in æquilibrio indicantium, & indicatorum consistit: nullum enim medicũ auxilium inueniatur, quod non laceret, quod noxam animo, & corpori non inferat.

Hinc Gal. lide opt. sect. cir. fin. dicit, nullũ remediũ potest impune administrari.

Oxymel quod est leuissimũ remedium Gal. 1. 1. meth. cap. 12. dicit tradere intestina, tussim excitare, & ledere partes neruosas, subdit nullum inueniri remedium quod citra noxã magnificè proficit. Phlebotomia frangit vires: Cassia ventrẽ perturbat, & cætera omnia auxilia aliquos languores ægrotantibus afferunt: illa tamen auxilia eligimus, à quibus maius beneficium, quam maleficium resultat.

Cornelius Celsus vir sanè insignis indicantium æquilibrium considerans per optimè dixit, circumspecti hominis esse gratia præcauendi futuram tempestatem, interdum augere morbum, & accendere febrem; quia ei, quod magis

verget, est attendendum.

Secundus locus est 5. simp. 18. vnde colligere possumus, vesicantia doctrinẽ Galeni maximè cohærere, ibi habet hæc verba, omne deleterium venenũ à foris impositis medicamentis euacuatur, nempe aut caliditate attracti onem molientibus, aut totius substantiæ similitudine, quare, si ratione caloris venenum à profundis corporis partibus foris attrahi possit, quãtò magis materia hæc putrida, & vrgens attrahetur à vesicantibus, quæ non solum virtute caloris, sed doloris, & vacui attractionem molitur.

Tertius locus est 6. epid. sect. 3. text. 47. vbi docet modos, quibus mouentur humores ab vno in alium locum. dicit, loca aliorum locorum morbos excipiunt, pro vt succi commutari sedes aut ob dolore partis, aut ob grauitatem humorum, aut aliam causam, aut ob acre medicamentum irritans, aut frictionem, aut ob calorem extrinsecum: hinc ex Galeno succus obrepēs caput, vel cor potest virtute acris medicamenti à propria sede dimoueri, erit quoque possibile, vt putridus, & malignus humor a corde, à cerebro, & à cæteris visceribus vesicantium auxilio dimouatur, & inde transponatur ad extremas partes.

Stupidi, vel in experti homines mihi videntur, qui hanc possibilitatem negant; etenim non solum vesicantia opportunè administrata possunt malignos humores ad infernas partes transponere, & inde præseruare cor, & cætera viscera; ne pereant; verum accidere potest iterum talis casus (sicuti vidimus) vt æger maligna febre oppressus sanetur, quia ab hostili ense vulneretur; si igitur intus vulnus ab ense hostili posuit diuertere humores petentes cor, & egrum ad salutis portũ trāsferre, quanto magis possibile est, vt vesicantia rectè administrata aliquando id efficere possint: similiter stupidi, & imprudentissimi mihi videntur illi, qui in omni febre maligna vtuntur vesicantibus; hancque opinionem reiecimus superius.

Insuper cognoscemus vesicantia summum beneficium aliquando afferre posse, si expenderimus causas salutis, & mortis nonnullorum ægrotantium Hippocratis, loquens igitur de Larissa Caluo, qui febre maligna erat detentus, dicit, n̄ temo-

re dolorem perſenſiſſe, quod erat bonum ſignum, at dum femur dolere deſit, dicit Hipp. id eueniſſe, quia tunc aſcendunt in caput humores qui eũ deinde occiderunt poſita hac Hiſtoria, cui dubium, ſi humores in femore exiſtentes non petiſſent, caput, vel cor, quod Lariffa eualiſſet? dum etant in femore non petiſſent caput, ſi potentiſſimo auxilio remuſorio, quale eſt veſicans, fuiſſent ad femur perpetuò attracti, & per inſiſta vlcera euacuati.

In Virgine, quæ in veſtibus templi habitabat, ad ipſum obſeruabatur; quia adueniente dolore pedum, ſtatim ceſſauit delirium, ex Hipp. igitur ſent, quia humores ad pedes confluunt, ſedari poteſt delirium; ſi igitur ſit, vel immincat delirium, poſſibile eſt, vt ſedetur, & præſeruetur veſicantium vſu; poteſt enim contingere, vt aliquando natura aliquam habeat inclinationem ad mouendos humores ad poſtèriores partes, attamen non ſit tantæ virtutis, vt ex ſe ſola, vel friccionum, balneorum, & cucurbitularum auxilio poſſit diuertere humores à corde; ſed ſolum id efficiat adiuta à vehementiſſimo auxilio reuulſorio, quale eſt veſicans, quod à profundis partibus vnicè humores attrahere poteſt.

Si nilit eſt æger in Dealcis Horto, qui habuit ſtillas ſanguinis è naribus nigras, cum vtrius nigris; hic liberatur, dicit Hipp. quia humores ad pedes cõfluxerunt; quare, ſi veſicantia poterunt ad pedes trahere humores, poterunt quoque in maligna febre, dum adſunt vrgentia, in bonorum auxiliorum catalogo collocari.

Demum eſt Chrito, qui habuit malignā febrem cum puſtulis nigris, huic acciſit dolor totius pedis; cauſa, cur periit, dicit Hipp. eſt, quia pes totum humorem capere non poterat, vnde retroceſſit, periit caput, delirium fecit, & deinde vitam cum morte mutauit: dicant mihi quæſo, ſi pes totum humorem recepiſſet, numquid periſſet; minimè gentium; quia Hipp. nullam cauſā delirii, & mortis reddidit, niſi, quia pes non poterat totum humorem capere: ſi igitur veſicantium auxilio in ſimili caſu redderetur pes admodum debilis an ne humores pes caperet, & contineret; quinimò cum per inſiſtum vlcus euacuari poſſiat humores excrementitiū tollitur

omnino occaſio retroceſſus, & mortis.

Neque obiciant quod motus ſymptomatici non ſint adiuuandi, quia plura ſunt exempla apud Hipp. quod ab iis motibus ægri aliquando ſubleuentur.

Primum exemplum obſervatur in Hiſtoria Metonis, qui habuit in quarta ſtillas ſanguineas, in quinta iuſſu Hippocr. ei fuit lotum caput, ſanguis largè ſubito effluxit, & deinde eadem die crudo adhuc exiſtente morbo, fuit liberatus.

Secundo exemplum deſumitur à Muliere trimreſtri ſatu grauida, quæ morbo exiſtente crudo per ſudorem iudicatur.

Tertium exemplum colligitur ab Hiſtoria Pericii, qui in quarta per ſudorem & ſanguinis fluorem liberatur.

Quartum exemplum obſervatur in Sileno, qui vixit vſque ad vndecimum diem ob papulas exeunt; Hic periſſet ante duos dies, dicit Gal. niſi motus ſymptomaticus papularum ſecutus fuiſſet.

Quintum exemplum deſumitur ab Hiſtoria Simonis propoſita ab Hipp. 6. Epid. 2. tex. 30. qui latas puſtulas & papulas habebat, cui fomenta ſeu vñctiones attractantes ad cutim non conſerunt, vt dicit Galen. in com. niſi purgatio vel ſanguinis detractio præcedat contra illos, qui in periculis exiſtente aliqua plenitudine reſpuunt ſanguinis detractiõnem per cubitum.

Quare quod motus ſymptomatici aliquando iuuare poſſint, non eſt amplius dubitandum.

Interim ex citatis ægrotantibus veſicantium vſum ex principiis artis medicæ colligemus: non tamen admitteremus hanc conſequentiam; enarrati ægrotantes febre maligna correpti morbo exiſtente, crudo ob humorum tranſpoſitionem ad cutim ſubleuantur, ergo in omnibus magna febre detentis ſunt tranſponendi: oſenſum eſt ſuperius, hanc conſequentiam eſſe vaniſſimam: valet tamen hæc, tranſmiſſio crudorum humorum ad internas partes iuuat citatos ægrotatos maligna febre vexatos, ergo poſſibile eſt, vt eadem tranſmiſſio humorum ab arte excitata aliquos coꝛreptos malignis humoribus aliquando iuuet.

Confirmatur hæc conſequentia virtute ſupericini illius principii metaphyſici, ſcē.

scilicet de quolibet est affirmatio, vel negatio vera; nam ex duabus propositionibus contradictoriis quilibet proterius cogitur affirmare, quod altera sit vera, altera falsa: Hæc duæ sunt contradictoriæ, altera est: omnes maligna febre læsos iuuat abscessus, vlcera, vel dolores pedum facti sponte, vel ab arte excitati gratia transponendi humores à supernis ad infernas partes: altera propositio est, aliquos non iuuat, veluti, quando natura mouet per sanguinem è naribus, per aluum, vel per alias regiones; hæc postrema propositio, cum sit verissima, altera, quæ est eius contradictoria, est falsa, quæ est quod vesicantia omnes maligna febre vexatos iuuat.

Occurrit dubitatio, non videtur, quod ex principiis artis Medicæ colligi possit, quod vesicantibus in febribus malignis vti debeamus; quia Gal. de illis nihil dixit.

Respondemus primò, quod fortasse Galenus, si diutius superviuisset, non solum de hoc præsidio pro transponendis virosis humoribus malignarum febrium scripisset; verum multa alia suo ingenio propemodum diuino reperiisset, nobisque reliquisset: scimus enim in arte medica ab ipso tradita, quod attractio sit vi caloris, & doloris; scimus, quod vesicantia calorem, & dolorem excitant: scimus reuulsionem esse faciendam in contrarium & pedes, quibus affiguntur, secundum rectitudinem aduersari humoribus existentibus in venis proximis cordi: scimus nullum esse reuellens, quod vehementius reuellar vesicantibus: & tandem scimus impetum, & furorem turbulentum magis posse ad indicandum potentissimum reuellens, quale est phænigma, quàm quodlibet prohibens: quibus positis principiis, & fundamentis coacti aliquando ad vesicantia pro transponendis malignis humoribus ad extremas partes confugimus.

Tempus verò opportunitum, quando vesicantibus debeamus vti in maligna febre à variis signis desumitur, primum signum est, si viderimus, naturam habere aliquam propensionem mouendi humores ad partes extremas; & cætera attractoria, vt sunt frictions, balnea, & ligaturæ, non

sufficere in hoc obeundo munere, tunc vniur vesicantibus, vt longè à corde transponamus malignos humores.

Præterea reuellemus hos humores vesicantium auxilio, si quatuor conditiones reuulsionis aderunt, quarum prima est, vt partes, quibus applicantur, secundum rectitudinem aduersentur locis vbi resident maligni humores: Secunda, vt vesicantibus trahi possint humores versus suam originem: tertia, per distantissimas; quarta per vasa communia: verbi gratia si humores caput ob repant, & imminere periculū ne humorum impetus omnino opprimat capitis vires, vesicantia partibus infernis adiunguntur.

Tertium, si humores à natura incipiant propelli ad femora, vt in Larissa, vel ad pedem, vt in Chitone, in Virgine vestibuli Templi, & in ægro, qui habitabat in Dea leici Horto, tunc tuum maxima cum salutis spe pedibus adiungere poteris vesicantia.

Quartum, si dum turgeant humores partes extremæ vlcusculis, pustulis, & similibus vexari incipiant, instetque ob morbi vehementiam aliquid seuum symptomata, statim illis partibus vesicantia erunt adiungenda.

Quintum, si coxis grauitas, vel tensio superueniat, signum est, quod natura conatur ad illas partes propellere: ideo est vesicantibus, si urgeat affectus, utendum.

Sextum, si in febre maligna suspicio est de imminente læthargo illicet, ut futuram tempestatem præueniamus coxis, & brachijs phænigmata sunt adiungenda.

Postremum, si adeo trux, & scelestus est febris maligna, ut ferè de salute actum sit; tunc, si adhuc turgent humores, & non uergant per alias regiones, ad vesicantia confugimus, ut Thucyd. & Gal. præceptum obseruemus 10. met. 10. ubi dicit, satius est nonnulla cum fiducia, & periculo aliquid facere, quàm spe adempta certo perire; tantò profectò satius est potentibus præsidii pugnare, quàm nihil agere: Ex his cognoscemus, quando vesicantia debeant opportune administrari, inde eritabitur eorum usum superfluum, diminutum, & transcendentem.



SANCTORII SANCTORII

Olim

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

METHODI VITANDORVM ERRORVM OMNIVM

In Natura Reuulsionis, & deriuationis perquirenda.

LIBER DECIMVSOVARTVS.

Ostenditur, quam varia sint opiniones auctorum in iis, quæ pertinent ad reuulsionem. Cap. I.

Acturi in præsentia de reuulsione, statim in medium eius proprietates, & conditiones afferemus, quia illis rectè perceptis cognoscemus, quando, & quomodo sit reuellendum: Quatuor conditiones reuulsionis vagantur per scholas, exque colliguntur ex Galeno 12. methodi cap. 11. & alijs in locis.

Prima conditio reuulsionis est, vt fiat secundum rectitudinem.

Secunda, per distantissima.

Tertia, quam Curtius magnificat, trahantur humores versus originem.

Quarta per vasa communia.

Verum quid intelligendum sit per rectitudinem, quid per distantissima, & numquid illa conditio, quod trahantur

humores versus originem per se, & semper conueniat reuulsioni, & demum quid sit per vasa communia intelligendum, tam variæ sunt opiniones, ut uix duo Auctores celebres inueniantur, qui in tota hac contemplatione sint concordēs.

Perelebres Auctores, qui de hac re plenius egerunt, & qui inter se ualdè dissentiant sunt Curtius, Manardus, Fernellius, Fuchsius, Achacius Petrus Brisotus, Altimarus, Argenterius, Laurentius Ioubertus, & Horatius Augenius.

Curtius ubi agit de pleuritide, & Petrus Brisotus in libro apologetico de pleuritide cum Fernelio unanimes tenet quod per rectitudinem debeat intelligi ea, quæ sursum, & deorsum est; negant enim quod seruetur rectitudo à parte anteriori ad posteriorem & ab interna ad externam.

Fernellius uerò apertius alijs descendit, si quod

quod inter dextrum & sinistrū nō sit illa rectitudo, secundum quam fieri debet reuulsio reddensque rationem dicit, quia fibræ rectæ, quarum beneficio (vt omnes credunt) fiunt humorum attractiones, non sunt in latum, vel in profundum exporrectæ, sed in longum; hocq; est præcipuum fundamentum Fernelli, quo sufful-tus defendit veram reuulsionem fieri à superna ad infernā partem, & non à dextra ad sinistram, vel ab interna ad exter-nam. Ex altera parte est Altimarus, qui omnino negat, reuulsionem fieri secun-dum rectitudinem fibrarum; quia dum post venam pertusam sit sanguinis reuul-sio, non à fibris rectis expellitur; sed tan-tum virtute vacui egreditur.

Similiter Argent. primò reiecit Ferne-llum, & negat sanguinem euacuari post sectam venam a rectis fibris; deinde opi-nionem, quam sustinet Altimarus, quod scilicet virtute vacui sanguis egrediatur, reprehendit, & demum propriam opinio-nem affert, quæ est, quod sanguis a secta vena egrediatur, quia expultrix irritetur a dolore vulneris, & a vinculis.

Ad eundem modum omnes dissident, dum interpretantur, quid intelligat Gal-dum dicit per distantissima esse facien-dā reuulsionem; Curtius, Fuchsius, Acha-chias, & Manardus dicunt, dum præfer-uamus, reuulsionem esse faciendam per distantissima, dum curamus per propin-qua: Laurentius Ioubertus dicit per propinqua, & nunquam per distantissima esse faciendam reuulsionem: Brisotus verò dicit, in principio esse reuellendum per proxima, in fine per remota; vt hæc mate-ria sit difficultatis plena.

Porro, si tertiam conditionem reuulsio-nis expendamus, an scilicet versus origi-nem sit semper reuellendus humor, quot sunt capita, tot sunt opiniones: Curtius hanc conditionem defendit: plures tamē sunt, qui tenent, quod nullo modo sint reuellendi humores versus originem, & præcipuè, quando pars, à qua humores originem trahunt, est inflammatione ob-fessa, vel est debilis & infirma; nunquam enim conuenit, vt ad partes læsas trans-ponantur humores.

Postrema conditio, quid videlicet sit intelligendum per vasa communia, pati-

tur quoque plurimas instantias, aliqui e-nim dicunt, reuulsionem fieri solum per vasa sensibilia; alii per vias quoque insen-sibiles, dicunt, totum corpus esse transpi-rabile: nihil igitur de reuulsione hæcte-nus propositum est, quod non sit explo-sum, atque reiectum.

Similimodo de deriuatione altercantur an scilicet fiat in eodem latere, an solum per proxima, & an humorib. solum con-fluxus æquè, ac fluentibus, competat: Quæ vt methodo aliqua tradamus de naturā, & conditionibus reuulsionis præcipuè a-gemus; quia illis cognitis, faciliè omnia, quæ de deriuatione quærentur, aperta & prænitentia erunt.

Reycitur quedam definitio reuulsio-nis, & ostenditur, quod reuulsio non sit at-tractio. Cap. II.

ALia non est via, quæ melius affe-ctiones, & proprietates rerum ex-plicit, quàm definitio: Aristoteles 1. de anima tex. 11. dicit, quod animæ defini-tione præcognita ceteræ affectiones faciliè cognoscantur: 1. de moribus c. 7. in omni re esse aspiciendum à definitione, & aliis in locis Aristoteles, & Plato in Cra-tylo testatum reliquerunt, quod definitio sit principium cognitionis proprietatum, & affectionum, quas quærimus: Nos quo-que horum imitatione conabimur prius definitionem reuulsionis perquirere, vt inde faciliè innoſcant reuulsionis attribu-ta.

Valde conuenit, vt prius definitionem ab aliis traditam examinemus; quia si ex illa perceperimus eius naturam, & prop-rietates, aliam non quæremus: hæc per scholas hodierno die vagatur, & à pluri-mis recipitur: reuulsio est attractio humo-rum confluentium, vel conflutorum in partem omnino contrariam.

Quod hæc sit imperfectissima definitio reuulsionis primò patet, quia, cū sit acci-dentis definitio, deberet esse illa, quæ so-lo situ à demonstratione differt: at sic est, quod hæc non est talis, ergo est imperfe-cta, & recipi non debet: patet maior, quia omnes accidentium definitiones sine cau-sa externa sunt nominales, & cum prin-cipii petitione; petimus enim, dum eclip-

sim definimus, quod sit priuatio luminis in luna, petitionemque aufugimus dum addimus causam externam, quod scilicet lumine priuetur ob terre interpositione:

Hinc Auert. causam extrinsecam, quæ tradit propter quid insint accidentia subiectis, vocat differentiam ultimam respectu accidentium; patet quoque, quia dum dicunt, esse attractionem in oppositis partes afferunt genus: dum verò addunt confluentium, & conflutorum afferunt subiectum; caret igitur causa inherentiæ, quæ non expressa, nihil de reuulsione sciri potest; erit igitur hæc definitio non illa, quæ solo situ differt à demonstratione, nec quæ est principium demonstrationis, cum non exprimat causam, sed, quæ est conclusio, quippe est aliis ineptior ad docendum.

Præterea, dum dicunt, quod reuulsio sit attractio, errare videntur; quia attractio neque est genus proximum, neque remotum reuulsioni; patet, quia reuulsio modo fit attrahendo, modo expellendo: quod fiat expellendo nos docet Gal. de similitudine methodi c. 3. ubi habet causas fluxionum esse partem mittentem, & partem recipientem.

Humor enim non fluit à se & proprio impetu, alias omni fluxio ad inferiora fieret, sed vel à parte mittente propellitur, vel à recipiente trahitur: pellitur à mittente nimis, quia robusta, tum quia irritata, quare, si fiet reuulsio, quia pars mittens medicamento irriteretur, tunc quomodo reuulsio dici poterit attractio? Similiter, dum laxantibus reddimus partem debilem, tunc quis dicet, quod pars laxa, & semiuina attrahat, cum in illam, ut in cloacam expellantur excrementa? erit igitur hæc reuulsio ab expultrice, & non attrahente ficta.

Amplius reuulsio, quæ fit per contrariū, non debet dici attractio, quia cæteris non recipiunt excrementa, quia attrahant, sed recipiunt quæ sunt expulsa ab aliis partibus: Nemo defendere poterit, quod reuulsio, quæ fit ratione vacui sit attractio stupidi hominis esse credere, quod vacuum, quod reuera nihil est, habeat proprietates positivas.

Omniis causa attrahens debet esse causa efficiens actu positiva, & non priuatiua

dum igitur videmus, quod multa ratione vacui magno cum impetu mouentur, id accidit, quia in locum, ubi nulla est resistentia, omnia facillimè, & celerrimè expelluntur: Cauteria, sinus, caro fungosa, glandulæ, & partes imbecilles naturali virtute ferè destitutæ non attrahunt, vel expellunt, sed solum aliarum partium excrementa expulsa sine ulla resistentia recipiunt.

Hinc, dum volumus humores petentes caput reuellere possumus non solum attrahentibus medicinis id efficere: verum etiam iis, quæ laxant ventriculum, & intestina; sicuti est oleum amygdalinum dulce; quia he partes laxatæ, deinde recipiunt sine resistentia excrementa ab aliis partibus expulsa; quis hanc reuulsionem laxantibus, factam vocabit attractionem?

Præterea si ventriculi excrementa caput petant, an ne reuelli possunt medicamento aloes; quippe solum irritando expultricem facultatē ventris expellit? nemo negabit, quod hæc reuulsio non sit expulsio.

Similiter Galenus 4. de loc. aff. cap. 2. habet quendam iussuione affectum, nullo adhuc vitio in pupilla apparente per litteras curasse exhibitione hie: Hæc est reuulsio per expulsionem, quia humor externus in ventriculo petens oculos reuulitur à stomacho ad pylorum virtute expultricis hie.

Ex altera parte obseruantur tum reuulsiones, quæ solum à virtute attrahente excitantur, sicuti sunt, quæ per hirudines fiunt, tum quæ à virtute expellente, & attrahente, sicuti quæ sunt per cathartica, quæ attrahunt ele&træ, & irritant expultrices ad propellendos proportionatos liticos, & quæ per vesicantia, frictions, quæ similiter attrahendo, & partem debilem reddendo retrahunt.

Quare nullo modo reuulsioni genus erit attractio, cum reuulsio modo fiat attrahendo, modo expellendo, & demum attrahendo, & expellendo; melius igitur est, ut cum Galeno lib. de arte Medici cap. 99. & 5. methodi 3. dicamus quod auersio sit genus reuulsioni & deriuationis, quia reuulsionem ibi vocat antispassim, id est auersionem in contrarium, deriuationem verò Parocheteusm, id est

auerfionem ad proxima : concludi igitur potest, quod genus reuulsionis sit auersio, & non attractio.

Ostenditur, quod reuulsio non solum conuenire possit humoribus fluentibus, verum etiam fluxis, & fluxuris. Cap. III.

Cognito, quod reuulsio sit humorum auersio in contrarium, sequitur, ut inquiramus, an hæc auersio solum conueniat humoribus fluentibus : omnes ferè dicunt, reuulsionem indicari à materia, quæ est in motu, à fluxa uerò, & à fluxura non indicari, quia utraque quiescit, quæ sententia non potest esse absolūtè uera ; quia fluxi, & fluxuri humores, quamuis actu non moueantur, dummodo apti sint, ut aliquo ingenio possint ab uno ad alium locum moueri, descendemus non esse impossibile, quod auersio in contrarium illis quoque conuenire possit.

Insuper oportet, ut reuulsio desumatur ab indicante, quod primò, & per se indicet reuulsionem : at non fluere in contrarium, sed posse fluere est quod indicat primò, & per se reuulsionem ; ergo non solù fluentib. humorib. sed omnibus, qui sunt fluxi, & fluxuri, dummodo apti sint, & possint cum ægrotantium beneficio in contrarium moueri, reuulsio conueniet : etenim scientifici quærent quod possibile est, & quod est æternum, & non quod solum actu est : sic nō dicimus, quod risus sit hominis proprietas, sed risibilitas ; ridere enim est accidens, & in nullo modo dicendū per se de homine dicitur.

His moti principijs dicimus, quod reuulsio per se non indicetur ab humorib. quatenus actu fluunt, sed quatenus possunt, fluere : possuntque aliquo ingenio aucti in contrarium, & tales non solum sunt fluentes, sed aliquando possunt esse fluxuri, & fluxi.

Similiter Gal. lib. de morb. diff. cap. 1. dicit, non ab actione, sed à potentia esse definiendam sanitatem : dormiens non uidet, attamen non dicitur cæcus ; quia licet actum uidendi non habeat, dummodo potentiam habeat, uidens dicitur ; à potentijs igitur definitionem reuulsionis haurientes decernimus, esse auersionem, quæ conueniat humoribus, qui possunt retrahi

in contrarium, & tales non solum esse, fluentes, uerum etiam esse posse fluxos, & fluxuros.

Præterea, quod reuulsio indicetur quoque ab humoribus quiescentibus, qui sunt fluxuri, & non solum actu fluentes, colligitur ex Galeno 2. in 6. epid. tex. 9. ubi dicit, quod reuulsio debet fieri in principijs morborum, & humores in principijs morborum ut plurimum quiescunt, ergo à quiescentibus, & fluxuris indicabitur reuulsio : Hinc Gale. 13. methodi 11. dicit, se sanasse inflammationem oculorum unica die facta purgatione, & reuulsione humorum existentium in uentriculo, qui partim fluebant, & partim erant fluxuri : hæc sunt Galeni uerba, uide distincta unica die sanatos purgatione per aluum, qui oculi phlegmone tentabatur ? Insuper quis negaret, quod dum sunt reuulsiones prima morbi die, non auertantur in contrarium humores non solum fluentes, uerum etiam aliqui, qui in contrarium erant fluxuri ?

Modò, cum probatum sit, humores confluxuros aliquando posse reuelli, sequitur ut confirmemus ratione, & auctoritate, quod etiam fluxi possint aliquando in contrarium auerti : ratione, quia cum omnes humores fluxi possint deriuari, poterunt quoque moueri, si poterunt loco moueri, non erit impossibile, quod à facultatibus naturalib. uel à medicamentis possint aliquando in contrarium auerti.

Auctoritate probatur, quia Hipp. 2. de ratione uictus tex. 10. loquens de pleuritide dicit, sanguinem esse euacuandum, donec liuidus exeat, quare, si tanta copia sanguinis fuerit euacuanda, donec liuidus apparuerit, euacuabimus humorem confluum : liuidus enim est confluxus, & sic reuulsio conuenire poterit quoque fluxis humoribus.

Videntes Curtius, & Manardus hunc locum interpretantur Hippocr. quod per reuellere intel ligat deriuare ; quæ expositione nulla potest esse deterior : sic omnes dubitationes facillè tolli possent, mutando scilicet, addendo, uel subtrahendo uerba.

Ad hæc Galenus 4. de ratione uictus in acut. tex. 30. habet hæc uerba, medicamenta circumposita ceruici in angina reucl-

nellent humorem, qui in parte anteriori fluxit: si fluxus medicamenta reuellent, ergo reuulsio conuenire poterit confluxis.

Porro Gal. 13. meth. cap. 11. & passim dicit, in icore inflammato est reuellendus sanguis secta cubiti vena, quæ societatem habet cum caua: quid vetat, tunc expultrices hepatis post sanguinis missionem posse confluxum sanguinem expellere a capillaribus parenchymatis ad venam cauam, uel ad portam.

Insuper in capite erit catarrhus falsus, tunc Gal. 5. met. c. 14. docet, esse supra commissuram coronalem applicandum ceratum ex thapsia reuulsione gratia: quis diceret, humorem illum non esse collocandum in numero illorum, qui dicuntur confluxi, vel confluxuri.

Amplius, an ne materia confluxa ad orificium ventriculi, quæ excitare solet angorem, uel alterius generis affectum, tolli potest medicamento reuellente, & auertente per aluum: vel acri enemate: quare non solum materia, quæ est in motu, verum etiam quæ est confluxa reuelli poterit.

Ad hæc, si possint reuelli humores impetum habentes in contrariam partem, quantum magis poterunt confluxi quiescentes, qui tantum impetum non habent in læsas partes?

Postremo adest argumentum efficacissimum, quod reuulsio competere quoque possit fluxis humoribus, supposito nempe hoc principio in philosophia altioribus principiis probato, quod inter duos motus oppositos mediet quies, quoniam, qui dicunt, reuulsionem solum desumi ab humoribus actu fluentibus, coguntur quoque affirmare à quiescentibus sumi reuulsionem: Exempli causa, humores petentes partes supernas non possunt ad infernas reuulsoriorum auxiliis trahi, nisi prius quiescant, quoniam inter motiones oppositas mediat quies, quare, qui negant reuulsionem conuenire humoribus quiescentibus negabunt quoque reuulsionem conuenire humoribus existentibus in motu, quia ij non possunt in contrarium auerti, nisi prius aliquatulum quiescant; melius itaque est, ut dicamus, quod reuulsio indicetur ab humoribus qui possunt moueri in con-

trariam partem, quam quod indicetur solum ab iis, qui actu mouentur: sic enim logicis principiis, Arist. rationi, & experientie melius consentimus.

Occurrit dubitatio, quia Galenus 2. ad Glauc. cap. 2. 4. methodi cap. 6. & sexcentis in locis habet, deriuationem, & non reuulsionem esse humoris in aliquam partem confluxi.

Respondemus nullo modo negari posse, quod deriuatio præcipue sit confluxorum humorum, sed dicimus non esse impossibile, quod humores confluxi possint quoque per reuulsionem aliquando in contrarium auerti.

Hæc sententia confirmatur auctoritate Galeni, & experimentis; 4. enim meth. c. 6. dicit, quod, si in aliqua particula confluxus, & quiescens humor steterit, melius sit tunc deriuare, quam reuellere: hæc sunt verba: at si iam fluxio resistit, atque in membro inhæsit, deriuare per vicina magis expedit: dicit (magis) non negando quin possit accidere, ut aliquando fluxi humores non possint quoque opportune reuelli, particula (magis) id clarissimè docet; quoniam omnium comparatiuum proprium est, ut positius participant: valet hæc, magis conuertit ut fluxi humores per deriuationem tollantur, quam per reuulsionem, ergo non est impossibile, ut per reuulsionem aliquando tolli possint.

Quod attinet ad experimenta, adest primum illud à Galen. propositum 5. methodi 1. p. dum cerato ex thapsia appposito commissuræ coronali reuelli pituitam saltem in cerebro quiescentem, & in pectus confluxuram: similiter 3. de locis aff. ca. 7. refert, quod puer, qui patiebatur comitalem ebauram frigidam à tibia ortam sit liberatus medicamine ex thapsia, aut sinapis tibiæ applicato: refertq; Galen. eodem cap. quam plurima experimenta, quæ clarissimè docent, posse applicari partibus corporis, si in illis adsint venenatæ qualitates, potentissima reuulsoria, quæ humores seu venenatos spiritus confluxuros ad cor, seu cerebrum retrahant in contrarium.

Nos igitur non arbitramur, differentiam constitutiua deriuationis esse, ut confluxi humores tollantur, reuulsione, nisi verò ut fluentes, quia deriuationis

re vera est, vt sequatur inclinationem, & motum humoris euacuandi, reuulsio- nis verò renitentiam; sed quod fluentes, & aliquando confluxi, & confluxuri pos- sunt reuelli.

*Que sit causa efficiens reuulsionis.
Cap. IIII.*

HActenus patet quod reuulsio sit a- uersio in contrarium, & quod non solum fluentibus, verum etiam fluxis, & fluxuris humoribus conuenire possit: restat, vt de causa efficiente reuulsionis dicamus: causa vna esse non potest, & hac ratione reuulsio est quid æquiuocū; alia enim est natura reuulsionis factæ vi vacui, alia per sectam venam, & alia virtute hirudinum.

Similiter Aristoteles dicit, causas effi- cientes adequatas sæpissimè esse innomi- natas, effectusque esse æquiuocos: Secun- do posteriorum de ijs causis loquens di- cit, non inueniri vnicam longæuitatis causam, longæuitatēque esse quid æqui- uocum, quia in animalibus gressibilibus dicit, causam longæuitatis esse carentiam bilis, in auiibus verò, in quibus est copio- sissima, non esse bilem, sed siccitatē car- nis; qui igitur causam longæuitatis com- munitè sumptam vellet afferre, alio mo- dō dicere non posset, nisi, quod esset cau- sata vel ob bilis carentiā, vel ob carnem siccam, seu recrementis purgatam.

Hac ratione nos quoque dicimus, re- uulsionis causam vnā non esse, sed modō promotam ab expultrice, modō attrahente, & modō ab vtraque simul qui modi auertendi inter se distant na- tura, & definitione.

Quod verò humores in viuētibz moueantur, vel quia transmittantur, vt attrahantur, est Galeni 3. de sympt. causis capite 2. & 13. methodi capite 3. Reuul- sio facta per cautერიum, per sectam ve- nam non est per attractionem, sed per transmissionem, natura enim ad locum, vacuum, vbi nulla est resistentia, facili- ter transmittit excrementa: similiter reuul- sio facta per hirudines, balnea, & cucur- bitulas est alterius generis: reuulsionis igitur causæ erunt vel facultates expel- lentes copia, vel qualitate grauante, vel

Sanctory Sanctory. Pars I.

attrahentes externæ.

Quomodo autem dolor, & calor attrahant lib. 10. declarauimus, vbi retu- limus rationes ob quas humores redun- dantes, vel mala qualitate affecti con- fluant in partem dolore, vel calore affec- tam, itaque colligere hæcenus possu- mus, hanc reuulsionis definitionē: reuul- sio est illorum humorum, qui possunt in contrarium auerti, à facultatibus expel- lentibus, siue attrahentibus.

Quomodo sanguis à sexta vena egredia- tur. Cap. V.

Verum quia sæpissimè sanguis mitti- tur reuulsionis gratia par est, ut in exemplum ponamus celebrem hæc quæ- stionem: quomodo sanguis à sexta vena fluat: variè de hac re distrahuntur Au- ctiores: Fernellius asserit sanguinem egra- di à sexta vena per vim fibrarum rectarum quæ in uenis sunt protensæ; dicit ha- rum esse officium attrahendi sanguinem per partem post partem, donec ex vena sexta exeat.

Fernellij sententiam secutus est Petrus Brisotus Parisiensis: dicit, hac de causa veram reuulsionē fieri solum secundum rectitudinē, quæ est sursum, & deorsum quia fibræ rectæ solum secundum hanc longitudinē sunt extensæ, negatque pro- pterea, quod dici possit reuulsio, quæ hu- mores auertit à parte dextra ad sinistram, ab anteriori ad posteriorem, & ab interna ad externā, quasi quod rectitudo, quam Galenus dicit, esse seruandam in reuul- sione, solum possit esse in longitudine, & non in latitudine, vel profunditate.

Reiicitur Brisotij & Fernellij sententia tum per instantiam, tum per fiduciariam reprobationem: per instantiam quia ne- gamus, fibras rectas esse solum extensas per longitudinem sursum, & deorsum; plurimæ sunt venæ, quæ in dextram, & sinistram partem propagantur, & quæ fi- bris rectis similiter sunt contextæ, ergo falsum est, quod fibræ rectæ solum per longitudinem sursum, & deorsum exten- sæ sint.

Porta vena splenis, qui est in sinistra parte, surculos porrigit, & Hepatis con- cauum circumuehit, quod est in dextra.

De Repro-

Reprobatur per fiduciarum reprobationem, quia quamvis fibræ rectæ essent solum in longitudinem extensæ, quid tum? mouebitur ne sanguis à secta vena velocissimo cursu ob vim rectorum fibrarum? nullo modo; quoniam motus à fibris dependens est naturalis, & tardissimus, est enim motus per partem post partem, quatenus inibitur, & repletæ exprimitur roris in modum tenues succos, quod tardissimè fit.

Argenterius in commentarijs artis Medicinalis quæstione propria arbitrat, sanguinem à secta vena defluere, propter expulsionem promotam à dolore sectionis venarum, & à vinculis.

Hæc sententia non videtur rationi consona, quoniam egreditur aliquando sanguis nullo percepto dolore, & nullis vinculis administratis, sæpè enim vidimus homines sauciato, qui non ex dolore, sed ex sanguinis visione se sauciato cognouerunt, ecce quod sanguis sine dolore, & sine vinculis egreditur; quare alia erit causa inquirenda.

Altimarus putat, sanguinem egredi ob vim vacui, dicit, pauca prius sanguinis portione egressa aliam necessariò subire, ne locus vacuus in natura relinquatur: quæ sententia sustineri non potest; quia in vena cava, vnde sanguis versus sectionem mouetur, idem sequeretur inconueniens, scilicet ibi quoque locum relinquere vacuum; quinimò retorqueret quis posset argumentum, quod scilicet sanguis, ne daretur vacuum in centro causæ venæ, non possit egredi in dolij ocellis; quamuis fiat foramen, nihil exit, nisi aer per aliud ingrediatur.

Verum neque Altimarus, neque qui retorquet argumentum appositè loquitur; quia venæ minores, & maiores in sanguinis egressu subito confidunt, & nullum sequitur vacuum; & prorsus itaque falsa est Altimari inuentio.

Recentiores dicunt, sanguinem spontè egredi, quatenus grauis.

Quæ opinio ceteris ferè deterior mihi videtur; quoniam sequeretur, quod in homine stante ab eius secto, & vulnerato perierant non illa posset fieri sanguinis euacuatio: sanguis non existit in venis eo modo, quo aqua in vase, in quibus nun-

quam effunditur per supernum orificium, quamuis sit reclusum; reclusis venis pericranei in homine stante, sanguis extemplo egreditur, ergo non ut grauius est Galeni sententia vbiq; locorum aperta, & prænitens, humores in videntibus non fluere proprio impetu, quia omnis fluxio ad interiora fieret, sed à parte mittente propelli, vel à recipiente attrahi.

Nos verò non absolute negamus, quod in sanguinis egressu ratio grauitatis, vis vacui, & fibræ rectæ non efficiant aliquid, sed negamus, quod hæc causæ sint præcipuæ, & adequatæ.

Dicimus primò, quod aer, & spiritus vitalis toto corpore inclusus, & perpetuò à corde in omnes partes infusus, inflet, & distendat cum violentia vasa, quæ si ferro, vel alio modo aperiantur, sanguis illicò foris cum impetu exprimitur.

Secundò dicimus, quod ob continuum motum arteriarum, quæ re vera subiectæ sunt vniuersis venis, eadem venæ cōprimantur, quibus compressis sanguis promptè foris exprimitur; quantò magis igitur arteriæ imbutæ erunt vitali spiritu, tantò magis erunt venæ compressæ, & inde promptius exprimitur sanguis ad vulneratam partem.

Hæc opinio pluribus experimētis confirmari potest: primum est, dum ob lypsochiam, vel syncopem sanguinis effusio in secto cubito cessat; cessat, quia spiritus vitalis ita dissipatur, vt amplius non inflet, vel distendat vasa, & per consequens non exprimat sanguinem extra venas.

Secundum experimentum habetur in dolis musto resectis, quibus fumus & spiritus vitalis vini inclusus aded abundat, ac feruet, vt per superna orificia multum aliquando cogatur magno cum impetu exilire.

Tertium experimētum hoc pacto potest observari; recipiatur uas, quod unicuique, idque superuum habeat foramen, in quo sit tubus, qui ad imum ferè descendat; deinde per eundem tubum uas ferè totū aqua impleatur, tandè in aer folli maxima cum violentia per eundem tubum immittatur, immixtus enim cum petat partem supernam, & amplius (cum ab aqua impediatur) non possit exire, comprimit aded aquam,

aquam, ut si adaperiatur orificium, tota licet grauis sit, magno cum impetu dissul-
tet: sic sanguis refertus spiritu vitali cō-
primente, & distendente uenas, à quali-
bet superna parte uiuentis corporis inci-
sa, vt compressus, & expulsus egreditur.

*Ostenditur, quod euacuatio per distantissi-
ma non sit conditio reuulsions propria,
& per se, sed per accidens. Cap. VI.*

Quamuis sæpissimè dicat Galenus reuul-
sionem esse faciendam per di-
stantissima, uidendum est, an hæc condi-
tio conueniat per se, vel per accidens: præ-
cipuum enim philosophandi munus est
decidere, an attributa per se, vel per acci-
dens rebus conueniant: si reuulsioni
conueniat per se, vt per distantissima fiat,
erit quoque semper, & in omni casu sic
reuellendum; si uerò per accidens, ut nos
credimus, non erit necessarium, ut sem-
per auertantur humores per distantissi-
ma, si enim ostenderemus auctoritate,
uel ratione potissima, quod semel fieri
possit reuulsio per proxima, conditio
per distantissima non erit de natura reuul-
sionis.

Pro huius rei decisione confugimus ad
Galenum 2 de ratione uict. comm. 10. ubi
habet hæc uerba, si in pleuritide extenda-
tur dolor ad iugulum, uena in cubito se-
canda est, quæ sanguinem ab affecta par-
te, & magis uelocius reuellere, & eua-
cuare possit: nulla alia de causa Galenus
uult reuellere per cubitum affectæ partis;
nisi, ut uelocius reuellat, ergo de ratione
reuulsionis erit, vt citò, & non tardè fiat;
ergo per proxima, & non per distantissi-
ma erit reuellendum: qua uerò de causa
per distantissima ut plurimum reuulsio
fiat, inferius declarabitur.

Insuper 5. methodi capite 14. docet,
committitur coronali ceratum ex thapsia
esse applicandum, ut fiat reuulsio ab inti-
ma cerebri parte ad pericraneum, ne pi-
tuita falsa in pectus descendat: hæc reuul-
sio est per propinquissima, hæcque
non potest ullo modo dici deriuatio, quo-
niam natura mouens in pectus catarrhum
sua natura grauem dici non potest, quod
sit prona ad mouendos humores ad pe-
ricraneum: Neque cum alijs dicere pos-

sumus, quod hæc reuulsio sit per di stan-
tissima ratione pectoris, quatenus scilicet
curamus, ut pectus præseruetur; quia
hæc est mera fuga; quoniam catarrhus,
qui ad pericraneum reuellitur, non à pec-
tore originem trahit, sed ab internis ce-
rebrī partibus, estque uera reuulsio; quia
pituita falsa dilabens deorsum in pectus
trahitur sinapismi uirtute sursum, scilicet
in locum contrarium, ergo per proxima
reuellitur.

Similiter digitus, à quo oritur aura,
frigida, quæ ex Galeno 3. de locis aff. 7.
epilepsiam facit, exurit, & sinapismi
tractatur, ut aura petens partes supernas
regeratur in contrarium, scilicet ad in-
fernas, uel foris expellatur; sicut enim
deriuatio trahit humores, quò sunt pro-
ni, atque propensi, sic reuulsio per con-
trariam semitam, quò non sunt inclina-
ti, auertit.

Amplius legamus Galenum & Hip-
pocratem, & non mutentur (ut nonnulli
faciunt) uerba, 2. in 6. epid. tex. & comm.
31. quia clarissimè apparebit, quod den-
tur reuulsiones per proxima: hæc sunt
Hippo. uerba, „ in oculorum fluxu in fau-
ces reuellere oportet: Galenus uerò in
comm. habet hæc, hoc unum est remedi-
orum reuellentium genus, ut diurnas
oculorū fluxiones ad fauces reuellamus
acribus medicamentis; patet ergo quod
apud Galenū, & Hippocratem aliquādo
reuulsio non fiat per distantissima: quare, si
sæper nō fiet, nec per se, nec de omni con-
ueniet reuulsioni vt per distantissima fiat.

Ad hæc, si materia sit in ventriculo, ea-
que obrepit orificium, & morbum insi-
gnem minetur, an ne statim auerti potest
in contrarium medicamēto deorsum tra-
hente? ergo reuulsio aliquando fiet per
proxima: omnes conueniunt, deriuatio-
nem per se insequi humorum inclinatio-
nem, & reuulsionem renitentiam.

Similiter clysteres acres auertunt in
contrarium humores habentes raptum
ad supernas partes, quæ auersio est per
proxima, & dicitur reuulsio.

Itidē, si à capite retrahere uelimus hu-
mores, eosque per cauterium euacuare,
cauteriū fiet in brachio: si per distantis-
sima auertere esset proprietas insequens
naturam reuulsionis, fieret in pedibus:

Hinc Galen. 5. method. 6. & plerisque alijs locis docet, in fluxu sanguinis è naribus esse secandam venam cubiti directè respondentem, vel esse affigendam magnam cucurbitulam reuulsionis gratia præcordijs, vel summæ ceruici, id est posteriori parti capitis: posterior pars capitis est proxima, & non remota: si per distantissima fieret reuulsio, proposuisset sectionem venæ tali.

Neque respondeant, id fieri ob antiquâ corporis diuisionem inter iecur & renes, ut scilicet intelligatur per distantissima in vnica parte sicuti ijs verbis admonet Gal. 6. epid. parte prima comm. 6. membra supra iecur venæ cubiti sectione indigere, infra verò crurum, in poplitibus venam fecimus, vel venam iuxta maleolos.

Quoniam retorquere possumus argumentum, quod scilicet hæc corporis diuio ob nullam aliam causam fuerit à Priscis proposita, nisi vt euacuationes, & reuulsiones per magis proxima, & non per distantissima fieret; etenim, si reuulsio per distantissima melior esset, diuio corporis esset vanissima: & tantò magis, quanto inter partes, quoque distantissimas, & remotissimas maximus seruator consensus per venam eandem, & per alia quoque vasa, quæ supernis, & infernis partibus maximè responderet.

Causa verò, cur sæpissimè reuulsiones fieri debeant per distantissima, est prohibens, & non illud quod indicat reuellens: prohibens est redundantia excrementorum, quæ ad locum affectum facili confluerent.

Quinimò, dum est læsa aliqua corporis pars, quæ aliorum recrementa facili suscipere potest, tunc reuulsio ad eam per distantissima fieri debet, vt antiqua illa corporis diuio nullo modo ab ipso Galeno obseruetur: exempla sunt plura, 2. ad Glauconem 2. habet, si morbus sit in genu sanguinem ex brachio mitti: dicitque in eodem capite retrahes à locis muliebribus, si eas, quæ in cubito sunt secueris venas, aut iuxta mammam cucurbitulas appueris: ecce, quod genu, & vterus sunt sub renibus, & reuulsio sit in parte superiori, in cubitu scilicet.

Ratio, cur reuulsiones vt plurimū fieri debeant in eadem corporis partitione,

& per proxima, nisi aliquid prohibeat, est, quia omnis curatio, & meditatio debet velocissimè fieri, vt egroti quamcūq; simè ad sanitatem transferantur: quolibet medicorum secta amplectitur Asclepiadis cōsilijs, quod scilicet citò, tutò, & iucundè sit medicandum: hi enim tres fines sūt de ratione omniū medicarū operationū, quare per se quoque cōuenient reuulsioni, ergo erit semper, quātò citius reuellendum, ergo, nisi quid prohibeat, per proxima, & non per distantissima.

Similiter causa, cur in reuellēdis humoribus seruari debeat rectitudo, est, ut per proxima fiat, recta enim linea est omniū breuissima: nobis quoque fauet Galenus lib. de ratione curandi per sanguinis missionem cap. 15. vbi dicit, seruandam esse rectitudinem, vt citissimè curētur ægroti: hæc sunt verba, si venas secueris gratia reuulsionis in directè oppositis partibus citissimè vitiatem afferes, & si cōtra feces, nihil profeceris: dicit citissimè ob proxima, & breuem viā; quia via recta est alijs breuior: idem dicit 2. de rat. vict. 10. velocè scilicet debere esse reuulsionem.

Idem Galenus 5. meth. 8. dum rumpitur aliquod vas in pulmone dicit, quod tunc protinus vena cubiti sit incidenda, à qua (ait) bis, terue postea sanguis est detrahendus auertendi causa. Ecce quod primus scopus in reuulsione est. vt citò & protinus auersio fiat, & per proximiora, id est per venam cubiti: non enim datur locus, tutior, & proximior pulmōni, quam sit vena cubiti.

Similiter Galenus 3. in 6. Epid. 22. laudat sententiam Sabini dicentis in fluxu sanguinis è naribus venam cubiti gratia reuulsionis esse secandam. Colligere ergo possumus, quod de ratione illius, quod indicat reuulsionem, sit vt per proxima, & non per distantissima fiat.

Quantum verò ad illud, quod Galenus 2. ad Glaucon. cap. 2. iubet, dum fluunt humores ad genu esse secandum cubitum; dicimus quod ibi proponat iuuenem cū maxima sanguinis redūdātia, quæ est illa quæ impedit, ne per proxima fiat reuulsio: si fiet igitur reuulsio per distantissima, nō fiet ratione sui, sed ratione prohibētis.

Hinc causa, cur sæpissimè fiant reuulsiones per distantissima, est, quia ægrotum corpora

corpora vt plurimum sunt humorum redundantia oppressa; ideo ratione huius prohibentis sepius timendum est, ne auxilia reuulsoria adiuncta partibus parum distat à locis affectis, allicere possint humores magno cum detrimento vicinè partibus, quæ actu mala valitudine premitur.

Eadem de causa topica præsidia vt plurimum in principiis ægritudinum non administrantur; quia tunc corpora sepe sunt humorum multitudo referta; non tollitur tamen, quominus inueniri possint corpora ægrorum sine excrementorum plenitudine, quibus topica in morbi quoque principio possint applicari.

Gal. declarans casum Larissæ Calui nos docet, quando in ægris adfit humorum redundantia, & quando vti possumus localibus non purgato corpore; hæc sunt verba, si ex antecedenti victus ratione nulla plenitudo in corpore appareat, statim nos vti posse remediis localibus, admoniti ergo Galeni præceptis dicemus, si non aderit corporis plenitudo, quod ex antecedenti victus ratione cognoscetur, nos non solum posse topica aduigere in principiis morborum, verum etiam per proxima reuellere, quia tunc non aderit prohibens, id est plenitudo humorum, qui excurrere possint ad locos affectos, ergo euacuatio per distantissima non conueniet per se reuulsioni.

Diluantur aduersariorum fundamenta, & apertius manifestatur, quod de ratione reuulsionis non sit, vt per distantissima fiat. Cap. VII.

Restat, ut aliorum opiniones melius expendamus, & fundamenta aduersariorum euertamus: Curtius lib. de mittendo sanguine in pleuritide, Akachias de arte Medicali, Leonardus Fuchsius Petrus Brisotus, & Manardus dicunt reuulsionem modò fieri per proxima, & modò per distantissima: dicuntq; humores esse in contrarium auertendos per distantissima vel gratia præseruationis, vel quando affectus est levis, & sine periculo vel quando humores non petunt partes principes: vel in morbis longis: per proxima ubi morbus est periculosus, vel quando humores petunt partes principes, ut in morbis acutis.

Sanctorij Sanctorij Pars I.

Horum sententia ueris philosophiæ fundamentis relictatur, quia, si intelligant, quod de ratione reuulsionis sit, quod modò ad proxima, modò ad distantissima sint trahendi humores, faciunt naturam uariabilem, & inconstantem, quod est apertè inconueniens; quia ratione unius naturæ, & unius ideæ unicus debet esse procedendi modus, & non plures: de qualibet re simplicissima debet fieri propositio uniuersalis, uniformis, atq; æternæ ueritatis: non decet rerum naturis, quæ sunt inuitabiles, & summa necessitate constitutæ, permiscere attributa contingentia quæ aliter esse possunt; quare, si statis, & firmissimis principiis loqui uelimus, cogimur dicere, quod uel sit de natura reuulsionis, ut semper per distantissima fiat, uel semper per proxima.

Qui rectè scient interpretari Galenum, ubi dicit, reuulsionem esse faciendam per distantissima, faciliè omnes nodos enodabunt, idque facient duplici distinctione, prima, quod reuulsio uel consideretur ratione suæ propriæ naturæ, & sic dicere poterunt, quod semper sit faciendâ per proxima: sic enim citò fiet, & citò Medicus de medio tollet peccantes succos; uel considerabitur reuulsio cum prohibentis comparisonem, si enim redundant humores, reuulsio non est faciendâ per proxima, quia imminet periculum, ne ad locum proximum loco affecto confluant humores; in hoc casu dicimus, quod longissimè à parte affecta est reuellendum: quia magis potest prohibens, quàm indicans.

Secunda distinctio est, dum dicit Gal. esse reuellendum per distantissima, dicimus, quod distantia duplicem habere possit considerationem, scilicet, uel ut eam a parte læsa dimetiamur, uel ab humoribus redundantibus in læsamque parrem irruentibus; dicimus, quod respectu læsæ partis, si aderit plenitudo, reuulsio semper per distantissima fieri debeat, & si non aderit, per proxima: si uerò consideretur distantia non respectu læsæ partis, sed respectu plenitudinis, semper reuulsio fiet per proxima: Exemplum, inflammatio est in crure; humores irruentes in crus sunt in uena cava; auxilium reuulsorium est phlebotomia cubiti; ecce, quod cubitum à læsa parte ualde distat,

respectu uerò humorum in uena cau-
residendum est proximum, alia quoque
plura sunt exempla, quæ superius citata
sunt: itaque merito harum distinctio-
num omnia dubia faciliè dilui possint.

Qui aliter sentiunt perperam interpre-
tantur Galeni meth. primò colligunt ex
Gal. 13. meth. c. 11. ubi dicitur, in inflama-
tionibus esse reuellendos humores lon-
gissimè à partibus, quæ inflammantur, di-
citque in brachio inflammato esse secan-
dam uenam cruris eiusdem lateris: idem-
que dicit 2. ad Glau. c. 2 similiter 5. meth.
c. 3. habet, quod dum sanguis ad membra
conuertitur proxima & vicina, sit deri-
uatio, dum ad contraria, & longinqua, re-
uulsio: idem dicit plerisque in locis.

Faciliè illis respondemus, quod Galenus
proponat reuulsionem esse faciendam,
per distantissima; non ratione indicantis,
sed ratione prohibentis.

Nec obstat, quamuis, ut plurimum per
longinqua fiat reuulsio; quia nõ tollitur,
amoto prohibente, scilicet plenitudine,
vel magno humorum affluxu, quin possit
quoque fieri per proxima.

Præterea respondetur, quod in curan-
da inflammatione, & qualibet humorum
proluuie duo vniuersales, & præcipui se-
offerat Scopi explendi, alter, ut cito cure-
tur, alter, ut tutò dicimus, quod hic postre-
mus magis potest, & idè sepe impedit,
ne reuulsio per proxima fiat: quando uerò
Medicus certissimè sciret, in corpore
non esse plenitudinem, tunc nihil prohi-
beret, quin per proxima reuelleret.

Dux obseruari possunt occasiones,
quando per proxima humores sint reuel-
lendi: altera, quando nulla est plenitudo
prohibens, veluti accidit, dum humores
mordaces in intestinis existentes, habentesque
propensionem in caput clystere
acri in contrarium auertuntur, altera,
quando erit prohibens, sed minus potens,
quam indicans; præceptum enim est om-
nibus notum in arte Medica semper po-
tentiori esse attendendum.

Hinc Galen. rubicantia ex thapsia ap-
plicat commissuræ coronali, ut auertat ca-
tarrhū salium, ne labatur in pectus; quia
magis indicat catarrhus, ut regeratur, ne
fluat ad pulmones, quā calido prohibeat
thapsiam, ne ab illa calefiat, & intédatur.

Similiter ex Galeno diximus in cap. su-
periori, quod oculorum fluxiones in fau-
ces reuelli possint, quia magis potest indi-
cans, quam prohibens.

Idem, si aura venefica à digito pedis
exoritur petat caput, & comitalem effi-
ciat, magis potest hoc indicans, quod est
ut exuratur digitus, & immediatè per
proxima retrahatur aura venefica, quam
possit hoc prohibens, idest, timor ne ad
digitum læsum confluant excrementa ab
alijs corporis partibus transmissa. Alia
quoque plura possent afferri exempla,
quæ ostenderent, quod per reuulsionem
licet reuellere, quamuis adsit aliquod
prohibens, quod tamen tale sit, ut minus
possit in prohibendo, quam indicans in
indicando; sed declarata sufficiant.

Præterea reuulsio sæpè fit per longin-
qua, non solum ob prohibens, verum etiā
quia non sunt valè propinqua, per quæ
reuelli possunt humores: si de reuulsione
per uenas loquamur, non inueniuntur
in omni parte corporis uenæ, quæ possint
secari, sicuti dum secamus in brachij in-
flammatione uenam cruris, si essent uenæ
prominentes in dorso, in regione He-
patis brachij proximiores, quæ recto
tramite respicerent locum læsum, vel es-
sent immediatè propagines cauæ uenæ,
tunc illas, & non uenā cruris sæpè seca-
remus; si igitur essent uenæ secabiles pro-
ximiores, nullumque adesset prohibens
vel adesset, sed minus posset, quam indi-
cans, semper reuulsio per proxima fieret;
si uerò obitaret prohibens, tunc fatius es-
set distantia maleficio, certo, & maiori
beneficio pensari, quam cum detrimento
per proxima cito euacuare.

Insuper confirmant quoque sententiā
ex Arte Medicinali, ubi Galenus dicit,
communem indicationem esse ad quam
maximè distantia loca reuelleret: & 2. de
natura humana ubi refert, sectiones esse
faciendas longissimè ab ijs locis, quidolo-
re premuntur.

Respondetur primò, quod Galenus in
arte med. considerabat comunem indica-
tionem, & nõ specificam, ibi non distin-
guebat indicantis naturam à prohibentis,
quia ibi non erat locus illud distinguendi;
sed in methodo medendi; dicebat igitur
Galenus esse communè indicationē idest

præceptum commune, quod ad loca quâ maximè distàtia sit reuellendū respiciens semper ad prohibens, & ad impedimenta.

Secundo dicit, esse faciendas sectiones longissimè ab ijs locis, qui dolore præmuntur, quia dolores attrahunt humores ad locum læsum; præterea, ne inde maius nascatur detrimentum, longissimè iubet esse sectiones faciendas: respicit loco citato Galenus ad prohibens, & nequaquam ad indicans, quia tunc magis potest prohibens in prohibendo, quam indicans in indicando.

Quod verò reuulsio fiat per distantissima ob prohibentia, & non indicantia, ipsi quoque aduersarij coguntur fateri; quia si ab illis quæres, cur reuulsio non fit per proxima, nūquid vna voce responderent, ne humores ad locum læsum trahantur, quare non indicans reuellens indicabit per distantissima esse auertendum, sed prohibens, ergo per aliud, sed quod per aliud fit, per accidens fit, ergo auersio per distantissima conueniet reuulsioni per accidens, & non per se, quod erat probandum.

Præterea mouentur auctoritate Galeni 13. meth. capit. 11. vbi docens rationem curandi inflammationem habet hæc verba, sed ad partes quæ maximè longinquæ sunt semper facies reuulsionem æstimata scilicet phlegmonis magnitudinem, & corporis totius statu.

Respondetur, quod locus iste ostendit reuulsionem fieri debere per distantissima ob prohibentia, quia Galenus dicit in inflammationibus fieri reuulsionem per distantissima ob magnitudinem inflammationis, & ob statutum totius corporis, status. n. corporis ferè semper talis est, vt quamplurimis abundet excrementis, quæ nisi auertantur longissimè à læsis partibus, maiore facient inflammationem.

Similiter pars corporis magna inflammatione obfesa redditur excrementorum corporis capax, & propterea reuulsio non fit per proxima, quia ad partes vicinas confluerent excrementa: conuenit ramen; vt per proxima faciamus reuulsionem, quando maius succedit beneficium, quam maleficium, vt diximus ex Galeno de catarrho falso in pectus dilatante, & de frigida aura faciente comi-

tialem, etenim longè maius consequimur beneficium, dum præcauetur comitialis, & phthisis; quam maleficium, dum digitus, vel caput impletur excrementis.

Medici igitur est spernere quod minus potest, & attendere potentiori: magis potest aura frigida, seu catarrhus falsus offecere, quam humores confluentes attrahos à rubificantibus, seu canterijs administratis in commissura coronali, vel in pedis digito.

His præcognitis facillè patebit, cur reuulsio aliquando fiat per propinqua, aliquando per remota, & aliquando per remotissima: per propinqua, dum indicans est vrgens, & maximè potest, & prohibes nullius est considerationis, vt dum applicatur commissuræ coronali ceratum ex thapsia, vt auertat, catarrhum, ne in pectus labatur: per remota, dum prohibens magis potest, sic Gal. 13. methodi c. 11. in. Iecoris inflammatione dextrum cubitum secat, & non venam taliper remotissima, dum prohibens quammaximè potest, vbi enim est quammaxima plenitudo in inflammatione pleuræ, Auicennas lib. 3. fen. 10. vbi agit de pleuritide secat prius saphenam, & deinde cubitum, quia prohibens vehementissimum cogit Medicum, qui tutò debet procedere, vt per loca distantissima reuellat.

Hinc quoque merito reijci potest sententia Laurentij Iouerti prima deca paradoxorum cap. 10. dicentis, in inflammatione manus, esse secundum idem cubitū, vt semper per proxima sit reuulsio faciendâ; errare videtur, quia maius ex hac proxima sectione nascitur maleficium, quam beneficium, ratio est, quia maior copia humorum à vena iugulari ad cubitum proflueret, quam à carpo ad cubitū, quare quando prohibens magis potest, quam indicans, ei prius est attendendum.

Postremò proponunt auctoritatem 2. in 6. de morb. vulgaribus 9. vbi Galenus dicit, quod reuellens locale sit retrahens ad locum proximū, commune ad remotos.

Respondetur, quod hæc Galeni auctoritas potius fauet sententiæ nostræ; ea enim de causa in locali reuulsione humores possunt in contrarium retrahi per proxima, quia in locali reuulsione cum

niam corpore prius purgato, non adest prohibens, quod magis possit, quam indicās.

Quod localia non applicetur, nisi purgato corpore, passim Galenus docet: patet ergo, quod retractio per distantissima non prædicetur de reuulsione per se, neque de omni: sed fiat per partes longinquas, ne scilicet excrementorum plenitudo inferat aliquod damnum partibus quæ proximæ sunt loco affecto.

Præterea, si retractio humorum ad distantissima conueniret per se reuulsioni conueniret ei de omni, idest non solum reuulsioni communi, verum etiam locali, quia reuulsio æquè prædicatur de communi, & locali: ambæ enim in contrarium auerunt humores.

Si verò dicerent reuulsionem esse ab vno, scilicet, eam per prius dici de communi, & per posterius de locali; falsum dicerent, quia localis eò dicitur localis, quia per proxima fit: quomodo igitur hæc conditio per distantissima per posterius locali conueniet?

Quod hic discurrendi modus efficacissimus sit, patet ex Aristotele 2. post. circa finem ubi docet, quod in quolibet proportionali genere sit primum subiectum querendum, exemplum ibi tradit de habente os, spinam, & sæpeum, dicitque philosophus, quod proprietates illius subiecti proportionalis sit sustentari, quia conuenit spinæ, ossibus, & sæpio; quare, si de ratione reuulsionis esset per distantissima auertere, sicuti sustentari ossi, spinæ, & sæpio conuenit: similiter retractio per distantissima omni reuulsioni conueniret; cum igitur auersio per distantissima non conueniat locali; sequitur, quod neque reuulsio ut reuulsio per se conueniat; non erit igitur reuulsio genus ab vno.

Sed, si dicerent hanc auersionem per longinqua non conuenire reuulsioni incommuni tantum, sed esse attributum specificum, & non genericum; hoc quoque defendi non potest, quia Galenus in fluxu eò naribus vult, cubitum, & non talem esse secundum, nulla pars, per quam communi reuulsione possint auerti humores e naribus, proximior est cubito; ceteræ enim partes proximiores, si scærentur gratia auertendi sanguinem in contrarium id fieret per reuulsionem localem,

& non communem.

Demum, dum dicunt, quod per proxima reuellere conueniat locali, non communi, petunt principium, ac si dicerent, quod reuulsio localis fiat per proxima, quia fit per proxima.

Colligere ergo possumus, quod de ratione reuulsionis non sit, ut fiat per distantissima; similiter quod non conueniat reuulsioni quatenus reuulsio, ut modo fiat per proxima & modo per remota, quia attributa propria sunt vniformia, & demum quod falsa sit Laurentij Iouberti sententia, dum dicit esse faciedam reuulsionem semper per proxima, nullo facto prius prohibentium, & indicantium examine.

Exemplo ischiadis declaratur, quando auxilia reuulsoria applicentur remotioribus, & quando proximioribus partibus. Cap. VIII.

TRibus diuersis modis obseruatur, Ischiadem auxilijs reuellentibus curari posse; primo, dum per distantissima fit reuulsio; sæpe enim cauterium in cubito eiusdem lateris reuellendo humores fluentes deorsum tollit sciaticam: hoc reuulsionis genus à Galeno proponitur 2. ad Glauc. cap. 2. & 13. methodi capite 6. ubi dicit, vno crute inflammato sanguinem nutri ex cubito eiusdem lateris; in qua reuulsione seruantur omnes conditiones reuulsionis; rectitudo scilicet, distantia, retractio humorum versus originem, & vasa communia.

Secundo curatur aliquando, ut experientia docet, auxilio cauterij in alio crure apposti: quod hæc reuulsio à partibus dextris ad sinistras, & viceuersa à Galeno concedatur, clarissime patet ex ijs, quæ leguntur 5. metho. cap. 3. ubi habet, quod reuulsio possit fieri secundum omnes oppositiones: hæc iunt verba, reuulsio vero in ijs, quæ supra sunt, omnibus deorsum semper agitur; sursum in ijs, quæ sunt infra; Præterea à dextris ad sinistra, sicut ab ijs rursus ad illas; similiter ex ijs quæ intus habentur ad ea quæ foris sunt, contraque ab ijs ad illa: ex his verbis non solum colligimus posse renelli humores à partibus (superius ad infernas, sed à dextris ad sinistras, & ab internis ad externas.

Ter-

Tertio patet, quod sciatica aliquando curari possit retrahendo humores inter-nos iuncturæ infixos ad externam cutim vesicantibus, dum enim sit retractio humorum cum violentia ab interno ad externum locum, quamvis per proxima fiat, debet vocari ex Galeno reuulsio; character reuulsionis est, vt in contrariū regerantur humores, & nihil refert an per proxima, vel remota fiat: neque deriuationis est, vt per proxima perpetuo fiat, sed quod motum, seu inclinationem humorum insequatur: exempla, quod per longinqua aliquando fiat deriuatio, non vno loco traditur à Galeno, & præcipuè 2. in 6. de morb. vulg. tex. 7. vbi dicit, quod renibus vitiatissimum sit per aluum deriuare, ecce quod in Galeno datur quoque deriuatio per longinqua.

Qui methodicam sectam colunt, quomodo poterunt intelligere, quando sciatica tolli debeat reuellendo ad brachium quando ad aliud crus, & quando ad cutim externam, nisi Galeni auctoritates ad methodum redigant? Dicimus ergo, quod si supra renes sit maxima humorum copia, quæ possit ad locum læsum summo cum detrimento procumbere, ratione huius prohibentis sit per loca distantissima à parte affecta reuellendum: Neque conueniret in magna humorum abundantia ad aliud crus retrahere, quia tanto cum impetu ad crura procumberet, vt maius oriretur detrimentum, quam emolumentum.

Occurrit dubitatio, quia superius diximus, quod de ratione reuulsionis sit, vt per proxima fiat, & non per distantissima quod reuulsio Galeno: præterea semper, & laudauimus illos tres fines ab Asclepiade inuentos, & qualibet Medicorum secta receptos, quod citò, tuiò, & iucundè mederi sint attributa essentialia cuiuslibet Medicæ operationis, quocunque modo enim medeamur; scilicet reuellendo, vel deriuando, vel concoquendo, quo citius ad sanitatem egrum transferemus, eo magis laudabimur, ergo per proxima & non per remota.

Respondemus primò, quod semper per proxima fieret reuulsio, nisi aliqua plenitudo prohiberet.

Secundò quod dum reuulsio sit per

longinqua, distantia non consideratur respectu plenitudinis, sed respectu lesæ partis: exempli causa, reuulsio per cubitum facta, licet sit respectu coxendicis per distantissima, attamen respectu plenitudinis est per proxima; reuulsio enim humorum exiles in partibus supernis, ne descendat deorsum, idque facimus per brachium, quod est adeo proximum & vicinum maioribus vasibus, in quibus residet plenitudo, vt alter non detur locus aptus sectioni, qui proximior sit.

Si verò viscera essent excrementorum sarcina liberata, eo quia transmiserint excrementa ad vasa, quæ sunt infra renes, scilicet in venæ causæ partitionem, tunc melius esset per aliud crus reuellerè, quam per cubitum; citius enim curaretur, quia tunc humores per proximiores partes retraherentur.

Si demum fluxi iam sint humores ad coxendicem, & non amplius fluât, commodè reuelli possent ad cutim vesicantium auxilio: ostendimus superius, à Galeno 5. meth. cap. 3. reuulsionem quoque vocari, dum humores, qui intus habentur, foras trahuntur, differentiamque inter deriuationem, & reuulsionem esse, quia deriuatio insequitur eandem propulsionem motus humorum, reuulsio vero contrarium; idem humor existens in interna parte coxendicis stabilis, & infixus, si ad cutim externam cum violentia auertatur, dicitur reuulsio, si verò propensus sit, & facillè, & sine violentia trāspōnatur, dicitur deriuatio.

Postremò datur etiā locus curandi sciaticam per cauterium paratum in eodem pede sub genu, vel supra in eodem affectæ partis latere, quod perbellè succedet, quando viscera superiora erunt sanitate donata, & tota mala valetudo cōsistat in iunctura coxendicis, quæ solet cōtingere, dū sciatica sit ob casu ob alto, vel ob externū frigus, vel ob nimiam equitationem & alias causas huius generis: Qui vero Ischiadè ab ijs causis externis prodeūtem curare voluerint, dum corpus excrementis est exutum, Medicinis purgantibus, potius lædent iuncturas, & ægros à malo hoc infortunio non vindicabunt; causa præcipua, quod humores insideant partem affectam, non est totius plenitudo, sed

sed solum dolor ab aliqua externa causa excitatus; itaque vnicum & singulare in ijs est remedium, vt à parte affecta auertamus stabiles, & infixos humores vesicantibus coxendici applicitis, vel cauterio administrato supra, vel infra genu eiusdem partis læsæ.

Tota hæc doctrina est Galeni lib. de curatione per s. miss. c. 18. vbi refert hos casus his verbis „memini me ischiadem vno die factam ex cruris euacuatione curasse nimirum, vbi non ex frigore, sed impletis sanguine, quæ in coxa sunt, venis prouenisset: quare secta in poplite vena commodior ita affectus est, quam in mallo collo: scarificatio autem nihil perspicuo illis prodest: ecce quod reuulsio fit per proxima dum sanguis peccas est in coxa: si vero esset in venis supra gibbam iecoris à cubito, vt iterum per proxima fieret reuulsio.

Andias casum similem, quem semel vidimus: fuit strenuus quidam miles in finitimis Vngariæ locis, qui ob externum frigus, & nimiam equitationem incidit in sciaticam sinistri lateris: quamuis Euerati esset temperamentum: hic fuit à Medicis non semel pharmacis, decoctis, cauterijs in cubito scilicet, & sub genu dextri lateris reuulsione gratia tractatus sine vilo leuamine: tandem administrato cauterio supra genu in eodem latere, post duos menses ad perfectam sanitatem illum transfulimus.

Hæc tam mirabilis medicandi varietas ex ea cognitione pendet, vt cognoscamus quando læsio partis mittentis magis possit, quam partis recipientis: in quolibet morbo, qui fit ex humoribus aliunde missis, duo semper sunt affectus considerandi; alter, qui est in parte mittente, alter in recipiente, & semper potentiori est attendendum: Exempli causa, si cruris inflammatio esset fota à copia sanguinis existentis supra renes, tunc magis posset pars mittens, quam parsiciens ad indicandum rudis, & mente captus esset medicus, qui in simili casu non secaret cubitum.

Similiter, qui per saphenam alterius cruris copiam humorum in supernis partibus prædominantibus reuelleret, male ageret.

Si verò pars mittens esset infra renes in partitione venæ causæ, vel e contra illas par-

tes, satius esset supernis visceribus prius bene euacuatis in aliud crus auertere; quia citius, & expeditius auerteret; hæcque erit reuulsio, quæ à dextra ad sinistram partem seruat.

Si demum partes mittentes, quæ sunt supra, vel infra renes nihil mitterent, quod ex signis læsionum viscerum cognoscetur, tunc tota cura esset in partem recipientem flectenda, quod fieret auxilijs reuellentibus, vel deriuantibus. reuellentia sunt, quæ stabilem & infixum humorem in altioribus partibus iuncturæ existentem ad externa cum violentia retrahunt, & hæc sunt vesicantia, vel sinapismi, quippe ex thapsia, & ex alijs similibus conficiuntur: deriuantia quæ retrahunt humorem inclinationem, & propensionem habentem, vel ad cutem, vel ad cauterium supra genu in eodem latere administratum.

Quid per reuulsionem seruandam in reuulsione intelligi debeat. Cap. IX.

N Vlla sanè opinio magis à physiologia Medica aliena visa est mihi, quam illa, quæ fuit Petri Brisotii in lib. apologetico de pleuritide, Curtij Ioannis Fernelij 2. methodi cap. 5. dicentium, quod per reuulsionem in reuulsione seruandam sit tantum intelligenda longitudo respectu partium, quæ sursum, & deorsum sunt, negaruntque à dextris ad sinistram, ab anterioribus ad posteriores, & ab internis ad externas partes fieri reuulsionem.

De causa tamen cur hoc fieri nequit, inter se valde dissentiunt: Brisotius, & Fernelius dicunt, reuulsionem fieri tantum secundum longitudinem sursum, & deorsum, quia retrahuntur humores solum virtute rectarum fibrarum, quæ in longum, & non in dextrum, & sinistrum, vel secundum alias oppositiones exporriguntur.

Altimarus hoc commentum de fibris rectis respuit, dicitque, quod dum reuelliuntur, & euacuatur sanguis per sectum cubitum egrediatur virtute vacui.

Alij dixerunt humores vt graues sponte deorsum defluere: quas causas superius

rius reieciamus; clarissimèque ostendimus quod fibræ rectæ non sint, quæ à venis scædis sanguinem expellant.

Præterea, quod per hoc verbum *κῆρ* *ὑπὲρ*, idest secundum rectitudinem non possit solum intelligi longitudinem partium, patet, quia à centro spheræ artificialis omnes lineæ ductæ ad circumferentiam vocantur rectæ, tam scilicet quæ sursum & deorsum, quam quæ in dextrum, & sinistrum latus sunt extensæ, ergo non omne rectum est longum.

Similiter Arist. lib. de cælo tenet, quod in mundo sint omnes differentiæ positionis, sursum & deorsum, ante retro, dextrum, & sinistrum, & lineas omnes a centro ad circumferentiam consideratas vocat rectas, quare non solum longum, verum etiam latum, & profundum poterit vocari rectum.

Insuper, quod per rectitudinem intelligatur longitudo, quæ sursum, & deorsum est, pueri quoque reiciunt, quia si viderint lineam in plano in rectum protensam, illicò eam longam, & rectam vocabunt.

Insuper Galenus 3. de fracturis 10. interpretans *ἰσὶ*, idest rectitudinem dicit, per rectitudinem esse intelligendum è regione: an ne dextrum brachium respectu sinistri est è regione, & auris dextra è regione alteram respicit: quare in Galeno admitti non potest, quod rectitudo conveniat tantum longitudini.

Amplius Galenus lib. de ratione curandi per venæ sectionem capite 15. habet venæ sectionem gratia reuulsionis in directè oppositis partibus citissimè utilitatem asserre, & si contra feces nil profeceris: directæ oppositio predicatur de qualibet differentia oppositionis, ergo servuari poterit rectitudo inter partem dextram & sinistram, anteriorem & posteriorem, & internam & externam partem.

Quod a parte dextra ad sinistram, ab interna ad externam, ab anteriori ad posteriorem fiat vera reuulsio, habuimus à Galeno 5. methodi cap. 3.

Præterea 4. methodi 6. loquens Galenus de fluxu sanguinis è naribus dicit, quæ pars anterior ita posteriori aduertitur, ut superior inferiori; hæc sunt verba

„aduersatur ei, quod supra est, id quod infra, & ei quod post habetur, id quod ante: inter partes oppositas reuulsio fieri debet, quia reuulsionis caracter est trahere in contrarium: inter directè oppositas partes seruatur reuulsio, ut reuellantur humores quam citissimè & per breuiorem viam, linea enim omnium breuissima est recta: recta potest dari tam in longitudine, quam in latitudine, & profunditate.

Denique Galenus ca. 99. Artis Medicinalis nō dicit, quod reuulsio sit retractio solum à loco superiori ad inferiorem, sed dicit ex omni loco ad oppositas partes, vult igitur, ut possit fieri reuulsio secundū omnes oppositionum differentias, quæ non sunt solum sursum & deorsum, sed ante, retro, intus foris, dextrū, & sinistrū.

Præter propositas rationes, & auctoritates est Avicennas, qui dum de pleuritide, lepra, & elephantiasi verba facit, docet hos affectus tolli posse purgantibus: est vera reuulsio, quia humores obrepentes ad cutem auertuntur in contrarium, ad intus na videlicet secundum rectitudinem, & per partes oppositas, quæ sunt ab internis ad externas: mirandum tamen est, quod inueniantur adeo pertinaces, qui videntes hanc non esse locale reuulsionem nec seruari longitudinem sursum & deorsum; dixerint non esse reuulsionem, sed deriuationem: quamvis clarissimè Gal. 5. meth. cap. 3. dixerit, quod ab iis quæ intus habentur, ad ea quæ foris sunt æquè seruetur reuulsio, ac a partibus superius ad infernas.

Argenterius putat perfectissimam reuulsionem esse inter partes, quæ sursum, & deorsum sunt, eam verò, quæ intus & extra est, esse minus perfectam, quia ut dicit ille non fit secundum perfectissimam rectitudinem, quæ conuenit præcipuè longitudini.

Quæ opinio nobis non probatur, superiorisque est reiecta, ostensumque est, rectitudinem conuenire posse etiam deriuationi, seruarique inter dextrum & sinistrum, & cæteras differentias positionis, & Galenum intelligere per rectitudinem è regione, ut per breuiorem viam semper fieri possit reuulsio.

Diluuntur rationes aduersariorum, dum probant per reuulsionem esse intelligendam longitudinem sursum & deorsum. Cap. X.

FAcile quoque diluuntur rationes, quæ à Petro Brisoto, & Fernelio locis citatis proponuntur, dum scilicet dicant, quod non detur reuulsio inter dexteram & sinistram, anteriorem & posteriorem, internam & externam partem; sed tantum inter partes quæ sursum & deorsum sunt ob fibras rectas, quæ ex illorum sententia sunt causæ reuulsionis, quæque solum in longum, vt aiunt, & non in latum, uel profundum extenduntur.

Primo videtur errare, quia est falsum, quod fibræ rectæ sint solum extensæ secundum longitudinem; innumerabiles enim venæ, & earum fibræ inueniuntur, quæ a dextro latere ad sinistram; & ab anteriori ad posterius extenduntur.

Vena porta ab Hepate ad splenem mittit furculos quamplurimos, qui à dextra in sinistram partem pereptant.

Similiter caua vena, quæ est in corporis centro ad corporis circumferentiam propagines sexcentas mittit; non potest igitur negari, quod fibræ rectæ non extendantur in omnem corporis dimensionem.

Secundò, dato quod rectæ fibræ non essent, nisi in lōgum protensæ, quid tum? probatum est superius, quod in præcipiti illa reuulsione, quæ fit dum sanguis mittitur, fibræ rectæ non possint esse causæ euacuationis sanguinis; quia à fibris tardissimè mouentur humores.

Dum verò confirmant, quod reuulsio solum fit secundum longitudinem partium; quia Gal. secundo de ratione victus rex. com. 10. & alibi dicat, sanguinem esse mittendum in pleuritide ex cubito eiusdem lateris, vt reuulsio secundū longitudinem obseruetur, non reluctatur ijs, quæ diximus, quia & nos fatemur, quando veræ sunt in longum extensæ, reuulsionem fieri debere secundū longitudinem vasorum, quia sic fiet per vasa communia, & per proxima: nulla enim linea breuior est ea, quæ longa, & recta est; quinimò vt plurimū reuulsiones fiunt se-

cundum longitudinem partium; quia maior pars venarum, quæ possunt secari, in longum exporriguntur.

Non tamen valebit, vt plurimum sit, ergo semper debet fieri: an ne affigimus dorso cucurbitulas, quæ magna vi ad cutim trahunt humores, qui centrum corporis quoque adoriri incipiebant? quod hæc sit reuulsio, patet ex Galeno 5. methodi cap. 3. vbi dicit reuulsionem fieri à partibus supernis ad infernas, ab internis ad externas, & à dextris ad sinistras.

Omnes sciunt, quod hæc auersio humoris ducti à centro ad ambitum corporis non sit longitudo; quare reuulsio non fiet solum secundum longitudinem.

Eandem solutionem alia Galeni auctoritates recipiunt, sicuti 13. methodi capite 6. & 2. ad Glauc. c. 2. de cura inflammationis, vbi habetur, in iecoris inflammatione dextrum, & non sinistram cubitum esse secandum: admittimus vt plurimum, sicuti dictum est, esse seruandam longitudinem partium, sed non semper: dum dicunt, quod fieri debeat semper, quia aliquando fit, est inductio imperfecta, & reducitur ad tertiam figuram, conclusione vniuersali, qui arguendi modus ab Aristotele est reiectus.

Rationabilius est, vt dicamus, reuulsionem vt plurimum fieri secundum longitudinem, non tamen tolli, quin secundum latitudinem, & profunditatem partium aliquando fieri possit, quemadmodum clarissimè docet Galen. 5. methodi cap. 3. dum dicit reuulsionem fieri secundum omnes oppositiones.

Declaratur, quid intelligi debeat per vasa communia. Cap. XI.

QUod reuulsio fieri debeat per vasa communia ex Galen. 13. meth. c. 11. & ex rei natura facile patet; similiter omnes admittent, quod hæc conditio per vasa communia conueniat reuulsioni per se, quia nisi essent communia, nihil euacuaretur; propterea euacuantur humores; quia retrahuntur ad vasa, per quæ possunt fluere; & hæc sunt communia.

Cæterum

Cæterum, quid sit intelligendum per hanc vasorum communionem, non omnes consentiunt: sunt, qui volunt, sicuti est Curtius lib. de venæ sectione, quod per vasa communia sint intelligendæ venæ; quia hæ sunt omnibus corporis partibus communes; in qualibet enim parte corporis est aliqua vena, quæ tandem habet societatem cum porta, vel caua, hæ ab Hepate, vt à primo stipite & trunco procedunt. Dicuntque propterea non posse fieri reuulsionem ab vna ad aliam partem, nisi meritis venarum, quia hæ solæ sunt vasa, per quæ sunt euacuationes à qualibet parte corporis, & hæ solæ summum consensum & communionem cum toto habent.

Confirmantur in sententia, quia in Galeno passim obseruant reuulsionem per venas factas reuellere à qualibet læsa corporis particula: afferunt locum 2. ad Glau. cap. 2 vbi à Galeno exprimitur hic communissimus venarum consensus; ibi habet, retrahas à locis muliebribus, si cubitum secueris, aut iuxta mammæ cucurbitulas apposueris, & deinde deriuabis, si poplitibus, vel coxis applicaueris cucurbitulas: ex hoc quoque Galeni consilio colligunt, retrahi posse humores à qualibet corporis parte per venas: dicuntque præterea vbiq; in corpore reperiri venas, & vnica illarum secta ob cõmunem totum corpus consequi beneficiũ.

Quorum opinio nõ videtur vera, quia sæpissimè malæ humorum ditluuies aueruntur in contrarium per alios canales, veluti per intestina, ventriculum, per vterum, per arterias, per intercapedinem carnis, & cutis, carnis & nerui, carnis & periosij, per concuitatem musculorum per extimam superficiem neruorum, per membranam carnosam, & per alios ductus; quare non per venas solum humores in contrarium retrahuntur.

Præterea, habetur ex Gal. & Hippocr. quod per vias nobis latentes & incognitas euacuantur humores crassi. Galenus enim habet hæc verba 7. aphorismorum 54. Hippocrates opinatur naturam validam, & fortem semper inuenire viam materiæ, licet sint quammaximè crassæ & debeant per angusta foramina permeare, refert ibidem Gal. ex Hippocrate

in ossibus fieri abscissum, quod in dicat crassos humores penetrare per ossium foramina angustissima.

Similiter primo Methodi cap. 3. vidēs, quod humores penetrent omnes meatus nobis occultos, refert hæc verba, rectè Hippocrates affirmat totum corpus esse (vt græcè dicitur) *σύνολον* v. *συνεπὲς* *πᾶσι*, quasi conspirabile, & conflubile dicat & 8. meth. cap. 3. habet esse commune consilium, in sanis & ægris corpus reddi vndique fluxile, & transpirabile.

Vanũ igitur erit dicere, quod per vasa communia sint venæ tantum intelligendæ, cum plurimæ sint viæ omnibus occultæ, per quas auerti possint humores: Qui anatomicorum penetrabit vasa per quæ conseruatur consensus inter processus mamillares & vterum? nihilominus talis obseruatur sympathia, vt odores gratissimi alliciant vterum superne, ingrati verò pellant deorsum: Arist. 8. de hist. animalium 23. dicit interdum sequi abortum odore extinctæ lucernæ: fatius igitur est vt cum Hippocrate, & Galeno dicamus, in viuente esse, plurimos meatus apertissimos, quos crassissimi quoque humores periuadunt, qui nullo modo ab anatomicis cognosci possint; quique in cadaueribus re vera non apparent.

Quod cum ita reuera sit, non est mirũ, si multi affectus remedijs quibusdam auferantur, de quibus vix ratio, vel methodus inuenitur; quemadmodũ, dũ Ischias acri clystere curatur. Quis mihi dicet per quas vice ab Ischiade ad intestina virtute clysteres auertantur pituitæ vitæ? dici non potest, quod solum hac de causa curatur hic affectus, quia per clysteres tollatur fomes; quoniam obseruatur, ancipit refertam crassissimis, & copiosissimis humoribus enematis virtute paruo tempore intervallo depleri.

Insuper, dicant mihi, dum aura dira, atque scelestæ, quæ à pedis digito ad caput conscendit, efficitque epilepsiam, quæ sit eius iter tam velox? non per partium poros, quoniam non sequeretur tam velox actio, ergo, vel per intercapedinem carnis & cutis, vel per aliam incognitam atque latentem viam, de qua nec ratio, nec methodus habetur.

Si-

Similiter dum quis hæmorrhagia narium angitur, aliquando supprimitur testiculis deuinctis: non videtur quod hic consensus inter nares, & pudenda sit per venas, quia sequeretur quod aliæ corporis particule maioribus venis contextæ, quando deuineerentur, citius supprimeretur hæmorrhagia, quod non experimur; alia igitur debet esse sympathia, quæ per vasa nobis incognita fiat.

Ad hæc sæpè in melancholicis hoc mirabile obseruatur, vt vaporosi spiritus celerrimè se ab vno ad alterū locum mouentes feriant modò vnam, modò alterā corporis particulam: omnes mirantur, dū hoc symptoma accidit, quomodo tot sint vasa inter se respondentia & communionem habētia, quæ nobis occulta sint.

Tale quidpiam contingit aliquando, dum aliqua corporis pars tentatur pruritu, illam enim fricando, & scalpando in alia longè diuersa corporis parte leues quædam puncturæ sentiuntur, & deinde omiſſa fricatione, illico desinant & iterū dum scalpimus resurgant ex Hipp. apl. 32. secundæ sectionis, & lib. primo eoaet. habentur hæc, quibus in febribus dolores lateris sunt, ipsi alio multa aquosa bile permixta deiciēte remedio est: ecce quod à pleura ad intestina via nobis ignota natura vitur: alibi quoque Hipp. refert, pleuritidem & peripneumoniam vrina solui.

Similiter Gal. 3. de crisiſibus ait pleuritidem, et peripneumoniā fluxu sanguinis è naribus solui: quo pacto id fiat dicta est difficile. Denique Hippocrat. 6. epid. & lib. de humoribus refert pleuritidem per hæmorrhoidas solui: & in eoacis dicat peripneumoniam solui parotidib.

Denum valeriola inter nostrates diligens obseruator libr. 4. obseruationum obseruatione prima testatur mulierem pleuriticam sanatam fuisse sudore absque alia tussi: quis igitur posset vasa, per quæ seruantur hæ sympathiæ, pernoſcere anatomica virtute?

Denique vt animaduertas, multis esse vias in viuētibz apertas, quæ in cadauere non possunt inueniri: audias historiam pluribus quoque notam: Contigit Venetijs puellæ acum magnum degluenti, vt post aliquot menses acus in ve-

sicam descenderet; vbi cum constitisset, calculus circa illum est adaucus, & tandem à lithotomo fuit transpositus: quis ex cadaueris sectione inuenire posset locum in iecore, qua magnus acus posset sine lēſione transire? vbi nec venę capillares, nec fibræ conspiciuntur, sed solum vniforme & simile parenchyma, nihilominus in viuīs alio modo res se habet. Cum igitur multa sint vasa occulta, & alia pletaque manifesta, sicuti est canale à recto intestino ad œsophagum extensum, à renibus per vteres ad vesicam: per vasa deferentia ad parastates, sit cœcitas musculorum, spatium inter carnem & cutim, inter ossa & periostia; sintque arteriæ & spinalis medulla, & alia plura, vanissimā ergo erit interpretatio, quod per vasa communia debeant intelligi solum venæ.

Ostenditur, quod retractio humorum ad fluxionis originem non conueniat per se reuulsioni. Cap. XII.

A Curtio quatuor traduntur conditiones optime reuulsioni, quarum prima est, vt fiat secundum reſtitudinem, secunda per vasa communia, tertia per distantissima, & quarta vt retrahantur humores ad originem fluxionis.

Quæritur an hæc postrema conditio conueniat per se reuulsioni: prima facie videtur quod sic; quia à Galeno proponitur 1. ad Glauc. cap. 14. vbi habet hæc verba: in aduersum trahere oportet, aut ad communia membris patientibus, aut ad eas, in quibus est fluxionis origo.

Experimentis à Galeno desumptis confirmant, Galenus enim, ne eatarrhus falsus in pectus descendat, applicat commissuræ coronali ceratum ex thapsia, ecce quod retrahit humores fluentes in pectus ad caput, quod est illorum origo.

Similiter 2. ad Glauc. 2. & alibi dicit, in cruris inflammatione esse secundum cubitum eiusdem lateris, quæ retractio est ad originem: alia quoque similia exempla possent afferri.

Cæterum illorū argumenta non concludunt, quia nos nō negamus, quod reuulsio non fiat sæpissimè retrahendo hu-

mores ad originem fluxionis, quærimus, an sit necessarium requisitum, vel quod saltem semper cōpetat reuulsioni, quod non videtur, si potioribus Galeni fundamentis sit credendum; dicit enim 5. methodi cap. 3. quod reuulsio fieri possit secundum omnes oppositiones; & hæc non sunt solum in corpore sursum, & deorsum, sed ante, retro, dextrorsum, & sinistrorsum, intus, & foris: quod cum ita ex Galeno sit, non est necessarium, ut semper in reuulsione retrahantur humores ad originem fluxionis.

Præterea, origo non potest esse nisi in vnico loco, dicit Hippo. 5. aph. 68. quod secta vena frontis tollitur labor partis posterioris capitis; qui diceret quod frons esset origo fluxionis.

Similiter an ne per cucurbitulas trahuntur humores a centro corporis ad cutim, vbi nulla est fluxionis origo? non conueniet ergo reuulsioni per se, quod retrahantur humores ad originem.

Neque occurrit, quod hæc conditio sit propria reuulsioni communi, & non locali, intelligendo per communem, quæ sit à partibus supernis ad infernas, vel ab his ad illas; quia offendere possumus, quod neque huic reuulsioni, quæ dicitur communis, semper competat: Exempli causa, Hepar, quod est sanguinis origo, est inflammatum, tunc, ut præseruetur à maiori inflammatione, Galenus cubitum secat. Ecce quod non trahuntur humores ad originem fluxionis; cum potius in aduersum retrahantur, ne petant iecur inflammatum: fatuum ergo erit asserere, quod retractio humorum versus originem sit requisitum necessarium, & conueniat semper reuulsioni locali.

Præterea si fuerit aliquod vicius origo fluxionis, & illud sit flaccidum, & viribus destitutum, quis ad illud traheret humores? superius ostendimus ad partes infirmas non esse trahendos humores.

Amplius, in reuellendis humoribus indigemus omnibus differentijs ob plurima prohibentia, quæ in morbis profligandis semper emergunt.

Hinc dum humores sunt in partibus supernis, & aliquid prohibeat, ne possint ad infernas trahi, nobis curæ est, nisi ali-

quid prohibeat, ut trahatur ad dextram, vel ad sinistram, vel ad exteriorem partem, prout citius, & tutius fieri poterit, quamuis in illis partibus sit fluxionis origo: Ars Medica non est tam inops auxiliorum, ut si aliquid prohibeat, ne possint ad fluxionis originem auerti humores, Medicus non possit amplius ægotantibus auxiliari.

Errant, qui dicunt sursum & deorsum, dextrum, & sinistrum reuulsioni: ante retro intus & foris derivationi conuenire. Cap. XIII.

Qui putant, quod reuulsio tantum sit inter partes supernas & infernas, dextras, & sinistras: derivatio inter externas & internas, anteriores & posteriores, eò mouentur, quia vident Galenum passim asserere, quod reuulsio fiat per distantissima, & derivatio per proxima, videntque inter partes internas & externas, anteriores & posteriores non esse distantiam, sed solum inter superiores & inferiores, dextras & sinistras.

Horum opinio superius quoque est reiecta; dii declarauimus, quod retractio humorum non sit per distantissima ratione indicantis, sed prohibentis: dum humores à toto irruunt ad crura, docet Galenus, per cubitum esse reuellendos: hæc auersio, licet sit per distantissima respectu morbi cruris, attamen respectu humorum, qui sunt in cava vena supra iecur, quique sunt deorsum fluxuri, erit per proxima.

Quando verò nullum adest prohibens reuulsio commode fit per proxima: conditio cuiusvis operationis medicæ est, ut cito, nisi aliquid prohibeat, medicatio fiat, quare per proxima, & non per distantissima.

Hinc in cruris inflammatione, si vene superiores non sint sanguine replete, sed sanguis fluens sit in partitione venæ cauæ, antequam descendat ad crura, vel sit in venis coxis, tunc inflammatio cruris non curatur per sectum cubitum, sed per aliud crus: Galenus libello de curandi ratione per sanguinis missionem c. 18. idē dicit, scilicet se curasse ichiadas, secta vena cruris, & non cubiti, habet; memini me

me curasse vno die ischiadas facta euacuatione ex crure, vbi prouenisset ex sanguine redundante in venis, quæ circa coxam sunt: semper humor esset reuellendus per proxima, nisi quid prohiberet, dicimus reuulsionem per distantissima fieri, non ratione humoris euacuandi, sed ratione partis læsæ: non decet, dum corpus humoribus redundat, trahere humores ad læsam partem, nec ad partes vicinas, si vero non redundet, licet, dum vnicum est affectum crus, per aliud reuellere.

Dicunt nonnulli, quod, dum secatur alterum crus, sit deriuatio, & non reuulsio: quorum sententia à Galen. 5. meth. c. 3. videtur esse reiecta, quia ibi vult, quod vera conditio reuulsionis sit, vt in aduersum retrahantur humores, vultque quod aduersæ partes non solum sint, quæ supra & infra sunt, verum etiam dextræ, & sinistra; anteriores & posteriores, internæ & externæ: nisi Galeni auctoritatem relinquant, non possunt negare: quin fiat reuulsio secundum omnes differentias oppositionis.

Quod distinguit reuulsionem à deriuatione est, quod deriuatio insequatur, & imitetur inclinationem, & promptitudinem humorum: reuulsio verò contrarium; æquæ conuenire possunt deriuationi, vt reuulsioni omnes oppositionis differentie, modò enim sit deriuatio superne, modò externæ, modò dextrorsum, & modò retrorsum pro vt citius possunt deriuari.

Manardi, & Curtij opinio improbat, dum dicunt phlebotomiam non posse esse remedium mixtum, reuulsorium scilicet, & deriuatorium. Cap. XIV.

Qui admittunt, quod per se conueniat reuulsioni, vt in contrarium humores auertantur, vt ex Galeno probatum est, admittuntque, deriuationem æmulari inclinationem, & flexum humorum; nescio, qua ratione moti audeant, deinde negare, quod phlebotomia aliquando non possit esse auxilium mixtum, scilicet partim deriuatorium, & partim reuulsorium: quoniam nihil prohibet, quò minus aliqui humores in

euacuatione auertantur in aduersum, quo scilicet non erant inclinati, & aliqui ad eundem locum proni deriuentur.

Exempli causa in pleuritide, vel angina dum per cubitum euacuatur sanguis, si humorem fluentem, & fluxurum ad pleuram, vel guttur retrahimus ad cubitum, dicitur reuulsio, quia illum in contrarium trahimus; si verò euacuetur sanguis, qui non resistit neque habet inclinationem in aduersam partem, sed sequitur eundem motum, auertiturque à loco affecto, dicitur deriuatio; ecce, quod phlebotomia respectu diuersorum potest quoque esse remedium reuulsorium, & deriuatorium: quodque dicitur de phlebotomia, de pharmacis, de fonticulis; & de cæteris auxilijs reuulsorij dici potest.

Ex traditis colligi potest in quibus reuulsio cum deriuatione conueniat, & discrepet: conuenit, quia vtraque est auersio, sed reuulsio est vt plurimum per distantissima, deriuatio per proxima; apud Galenum centum inuenimus exempla, quod deriuatio per longinqua aliquando fiat: secundo in sextum de morbis vulgaribus tex. 7. habet, quod renibus vitiatis optimum sit per aluum deriuare; magis distant renes ab aluo, quàm dextrum cubitum ab hepate, inter quas partes est locus reuulsionis: sed melius, 2 ad Glauc. cap. 2. dicit, cucurbitam applicatam manibus ab vtero reuellere, & sectam venam tali ab vtero deriuare, cum igitur magis distet vena tali ab vtero, quàm manumille, sequitur, quod aliquando deriuatio fiat magis per longinqua, quam reuulsio.

Quod reuulsio sæpè fiat per longinqua, non prouenit (vt ostendimus) à natura reuulsionis, sed à prohibente: ostendimus duplex esse prohibens, cur semper per proxima non fiat reuulsio, & deriuatio, alterum, quando non est locus aptus sectioni, qui proximus sit, per quem possint humores auerti, veluti si vena tali in coxa, vel inguine appareret, nos eam secaremus & deriuatio ab vtero melior & citius fieret.

Alterum prohibens est, ne ad locum affectum, vel ad partes vicinas excurrat redundantes humores, qui possent redde-
dere curam difficiliorem: quæ cum ita
sint,

sint, dicere possumus, quod reuulsioni, & deriuationi per se, nisi ad sint impedimēta, conueniat vt per proxima fiant; etenim quāto citius Medicus operabitur, tantō magis eius operatio laudabitur.

Discrepat, quia sicuti reuulsio cōuenit magis fluentibus, quam fluxis, & fluxuris; sic deriuatio magis fluxis: discrepat quia deriuatio sequitur humorum motum & inclinationem; reuulsio contrarium.

Amplius reuulsio vt plurimum retrahit humores ad originem fluxionis, deriuatio longius ab origine semper illos adducit.

Conuenit, quia causa efficiens reuulsionis æquē ac deriuationis est æquiuoca, modō enim fit deriuatio attrahentibus, modō expellentibus, & modō vtriusque virtutibus, vt ostendimus.

Conuenit, quia vtraque fit per vasa communia, & secundum rectitudinem; quid autem intelligi debeat per vasa cō-

munia superius declarauimus.

Conuenit demum, quod non solum humores fluxi, fluentes, & fluxuri apti sunt, ut deriuentur, uerum etiam reuelantur.

Nos de proprietatibus loquuti eas expendimus secundum aptitudines, & non actus, qui re uera non ingrediuntur modos dicendi per se, proprietates uero in secundo modo collocantur; quod uerō apti sint fluxi, fluentes, & fluxuri ut deriuentur superius dictis, & ex experientia ipsa certissima ostendi potest; dum enim sunt suppressi menses, quia caua uena sit sanguine referta; tunc si talis tundatur statim menses, ut millies uidimus, defluunt. Ecce quod deriuatio potest quoque conuenire fluxuris; similiter experientia patet, dum diminutē fluunt, quia tunc selecta uena tali promptius deriuantur, colligamus igitur deriuationem quoque conuenire posse non solum fluxis, uerum etiam fluentibus, & fluxuris.

FINIS, DECIMIQUARTI LIBRI.



SANCTORII SANCTORII

Olim

IN PATAVINO GYMNASIO MEDICINÆ
THEORICAM ORDINARIAM
PRIMO LOCO PROFITENTIS.

D E

I N D I C A N T I V M

Æ Q V I L I B R I O.

LIBER DECIMVSQVINTVS.

*Ostenditur, quod medendi principium sit
sumendum primò ab urgente, secundò
loco à causa, tertio ab impe-
dimentis, & quarto à mor-
bis. Cap. I.*



Est ægrotantium miseria, ut post initium vnius simplicissimi morbi, statim alius affinis, & post illum alij plures breui spatio insurgant; vnde fit, ut in qualibet ægitudine plurimæ se offerant Medico hauriendæ indicationes curatoriæ, plures præservatoriæ, & vitales: aliquando quindecim, & aliquando viginti, & ultra observabuntur affectus in ægrotante, quem Empirici unico, & simplicissimo detineri fortasse putabunt; itaque nisi esset præclara medendi methodus à Galeno tradita, quæ docet à primis fontibus indicationes haurire, quæque ad determinata capita viro ordine eas redi-

git, & primo methodi cap. 4. admonet, ut in complicatione affectuum videamus, cui primo, cui secundo, cui tertio, & cui quarto sit loco attendendum, Ars medica non leuamen, sed laborem, & sæpè exitium ægris afferret.

Galenus itaque 3. meth. cap. 9. & alibi loquens de numero indicantium, quibus est necessarium, ut medicus occurrat, antequam agrediatur curationem morbi, dicit, quod hæc omnia reducantur ad tria, ita ut primum sit *urgens*, secundum *causa principalis*, tertium *causa sine qua non*, sub quo nomine intelliguntur impedimenta.

Trahet Medicus ægrotantem, qui centum habeat affectus, non inueniet ante morbum curandum plures indicationes tribus: Galenus 3. methodi cap. citato in exemplum efferens *ulcus iunctum cum inflammatione, sorditie, cauitate*, & in modico sanguinis profluvio statim in hoc affe-

affectuum concursu iubet, primo esse attendendum causæ principali, & demum iis, quæ impediunt vlcæris sanationem, habetque hæc verba: profluuium sanguinis, vnde primum, maximèque imminet homini periculum, primò curari debet, si verò nulla sit vrgentis indicatio, primò inflammatio, quæ est causa principalis vlcæris, secundo loco sordes, quæ impediunt, ne cauitas impleatur, & tandem vlcus sanetur: immagineris, & tu centum alios affectus vlcæri iunctos, vel separatos, omnes similiter reduci poterunt ad hæc capita, scilicet ad vrgens ad causam, ad impedimenta, & ad morbum.

Similiter, dum aliquod symptoma ad se trahit curationem alio modo non indicat nisi, vel quatenus subit vicem vrgentis, vel causæ principalis, vel causæ sine qua non, impedimenti scilicet; symptoma enim ex se nihil indicat, nec morbus esse potest, quia solum est in fieri, & semper illum insequitur, vt umbra corpus.

Similiter Gal. ad hanc trimembrem diuisionem non solum loc. cit. verum etiam 7. meth. cap. 12. omnia indicantia reduxit.

Si patiens conuulsione prematur, Medicus non primò de intemperie partis, de sorditie, de cauitate vlcæris debet cogitare, sed de conuulsione, quia hæc ad vrgens reducitur, potest tamen conuulsione repressa, & quolibet alio vrgente, illi cō agredi curationem inflammationis, quia est causa principalis vlcæris: similiter superata inflammatione dirigenda est oculorum acies ad impedimenta, scilicet primò ad sordes, & deinde ad cauitatem tollendam, postremò vlcus, aliis superatis, est remediis tractandum.

Ob præposteram Empiricorum medicationem innumera committuntur errata: nos aliquot tantum obseruabimus, vt exemplorum luce methodum citius addiscamus, est Gal. 2. methodi cap. 4. quod exemplorum multitudine stupidorum quoque animi à somno excitentur.

Declaratur distinctius, cur primo ab vrgentibus, secundo a causis, tertio ab impedimentis, & quarto à morbi sumatur ordo curationis. Cap. 11.

Acturi de ordine curandi omnes affectus præter naturam, præstat vt,

in hoc capite de vrgentibus, causis, impedimentis, & morbis verba faciamus: Vrgentia varia, & multiplicia in ægrotantibus contingere possunt, Medicus nisi singillatim prænoscat omnia, nō poterit diuinare, à quo sit sumendum medendi initium: Arist. 1. cæli text. 110. dicit omne multiplex est prius distinguendum, quàm definendum; distinguui igitur poterunt in hunc modum.

Vrgentium aliqua sunt, quæ exitium & vitæ extinctionem minantur, aliqua non vitam, sed meliorem vitam auferunt quæ exitium minantur patiuntur quoque diuisionem, vt scilicet aliqua sint, quæ vires actu prosterant, & extinguant; aliqua, quæ non actu vires tollant, nisi tamen illicò auferantur, certam viriū perniciem, vel breui ægris pollicentur: Quæ uerò non vitam, sed peiorem uitam promittunt, similiter sunt duum generum, aliqua maximam longitudinem affectus portendunt, aliqua uerò statum indecorum, & inhonestum ægrotantis minantur, tale vrgens obseruatur, dum in curanda luc ueneret despicit solet uirulentia ne depilentur patientes.

Gal. 10. meth. c. 3. proponit casum cuiusdam iuuenis, quem in accensione nutriti ob uirtutem prostratam, erat temperamentum calidi & siccī, febreque continua tenebatur: huic dedit tres cyathos cremoris pūssanæ, & duos cyathos uini diluti albi & tenuis; post quos dicit Gal. æger qui antea sine uoce & sensu iacebat sustulit oculos, & tum audire, tum loqui tum præfentes noscere cepit. Ecce quod spreta febre uirtutis labentis gratia cibum & uinum dare possumus propter urgens primæ classis.

Quare nisi obseruemus præceptum Galeni 1. meth. cap. 4. quod in omni affectuum complicatione præsciamus cui primo, cui secundo, cui tertio loco sit attendendum de medicinæ exercitio nihil scimus.

Quo ad primum urgens, quod est dum vires sunt collapsæ, dicimus quod illi primò est uacandum quia in illarū comparisonem quod cetera urgentia, causæ principales, impedimenta, & morbi sperni possint. Galenim 9. meth. 13. dicit, uirtutem omnium primam esse custodiendam.

Ee 2 quia

quia à viribus pendet viuere, addit, vitam vel esse ipsas vires, vel earum actiones, si igitur virtus omnium prima sit custodienda, quando adhuc viget, & non est collapsa, quanto magis, si fuerit perditā, erit præ ceteris recuperanda? quanto magis causæ, impedimenta, & morbi curandi omitti poterūt: Adit febris, quam tūc ardens, si superuenerit syncope, quippe vires & vitam tollat, ei ut potentiori attendemus, spernimus febrem, confugimus ad vinum, & ad alia etiam febri aduersa.

Quo ad secundam vrgentium classē, quæ continet illos affectus in quibus imminet periculū, ne vires, vel breui extinguantur: sicuti accidit in proliuio sanguinis, in truci & insigni dolore, in conuulsione, & in illis affectibus, qui cum actu non sint, possint cetero fieri tales, ut vitam tollant, nisi medicus futuram tempestatem præueniat, sicuti euenire potest in vulneribus frontis, Hipp. lib. de cerebro dicit, quod sola frontis ex tota caluaria est magis exposita inflammationi, quia continetur, & non continet; causa inflammationis est, quia pars continens se exonerat semper in partem contentam: Quis igitur infuso vulnere frontis ob inflammationem imminentem non sperneret aliquantulū vulnus & attēderet futura inflammationi, quæ ob vitæ periculum subit vicem vrgentis secundæ classis? quod intelligimus de inflammatione frontis, de omni affectu imminente & minitāte vitæ periculum intelligendū, itaque & in alijs plurimis affectibus, dicimus, quod si hoc quoque vrgēs aderit, omnia similiter primo excepto spernantur, quia Galenus 9. methodi capite 13. habet, quod primum indicatum desumi debeat à virtute, deinde ab affectu: quinimod addit, si indicantia fuerint paria, primo quoque à virtute, deinde ab affectu desumi indicata; Exempli causa, si aliquis affectus valde perturbet, & virtus eo modo deficiat, ut Medicus quæ de virtute, ac de morbo iudicet esse consulendum, docet Gal. ut tutius agatur, primum à virtute, deinde ab affectu esse auspicandam curationem.

Si uerò vires constet, & nul.ū ex propositis vrgentibus adsit, audacter causis,

& morbis, & nō uirtuti attēdimus; Hinc 9. meth. 7. dicit, quod uirtus robusta sic despicienda, mediocris uerò mediocriter conseruanda: quemadmodum aberrant plures dum spreta uirtute imbecilli medicamenta potentissima exhibent, sic nonnullorum pace dicimus, quod aberrant, dum statim in morbi limine uirtute existente robusta plenè nutriunt, ouis scilicet, & pullis.

Simili modo Galen. 10. met. c. 1. habet, si uirtus sit robusta, febrē, & causam profligare oportet; Robusti enim homines inedia & magnis remedijs in morbis fruiſsimis, quales sunt febres malignæ, & alij similes, sunt tractandi; nisi enim cito morbum magnum, & eius causam, dum uirtus est ualida, profligare tentemus, potest accidere, ut deinde à causis, & morbis aduētis uirtus destruat, deinde non sit amplius tempus uacandi affectibus præter naturam, sed uirtuti.

Potest quoque accidere, ut interim nō solum à causis, & morbis; uerum etiam, ab aliquo symptomate uirtus elidatur; sæpè enim contingere solet, ut symptomata uicem vrgentis subeant, quo casu non primò causis principalibus, & morbis, sed symptomati attendimus; propterea Galen. 12. methodi cap. 1. dicit, symptomata aliquando ex accidenti mutare curationem.

Symptomata si subeant uicē illarū vrgētium quæ tenent primum locum, sicut est syncope, audacter cetera omnia indicantia sperni possunt: si secundum locum, sicuti est magna hæmorrhagia, primo attendimus symptomati, sed non omnino spernimus alia; Galenus 9. methodi 13. dicit, dum uirtus est collapsa, tunc nullum remedium, quod affectum sanet est exhibendum; hæc sunt uerba, tempus quo vires reficimus, eorum, quæ affectum sanent, nihil planè agrotanti exhibemus, ubi uero eo roboris eas peruenisse conuicimus, ut nihil, aut parum ex uacuando sint lædendæ, tunc ad effectus curationem est accendendum.

Non desunt tamen Empirici importuni atque molesti, qui eodē die, quo viribus est attendendum, remedia plura, quæ affectum alijs tēporibus sanare possent, exhibeant; de ijs Galen. 2. ad Glau.

cap. 2. dicit, quod falsum se ipsos incidentes in illum sermonem, morbus quidem curatus est, homo autem obiit.

Vrgens in ordine tertium est nimia affectus longitudo; Galenus enim quarto methodi secundo habet hæc, sunt nonnulli homines, qui dummodo citius sanentur, sunt parati quidvis subire: sunt, qui malunt pati, ut testiculus tumidus euellatur & præcidatur, quam toto vitæ curriculo illud pondus sustinere: similiter plurimi sunt, qui habent vlcera in pedibus, ubi nullum subest vitæ periculum, qui, ut citius curentur, spernunt longiorem, & diligentiorē curam, quæ viū pharmacorum, & decoctorum administratur, & unionem exposcunt: quamvis eis doctus chirurgus prædicat, quod quamvis vlcera ad cicatricem illis violentissimis excantibus redigantur, pedes tamen paulo post alijs maioribus scatebunt vlceribus: in his ægrotantibus coactus Medicus despiciat causam, & impedimenta, & vacat breuitati curationis: ad eundem modum plurimi confugimus, ut citius curentur, ad potentissima medicamenta, sicuti est stybium.

Quartum & postremum vrgens, quod pertinet ad decorationem, veluti dum non patiuntur, ut cicatrix in facie appareat, tunc chirurgi prius huic vrgenti attendunt, quam causæ, & impedimentis; similiter, ne quis in alopeciam cadat, coactè utimur astringentibus, quæ detinent pilos, quæ tamen occludunt, ne acer, & mordax humor exhalet.

Causa principalis tunc solum primò, & maxime indicat, quando nullum adest vrgens ex propositis; quævis enim illorum quatuor causæ principali præferri solent; amoto igitur quolibet vrgente Medicus totū spiritū dirigere debet in causæ amotionem, si morbos & symptomata curare voluerit, etenim, si tractu annorū centum auxilijs medicis velle, non amota prius principali causā, morbos seu impedimenta auferre, tempus prorsus contereret; hinc Empirici frustra in vlceribus utuntur exsiccantibus, quæ sanant vlcera, frustra utuntur lotionibus deterforijs, quæ sordes eluunt, frustra sarcoticis, quæ caritatem implēt, nisi prius demant intemperiem partis, vel humorum afflu-

xum ab alijs partibus prodeuntem, quæ esse possunt causæ principales vlceris.

Alius igitur non inuenietur ordo, vel alia medendi series, nisi ut primo loco ut genti, secundo causæ principali, tertio impedimentis, licet ante omnia sint tollenda, si tolli possint, & quarto morbo, qui tamen nec vicem vrgentis, vel causæ principalis, vel impedimenti subeat.

Si uerò alij fuerint affectus, qui morbum sequuntur, quippe in proposito serie nullum habeant locum, quales sunt affectus in fieri, despiciuntur, non curantur, illisque nunquam attendimus, quoniam alios sequuntur, ut umbra corpus, & ad ablationem aliorum cessant, & desinunt esse.

De impedimentis, quæ à Galeno 7. methodi. 12. & alibi uocantur causæ sine quibus, non, dicimus, quod ex harum amotione nunquā sanari possit patiens, nisi prius causæ principali occurratur: si in vulnere ensis fructū relictum sit, semper auferri potest: Similiter, si ossis fragmenta, pili, sanies, sordes, sanguis in thrombū conuersus, & alia impedimenta sint in vulnere, dicimus, quod possint prima die à vulnere demi, non tamen vulnus curari, nisi causa principalis, quæ potest esse inflammatio, vel affluxus, prius superetur: hinc quamuis vulnus indicet unionem, hæc uniendi intentio despicitur propter impedimenta posita: impedimenta, quamuis semper debeamus auferre, dum possumus, non tamen ex amotione illorum vulnus uhitur, vel sanatur.

Vnō vulneris despiciunt ob causam principalem, quæ tollitur vulnere manente aperto, quia per insensibile foramen non solum inflammatio partis vicinæ, nerum etiam humorum affluxus exhalant.

Despiciunt unio oburgēs aliquod imminens, ne scilicet clauso vulnere dolor insignis succedat ob retentum affluxum, vel ne sequatur spasmus ob puncturam nerui, vel ob alias causas.

Causa à Galeno 6. methodi capite 2. proponitur de punctura nerui talis, quidam stilo passus est nerui puncturam in manu, quidam Thessalius imposuit emplastrum ex farinis, quod claudens vulnus inter septimum diem hominem reddidit conuulsum, eumque iugulauit; do-

cet igitur Galenus, non esse vniendum vulnus, dum nervus pūctus est, sed apertum, & inglutinatum custodiendum, nō solum propter causam principalem, verum etiam propter vrgens imminens, idest consulsionem.

Galenus loco citato, vt apertum detineatur vulnus, & è profundo sanies trahatur docet esse vtendum therebentina, sed in habitu molli simplicit in duro verò cum therebentina paxillum euforbij.

Satis est igitur, vt colligamus, primò esse attendendum vrgentibus, secundo loco cause principali, tertio impedimentis, & postremo morbis.

Morbus ultimo loco sanari debet, nisi vicem subeat vrgentis, vel causæ principalis, vel impedimenti; ratio verò, quod morbus nō debeat curari, nisi causa prius curetur, est, quia semper à causa fit, nec vnumquam cessare potest, nisi causam illum facientem tollamus; hinc Galen. 4. meth. 4. & alijs in locis dicit, quod si fiat morbus, à causa auspicandam esse curationem, si non fiat, à morbo.

Hinc in morbis, qui non sunt, quique simplices sunt, & sine causa fouente, vt hæctica, & ephimera simplices habent methodum; hæctica enim tamquam vni & simplicissimo affectui attendimus; si vero cū hæctica sit putrida febris, sintq; obstructiones, tunc exoritur à putrida, & ab obstructionibus, non quia sint causæ febris hæcticæ, sed quia sunt impedimenta, ne hæctica balnei, lacte, & similibus adimi possit.

Quomodo vires totius corporis collapsæ possint recuperari. Cap. III.

Cum indicatio præcipni vrgētis hauriatur vel à vrbibus, dum sunt perditæ, & collapsæ, vel quatenus imminet, ne vel breui collabi incipiant; videndum est quibus auxilijs sint reparandæ, & custodiendæ: Galenus nono meth. cap. 13. docens, quomodo vires conseruentur, habet; seruabuntur, si nec eius substantia innaniatur, & nō alteretur, quod fit seruando temperaturam; quomodo verò sint recuperandæ, præcipuè agi debet, quia qui sciet eas recuperare, eodem auxilio promptius eas quoque custodiet:

omnes sciunt, quod solum recto vsu alimenti vires & conseruari, & resarciri possint: sed qualis sit hic vsus, à vulgariibus hominibus non cognoscitur; ideo de illo agendum est.

Dicimus, quod quatuor pertineant ad rectam nutriendi administrationem, scilicet quantum, quando, quomodo, & vbi, quantum videlicet nutrimenti sit dandum, quando, & qua hora, in quem modum sit parandum, & vbi: hæc sunt exactè expendenda: quia ex horum incitia quotidie pereunt innumerabiles ægritantes, qui sine medicamēto possent quoque ad sanitatē peruenire: exempla inueniuntur apud Hippocr. in Epidem.

Dicit de Apollonio Recto, qui licteria laborabat, quod miserrimè perijt, quia carnem bubulam, & lac coctum comederat, & aquam potauerat.

Similiter de filia Eurianaetis habet, quod ob uix racemum in delirium incidit, & obicit mortem.

De Pario, Hippocrates, & Galenus dicunt, die centesima uigesima perijsse ob malam viuendi rationem.

Verum hic non querimus modum reparandi seu custodiendi illorum vires, qui nec normam, nec ullam viuendi rationem seruare cupiunt, sed illorum qui medicis morem gerunt, & nihil prætermittunt, ut diutissime uiuant.

In ijs igitur, ut resarciantur, & conseruentur vires, in primis se offert considerandum, quantum cibi sit dandum, uel unde sumi debeat nutrimenti quantitas; dicimus cum Galeno primo ad Glanconem cap. 10. cibi quantitatem tantam esse, quantam æger concoquere potest; si æger igitur tuto posset diuos ouorum uittellos coquere, & unicum tantum sumeret, haud dubiè egri vires minuerentur: quia calor naturalis tempore, quo maneret ociosus, humidū radicale absumeret & maximè læderetur, quinimmo ex Hippoc. minus læduntur, qui pleniori uictu utuntur, quam illi qui tenuiori; si uerò tres sumeret, similiter læderetur, quia distraheretur natura à certamine cum morbo non sine magno detrimento, dum concoqueret redundans alimentum; quare tantum debet dari alimentum, quantum potest concoqui, quia indica-

tio de quantitate alimenti hauriri debet ab actione virtutis.

Hinc Gal. lib. de opt. secta ad Trasylb. c. 43. habet multitudinem alimentorum non deprehendi à morbi temporibus sed à mensura facultatis, quæ debet in tribus coctionibus aterere & conuere in alimentum; omnes. n. partes nutriuntur cibo qui per tres concoctiones purgatus sit, valeant ergo qui tenent ventriculum ali chylo propria nutritione.

Præterea comprobatur hoc à simili, quia sicut quantum agendum in methodo curatrice desumitur ab actione indicantis præter naturam, similiter in methodo de tuenda sanitate quantitas nutrimenti ab actione vitali desumi poterit: itaque virtus fortis, dum à cet. tamine cum morbo distracta est, requirit maiorem cibi quantitatem, viuis verò mediocribus, cibo mediocri est tractanda: debilis & infirma, vel quod in idem recidit, fortis quæ semper sit occupata in certamine cum morbo minimam cibi quantitatem requirit.

Quo pacto verò tutò possit reparari, & conservari minima quantitate sine detrimento, & læsura virium, inuenta est medela à Galeno 2. de rat. vict. in acutis comm. 36. & alibi, quæ est, quod tales parum, & sæpè possint nutrir.

Quæ verò sint signa virtutis valentis, & probè concoquentis, & quæ sint signa cibum prohibentia, quæ variant quantitatem, ab Hippocrate prima sectione aphorismorum secundo colligi possunt, quæ sunt regio, ætas, consuetudo, & morbus; in Germania febrientes non læduntur ab esu carnis castrati, vel à vini potione: in Italia non læduntur ab ouis: in Creta, si ouum comederent, perirent: ætas quoque mutat quantitatem, sic pueris ob consuetudinem assiduam comedendi maior cibi quantitas, quam hominibus dari debet: si de morbis loquamur, similiter dicimus, quod in magnis vulneribus, & inflammationibus, ut in angina, & pleuritide ous non dantur; in febris tamen maligna cōceduntur. Ecce, quod regio, ætas, consuetudo, & morbus indicant, an virtus in coctione valeat, & an adsit ali quod prohibens: Regio frigida indicabit validam esse concoctionem facultatem,

quia ob frigus concentratur e a lor, & inde fortius agit.

Similiter ætas puerilis primo fortior est in concoquendo, secundo est puerorum consuetudo, quæ in omni re reddit operationem facilem.

Dictum quoque est, quod morbi nonnulli sint, qui indicant, ægros paucò cibo esse reficiendos; quia magis potest prohibens in illis, quam indicans, sicut in angina, & pleuritide dicimus, quod magis possit imminens suffocationis periculum, quam, ut refociletur robur, quod tenuissimo quoque cibo potest tam graues morbos vincere.

Semper est facienda comparatio inter indicantia, & prohibentia, & semper prius potentiori est attendendum; tamen si virtutis robur multam exposcat cibi quantitatem, nisi prius confugas ad indicantium examen, ubi videre possis an indicans, vel prohibens magis possit, tutò non procedes: sola medendi methodus est, quæ apparentes contradictiones illico diluit. Hippoc. 1. aphorismorum 11. dicit, in paroxysmis nihil cibi dandum esse, in methodo Galenus picrocholos, ne in hæticam cadant, in principio paroxysmorum nutrit, ratio est, quia imminens periculum hæticæ febris magis potest, quàm morbi insultus; imminens enim periculum hæticæ est urgens secundæ classis, in qua collocantur omnes affectus, qui minatur virium prolapsum, insultus verò pertinet ad morbum, qui ultimo loco indicat, & non solum minus potest urgentibus in indicando, verum etiam minus potest quam causa principalis, & impedimenta: ecce, quod Hippocratis, & Gal. sententiæ, nisi methodi, ut ita dicam trutinam ponderentur, & examinentur, neque intelligi, neque in bonum usum reuocari possint.

Quoad quando sit nutriendum, maxime refert scire, quia innumerabiles pereunt, qui in tempore non opportuno cibantur; exempla plura leguntur apud Hippocratem in Epidemicis; dixit de ægro innominato, quod perierit non ob morbum, sed quia cœnavit calefcens, & largius potauit, dum scilicet erat paroxysmo detentus; idè ferè dicit de Filia Philonis, quæ ob similem errorem mortem obiit.

Vt igitur rectè præsciatur, quando cib. sit dandus, duo sunt observanda, alterum est indicantis præsentia, alterum verò est prohibentis absentia; indicantis præsentia est virtus potens alimentum assimilare, & coquere; absentia prohibentis dicitur esse, dum in vètre cib. inconcoctus nō addit: dum absunt paroxysmi, animi passiones insignes, & dum paulò ante cibū non præcesserit nimius coitus, vel exercitium immoderatum: diximus, dum absūt paroxysmi, quia natura non est cibo distrahenda à certamine; similiter debent abesse insignes animi passiones, quia si ira, vel insigni timore, vel gaudio æger corripitur, adeo eius spiritus distrahitur vt nisi paululum moderetur passionibus animi, cib. à ventriculo non rectè apprehenditur, vnde clydones statim succedunt.

Neque illicò post coitum immoderatum est nutriendum, quia spiritus defessus magis cibo vexatur; etenim non sine labore coquitur; post coitum igitur expedit, vt corpus se tradat quieti.

Neque post exercitium statim est cibandum, quia virtus defessa nō reficitur cibo, sed obruitur, nisi in minima sit quantitate: colligi itaque poterit, tempus dandi cibum à præsentia virtutis, & à propositum prohibentium absentia, defumi: vel saltem quando prohibentia minus possint, quam indicans vitales; in ægrotantibus dicit Galenus 11. method. 5. esse cibandum, quando virtus facilius morbum tollerat, hæc sunt verba: tempus nutriendi in febribus accessionem habentibus est illud, quo facilius virtus motum tollerat, subdit Galenus quo prius in sanitate erant assueti: data enim horarum paritate, vt scilicet prohibens non magis possit media nocte, quam meridie, dicimus, quod tempore quo in sanitate erant assueti cibis pasci, cib. sit exhibendus, & nequaquam alijs horis insolitis: si verò certis horis morbus adoriatur, ea erit hora eligenda, qua natura facilius morbum tollerat, eritque longè ab accessione, vt natura in certamine non onusta ciborū sarcina possit vincere morbum.

Quoad modum exhibendi cibum, dicimus, quod exhibendi modus sumi debeat à minori passione virtutis, vt scilicet

eo modo exhibeatur, quò minimū quid virtus in coquendo patiatur, quemadmodum quomodo sit medicandū indicatur à passione indicantis, sic versa vice, quomodo sit cib. exhibendus indicabitur à minori virtutis passione; hinc liquida eligimus pro reficiendis viribus, quia virtus concoctrix, & cæteræ facultates naturales citius, & minori cura labore suū pensum absoluunt, quàm si dura comedantur: hinc panis nō madefactus iusculo ineptus est ad coctionem, difficillimè digeritur, et tardissimè auget vires: Hinc fortasse Hipp. 2. sect. aph. 11. dicit, quod facilius est potu refici, quàm cibo, natura enim à potu minus patitur.

Quo ad vbi, dicimus, virtutem viscerum principalium esse conseruandam: si de ventriculo loquamur, quia semper est pituita refertus, dicimus, exposcere alimenta calida: si de corde, quæ spiritum gignunt, vt sunt vinorum varia genera: si de cerebro edulia, quæ non fumant, si de iecore, quæ habet vim roborandi, adstringendi scilicet, sicuti inter vina sunt subaltringentia, inter carnes sunt perdicæ, fāsiani, & siluestres gallinæ, quæ vesci solent varijs corymbis adstringentibus; si de splene, dicimus exposcere, quæ mixtas habent vires, id est corroborandi, & aperienti, sicuti est tamariscus, citrac, & alia id genus: hæc sunt ea quæ in collapsis viribus reficiendis possunt administrari.

Quomodo vires partium collapsæ recuperari possint. Cap. IV.

VRgens præcipuum colligitur non solum à virtute totius corporis collisa, verum etiam aliquando ab aliqua corporis parte viribus destituta; etenim interitus vnius partis in consortium trahere, quoque potest totum animal: Declarauimus de virtute rotius, vt possit alimentis conseruari, & recuperari; sequitur vt de partibus agatur, quomodo, dum sunt robore exolutæ, vel imminet periculum, ne exoluantur possint in vita conseruari, & collapsæ recuperari.

Loquens igitur Gal. de ijs, quæ roborant partes, dicit, esse adstringentia, habetque hæc verba 11. methodi 16. adstrin-

gentia esse illa, quæ corroborat affectum partem, ne excrementa suscipiat; ratio, cur moderatè adstringentia roborent, duplex est, altera quia colligunt vires viniendo minimas particulas, quibus inde collectis alacrius natura suorum officiorum muneribus fungi potest; fortius enim expellit, concoquit, & promptius quod est bonum, & familiare attrahit, & conuertit: altera est quia ope virtutis adstrictoriæ partes affectu non suscipiunt aliena excrementa.

Quod adstringentia roborent, exemplo splenis cognoscitur, videmus enim aquas fabrorum, & calibeatas, quæ valdè adstringunt sanare splenicis; tamariscum, intinum corticem fraxini, citrac, quorum virtus adstrictoria gustu manifestissimè percipitur, similiter lincosofos curare: item Gal. 11. meth. 16. dicit in lienis affectibus esse admittenda, adstringentia, vt tollatur occasio fluxionis, tollitur, tum quia roborata parte adstringentium vsu fluxa materia resoluitur; tum quia pars non suscipit nouam fluxionem.

Cum igitur auxilium astringens habeat uirtutem feruandi robor partis, ne in affectus exitiales corruat; quales sunt gangrenæ, & cachexiæ, par est, vt hic de recta administratione adstringentium loquamur, scilicet quantum sit adstringendum, quomodo, quando, & ubi.

Quoad quantum dicimus, ab actione partium indicari; si partes considerentur in habitu corporis densis, & plurimæ virtutis, sicuti in rustico, vel nauta inueniuntur, dicimus, quod tales partes indicent fortius astringens: ratio est, quia durus & firmus habitus magis resistit, & reagit, & à maiori reactione maius quantum, quàm in habitu molli, in quo exigua sit resistentia, debet indicari.

Quoad quomodo, dicimus, quod à passionibus indicantis, id est partis debet desumi; sicuti enim dantur habitus, qui minus patiuntur, quales sunt duri, & qui magis, quales sunt molles, similiter adstringentia, & quæuis alia indicata debent modò fortiora, modò debiliora applicari: Gal. 3. method. 3. loquens de sarcoticis dicit, thus in humidis naturis est sarcoticum, in siccis vero nequaquã, quinimò in his non carnè, sed pus generat; quo loci

colligit Gal. non satis esse, vt in edic amèta meditemur, vt medeamur, nisi quoque, tēperaturarū notas quoque sciamus: quod de sarcoticis dicit, idem de astringentibus. & cæteris omnibus medicinis est dicendum: hinc vinum, quod moderatè adstringit, roborabit partes in habitu molli, si vero valdè astringat, habitum firmum, & durum corroborabit, & mollem, exprimendo humorem toridum lædet.

Quod verò debeat esse astringens, siue roborans cuilibet proportionato, coniectura assequi poterimus ex traditis in 11. lib. vbi de analogismo, & experientia, & in 3. vbi de specificis affectuum differentiis egimus, diximus coniectura, & non certa scientia inueniri, tum quia habitus duri, vel molles suscipiunt magis, & minus, tum quia proprium cuiusque ex Gal. 1. ad Glauco. in princ. & alibi solus Esculapius penetrare potest.

Quando verò partes viuientium sint corroborande, dicimus, cum debeat desumi quando à præsentia indicantis, & ab absentia prohibentis, quod semper pars debilis erit, nisi quid prohibeat, adstringenda: si quis in curandis vulneribus uti uellet astringentibus corroboraret partem vulneratam, sed si hoc faceret antequàm tolleret prohibentia, qualia sunt sordes, pili, ossium fragmenta, thrombus, & alia id genus, uel maxime vulneratum læderet: similiter, qui roborant uentriculum ablynthio, mīa, mastice, & similibus ante omnem aliam excrementorum euacuationem lædunt pèinde ac, qui in proprio domicilio hostem occultant; qui alia in meliori occasione hostilibus armis truciùs ferit.

Hic exurgit dubitatio, quia ex Galen. lib. de compugn. medic. & passim in meth. habetur, quod adstringentia gratia conseruandi natium calorem debeant omnibus medicinis permisceri.

Respondemus, quod adstringentia in compositionibus sunt perexiguæ uirtutis, & talia ut non ruperent vires medicinæ, sed superentur a reliquis simplicibus. & talia adstringentia non occultant hostilia excrementa.

Quoad ubi dicimus, quod sicuti in therapeutica ubi indicatur à substantia indicantis, similiter in profilactica indicabitur:

cabatur: Dum ventriculum roborare volumus, non iniicimus astringentia per clysteres; sed per os.

Quæ verò debeant esse roborantia ac cōmodata pro omnibus partibus corporis aliis quoq; diximus, quod de ratione partium corporis sint decem requisita nempe substantia, temperatura, compositio, meatus, situs, progressus, exordium, officium, figura, & numerus; ijs itaque præcognitis facile conijcere poterimus, quæ nam astringentia, quæ concoctoria, & quæ aperientia convenire possint vni, vel alteri parti.

Exempli causa, si consideretur cerebri substantia, quæ sua natura mollis, & parum resistens est, dicimus indigere mitiori astringente, vt roboretur.

Similiter si consideretur eius temperatura, quæ frigida est, oleum rosatum (vt optimè nos docet Galenus) erit concoctorium, quamvis in alijs corporis partibus sit repercussus.

Quia prout est natura & temperatura partium, sic varia debet esse curatio.

Hinc Galen. 5. meth. ultimo reprehendit methodicos dicentes cognitionem partium esse inutilem pro inuentione curationis: ibidem loquens de viceribus ait quod partes sicciore indigent sicciora remedia, exemplificat de vlcere penis: addit quod in ipsomet pene vlcerato variantur remedia; qui in postrema parte penis requiruntur sicciora, quam in cute glandis subdit, se sanasse vlcus penis potentissimis exsiccantibus maxima cum admiratione cuiusdam medici Theſalici qui aſſiſebat curæ, qui admiratus Galeni præstantiam erupit in hæc verba: non tantum lætatur sum de salute hominis quæ testatur, quod in mala sæcta fuerim educatus: merito tristari debent in mala doctrinæ sæcta educari: quia ex Galen. 7. meth. cap. 3. in prava sæcta alti geminum tempus requirunt: alterum in quo prava opinioniones dedicant, alterum in quo melioribus se exercent.

Idem de compositione est dicendum; astringentia enim, quæ firmant dentes, vel iuuant, vt melius componantur, valde differunt ab illis, quæ genibus, & coxendici conveniunt; ratio diversitatis est, quia genua, & coxendices sunt com-

posita per diarthrosim, dentes per gomphosim.

Similimodo de situ est dicendum; etenim si pulmo est roborandus, cum à ventriculo magis distet, quam hepar, valentioribus astringentibus vt debemus, si velimus, vt roboretur.

Tale quippiam est considerandum, si agatur de partium progressu, scilicet, vt rectè videamus, an per partem roborandam progrediatur nervus aliquis, qui prohiberet valentiora astringentia: idem de alijs; sed cum locupletissimè acta sit hæc materies in 3. libr. non est, vt de hac re protrahamus sermonem, tanto magis, cum Galenus passim in method. primo de loc. affectis in principio, & alibi dicat, quod partes affectæ variant curationem morborum; quinimmo 13. methodi cap. 20. habet, quod nulla in arte medica maior sit difficultas, quam perfectè cognoscere indicationem à partibus affectis desumendam; additque si quis indicationem sumptam à parte adimat, medicinam sex diebus addiscere.

Non est igitur mirum, si his temporibus studiosi omisso exercitio anatomico, cuius beneficium has indicationes addiscimus, paucorum dierum cursu in medicos exeant, sed admodum rudes, quia nō in cognitione partium affectarum, sed solum in genericis persistunt, ex quibus est omnino impossibile, vt proportionata remedia colligant.

Galen. 1. de loc. aff. in principio laudat Erasistratum qui dicere solebat, oportere hominem esse exercitatissimæ consuetudinis, qui voluerit affectum & locum affectum probè dignoscere.

Hinc semper miratus sum nostratum non paucos, qui de qualibet ægritudine non ulterius inquirunt, quam an sit intemperies, mala compositio, vel soluta unitas, & an peccet bilis, vel pituita, neque ullam specificam indicationem sumunt à partibus corporis expensam secundum decem propositas conditiones, quorum erratum quanti sit, in lib. de indicatione, de analogismo & experientia cumulatissimè ostendimus.

*De ordine, & potestate indicantium.
Cap. V.*

Indicatio vrgentis præcipuè ex omniũ sententia primum tenet locum, & in eius comparationem omnes indicationes à causis, impedimentis, morbis, & partibus desumptæ spernuntur: est Galeni 7. meth. c. 12. quod prius vrgenti sit attendendum, deinde causæ, quæ efficit morbum: similiter causæ prius, quam morbo est attendendum, dicit enim Galenus 8. methodi 1. quod si causa efficiat morbum ab ea sit auspicanda curatio; si non amplius fiat, sed factus est: à morbo, verum sit causa, sit morbus factus, sit denique pars quævis quocunque modo læsa vrgenti prius vacandum est.

Galenus 14. methodi cap. 11. in comparatione vrgentis adeo despicit indicationem sumptam à parte, vt non solum, quando affectus est lethalis, verum etiam dum solum est insanabilis, admonet corporis partem, quæ tamen non sit gratia vitæ, esse amputandam.

Hinc, si cancer obideat partem corporis, qua ablata vita manere possit superstes, eam amputamus: similiter, si canis rabidus digitum mordeat, vt ille lethalis affectus præcaueatur, digitum abscindimus, vel saltem profunde inurimus: si aura frigida à digito exiliens cerebrum obrepat, & epilepsiam faciat, phlegmate, uel cauterio, uel igne confoditur: similiter, nisi in exitu sanguinis arteriosi, qui fit in aneurismate, transuersem toram arteriam scindamus, actum est de vita.

Patet itaque, quod facta comparatione inter vrgens & causas principales morbos & impedimenta, quod prius vrgenti sit attendendum: inter vrgens præcipuum, & vrgens sumptum à parte vacandum est præcipuo.

Pater quoque, quod facta comparatione inter vrgens sumptum à parte, & causâ, & morbo, quod aliquando magis causæ, & morbo sit attendendum; exempla sunt, dum testiculus tumidus euellitur, ne pars illa ingrauescens uiuentem perturbet; dentem quoque perforatum eximimus; quia magis potest morbus partis, quam ipsa pars; erit igitur hic ordo seruandus,

vt primo sit vrgentis præcipuo attendendum, & merito: quia agitur de viriũ lapsu, & de vitæ extinctione: Secundo causæ principali: Tertiò impedimentis: Quarto morbo, qui tamen non subeat vicem vrgentium, causarum, vel impedimentorum aliorum affectuum: Quinto loco attendere oportet corporis partibus, quæ non sint gratia vitæ.

Verum omnes indicantium naturæ semper sunt expendendæ, an subeant aliorum vicem, posset enim indicans, quod sumitur à parte vicem vrgentis subire, causæ principalis, impedimentis, vel morbi: Similiter alia indicantia transire possunt de genere in genus, & mutari; quia morbus, cui ultimo loco est attendendum, aliquando adeo vrget, vt primum aquirat locum; idem dici potest de causâ principali, & impedimentis: Itaque nisi medicus omnes ægrotantes affectus disponere, & in ordine redigere sciat, cui scilicet primo, cui secundo, cui tertio, & quarto loco sit vacandum, si totum Galenũ memoria teneret, adhuc nihil sciret, quinimodò satius esset, vt uniseri ægrotantes se ipsos fortunæ, quam similibus medicis committerent, à nullo enim errore eque, vt à confusa, & præposita medicina eger detrimentũ colligit.

Ostenditur, quod quindecim sint indicantium comparationes, & quod nam sit illud indicans quod in qualibet occasione magis possit. Cap. VI.

Quatuor itaque sunt indicantium gradus: in primo collocantur vrgentia, quæ, cum inueniuntur interitum, ante omnia medicum alliciunt: Galenus 3. method. cap. 9. dicit, si in curandis vlcibus phlegmonosis superueniat conuulsio, prius esse attendendum conuulsioni, quam phlegmoni, quamvis phlegmone sit præcipua causa vlcis: Septimo method. cap. 12. dicit prius esse dirigendam oculorum aciem syncope, quæ vires enervare potest, quam cæteris affectibus.

In secundo gradu ponuntur indicantia, quæ hauriuntur à causâ principali, & fonte: Galenus 3. method. cap. 9. docet in ulcere phlegmonoso non esse exordiantem curationem ab ulcere, sed ab inflam-

inflammatione, quæ est præcipua causa vlcæris; 4. method. cap. 4. dum morbus adhuc sit dicta causa esse exordium; octauo methodi cap. 1. habet, prius esse submouendam causam febris, & deinde febrem: habet tamen, quod si causa iam desierit, tunc immediatè à febre esse auspicandam curationem.

In tertio gradu impedimenta collocantur: non decet, vt tollamus sordes, pilos, fragmenta, & thrombum, nisi quæ inflammationem, quæ potest esse causa vlcæris, prius superemus; & vbi cõtingeret conuulsio, sanguinis profluuiũ, vel aliquod aliud vrgens, tunc omittimus oblationem causæ vlcæris, impedimentorum, & illicò vrgenti attendemus: dicimus igitur, quod nisi hæc impedimenta auferantur, non possumus vllomodo vlcus sanare; idem dicimus de alijs affectuum generibus non licet, vt obstructions tollantur, vel iecoris ardores mitigentur, nisi alui excrementa leniter subducantur.

In quarto gradu sunt morbi, qui ex Galeni sententia 7. method. cap. 12. & 3. meth. 9. post amotionem dictorum omnium, & non prius submoueri debent: quo tempore solum roborentur partes astringentibus, quod officium non ad methodum medendi, sed tuendæ valetudinis pertinet, non licet vt roborantibus, dum sæuiunt vrgentia, vel dum causam morbi profligamus: quia roborantia cum astringant, impedirent causæ amotionem; eadem de causâ dum impedimenta auferimus non roboramus partes, quia non astringentibus, sed laxantibus, vel deterforijs ea euelluntur, relinquitur igitur, vt solû roborentur partes, dum morbus curatur.

In hoc loco rudiorum erratum vocatur, dum prima die ante ablationem causæ, & impedimentorum vtuntur roborantibus, quæ potius resistunt, ne inde causæ, & impedimenta superentur.

Proposito hoc indicantium ordine sequitur, vt videamus, quomodo possint sibi inuicem comparari, & quod magis possit dici mus igitur, quod quindecim, & non plures fieri possint indicantium comparationes, & ab hoc solo examine rectum indicantium æquilibriũ cognosci.

Prima comparatio debet fieri inter

vrgentia, dum plura superuenient, ut sciatur, cui prius sit uacandum.

Secunda inter causas principales, dum ager diuersis affectibus premitur.

Tertia inter impedimenta.

Quarta inter morbos.

Quinta inter indicantia uitalia desumpta à partibus, quæ non sunt gratia uitæ, sed melioris uitæ.

Sexta comparatio fieri debet inter vrgens, & causam.

Septima inter vrgens, & morbum.

Octaua inter vrgens, & impedimẽta.

Nona inter vrgens, & indicationes uitales sumptas à partibus à natura institutis gratia melioris uitæ.

Decima inter causam, & impedimenta.

Vndecima inter causam, & morbos.

Duodecima inter causam, & partes roborandas.

Decimatertia inter impedimenta, & morbos.

Decimaquarta inter impedimenta, & partes roborandas.

Decimaquinta inter morbos, & partes; alias fingere comparationes indicantium nemo poterit; ueretur quis in omni affectuum uarietate, & fingat ægrotum, qui centum habeat ægritudines, nunquam poterit plures ijs comparationes ethicere.

Quoad primam comparationem, quæ debet fieri inter vrgentia, dicimus, quod statim uidendum est; ad quam classẽ reducantur; vrgentium classes quatuor sunt; in prima posuimus vrgentia, quæ vires statim dissoluunt, ut est syncope.

In secunda, quæ minatur uitium prolapsum, ut sunt profluvia.

In tertia quæ pollicentur nimiam morbi longitudinem; sicuti dum spreta causa, & morbo euellitur testiculus tumidus, ne maximam longitudinem morbi experiatur patiens.

In quarta, quæ ad decorationem pertinent; sicuti sunt, qui, ne depilentur, petunt à medicis astringentia, quæ gallinam luem non sanant, sed seuiorem reddunt; dicimus, quod facta horum vrgentium comparatione, quod prius attendendum sit ijs, quæ collocantur in prima classe, & deinde ordine proposito vrgentibus aliam;

tum;

rum Galenus nō solum spernit causas, & morbos, dū est vrgens, quod statim vires adimit; verum etiam ob vrgens, quod non statim, sed temporis spacio posset vires opprimere, etenim in alui fluore, quamvis vires actu robustæ sint, subeat tamen periculum, ne aliquo intervallo temporis cadere possint, nec phlebotomiam, nec pharvacum, vt colligitur t. ad Glauconem c. 14. Galenus admittit.

Cadit tamen in hoc loco considerandum, dum plura simul sunt vrgentia primæ classis, quæ scilicet sunt de illis, quæ statim vires tollunt, sicuti est syncope, & magnus fluor sanguineus, cui primo, cui secundo sit vacandum: Respondi potest, quod statim est videndum, quod nam vrgēs citius vires tollat, quo viso, dicimus, quod nisi eodem tempore vtrique occurrere possimus, quod affectui, qui citius vires opprimat, prius sit vacandum: Similiter dicimus, si adessent plura vrgentia secundæ classis ei prius esse attendendum, quod citius, potentius, & certius vitam, & vires ledit.

Vrgens tertiæ classis, quod consistit in longitudine affectus, spernitur nō modò ob affectum, qui vires extinguit, verum ob illum, qui minatur virium lapsum: quod verò huic vrgenti prius, quam causis, & morbis, aliqui attendunt, Galen. 4. method. cap. 2. ijs verbis fatetur: sunt quidam, qui malunt quidvis subire, quam diutissime pati; Hinc plures arbitantes, quod stybi vsus possit inueteratum affectum vincere, spernunt febrem, eius causam, & alios affectus, quippe stybio intendi possunt.

Quartum locum tenet vrgens, quod pertinet ad decorationē; nisi morbi subeant v'cem vrgentium primæ, secundæ, vel tertiæ classis; possumus prius decorationi, quā cæteris morbis, & causis attendere; Medicus tamē debet tutò mederi, quod respondet primis, deinde secundis vrgentibus, deinde citò, quod respondet tertijs, & demum iocundē, quod respondet decorationi; iocunditas, ne turpis fiat cicatrix, tanti est, quanti, omnia plurimi patiuntur, vt non conspiciatur.

Secūda cōparatio fit inter causas principales: vnus morbi vnica est causa principalis, attamen; cum plures in ægrotan-

te possint esse morbi, ijque separati, plures quoque in illo possunt esse causæ principales.

Hippocrates in epid. de Pythione habente pectoris affectionem, & febrem, dicit in illo duas fuisse causas principales, altera erat catarrhus in pectore collectus, altera erāt humores putridi: vnica die apparuerunt sputa subcocta, & vrina tenuis, sputa cocta ostendebat causam principalem affectionis pectoris esse à natura domitam, & superatam: vrina tenuis, humores febrim cientes esse adhuc crudos.

In ijs separatis causis erit semper expendendum, quæ ex illis magis possit: quod fiet hoc modo: debet videri, quæ nam ex illis sit magis reducibilis ad vrgentia primæ, vel secundæ classis, scilicet quæ citius, certius, & potentius vires opprimere possit.

Exempli causa in Pythione erat catarrhus tenuis in pectore collectus, & in venis putridi humores dicimus: quod magis poterat putridi humores vires opprimere, quam catarrhus, quia in pectore nulla aderat inflammatio; magis igitur humores putridi erant reducibiles ad vrgentia, quoniam putredo viribus magis est inimica, quam tenuis catarrhus, idēo medicatio fuisset incipiendā à putredine, non tamē spreto catarrho, si verò fuisset crassus, & talis, vt tēporis spatio potuisset inflammationē pectoris, vel suffocationem efficere, & putredo careret malignitate minus esset reducibilis ad vrgentia, & per consequens minus posset, & ei non primo, sed secundo loco esset attendendum; catarrhus. n. qui posset inflammationem, vel suffocationē parere esset reducibilis ad vrgens secundæ classis, putredo aperta ad vrgens tertiæ classis, in qua non vitæ periculum, sed morborum longitudines collocantur.

Præterea in vno morbo aliquādo dūte possunt esse causæ, sicut in erisipelate esse potest sanguinis copia, & sanguinis feruor: tunc ei quod magis vrget est vacandum: nemini dubium, quod vt docet Gal. 3. meth. c. 8. & 3. de temperamentis c. 5. quod magis vrget refrigerationis indicatio, quæ euacuationis, quod cōtrariū obseruandum esse dicit Galenus in apostoma-

stomatibus, quia in apostemate indicatio evacuationis vincit indicationem refrigerationis: ideo in affectibus complicatis examinandæ sunt causæ, & semper vrgentiori prius attendendum.

Quod de ijs diximus, de omnibus est intelligendum, quod scilicet medicatio sit incipienda ab illis causis, quæ sunt magis reducibiles ad vrgentia potentiora.

Tertia cõparatio fieri debet inter impedimenta, quæ cum in quolibet morbo plura sint, aliquo ordine est procedendum: dicimus itaque, quod impedimenta, vel sunt reducibilia ad vrgentia, vel non: si sint conducibilia, videndum est ad quam classem, an scilicet ad primam, in qua collocantur illa impedimenta, quæ actu vires, & vitam tollunt, veluti quando est sub crampo pus retentum; vel ad secundum, in qua sunt impedimenta, quæ nisi auferantur, minantur virium dissolutionem, sicuti, dum in vulnere fragmenta ossis, vel ensis, vel sanguineus grumus detinentur.

Dicimus loquendo de impedimentis, quæ vrgent, quæque sunt in eadem classe, quodd ei prius sit attendendum, quodd citius, potentius, & certius vires, & vitam tollere possunt: si ex symptomatibus cognoscatur esse pus sub crampo, quodd est impedimentum, ne sanetur, essentque in vulnere sordes, si chirurgus inciperet à medicatione sordium, & post diem cogitaret de terebra, valdè deficeret in suo explorando munere; quia illo brevi temporis spatio in maximum discrimen ægrum vocaret, statim igitur impedimẽto, quod potentius, certius, & citius lædere potest, est attendendum.

Si verò impedimenta non sint reducibilia ad vrgentia, prius attendimus causas, & deinde impedimentis; si verò accideret, vt plura essent impedimenta istius generis, tunc prius attendimus ei, quodd magis impedit, vel quodd est causa, ne alterum auferatur impedimentum; sicuti sordes est impedimentum, ne cauitas ulceris impleri possit, à sordibus est incipiẽda cura, quia cauitas, quæ similiter est impedimẽtũ, cur ulcus non sanetur, nõ potest impleri carne, nisi sordes auferatur.

Quarta comparatio fit inter morbos, qui non subeant vicem vrgentis causæ,

vel impedimenti; tunc dicimus, si plures in ægrotante extiterint tales, quod illis magis attendendum, qui erunt propinquiore vrgentibus.

Aderunt gonorrhæa, & perniores; hi sunt affectus separati; si quis quæreret, à quo esset incipienda medicatio, responderem à gonorrhæa; quia nisi curetur, posset temporis spatio impedire vrinam, vnde succederet non solum vrgens secundæ classis, dum scilicet subest periculum, ne succrescat symptoma, quod vires tollere posset; sed vrgēs primæ, dum scilicet ob retentum lotium aliquando mors sequitur; quod de pernioibus non potest dici; idem de alijs comparationibus dicendum.

Quinta, & postrema comparatio fit inter partes læsas, quæ cum ad uitam non pertinent, sed ad meliorem uitam, non subeunt vrgentis vicem, vel causæ, & impedimenti, vel morbi; tunc si dux partes fuerint læsæ, dicimus, quodd curatio erit exordienda ab illa parte, quæ temporis spatio vicem maioris, & vehementioris vrgentis, causæ, impedimenti, vel morbi posse subire.

Colligemus itaque, quod à fiet comparatio inter vrgentia, & causas, ab vrgentibus sit incipiendum inter vrgentia, & impedimenta similiter ab vrgentibus, inter vrgentis præsentia, & imminencia à præsentibus; inter imminencia, quæ vires possent vel breui opprimere, & vrgentia pertinentia ad longiudinem affectus, vel decorationem, dicimus, quod medicatio erit incipienda ab ijs vrgentibus, quæ minantur virium casum; inter vrgentia, & morbos similiter ab vrgentibus, itidem inter causas, & impedimenta à causis; inter causas, & morbos à causis, & non à morbis; inter causas, & partes corroboranda à causis; etenim non potest roborari pars vulnerata, vt exemplo chirurgico utar, nisi dematur inflammatio partis circumstantis; inter impedimẽta, & morbos ab impedimẽtis; quis uellet, nisi stolidus sit, prius siccare vicus, & deinde tollere sordes? inter impedimẽta, & indicationes partiũ ab impedimẽtis; quis uellet partẽ prius roborare, & deinde sanguinem concretum auferre? Demũ si fiet comparatio inter morbos, & partes, dicimus,

mus, quod simul tempore morbus potest curari, & pars roborari: Quare per quindecim capita est faciendum examen indicantium, si velimus exactè scire, quid magis possit indicando, vel cui primo, cui secundo, & tertio sit attendendum.

Ostenditur, quod Chirurgi illi sint à methodi qui in omnibus ulceribus viuuntur exsiccantibus. Cap. VII.

Declarata methodo, quæ in complicatis affectibus docere potest, à quo sit exordienda cura: præstat, ut nunc ea in exerceamus: est Gale. 9. meth. cap. 1. quæ vniuersales methodi non satisfaciunt pro exacta cognitione, nisi in exemplis exerceantur: & cap. 6. eiusdem libri, quod in comparanda omnium artium scientia non sufficiat methodus per vniuersalia theorematum acquisita, nisi addatur aliquod exercitiū in particularibus exemplis.

Vt igitur methodum superius declaratam exerceamus, incipiamus Galeni imitatione ab ulceribus ostendemusque empiricos chirurgos ordinem curandi ulceris sæpè peruertere: quia, quod primo loco est in ulceribus sanandum omittunt; & quod postremò, curationem primò aggrediuntur.

Proponatur igitur ulcus fordidum, cauum, cum labris duris, cum partis intemperie cum materia, quæ adhuc ab humorum affluxu foueatur: in hoc ulcere curando, chirurgorum plurimi, ijque rudiores statim prima die spreto indicantium examine, & æquilibrio utuntur solum exsiccantibus scilicet emplastro de minio, serato de succo solari, lenimento simplici, unguento de pomo citri, & uino, quo semper abluunt, perinde ac in ulceribus, non possint esse plures idæ, quam unica, quæ indicet exsiccantia, & solum ille chirurgus omnibus præstat, qui in curandis ulceribus sciat uti potentioribus exsiccantibus.

Horum errarū uidetur esse inexcusabile, quia si de affluxu loquamur, tantum abest, ut exsiccantibus de medio tollatur, ut potius impediant, ne fluxi humores perspirent; quod maximum detrimentum adiecit ulceribus; impedita enim perspiratione, humores inde fiunt ma-

gis effrēnes, unde ulcus sordidius, & magis cauum efficitur; quare, dum ulcus est cum affluxu exsiccantibus externis nunquam sanabitur.

Præterea, dato etiam quod ulcus non esset fottum ab affluxu, sed solum ab humore imbibito in parte ulcerata, adhuc dicimus, quod nullo modo exsiccantia conuenire possint, ratio est, quia partes ulceratæ humoribus imbibitæ cum sint omnes imbecilles, non possunt digerentibus, ut uino & similibus expurgari, sed suppurantibus; quam doctrinam nos docuit Galenus 3. præfag. 29. dum dixit, humores detentos in parte debili nunquam iudicari per excretionem insensilem, sed per conuersionem in pus; quare non remedia sicca, sed potius humida, & suppurantia conuenient.

Insuper, dicimus, quod exsiccantia sordido ulcere non conuenient, quia non poterunt sordes, & cauitatem sanare, nisi prius sanetur inflammatio, quæ iuncta est cum ulcere: clarissima est Galeni doctrina 17. method. cap. 12. ubi habet, si ulcus cauum iunctum sit cum inflammatione partis circumstantis, nisi inflammationem, seu tumorem, uel materiam imbibitam prius curaueris, ulcus efficies sordidius, & inde magis cauum; ratio est, quia exsiccantia, quibus uti solent, ut est uinū, & similia, sunt deterforia, quæ partem ulceratam aliquantulum uellunt, & pungunt, unde sæpè confluxus maior, unde sordidū incrementū, unde sinus, & plura alia symptomata exurgere possunt.

Denique uarijs Galeni locis confirmari potest, quod in ulceribus, quæ ægrè curantur, non sit exordicendum ab exsiccantibus 4. meth. 7. habet, quod difficultas sanationis ulcerum non pendet ab ulcere, ut ulcus est, sed ab eius causis, quæ alio ingenio, quam exsiccantibus externis tolluntur: hacque occasione omnes ulceris causas ipsi paucis uerbis enumerat, ulcera ægre sanantur uel propter intemperiem, carnis ulceratæ in qualitate sola, uel ob intemperiem cum tumore, uel ob affluētē humores peccantes qualitate, uel quantitate: sequitur itaque quod in sanandis ulceribus, nisi adsit aliquod urgēs, cura sit incipienda ab aliqua causa ex ijs quatuor à Galeno relatis, scilicet uel ab

intēperie carnis vlceratæ, quæ sola qualitate officiat, vel ab intemperie cum aliqua magnitudine aucta, idest cū tumore seu apostemate; vel a fluxione humorū copia, vel qualitate peccantium, addas vel ab omnibus ijs simul iunctis.

Vel dicendum est cum Gal. 1. de comp. med. per genera cap. 18. vlcera esse vel cachoetica, vel dysepulota, cachoetica sunt, quādo pars vlcerala est adeo intemperata, ut influentem humorem, licet sit bonus corrumpat: dysepulota, quando propter cōfluxum humorum copia, vel qualitate peccantium non sanantur, absque eo quod pars vlcerala habeat virtutem corrumpēdi fluentes humores: dum igitur ulcus est cachoethicum, vel dysepuloticū, dicimus, quod ab ijs causis sit incipiēda cura, & in illis anouendis exsiccatia externa nullum habeant locum, quinimmo ulceris sanationi potius sint impedimento.

Præterea Gal. 4. met. cap. 4. Fufius considerat causas seu impedimenta cur ulceræ, & uulnera non sanentur, duodecim sunt causæ.

Prima causa est cōfluxus excrementorum ad partem ulcere, vel uulnere affectam.

Secunda sunt labia duratibi reprehendi Thesalum, quia in sanandis ulceribus auferēbat quidem labiorum duritiem, sed relinquebat fluxionem, quæ ante omnia erat tollenda.

Tertia causa est tumor vlcerae partis.

Quarta intemperies partis circumstantis: opitex sanationis ulceris seu uulneris est sanitas partis circumstantis ulceris seu uulneris.

Quinta est uarix: si igitur in parte vlcerala seu uulnerata sit aliqua uarix impeditur sanatio, nisi abscindantur uarices. Quod uerò etiam uarix impedit sanationē, & de hac intel ligat Gal. in tex. patet: quia in text. antiquo legitur *κίρρος*, quamuis apud Linarcum legatur *οὐκ ἔστι κίρρος* significat varicem.

Sexta causa est uitium iecoris, uel lienis, quod uinum nisi dematur ulcus sanari non potest. Hinc Gal. 4. de art. 40. loquens de illis medicis, qui in ulcere intestinorum non corrigunt prius uitium hepatis, habet hæc uerba, plerique me-

dici neglecto iecore ulceri dumtaxat intestinorum medentur, & ægrum precipitant.

Septima causa est imbecilitas partis vlcerae, quæ potest à qualibet intemperie provenire.

Octaua est plethora.

Nona est cacochymia.

Decima est cauitas ulceris: ulcus enim sanari non potest, nisi cauitas carne impleatur.

Vndecima causa impediens sanationem est cachexia.

Duodecima est aliquid tertij generis in ulcere seu uulnere: si. n. esset sium, seu ramentum ossis, uel esset pilus nisi separaretur ulceris sanatio fieri non potest.

Quo pacto uerò sit procedendum in ulceris curatione, dum tot sint causæ difficilis sanationis, dicimus, quod aliquando ab affluxu auspicamur curationem, aliquando ab intemperie, & aliquando ab apostemate: ab affluxu incipimus, quādo apostema, & intemperies partis dependent ab humorum fluxione, ablata enim causa, cætera indicantia facili susperantur: ab intemperie partis, si esset mali moris, & ulcus esset cachoethicum; quia tunc magis posset malignitas ad indicandum, quam apostema, & affluxus: aliquando. n. quamuis sint affluxus, & apostema malignitas magis potest, quia tam mordaces succos in ulcere gignit, ut inde excitetur fluxiones, quæ deinde apostemati summum adferunt incrementum, quo casu curatio nō ab affluxu, uel apostemate est exordienda: sed à malignitate ulceris, quæ solum ferro, uel igne tolli potest.

Ab apostemate uerò exorditur curatio, non semper ab affluxu, quando affluxus excitatur occasione doloris, caloris, & putredinis pendenti ab apostemate, ulceris; apostemate enim ablato, illico cessat fluxio, & ulcus: quo pacto igitur rudiores poterunt excicantibus sanare ulcus cum apostemate iunctum, nisi prius tollant suppurantibus apostema?

Sapientissimus Gal. 3. de fract. 43. utitur in ulcere cum inflammatione coniuncto non excicantibus, sed ijs quæ leniunt, ne inflammatio incrementum suscipiat, tantum enim abest, ut ea, quæ leniunt licent, ut potius vlcus sordidius red-

reddatur, habetque hæc verba, medicamenta, quæ inflammationem coercent, & leniunt, sunt vt terrapharmacum, quod tuetur partem affectam ab inflammatione, sed efficit vlcus sordidum; ecce igitur, quod si adsit inflammatio in vlcere liceat applicare humida, quamuis vlcera ab illis reddantur sordidiora; magis enim potest phlegmone, quam vlcus, & cavititas.

Hinc Galenus 4. method. 5. dicit, quod dum cupimus pus in vlcere, non est excandum, cupimus pus, dum vlcus est cum apostemate; quia vlcus sanari non potest, nisi prius apostema sanetur.

Vidimus in Vngaria empiricum, qui ob huius methodi infantiā miserrimè vlcera tum hominem tractauit; hic erat miles vlcere sordidissimo cum phlegmone correptus, empiricus utebatur exsiccatibus, scilicet emplastro de minio, de succo solatri, vnguento de poma citri, lenimodo simplici, vng. de litarg. & similibus, his vlcus modò videbatur sanari, & modo sordidius, & magis cauum effici, nunquam tamen poterat ad sanitatem peruenire, tandem me in consilium vocauit; noui inflammationem magis posse, quam vlcus, & cavititas; & camque alio modo non tolli, quam suppurantibus, iussi, vt farina, lac, & pinguedines applicarentur, post quorum vium, vel breui apparuit album pus, quod erat signum, humores imbibitos esse concoctos, & superatos, est Galeni 5. aphorismorum 22. pus in vlcere maximum esse securitatis signum; superata inflammatione breui spatio exsiccatibus, & epuloticis cum sanauit.

Denum, qui vruntur topicis exsiccatibus pro sanatione vlcis, cui iuncta sit durities scyrrhosa, aberrant, & conterunt tempus, quia nisi scyrrhosam duritiem prius emollientibus tollant, vlcus nunquam sanabunt.

Causis vlcis ablatis non potest adhuc exsiccatibus vlcus sanari, quia prius sunt miro ordine removenda impedimenta, quæ sūt sordes, cavititas, vel sinus, fragmenta ossium, Thrombus, labra indurata, & alia plura: si quis vellet cavitatem, vel sinus sanare, antequam sordes auferantur, inter imperitos esset ponendus, quoniam sordes causant cavitatem, & non cavititas sordes; similiter, si quis vellet prius sor-

des auferre, quam callum, vel duritiem laborum, nunquam sanaret, etenim donec adesset durities laborum seu callus, nunquam vlcus coalesceret, vel sanaretur: ratio est, quia caro non fit nisi supra rem animata, callus verò est res inanimata: ideo non ablato callo non coalescet vlcus secundum primam intentionem.

Sed ex dictis exurgit dubitatio; quia diximus ex Gal. 4. met. c. 1. & cap. 4. quatuor & plures esse causas vlcis ægrè sanabilium, & non plures: hic tamē proposuimus sordes, cavitatem, thrombum, quæ non reducuntur ad quatuor propositas. Augetur dubitatio, quia Galenus 6. aphor. 45. dicit, vlcera ægrè sanari, non solum propter affluxum humorum, aut propter dispositionem in membro longo tempore contractam ex humoribus influentibus, sed etiam ob aliquam passionem ossis corrupti, ecce, quod præter quatuor propositas causas, refert os corruptum impedire vlcis sanationem.

Responsio facilis est, quia sordes, os corruptum, thrombus, siue sanguis concretus, & alia id genus non referuntur ad causas vlcis, sed ad impedimenta; in illis enim quatuor causis ægrè sanabilium vlcis non continentur impedimenta, sed solum cause: quæ verò impedire possunt sanationem vlcis sunt infinita: hæc doctrina est Galeni 3. meth. 9. & 7. meth. 12. vbi omnes affectus, qui sunt ante morbum curandi, refert ad tria capita, scilicet ad vrgens, causas, & impedimenta: nunquam curabitur morbus, nisi prius causæ, & deinde impedimenta, quæ natura distincta sunt, auferantur.

Quibus sic positis mirandum est quopactò Chirurgi empirici audeant nullo facto indicantium examine *vt supra* medicinam facere, dum scilicet prius vlcis topicis exsiccatibus vacant; quod vltimo loco esset curandum: errant, quia nisi causæ, & impedimenta vniuersa, quæ in vlcis productionem conspirant, auferantur, vlcus æterno tempore perseueraret, quinimodò nisi esset, positus causis citò fieret, & si aliqua vi supprimeretur, iterum rediret, illudque sordidius.

Quamuis obijciat aliqui, quod sordida vlcera aliquando potentissimis exsiccatibus perueniāt ad *suppurum* & coalescant.

Respondemus, quod illa sanatio est faciliata; quia causæ ulceris insidam pacem faciunt, exsiccantia enim potentissima solum externam ulceris faciem velant, interimque humores oclusi sunt magis audaces, & erumpunt in ulcera fordidio-
ra, & maligniora.

Causa erroris empiricorum est, quia Gal. methodus hæcenus ad illorum aures non peruenit, methodus est breuissima, indicantia enim, quamuis in vnico ægrotante essent centum, redigi debent ad quattuor, sed hoc ordine, vt prima, quibus attendamus oportet, sint vrgentia: secunda causæ, tertia impediimenta, & postrema sint morbi.

Si proponeretur vlcus curandum, cui omnes isti affectus essent associati, syncope, hæmorrhagia insignis, affluxus humorum ad partem vlceratam, intemperies, tumor, dolor, imbecillitas, sordes, cauitas labra vlcis dura, sinus, caro fungosa, ossium fragmenta, caries ossis, pili, & alia, quæ tertij generis vocantur à Gal. atq; vlcus, dicimus, si adhuc essent mille, alij affectus, quod omnes ex Gal. ad quatuor propolita indicantia debeant referri, hoc scilicet modo, vt syncope, & hæmorrhagia referantur ad vrgentia, affluxus humorum, intemperies, tumor, dolor ad causam, sordes, cauitas, labra dura, ossium fragmenta, os corruptum, & pili ad impediimenta; vlcus ad morbum, quod tunc solum curari poterit, quando omnes causæ, & impediimenta erunt ablata. A quo uerò vrgere, à qua causa, et à quo impediemento dictorum cura sit incipienda, dicimus, quod à syncope non speretis alijs, quia syncope reducit ad vrgentia primæ classis, dum scilicet vires statim exoluantur syncope amota, hæmorrhagia magis potest, quia reducit ad vrgentia secundæ classis, in qua collocantur affectus, qui hæcenus non destruxerunt vires, sed solum minantur virum ruinam: amotis vrgentibus statim attendimus causis, causæ erant affluxus, intemperies partis, & dolor: dolori primo attendemus, quia à dolore potest nasci affluxus, & ab affluxu intemperies: lenito dolore vacabimus affluxui, corrigendo viscera, & sanguinem, vbi enim sanguis fluens est imperfectus, vlcus difficile sanatur.

Hinc Gal. 3. aph. 31. habet, quod si vlcus adueniat senibus difficile sanetur ob sanguinis defectum, præstat igitur, vt viscera, & sanguis corrigantur, ne amplius sint fluxionis origines: si verò transmittentur ad vlceratam partem humores, non ob læsionem viscerum superiorum, sed ratione doloris, vel caloris excitati à putredine vlcerate partis, vel à medicamentis perperam à Chirurgo administratis, tunc prius dolores essent demulcendi, deinde statim doloris causæ demendæ, ne iterum excitentur novæ fluxiones.

Vt errant qui in suppurandis apostematibus vtiuntur duris emplastris. Cap. VIII.

Ex omnibus, qui in artis medicæ opera insiliunt, nemo ægrotantes frequentius deludit, quam empiricus Chirurgus, qui à circulatoribus, vel tonforibus Medicinam addiscit: Hic simulatque se esse Doctorem somniat, vult sermone, vestitu ab omnib. talis existimari: nuper in foro similem, quem multo ante noueram, nidi, nobilique toga laruatam, miratus vestitus nouitatem, sciscitabar ab illo, an celebrauerit nuptias; en tandem refert causam, quam nemo vnquam diuinasset, quæ erat medendi gratia.

Vah illis, qui ab huiusmodi empiricis tractantur: Hi, si velint medicari apostematibus, nec quos, nec qualia sint indicantia, nec cui primo, cui secundo, vel tertio sit attendendum, cogitant: si velint suppurare, vtiuntur emplastris duris, & tenacibus, sicuti est diachilon simplex, vel cum gummis, quæ emplastrorum genera solida, & dura cum tenacitate adhærescunt: nec videtur, quod emplastrorum durities, & tenacitates inflammationem augeat; causa est quia impediunt, ne humores effundantur in spatia affectæ partis: dicimus in spatia, quia sanguis nunquam potest fieri pus, nisi postquam egressus est venis maioribus, & minoribus vniuersis.

Hinc Gal. 3. de offic. med. 31. dicit inflammationes non ferre modicum pressum.

Ratio verò, cur sanguis, dum manet in venis, nulla emplastrica virtute potest conuerteri in pus, est, quia hoc, (vt habet Arist. 4. physic.) est conseruatiuis locati.

Hinc

Hinc ab omnibus accepta est sententia, quod venæ non apostemantur, cuius ratio est: quia sanguis in proprio vase in aliam naturam non est transmutabilis.

Quod verò sanguis in venis non conuertatur in pus; sed solum postquam est ab omnibus venis expulsum, patet apud Galen. lib. de tremore præter naturam c. 3. ubi referens quomodo fiat inflammatio dicit inania spacia sanguine repleti ex vasīs per eorum tunicas refundante: idē 2. ad Glau. & alijs in loc. nisi exsudet ex venis, non potest fieri pus, quia causa efficiens est concoctrix tunicularum, & membranarum, pus redditur album tunicis nimirum in colore simile, sicuti in mammillis sanguis, & in testibus semen: quæ cum ita sint, opus est, ut pus mouentia sint similia, augeantque caloris substantiam, sed non intendant qualitatem; ut dicit Gal. 5. simp. medic. facult. non convenient ergo tenacia, & dura emplastra, quia sanguis liberè non conflueret ad spatia, & per consequens non fieret pus. Et quod deterituum est durum quipiam in sine relinqui solet quod interdum reuocat inflammationem: interdum si durum adnecitum neruis impedit motum, vel sensum. Audias Gal. 4. de loc. aff. 4. hæc dicentem, erat inflammatio in quodam homine iuxta cruris initium: accidit illi membro difficultas mouendi: quia durū quidpiam tuit detestum adnexum neruorū hominem illum sanauit adhibito medicamine idoneo duritiei.

Denique est Gal. auctoritas 13. meth. c. 5. ubi clarissimè docet, cur ab emplastris duris in phlegmone sit abstinendum, habet, a duris emplastris in phlegmone esse abstinentum, quia contrahunt reliquias phlegmonarum, & rursum phlegmonem in ægra parte excitant: dura emplastra debilitant partem, quia sua duritie eam lædunt; deinde excitant dolorem, dum euelluntur, quo excitato conflunt humores, unde rursum inflammatio in ægra parte promouetur: intusper dura emplastra contrahunt reliquias, quia prohibet, ne egrediatur sanguis e tunicis capillarum venarum, quo necnon egresso alio tempore promouetur, & inflammacionem efficit.

Si igitur rudiores præsciret, quod pars

affecteda sit puris auctor, eam duris, & tenacibus emplastris non vexarent: si scirent, quod in apostematibus magis, esset causa, quam morbus, prius eam tractaret anodynus, quam emplastri tenacibus, dolor enim subit v'cè cause magis principalis, cui semper prius est attendendū: ijs igitur mori rationibus dicimus, quod omnia emplastra pus mouentia debeant esse mollia, anodyna, & non dura, qualia sunt ex farina triticea, pinguedine, & lacte, sicuti optimè nos docet Galenus 5. simp. cap. 9. & 3. de officina medica 31.

Illæ errata reijciuntur, quæ sunt dum rudiores prius causis, & morbis, quam vrgentibus attendunt. Cap. IX.

FAlluntur aliquando rudiores, dum hecicis primi, uel secundi gradus hypocondriorum minimis obstructionibus, vel leui putrida febre uexatis, lac omnino interdicitur; nec uident, quod hecici interim, lacte non exhibito saltē in pauca quantitate, ad tertium gradum properant, unde mors: dicimus, & nos cum Hip. 5. aphor. 64. quod lac habentibus obstructionem, & putridam febrem exhibere malum sit, sed, quod longè maius malum sit permittere, ut æger maximè exticcetur & certò pereat.

Augetur difficultas sanationis ob hæcica moram: quia semper eorum corpora sunt sicciora & siccitas difficultus sanatur, quam humiditas, Gal. 2. de symp. causis, c. 2. loquens de affectibus thagoidis dicit, si pupilla appareat minor ob humiditatem, facilius curatur, quam si minor sit ob siccitatem: quia difficilior est partem exsiccatam humectare quā humidam exticare: habemus enim ex Gal. 7. meth. c. 12. quod vrgenti magis sit attendendum, quia cauet & 10. met. c. 10. satius esse nonnulla fiducia, & cū periculo aliquid facere, quā ipse adempto certo perire.

Quare, si viderimus hecicum in dies magis tabescere, cur non licebit humectadi gratia ad lac confugere, illud prius exhibendo in minima quantitate, & deinde si beneficium maius foret male scio in maiori.

Medicorum est præcipuum munus expendere in alteram lancem beneficium,

& in alterâ maleficiû pharmacorû , & q magis perpedit eligere; nulla est tã perfe-
cta medicina; quæ nõ lædat: cassia omniû
saluberrima stomachû lædit, missio san-
guinis vires minuit, animû perturbat, ve-
rû tamẽ, quia speramus, quod inde maius
emolumentum, quam detrimentum nas-
catur, ideo patimur, vt æger lædatur.

Reuertentes igitur in orbem propo-
siti nostri dicimus, quod millies vidimus,
Medicos aliquos potius permisisse, vt he-
ctici pereant, quam eis habebitis leuem
obstructionem, vel leuem febrem putri-
dam lac dare: vidimus tamen hecticos
aliquibus obstructionibus & febre putri-
da detentos vsu lactis fuisse liberatos, ra-
tio huius est, quia hectica potest esse vr-
gens, febris putrida, & obstructio impe-
dimenta, semper enim magis potest vr-
gens in indicando, quàm impedimenta
in prohibendo.

Neque obiciant ex Hipp 5. aphorif. 64.
dicentes, lac habentibus tensa Hippocon-
dria, & febrem putridam nõ conuenire.

Respond. quod Hipp. Gal. & omnium
medicorû sententiæ considerari possint,
nec nulla facta comparatione cû alijs in-
dicantibus, vel cû comparatione; qua posita
distinctione dicimus; quod si cû cõpara-
tione considerentur, variû quoque sen-
sum habere possint: exempla: dicit Hipp.
Gal. 1. sectione aphorif. 11. quod in paro-
xismis æger non sit cibandus: hæc senten-
tia considerata ex se vera est, attamen, si
consideretur in comparatione aliorû in-
dicantium, potest esse falsa, patet, quia
Galenus 10. method. 30. pierocholos ha-
bentes diatrioton nutrit in principio paro-
xismi, nec in hecticam labatur, ecce quod
facta comparatione beneficij cum male-
ficio, eibus datur quoque in principio pa-
roxismi, ratio dicit, quia hæctica est vr-
gens, & magis potest, quam diatricon.

Similiter aliquando magis potest he-
ctica, quam putrida, quo tempore licet
lac exhibere; quamuis sit putrida; qui igitur
non ponderat præcepta Hippocratis, &
Galenus facta cum alijs comparatione
renerent, eorum scientia ut uana, & peri-
culosa deberet explodi; magis enim po-
test hæc sententia, si de ordine medicatio-
namur, quod primo vrgenti, secundo

causæ, tertio impedimentis, & quanto
morbis sit attendendum, quam omnes
aliæ sententiæ in arte propositæ.

Qui vesicantia omninò explodit, quia
ab illis dolores moucantur, uigiliæ, & fe-
bres intenduntur in similem errorem la-
buntur, quoniam, si reuellant in contra-
rium humores virosos petentes cere-
brum, unde phrenesis, & mors, essent
adminiistranda. quamuis alia præterea in-
numerabilia mala. minoris momenti ef-
ficerent.

Itaque non illi cum ratione reiiciunt
in malignis febribus vesicantium uisum,
qui dicunt, inde excitari uigiliæ, dolo-
res & dysurias; sed qui probabunt maius
ex illis colligi maleficium, quam benefi-
cium: medici enim munus est perpende-
re detrimentum, & emolumentum, &
deinde minus malum eligere.

Quod cum ita sit non solum errant,
qui in omnibus febricitantibus reiiciunt
phægninata; uerum etiam, qui in omni
maligna febre hoc genus remedij propo-
nunt: rudis admodum esset ille medicus,
qui posset turgentes, & furiosos humores
caput incurfantes frictionibus, balneis, li-
gaturis, sanguinis missione reuellere, &
uellet vesicantibus id efficere: stupidus
tamen esset quoque ille, qui cum hæc re-
media nihil possent, essetque turgens hu-
mor ab his inuincibilis desisteret, & dum
certò uideat ægrotum perire non con-
scendat ad potentissima reuulsoria qua-
lia sunt vesicantia.

Errare uidentur, qui omnem conuul-
sionem factam a repletionem curât ijs, quæ
excitant febrem, ut est confectio anacar-
dina, castoreum, sassafras, oleum de there-
bentina, nulla prius facta distinctione
inter urgens, & causam, quia sic sper-
nunt urgens, & causæ attendunt; urgens
est uirtus nervorum imbecillis, quæ a ca-
lidis non custoditur, sed aliquando resol-
uitur, & enervatur.

Quod uerò ita sit, patet ex Galeno 5.
sect. aphorif. morum com. 20. qui dicit, ca-
lida reddere nervos imbecilles, quia dis-
solvunt eorum substantiam: similiter 6.
method. 2. dicens, quod neruea substan-
tia est res solubilis, habet hæc, ablutio aque
calide est inimica uulneratis nervis, quia
conditi sunt ex frigida, & cœcreta humi-
ditate;

ditate; si igitur aquæ calidæ perfusio nervis noceat, multo magis calidiora nocebunt; etenim calida etiam quatenus sicca nocebunt convulsos: qui ob siccitatem nervi magis tenduntur Gal. 2. de loc. aff. 7. dicit cordas citharæ non solum ab aere humido tendi sed etiam à siccis, & arido: laudatque Hipp. dicentem convulsionem fieri à repletione & inanitione, peioremque esse ex inanitione quæ ab exsiccantibus fit calida igitur magis ledent convulsos.

Secundo paralogizant, quia à particulari ad vniuersale procedunt: non valet, quamvis Hipp. & Galen. 4. aphorism. 70. dicant febrem quartanam superuenientem convulsis, eos sanare: ergo omnes convulsos sanabit, quia par est prius, ut differentie convulsionum in medium afferantur, deinde ex specifica differentia affectus, & non generica remedia colligantur.

Dicimus igitur ex Gal. quod alia convulsio fiat ex inanitione, & alia ex repletione: quæ fit ex inanitione facile cognoscitur; quia fieri solet post ingentissimum calorem, vigilias, fluxum alui, vel aliarum partium: hæc est lethalis, & solo prognostico relinquitur; quoniam absumpta est substantia nervæ, quæ non amplius refarcitur; debiles .n. sunt nervi & sui natura frigidi, & valde similes cerebro: imo Gal. 8. de usu p. c. 6. vult quolibet nervum esse paruum cerebrum rescitatum & durum: sicuti cerebrum velatur tenui & dura membrana: similiter nervi sic Hipp. in libde natura ossium vult à cerebro orti nervos. Erasistr. ut refert Gal. 7. de placitis cap. 3. dum erat iunior à cerebri membranis orti nervos putabat: dum senex à cerebro: sic omnes medici sapientiores à cerebro orti putabant: sed esse nervum ut dicit Gal. rescitatum cerebrum: verum siccitas si à causa præternaturam maior fiat oriuntur affectus concludamur & lethales.

Adest tamē alia convulsio ex inanitione, quæ non est fatalis, quia non absumitur nativa nervorum substantia; sed solum tos, ut accidit in heceticis primi gradus, & hæc humiditas potest restitui; huiusmodi convulsiones fieri solent à vaporibus malignis ortis ab æruginosis succis,

Sanctory Sanctory. Pars I.

vel à inorsu venenati animalis.

Quod vapores expirant ab æruginosis succis aliquando convulsiones efficiant, testis est Gal. 5. aphor. commun. 1. met. l. c. 8. & 5. de loc. affec. c. 6. vbi de quodā iuvene habet hæc verba: æruginæ per vomitū euacuatæ, febris, et convulsio licet cessant.

In hoc loco erratum quorundam notatur, qui convulsium à vaporibus æruginosis factum, auxilijs calidis tractasse vidimus, quem miserum, nisi natura æruginoso vomitu iuasset, certo perisset.

Quæ vero fit ex repletione facile quoque cognoscitur, quia nullo præcedente morbo tales convelluntur, quod quoque docet Gal. 2. aphorism. 26. vbi dicit, si sanus convellatur est ex repletionē: licet vero convulsio modò est cum febre, modò sine febre, si cū febre, potest esse illa, quæ ab apostemate fit; si sine febre, illa quæ refert à Gal. 3. præfag. 39. vbi dicit, excitari convulsionem sine febre à vehementi refrigeratione, & à copia crudorum, & crassorum humorum; quod postremum convulsionis genus calore febrili expellitur, vel si habitus sit carnosus, perfusione aquæ frigidæ curatur.

Refert Gal. 5. aphorism. 21. se iuvenem convulsium curasse aquæ frigidæ perfusione; ratio curationis est, quia aquæ frigiditas revocat ad internas partes calorem, qui deinde melius discutit frigidos humores in nervis insertos, quod remedium non solum fuit acceptum à Græcis, vetum fuit maximè in usu, & de illo Paulus, vbi agit de spasmo, nos docet aliqua pertinentia ad eius usum, dicit enim aquam frigidam ledere convulsium, vel quādo non est optimi, & carnosus habitus, vel quādo convulsio pædet ab apostemate.

Gal. lib. de causis procatarcticis c. 2. reprehendens Erasistratum, qui non concedebat frigidæ potionem in febre ardente: quia putabat, omnes febres ex phlegmone fieri, habet frigidæ potionem solvere febrem ardentem dummodo nulla obstat vicerum inflammatio.

Colligas ergo ex Galeno calida non conferre convulsioni factæ ab apostemate: neque illi, quæ efficitur à duritie relicta in sine apostematis, quia calidorum usu crassi humores lapidescunt; neque illi convulsioni quæ ex aura calida, vel ex

morſu fit, quia redderent affectum incurabilem: relinquuntur, vt conueniant conuulſioni factæ à frigidis, & à pituitosis humoribus alimetalibus, & non crudis, & concoctioni ineptis.

Pituitosi humores sunt in duplici differentia, alij alimetales, alij crudi, vitrei, & inepti, vt conuertantur in nutrimentum, quos calida, & febrem excitata duriores efficiunt: hanc sententiam ad verbum explicat Galenus 2. aphorismorum 26. his verbis, febrem curare conuulſionem factam ab humoribus glutinosis, & frigidis, quibus nutriuntur, tales enim virtute calidorum liqueſcunt, & partim in sudorem, & vaporem abeunt, partim vero in substantiam nutriti, crudi vero, & vitrei caloricis in tophos, & scyrthos conuertuntur.

Quod errent, qui vtuntur calidis in conuulſionibus factis à pituita non alimetalis ex dictis patet, patebit quoque quod empirici aliquando errent, dum in conuulſione facta à pituita alimetalis virtutem calidis, quia sprete methode non poterant causam, & vrgens, sæpe enim euenit, vt in huiusmodi conuulſis virtus nervorum sit adeo imbecilis, vt magis possit in indicando sui custodiam, quam possit causam pituitosa sui ablationem: hinc calida, quæ sua natura possent pituitam alimetalem digerere, quia debiles nervos in deteriore conditionem reducerent, Galenus respuit, dicit enim 5. aphorismorum 20. huiusmodi calida resolvere substantiam nervosam: sapientissime experientia nos docuit conuulſos ex repletione frigidorum humorum usu calidorum morte fuisse peremptos.

Falluntur, qui purgant ventriculi cruditates, dum stomachus morſum patitur, antequam corroboretur: erratum est illius generis, dum pluri faciunt causam, quam vrgens, causa est cruditas, oris morſus est vrgens, cui prius est attendendum, Gal. 1. ad Glau. c. 14. habet hæc verba, si quis febricitet, & addit ei plethorica dispositio, & ex recentibus cruditatibus fit, sentiatque morſum, & afflictum os ventriculi, vel etiam euomerit humorem malum, & in transitu esset læsum os ventriculi, vt anxie, & grauiter se habeat, prius stomachum corroborare debemus, deinde euacuare: addit, & aliquos perisse

vidi, & in periculum fuisse perductos ob euacuationem non roborato prius ore ventriculi Hipp. 2. apud mulieri cardiacia laboranti obtulit polentam cum succo granatorum cuius usu liberata fuit. Nos panem vino granatorum maceratum adhibuimus. Si vero addit febris accipimus præceptum Hipp. 7. aph. 56. ubi dicit anxietatem tolli à vino equali aquæ portione mixto.

Sæpe rudiores in febricitantibus existente plenitudine, nausea, stomachi cruditate, vomitu æruginosi mordentis os ventriculi conſurgunt ad vomitoria, vel ad medicinas purgatorias, sprete vitali indicatione, quæ consistit, vt roboretur os ventriculi: *ὅτι πορροδὲται, ὅτι* medicina facit magno cum ægrorum diſcrimine: prius igitur intrinsecus, & deinde extrinsecus esset stomachus roborandus, intrinsecus id fiet mastiche, pane igne toſto vinoque austero madefacto, vel granatorum extrinsecus emplastro à Gal. 1. ad Glau. c. 14. proposito, quod factum est palmulis, vino, farina hordei, croco, aloë, mastiche, madefactumue sit oleo mastiche, nardino, enanthi vino, & ijs, quæ constant ex absinthio.

Similiter, qui in splenicis incipiunt ab aperientibus, & non astringentibus aberrant, quia pluri faciunt indicationem præseruatoriam, quam vitalem: quod nullo modo in partibus flaccidis, vt est lien, est faciendum: vimur in ijs aqua chalybeata, tamarisco, scolopëdia clæuatio ex chalybe, quæ omnia virtutem astringentiam habent: hæc roborant lienem, & roboratus redditur valentior in expellendis excrementis: deinde eadem virtus astringentia defendit, ne fluentes humores à liene recipiantur: Hanc doctrinam apud Galenum legimus 11. meth. c. 16. ubi dicit, in lienis affectibus esse medicamentis admiscenda astringentia, ratio est, quia omnia aperientia destituta virtute astringentia insunt lienem: comprobatur experientia, saccharum, mel, & dulcia omnia, quæ aperientia sunt, tumidum ventrem, lienem, & quamlibet partem laxam lædere possunt.

Prima indicatio in parte flaccida excrementis quoque imbuta est robur addere parti.

Secunda est causam profligare, prima enim meritò desumitur à vita, secunda à causa: miscetur igitur cum aperientib. roborantia, vel eliguntur aperientia, quæ dissimilarem virtutem habent, vt tamariscus, citrach, & alia id genus.

Aberrant, dum firmiter tenent apparentib. papulis in maligna febre nunquàm esse mitèdum sanguinem è cubito: quia quamvis materia putrida indicet esse eò, quòd vergit educendum, attamen si adefset vrgens, quod indicaret per cubitum esse sanguinem extrahendū, ei prius attendere deberet, & nō materia putrida, quo malo vsu in maximū prolaberetur errorem, qui vterentur cucurbitulis.

Quod verò in malignis febribus, in quibus apparent papulæ contingere possit hoc vrgens, pater experientia, quia sæpè vidimus in ægrotatē febres malignas, papulas, & anginam, quæ suffocationem minabatur, cui dubium, quod tunc angina sit vrgens, cui prius attendamus oportet, & quod angina indicet, vt per cubitum sanguis copiosè extrahatur, & deinde per venam linguæ.

Similiter, si febris malignæ associetur pleuritis, vel iecoris inflammatio talis, quæ vicem vrgentis secundæ classis subeat, cui dubium, quod magis indicet inflammationem, quàm materia seu vapor putridus procliuis ad cutim efficiens papulas? & quod potius cubitum secundum, quam cucurbitulæ applicandæ sint?

Idem si magna exurgeret phrenesis à copia sanguinis prodiens, copia, cum sit prima radix, cui dubium, quod melius sit usque per cubitum, quam per cucurbitulas tolli posset?

Denique posset contingere, quod tota massa sanguinea ob copiam sanguinis inciperet putrescere, quod malum non potest arceri, nisi phlebotomia, quo casu, licet totum dorsum esset exanthematib. respersum, cucurbitulas sperneremus, & cubitum aperiremus, & merito: quia nisi copia per venam cubiti minuatur, certò æger periret.

Errant, dum in ijs, quorum pedes præ nimio frigore ad eò torpidi, & congelati sunt, vt sensum, & motum amittat, spernunt urgēs, id est indicationem vitalem, & attendunt causæ, id est congelationi:

tales enim, qui curant sem iuuos pedes, non cogitant vitale auxilium, quod prohibeat ne pedum vita extinguatur, sed solum auxilium calefaciens, semper scilicet hoc impetu incidentes in omni egritudine, vt credant prius causis, quam vrgentibus vacandum: admittunt, vt illi igne calefiant; nec vident, quod calor externus statim dissoluat natiuum robur, & deinde moriatur pars congelata, eaque mortua, nisi abscindatur pes, totum trahitur in consensum, & animal cito pereat oportet.

Duo hic committuntur errata, alterum dum nesciunt, quæ sint vrgentia, alterum dum primò causis, quàm vrgentibus attendunt: non sat est Medico, vt indicationes omnes colligat, sed oportet, vt in ordinem eas redigat, & perfecte sciat cui primò, cui secundò, cui tertio, & quarto sit attendendum, nullus enim est error magis insignis in arte medica, quàm, *ὡς ἔπος ἐστὶν ἰατρῶν* medicinam facere.

Vanissimi enim sunt, qui quotidie sine vilo indicantium æquilibrio dicunt, in temperies frigida indicat calefaciendum, materia crassa incidendum, viscida detergendum, copiosa euacuandum, petens partem principem auerendum, pars viribus perditā roborandum, non perfecte scientes, cui primò, & cui secundò loco sit vacandum, quem ordinem adeo nobis commendat Gal. 1. meth. c. 4. in presenti casu pedes vt frigidi indicant esse calefaciendos, vt viribus destituti custodiendos ijs, quæ possunt impedire, ne calor natiuus dissoluatur, cui dubium, quod in primis est attendendum vitæ parti, & deinde causæ, qui enim secus efficit, incidet in illum sermonem à Galeno citatum 2. ad Glauc. 2. scilicet, morbus est sanatus, homo autem perijt.

Qui igitur prius attendunt vrgenti, quique congelationem pedum sciunt sanare, curant, vt vitæ pedum conseruetur hoc modo, iubent, ut immergantur in aquam frigidam recentem à fonte haustā, detineanturque horæ spacio, sic certò sanantur: quem curandi modum multoties in Vngaria vidimus, ratio sanationis est, quia aqua vnit calorem debilem, & ferè extinctum, & simul tollit siccitatem congelationis, qua amota promptè natiuus

calor fouetur ab influente, & sic non extinguitur, sed potius augetur.

Sed occurrit, quia, quæ congelantur à frigido, liquefiunt à calido, quare pedes vel aliae partes à summo frigore congelatae calidis, & non aqua frigida deberent sanari: antecedens auctoritate Arist. & experientia videtur verum; glacies à frigido congelantur, & à calido dissoluitur; oleum increffatur à frigido, & liquefit à calido, similiter pix, cera, metalla, & reliqua omnia, quæ à frigido densantur à calido liquefiunt: similiter dicunt, si pedes fuerint congelati à frigido, hæc congelatio debet à calido vinci, & superari.

Respondetur dū dicunt, quæ congelantur à frigore à calido dissolui; at pedes, cōgelantur à frigore, ergo à calido dissoluentur: argumentum esse verissimum, sed in crē philosophicum, & non medicum, quia nullam habet relationem ad sanitatem, quia philosophi, dum pars cōgelata à frigore dissoluitur à calido, nihili existimant, an inde morbus, & mors partis, vel sanitas sequatur: pertinet tamen hæc consideratio ad medicum, qui pro virili sanitatem, & vitam conseruat: si calor externus non destrueret partem, longē melius esset congelatos illicō calefacere, vt statim omnia liquefcerent, sed cum destruat hoc modo pars viuēs, medici officium erit id respuere. Quæ ab Arist. in lib. mete. habentur, dum dicit, crystallum, & adamantem ab ingenti calore dissolui, aurifices, qui volunt integros adamantes, & crystallos conseruare non recipere: similiter medici à philosophis sunt omnino diuersi: quoniam fines sunt quodque diuersi; philosophi veritatem, medici sanitatem querunt.

Insuper auctoritas Arist. si eam rectē interpretabimur, non aduersabitur nobis: dicimus, quæ congelantur frigido & sicco, vel summe cōgelari, vel remissē, si summe, dicimus; quod dissoluantur solum à vehementissimo calore, vt crystallus, & adamans; si remissē congelentur, dissoluantur tum à calido humido actu, tum ab humido frigido, sed hoc discrimine, vt calidum humidum actu dissoluatur, & consumetur, humidum verò frigidum dissoluatur, & non consumetur: hinc fit, quod quibus congelantur pedes a-

qua calida, vel calido igneo pars congelata consumatur, & pereat; si verò in aquam frigidam imponantur, ob aquæ humiditatem frigiditas dissoluitur, & non petit pars; causa est, quia aqua frigida à fonte profundo hausta non habet vim absumendi calidum narium, patet experientia, quia dū injicitur glacies in aquā frigidam, dissoluitur, & non absumitur: si vero in aquam calidam, vel in ignem, non solum glacies dissoluitur, sed aliquantum absumitur, quia in vaporem aliquæ partes abeunt.

Neque obieciat, quod humidum non dissoluatur frigidum, quia non est eius contrarium.

Respondemus, quod humidum dissoluit frigidum congelatum, quatenus omnis congelatio sua siccitate lædit: torpor in partibus congelatis fit immediatē à sicco, & non à frigido: hinc Gal. 1. simpl. med. facul. dicit, quod congelari sit præ frigore durescere; at dura redduntur mollia suo contratio, humiditate scilicet; redditaque parte congelata molliori, robur narium seminiue partis ab influente potest refocilari, & nuttiri, quod antea non poterat.

Casus in quibus empirici pluris faciunt morbum, quam impedimenta.

Cap. X.

Ostensum est superius, quod post vrgentia primo causis, deinde impedimentis, & tandem morbis sit attendendum: non desunt tamen casus in quibus rudiores, spreto hoc mirabili medicandi ordine, pluris faciant morbum, quam impedimenta.

Hoc erratum præcipuē obseruatur, dum apostema cum copioso pure, & duritie secant, & permittunt, vt statim (nullo expenso indicantium æquilibrio) totum egrediatur; pluris faciunt magnitudinem auctam, quam subiectam duritiæ: deberent doloris demulcendi gratia permitttere, vt solum putis aliqua portio egrediatur; primò ne vires debilitentur: secundo quia pus coctum, dum relinquitur, detergit, & secat materiam, quæ efficit duritiem, eam dissoluit, & liquat: nullum medicamentum locale tan-

ri, est in duritie inflammationis auferenda, quanti est pus: quinimò, dum pus totum euacuatur, materia, quæ relinquitur pori duritiem subit, & aliquando redditur incurabilis.

Reluctatur Gal. 13. met. c. 5. ubi aperte ijs verbis reicit, qui incidunt apostema, & totum pus euacuant, si pus aliquod notabile in suppurante particula sit contentum, non expedit (quod nonnulli faciunt) protinus incidere; sed digestionem molliori medicamentis ad id valentibus, quippe cum phlegmones naturæ, si quicquam in membro adhuc restat, acria medicamenta magis irritant, quam digerant.

Galenique tempore aderant, qui totum pus egredi permittebant, adeoque duos, & cyrthos tumores reddebant, ut nec resoluentibus, nec emollientibus poterant superare duritiem, quia tenue absumitur, & quod relinquitur lapidescit: Emollientia non possunt id efficere; quia humor durus debet secari, & attenuari ad minima, quod non ab emollientibus extetnis, sed à pute tangente, rebellem humorem; pus enim est efficiens proximum, & eiusdem speciei, quod vniç secare, & attenuare potest præterea ob nimiam puris euacuationem vires maximè debilitantur.

Insuper aduerfantur methodo à Galeno posita 7. method. cap. 12. ubi post urgentia primò causis; secundo impedimentis, & demum morbis vult esse vacandum: quia prius tollunt totum pus, quam duritiem, pluri faciunt morbum, quam causam sine qua non, seu impedimentum, quod in idem recidit: durities est causa sine qua non tollitur inflammatio, licet enim totum pus egrediatur, si durities aliqua relinquatur, iterum inflammabitur pars: magnitudo aucta ob puris copiam est morbus; non licet in methodo prius attendere magnitudini auctæ, quæ est morbus, quam duritiei, quæ esse potest causa.

Similiter, dum hæmorrhoidarum symptomata urgentia ab humore sanguineo pronenientia curant, applicando vnguentum, sanguifugas, & similia, spernunt causam, quæ est humor prodicens à superioribus partibus; primo enim humori fluenti, & fluxuro est vacandum reuellentibus:

accommodatissimum auxilium reuulsorium in accensa passione hæmorrhoidum à fluxione humorum facta, est sanguinis euacuatio per saluatellam, si bis, terne tridui spatio tundatur.

Errata illorum, qui potius indicantibus, quam prohibentibus potentioribus attendunt. Cap. X.

Qui vtuntur diureticis in ijs, qui abundant cruditatibus, ut plurimum ægros lædunt, quia sæpè numero magis potest cruditas in prohibendo, quam possit in indicando; dicimus sæpè, & non semper; quia dum vrina in superioribus partibus detinetur, & omnino supprimatur; tunc licet cruditas magna sit; nihilominus ad potentissima diuretica, qualia sunt cantarides, confugimus.

Quod cruditas magis prohibeat diuretica, quam indicet; est Galeni 4. de tuenda sanitate, ubi habetur, quod diuretica non sint in habentibus cruditates exhibenda; quia sanguinem calefaciunt, & liquant; additque non conuenire humoribus, qui debent coqui; tantam vexationem, & meritò, quia concoctio ex Hipp. 4. de ratione vict. in acut. 44. quiete fit.

Insuper diuretica secum ferunt cruditates ad intra venas, unde obstructions, & putredines fiunt.

Amplius diureticis fecernuntur tenues; & relinquuntur crassiores humores: Galenus 5. de simp. med. facul. cap. 12. interdicebat diuretica ijs, qui expuunt pus, quia secretis ichoribus pus crassius, & tenacius redditur; addit loco citato, diuretica nobis aduersari, quia sunt calefactoria, exsiccatoria, secretoria, & constrictoria; inde colligi potest in asthmaticis diuretica non habere locum: quinimò, nec medicamenta, quæ serosos humores euacuant, qualia sunt mana, elaterium, scamonium, & alia id genus.

In hoc loco illorum opinio reijci potest, qui cum intellexerint manam esse pectori amicam, eam porrigunt ijs, qui pectus cruditatibus onustum habent; nec vident, erudos siccos crassiores, & concoctioni magis rebelles fieri, dum seceruntur serum: sæpissimè experientia cognouimus, similes exhibitione manæ in deterriorem statum fuisse prolapsos: natura

tura vult crassos succos reddere fluidos : qui verò exhibent mannam, scamonium fecernunt ichores, & reliquias humorum crassiores efficiunt, quod relictatur Hippocrati, qui secunda sectione aph. 9. dicit, quod corpora purganda sint facienda fluida : sicuti crudus humor non est medicamentum euacuandus, quia solum cocti, seu fluidi humores apti sunt euacuationi, similiter crudus humor non erit diureticis mouendus; quoniam vsu diureticorum fecernuntur ichores, & inde crassiores, & tenaciores euadunt humores: sicuti medicamenta non conueniunt, quia siccant, & calfaciunt; similiter diuretica non continent; sicuti medicamenta commotionem, & vexationem faciendæ coctioni sunt impedimento, idem de diureticis dici poterit.

Hinc errant, qui in principiis morborum, quando corpora crudis succis abundant, exhibent hoc seminum mellonum, petroselinum, & alia id genus.

Similiter errant dum in nephriticis, artritide catenatis referunt cruditatibus vtuntur therebinto Cypri.

Idem, qui vtuntur mouentibus menses, dum corpus est cruditatibus onustum, lædunt, nisi euacuatio totius præcedat, quinimodò sæpè mouentur menses à secta basilica, quia depleto venarum trunco, qui est tanquam omnium venarum tons, venulæ vteri vndequeq; nimietate sanguinis crassioris, & tenacioris obturata statim aperiuntur, & natura inde promptius suorum officiorum munera explet.

Si verò cruditas, non vt causa morbi, sed vt vrgens indicaret, tunc prohibentia superius relata non haberent locum, quia semper magis potest vrgens, quam causa: sunt quibus vrina supprimitur, quod symptoma subit vicem vrgentis, tunc spretis prohibentibus vtuntur valentissimis diureticis.

Similiter dum crudi humores habent impetum ad cor, vel ad cerebrum, tunc reuulsionis gratia vtuntur catharticis & diureticis; quia magis potest imminens periculus, ne scilicet virtus visceris principalis cadat, quam possit cruditas, & reliqui affectus, qui non pertinent ad urgentiam primæ, vel secundæ clâsis.

Similiter spernunt Rudiores prohibentia potentiora, & attendunt indicantibus leuioribus, dum crudis existentibus humoribus utuntur frictionibus, balneis, exercitio, cucurbitulis, & inunctionibus foras cruda trahentibus.

Quod erratum à Gal. 4. de tuenda sanitate capite sexto reprehenditur, ubi habet ferè hæc verba, cavendum est, ne crudi succi foras trahantur, & ne mordaces intro reuocentur, quæ uerò foras trahere possunt crudos humores sunt exercitatio, frictio, balneum, fomenta calida, & unctio calefaciens: quot sunt Empirici, qui in principiis morborum utuntur frictionibus, balneis, fomentis calidis, & inunctionibus calidis spreta Galeni auctoritate, & ratione, quæ aperte suadet, ne cruda trahantur à maioribus ad minores uenas ob insignes obstructions, quas cruda efficerent.

Offenditur exemplo localium, quod qualibet sententia medicorum sit methodi censura moderanda. Cap. XII.

Videntur aberrare, qui seuerè sustinent, localia nunquã applicari posse sine totius purgatione; quod illos mouet est Gal. auctoritas, ratio, & experientia: quorum fundamenta cum sine methodo sint expensa, crunt reiiciendæ: afferunt Gal. locum 2. de loc. aff. 3. ubi legitur, quod topica semper sint adhibenda præmissa totius corporis euacuatione.

Alius locus est secundo ad Glauc. ca. 2. ubi dicit, quod duo committantur errata in inflammationibus, primum dum non habetur prouidentia totius, secundum, dum laxantibus utimur; addit Gal. prius totum esse euacuandum; secundum esse repellendum; tertio detergendum; quarto robur esse parti affectæ addendum.

Demum quarto Methodi quarto dicit, totum prius esse euacuandum à superuacuis, quod Empirici, Dogmatici, & omnes Philosophi admittunt præter Thesalum: in hoc loco animaduerti potest differentia inter præcos empiricos, & nostrates; illi enim ante localium appositionem semper purgabant totum; ij uerò nunquam cogitant totius euacuationem; quod est longè maius erratum.

Ratio,

Ratio, qua vtuntur, cur ante oppositionem localium semper sit corpus purgandum, est, quia si fiet morbus à causis internis purgando totum remouebimus morbum tollendo eius causas, si ab externis, purgando ab excrementis internis non iouebitur morbus.

Experientia probatur, quia ocyus sanantur à Chirurgis, qui purgantur: colligunt itaque ante localium appositionem semper esse purgandum totum.

Nihilominus, dum Medicus Dogmaticus animum conuertit ad indicantium potentiam, videbit quod aliquando quælibet auctoritas Galeni expensa extra Methodum potest lectorem fallere, & decipere, quia quælibet causa, & quodlibet impedimentum, dum vrgens superuenit, spernitur: Exempla in Medicina sunt innumerabilia.

Hippoc. in princ. Paroxysmorum dicit, nullum esse dandum cibum; attamen, si Methodo considerabitur sententia Hippoc. inueniemus, quod aliquando non sit vera; sicuti in picrocholis, & his, qui diatrioticon habent, de quibus loquens Galenus octauo Methodi secundo dicit, quod in principio accessionis, ne in marasimum cadant, sint nutriendi.

Quinimo Gal. repetit lib. de causis procatartice casum illius adolescētis emaciati qui cum febre eum horrore cepit, Medici Romani iusserūt, vt ante tertiam inuasionem nihil daretur: Gal. verò iussit, vt uberrimè lauaretur, & cibus humidus, & vinum ante occasionem daretur: quod in alia occasione cibus ante accessionem valde noceret.

Ecce, quod medica præcepta, nisi Methodo ponderentur, & moderentur, sæpè nos fallere possint.

Quinimo quodlibet Galeni, & Hippoc. remedium vanum reddi potest nõ seruata sententia proposita 3. Meth. 9. & 12. Meth. 12. quæ est, primò vrgenti esse attendendum, secundò causæ principali, tertio causæ sine qua nõ, & quarto morbis: febris, vt febris non exposcit vinum, similiter bilis, quæ potest esse causa febris uino angetur, nihilominus, si cum febre esset syncope vinum esset exhibendum, propter vrgens.

Similiter in aenrismate abscindimus

arterias; in morsu viperæ manus, quia vrgentia sic præcipiunt.

Ad eundem modum dicimus, quod totum hæc conditione ante localium appositionem est purgandum, scilicet nisi aliquod vrgens impediatur: Hinc Gale. 14. met. 9. dicit, in cancro tam in purgationis tempore, quam ante esse repellendum; si igitur topicis repellentibus vti possumus in cancro, licet corpus non sit purgatum, sequitur, quod hæc sententia, quod localia nõ apponantur nisi purgetur totum, non sit semper vera; ratio desumitur ab vrgente indicante, quod magis potest, quàm causa: vrgēs est imminens periculum, ne locus affectus ob concursum humoris atri moriatur, causa est humor ater, hinc est, quod prima die vtitur repellentibus in cancro gratia conseruationis partis.

Neque obijciant, quod non conueniat repellere à parte ignobiliori ad nobiliorem, quia dum agitur de vita partis, agitur de vrgente, dum verò dicimus, quod non conueniat ab ignobiliori ad nobiliorem partem repellere sine consideratione vite partis, agitur de indicante: præterea repulsus humor, & receptus à sanis partibus longè melius, & expeditius poterit sufferr.

Hinc Gale. 14. met. 17. loquens de herpete dicit, aliquando humoris paucillum repelli ad interna sine damno, quia viscera interna, vt fortiora promptius superant, resoluūt noxia excrementa, hæc sunt Gal. uerba: etiam si modicū repellatur in corpus, & ad partes principes, id damnum non infert, cum à visceribus resoluatur; dum igitur corpus non ualde abundat biliosis succis, & herpes incipiat, plurius faciendum est, ne aliqua corporis particula exedatur, quam biliosis succi, qui tamen neque multis, neque ualde mordaces sint, quauis impellantur ad viscera interna, quia ibi facilius superantur.

Hinc, dum Phrenesis de repente adortitur ægrotantem, utimur prima die repellentibus, uidelicet oxyrodinis, & deinde statim incipimus corpus expurgare; & ratio est, quia quæ purgant totum respiciunt ad causam: quæ caput tutantur respiciunt ad vrgens, cui primo est attendendum.

In hoc loco quorundam error notatur,

tur, dum in phrenesi, incipiente non audent prima die uti oxyrodinis; errant, quia interim, dum totum purgant, uacant primò causæ & deinde urgenti; quæ prepostera medicina mortis causa in plurimis esse potest, quoniam, dum humor in caput est confluxus, & extra uenas expulsus, non potest amplius repercutientibus propelli, quinimò ibi manente humore plura exitiosa, & urgentia Symptomata exurgunt.

Insuper præter topica repellentia pos. sunt aliquando administrari ante totius purgationem digerentia, quia ut plurimum pro sedandis doloribus utimur omni tempore anodynus digerentibus, calidis scilicet in primo gradu, & tenuium partium.

Causa uero, cur ante totius purgationem liceat uti anodynus, est, quia dolor si magnus sit, subit uicem urgentis, si moderis quoq; sit, subit uicem causæ magis principalis, cui prius est vacandum, quam impedimentis, in quorum cathologo collocantur totius excrementa: Gal. 3. de mor. vulg. tex. 76. docet, quando fomentis, ijsq; humidis uti possimus ante totius purgationem, habetq; hæc verba, nisi ex antecedenti nictus ratione nulla plenitudo in corpore appareat, uti licebit remediis localibus ad dolorem mitigandum, ut fomentis humidisque medicamentis, & facultate calidis, & si per hæc non sedetur totum corpus euacuandum: ualebit ergo ex Gal. præcessit moderata uiuendi ratio, ergo localia anodyna ante totius purgationem parti dolenti possunt applicari, quod non dicimus de insigni dolore, quia subit uicem urgentis, uehemens enim dolor quamuis maxima sit corporis plenitudo, eius trahit ad se curationem, quam corpus purgetur.

Quod Galenus, & Hippocrates vsu sint localibus ante euacuationem totius, plurima sunt exempla; in Anaxione sexta die Hippocrates usus est fomentationibus, ut dolorem auferret, & deinde octaua die secuit cubitum: similiter in Larissa caluo apposuit fomenta coxis ante totius purgationem, ut illuc excrementa confluerent. Præterea Gal. 13. met. c. 5. dicit, si corpus non sit plethoricum, uel prauo fuceo reddidit, calida, & humida super

phlegmonem apponemus, ut lana calente oleo imbuta, & calidum cataplasma ulceri ex farina triticea, hordeacea cum aqua, & oleo, idem quoque conuenit adenis, si inflammentur: at si corpus sit plethoricum, uel cacocymum, hæc laxantia excitant fluxionem ad locum affectum, ecce quod sententia, quod localia non sint apponenda, nisi purgato corpore, non est perpetuæ ueritatis: insuper primo de humoribus com. 12. habentur hæc: si corpus non habeat plenitudinem, uel sit refertum malis humoribus in pleuritide statim confugimus ad localia, de qua re diximus etiam in casu Anaxionis.

Ad fundamenta illorum, qui semper ante localium usum euacuât totum, facilius est responsio, quia nos admittimus, Galen. auctoritates propositas solum esse intelligendas re motis vrgentibus, dum enim topica indicantur ab vrgentibus, sperniuntur morbi, causæ, & impedimenta, & illis primo attendimus.

Concludi igitur potest, quod facta cōparatione inter morbum, & causâ; si topica applicentur morbo, absque causæ ablatione, vanum reddi topicorum usum topicaque applicari posse ante euacuationem totius, dum dolor est insignis, quia est vrgens: similiter corpus non indiget purgatione, quia sit excrementorum expertus, ut de Larissa caluo dictum est: Insuper dicimus topica prima die applicari, quando dolor est præcipua causa fluxionis, ut de Anaxione dictum est.

Hinc errant, qui in leuissimis doloribus, articularibus statim, quamuis non sit totum euacuâtum, nõ vtuntur anodynus, errant inquam, quia insignis dolor subit uicem vrgentis: Secundò errant, quia est causa principalis fluxionis, cui secundo loco est attendendum; errant similiter nõnulli, qui eadem seueritate detestantur anodyna ante euacuationem totius in ijs, qui dolore insigni cruciantur, æquè ac in ijs, qui mediocri uexantur.

An in febribus cum alui fluxu conueniat pharmacum, uel phlebotomia.

Cap. XII.

DVm in ægro multæ seuiunt egritudines, Medicus, nisi prænoscat quæ sunt

sint vrgentes, & inter illas, quæ magis vrgeat, quæ sint causæ aliorum, & inter causas, quæ magis foveat, & inter impedimenta quod primò, & principaliter impediat, non Medici nomen, sed circulatoris breui spatio sibi compararet; hoc sanè conuenit studiosis, qui non expendant, vel examinant methodi arcana, sed solum colligunt Galeni, & Hipp. sententias, illasque mouentur, nulla facta affectuum comparatione, seu indicantium examine: exemplum, qui diatrioton excolebant, in paroxysmis cibum non dabant, hocque consentiebat aphor. Hippoc. dicentis, in paroxysmis esse abstinendum à cibo, attamen Gal. docet, esse nutriendos diatriotes in principio accessionis, quod non reluctatur Hippoc. qui in aphorismo proposito respicit causam præter naturam, quæ re vera non potest à natura vinci, dum est intenta, & occupata expulsionem putrescentis humoris; Galenus vero non causas, sed vrgentia respexit, ne scilicet diatrioti ob inediam fiant tabidi, & certò percant, quod quam maximè vrget.

Hac distinctione admoniti decidere poterimus illam nostratam questionem, quæ est, an in febricitantibus cum alui fluore liceat vti medicinis, & phlebotomia: monstrates enim sunt bipartiti: aliqui tenent, quod in febricitantibus cum alui fluore nunquam sit sanguis mittendus, vel pharmacum exhibendum: quamuis euacuatio non sit præ multitudinis ratione; aliqui inter quos est Antonius ab Altomari dicunt, quod si natura non integrè moueat, quamuis fluxus non sit præ multitudinis ratione possit pharmaco, & phlebotomia curari.

Vtraque tamen Medicorum secta à præcipuis Gal. fundamentis deflectere videtur; quia moueat natura integrè, vel non integrè, accedit, vt modò lenientia, & phlebotomia conueniant, modo verò aduersentur, & ratio est, quia indicantia modo magis indicant, quam prohibent, & modo prohibentia magis prohibent, quam indicent.

Exemplum, sit aliquis febre correptus cum alui fluore, cum periculo ne ob nimiam euacuationem robur cadat, & inde non vincatur febris, tunc haud dubiè

prius erit attendendum viribus, quia in indicando sui custodiam magis possunt, quam febris sui ablatione; quo casu neque pharmacū, neque phlebotomia conueniet: si verò febris illa esset admodum, maligna, & si uor non esset præ multitudinis ratione, tunc si immineret periculū, vt malignitas furiosè obreperet cor, seu cerebrum cū certo fore mortis periculo, tunc haud dubiè magis vrget furiosa malignitas, quam timor, ne cadat virtus ob medicinam, vel phlebotomiā, quo casu, si vera sit sententia, quod ei, cui magis vrget sit attendendum, coacti medicinam, vel phlebotomiam laudabimus.

Exempla, quæ possunt confirmare hanc opinionem, plura habentur in medicina, sicuti est illud famosum, dum in febricitantibus cum maximo sanguinis fluore vti-mus phlebotomia; etenim in febricitantibus cum maxima eruptione sanguinis è naribus nullum haftenus est inuentum remedium, quod magis iunet, quā ex parte directè opposita sanguinē mittere, quod cum ita re vera sit, cur non licebit in febriciente cum diminuto alui fluore aliquā leuem medicinam exhibere? vel clysterē iniicere ex decocto mercurialis, quo ita libenter Hipp. utebatur, vt narrat 7. apud. in casu Aristocratis: nemo est qui nesciat fluorem sanguineum magis posse in frangendis viribus, quam alui fluori.

Neque propterea dicimus, fluxum diminutum semper esse lenientibus tractandum, sed solum, dum magis potest indicans, quam prohibens, quod expensis indicantium comparationibus superius declaratis optimè cognosci poterit.

Sat est in hoc capite, vt propositis exemplis destruamus hanc vniuersalem propositionem, in febriciente cum alui fluore, quamuis fluori non sit præ multitudinis ratione, non esse euacuandum: destruitur virtute huius principij, scilicet vrgentiori semper esse prius vacandum; potest enim, vt diximus, accidere, quod indicans magis vrgeat, quam timor, ne vires ob fluxum pereant.

Qui tenent pharmacum, & phlebotomiam habere locum in fluxu alui cum febre, colligunt ex Galeno 4. de rat. uic. in ac. 64. vbi dicit, quod si biliosa deorsum repant dandum sit scamonium, qua biliosa

liosa purgantur.

Insuper 1. aphor. 20. dicit Hippocrates, quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè, non esse medicamentis, nec alijs irritamentis mouendum: quare argumento ex oppositis sumpto dicimus, quod diminutus fluxus supponat non integrè indicari, & per consequens naturâ exposcere medicamenta, vel irritamèta per locum, quod expedit: est Galeni 6. de morb. vulg. Com. 2. text. 28. reuellendum esse, si non repant humores, quod expediat, uiamque esse aperiendam, si repant, quod expedit: ex ijs inferunt in fluxu, qui non sit præ multitudinis ratione, vias esse aperiendas medicamento, vel quouis alio ingenio.

Quæ fundamèta sunt omnino à principijs methodi aliena dum dicunt, dandum esse scamoniû, dum bilis habet raptû deorsum: respondemus, quod raptus valde differt à fluxu, fluxus .n. symptoma in excutè mutato, raptus vero non est motus symptomaticus, sed motus naturæ, de quo Gal. primo ad Glau. c. 14. dum de alui fluxu loquitur, non intelligit.

Similiter dum dicunt, quod natura, dum integrè non mouet in alui fluxu, sic medicamentis adiuuanda: occurrimus, quod Galeni auctoritas primo ad Glau. loco citato sit de fluxu, qui est morbi motus, aphorismus verò de motu naturæ.

Alomar. lib. de inor. c. 73. interpretatur Galen. 1. ad Glau. cap. 14. quod loquatur de fluxu critico, & non symptomatico, quæ interpretatio vera esse non potest, quia tēpus euacuandi per phlebotomiam non est in declinatione, sed in principio, quo tempore motus critici non sunt.

Quod vero in principio non fiant motus critici, patet ex Gal. 4. aphor. 22. ubi dicit, si quid excernitur in principio morbi, nihil ratione naturæ excerni, sed omnia esse symptomatica, quinimodò subdit, ante motum critici cū præire coctionem, subsequi discretionem, & postea euacuationem, quo tempore non est cogitandum de phlebotomia; locutus igitur est Gal. de motu symptomatico, & non de critico.

Præterea in criticis motionibus non est timendum, quod ægri ob medicinas pereant, quoniam in critica euacuatione statim vires subleuantur, quare de motu symptomatico, & non critico intellexit.

Insuper Galenus prohibet phlebotomiam, & medicinas in fluxu, ne viribus factis debilioribus patiens multorum dierum spatium ob fluxum continuum peccet; quis dicet, quod fluxus, qui multorum dierum intervallo perduret vocetur criticus?

Demû fluxus criticus nō est verendus, quia omnis crisis fit in declinatione, & in declinatione nemo moritur, ergo Galenus locis citatis locutus est de fluxu symptomatico, & non critico.

Similiter errant, qui seuerè sustinent, nunquam esse phlebotomandum, vel aluum mouendam, dum est fluor alui symptomaticus, & cum febre iunctus, quia si indicans pharmacum, vel phlebotomiam vrgeat, nos docet Galen. 3. methodi 9. cetera omnia indicantia, & præcepta sperni.

Præterea symptoma duplex est vel ratione temporis, vel ratione humoris, dū scilicet humor peccans est pituita, & euacuatio sit biliosa, tale symptoma non est iuuandum: ratione temporis est, dum in biliosa materia bilis euacuatur non coacta materia, & tale est iuuandum.

Qui Galeni, & Hippocratis auctoritates adducunt, easque deinde non examinant in methodo medendi, quamuis ad verbum omnes referrent, nihil de arte medica intelligerent; methodi enim sapienter putant, Galeni sententias sibi esse parum coherentes, exempli causa quarto de rat. vict. in ac. legunt, quod cor, ora ægrorum quieti sint permittenda: prima scēth. aphor. quod in principio, si materia turgeat, corpora ægrorum pharmaco sint tractanda: similiter in principio paroxi sinorū, quod nihil cibi sit dandum: 8 methodi in principio Paroxysmorum picrocholos esse nutriendos; nisi methodi trutinā omnia perpendant, nunquam hos nodos tollent.

Methodi examen præcipuum est, vt sibilpsis ante oculos hoc proponant, vt semper sit attendendum prius vrgeri, quam causis, impedimentis, & morbis; & inter vrgeria prius vrgeri: cui dubium, quod corpora ægrorum temper quieti sint permittenda gratia coactionis: cui dubium, quod si turgeat materia, quod sperni possit quies, vt prohibea-

mus ne turgidæ materiæ feriant cor, & vitam tollant.

Similiter nihil cibi dandum in accessione, attamen, si immineat leticia, spernitur, quod minoris est momenti.

Idem Galen. 2. aphor. 24. dicit, quod si dysenteria incipiat ab atra bile, sit mortale; si verò quiescat atra bilis non nasei hæc mala, ecce quod quies modò habet locum, modò spernitur, habet locum, quia dum mouetur atra bilis potest intestina exedere, ideo hac ratione nō est medicamento mouēda, spernitur aliquādo, quia potest accidere dum quiescit, vt paulò post magno cum impetu feriat cor, & mortem adferre possit: quis posset mederi, nisi perfectè expenderet, quodnam ex illis minetur certiore mortem?

Sic igitur procedimus, si cordis symptoma magis vrgeat, quā intestinorum; quod dysenteria, pharmacum omninò standum est, quamuis intēdatur dysenteria; quia symptoma cordis minus potest præcaueri, quam dysenteria, quæ loriciatibus aliquomodo minuitur: semper prudens medicus potius dubiam salutem, prosequi debet, quam certam mortem.

Postremò dicimus, quod Altimarus cum alijs perperam interpretatur Galeni sententiam primo ad Glauc. 14. dum dicit, si febris sit cum profluio ventris, alia non est opus euacuatione, quamuis non sit præ multitudinis ratione, quia ibi Gal. loquitur de læsione oris ventriculi, in quo casu dicit, stomachum prius esse corroborandum, quam euacuandum, additque hæc verba: aliquos perijisse vidit; & in periculum perductos ob euacuationem non roborato prius ore ventriculi, subditque sed neque si fuerit febris cum profluio ventris alia est opus euacuatione, quamuis non sit præ multitudinis ratione, nam si quis repletum hominem euacuabit per ventrem, vel ei sanguinem mittit in grauiora pericula illum ducet; ecce quod Galeni ob aliam causam loco citato nō vult in fluxu euacuare, vel sanguinem mittere, nisi quia os ventriculi sit læsum, ob quā læsionem imminet periculum, ne ob euacuationem in cardialgiam, vel alios deteriores affectus ægri incidant: quæ Galeni sententia methodo cum primis coheret, quia

urgenti prius, quam causæ attendit.

Non negat Galen. fluxum aliquando posse tolli euacuantibus, sed solum facta comparatione inter urgens, id est inter damnum dependens ab imminente cardialgia, & beneficium euacuationis peccantis causæ, dicere videtur, quod magis uacandū imminenti cardialgia, quam euacuationi, quia magis urget: non negat Galen. 2. aphor. 24. quando quis esset robusto ventre, si periretque diminutè fluenter, materia esset insignis, & uirulenta, instaret periculum ne quantulum retenta exederet intestina, & quantum retenta necum excitaret, quod periret, & phlegma fluxu euacuantibus ventrem posset tolli botomia, quæ ex omnium sententia phlegmalem uiscerum effrenem, cui esse præcausa fluxionis compefit.

Hinc Alexander Trallianus loquēs de dysenteria, ne æger in grauiora mala cadat, laudat modò purgationē, modò sanguinis euacuationem, si uires dysenteria correptus habeat robustas: eodem spiritu Auicenn. 4. primi c. 3. dixit, fluxum fluxu tolli: quare omnes sententiæ Gal. & Hippocr. aut moderande facta comparatione indicantium, hæc scilicet lege, ut urgentiori prius sit uacandum, secundo causæ magis principali, deinde impedimentis, & postremò morbis.

Ostendit: r. vanam, & Medico indignam esse Archigenis opinionem, quod semper a leuioribus auxilijs sit exordienda morborum cura. Cap. XIV.

Queritur rādem, an Archigenis sententia uera sit, quæ est, an in qualibet ægritudine curanda, auspicandum sit à leuioribus auxilijs: Archigeni reluctatur in primis Hippocr. qui dicit in aph. quod extremis morbis extrema remedia sint adhibenda: Galen. quoque non semper à leuioribus exorditur, sed solum in morbis non periculosis, 5. enim method. c. 15. hæc uerborum serè exprimit suam sententiam contra Ardraginē: sicuti medicorum nonnulli ceniunt à paruis incipiendum auxilijs, & deinde ad maiora; in morbis enim ubi non impendet periculum, uera est opinio, ubi impendet, alienissimum est à ratione à minoribus auxilijs auspicari.

Ratio

Ratio verò potissima, cur à leuioribus non sit inchoandum, hæc est, indicans præter naturam vnū indicat, quia vnum vni est contrarium; quare si indicans indicabit potentissimum remedium, leues quoque indicare non poterit; quia duo indicaret, quod relictat Gal. 9. meth. 12. & 11. meth. 13. est. n. necessarium, vt verum remediū sit vel leuius, vel potius, ambo esse non possunt, quia ratione remediū est, vt vincat, superet ægritudinem, si igitur leue remedium sufficit in victoria contra affectum lædendum remedium parum ægritudinem, & nouam introductam ægritudinem.

Dignum in morbis, vbi non imminet Gal. dicitur mortis, à leuioribus esse imperandum, quia hoc videtur aduersari sibi ipsi, qui 14. meth. vlt. loquens de pterygio dixit, pterygij parui detergentibus, magni chirurgicis auxilijs sunt tollendi, at sic est, quod pterygium magnum non minatur mortis periculum, ergo sententia Gal. dubia, & perplexa esse videtur.

Gal. vindicari potest, quia 5. meth. vlt. non est locus de remedijs pertinentibus ad indicationem, sed ad experientiam, & analogisimum, quæ duo instrumenta versantur circa coniecturam, quasi quod diceret, si non immineret periculum, & indicationes specificæ sint occultæ, varia nos posse experiri, sed hac conditione, vt tutò procedamus, scilicet incipiendo à leuioribus, ne ægrum potentioribus remedijs lædamus: at si morbus per indicationem cognoscatur, tunc certò scimus, quale debeat esse remediū, quod vnicum esse debet, & non plura, quia indicans indicat vnum: si indicans indicaret remedium validum, vanissimus esset ille Medicus, qui leue exporrigeret, quia illud leue nihil faceret, & frustra tempus Medicus tereret: si in pterygio magno vteremur detergentibus centum annorum tractu, nihil omnino proficeremus, quia solum ferrum, vel ignis sint proportionata indicata, vel materiæ indicatorum.

Itaque, quia in methodo medendi solum per indicationem remedia perquirimus, & quodlibet indicans vnum indicat, vnicum erit remedium: si verò non cognoscatur morbus per indicationem,

& non immineat mortis periculum, antequam ascendamus ad potentiora remedia, à leuioribus exordimur.

Conferentes omnia, quæ dicta sunt in hoc libro in Epilogum, dicimus, quod in primò docuimus tres methodos pro cognoscendis affectuum ideis; prima quantum transferebat nos ad cognoscendam symptomatum omnium coordinationem: secunda per signa propria: tertia per syndromem signorum communium in cognitionem omnium formarum ægritudinum nos ducebat: hæcque exemplis adeo manifestis est illustrata, vt quilibet rudis inde animaduertet errata, quæ in hac contemplatione contingere poterunt.

In 2. lib. traduntur normæ quibus cognoscere possimus, quando affectuū ideæ sint per essentiam, & quādo per consensum.

In tertio agitur, quomodo specificæ formæ affectuum cognoscantur.

In quarto quomodo metiri possimus recessum morborum à statu naturali, egimusque de consuetudine, vt profundius hæc materies de morborum ideis nosceretur.

Peracta contemplatione pertinente ad ægritudinum formas, sequuntur sex libri de cognitione peccantium humorum: in quorum primo ostendimus, quæ sint signa propria peccantium humorum.

In secundo lib. quæ sit artificiosa syndrome signorum communium pro cognoscendis absconditis humoribus in corporis latebris existentibus ostendimus.

In tertio de humorum misturis, & quot possint esse in viuentibus.

In 4. de principijs reconditarum caus.

In 5. de quantitate, & in 6. de motu peccantium humorum.

Peracta contemplatione causarum efficiendum, sequuntur quinque libri in quibus egimus de solertia pro inueniendis ægritudinum remedijs; in quorum primo agitur de principijs meth. medendi.

In 2. quomodo remedia per analogisimum, & experientiam perquirantur.

In 3. qua arte administrari debeant remedia.

In 4. de reuulsione, & deriuatione.

In postremo lib. egimus de indicantiū æquilibrio, merito quorū librorū omnia errata, quæ ab empiricis fieri possint quilibet studiosus facile detegere poterit.

